






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4869/A









Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4869/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4869/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4869/A

4869

A


A xix. o



55450  
PAVLI AEGI-  
NETAE MEDICI  
OPERA,

\*  
A<sup>o</sup> IOANNE GVINTE-  
rio Andernaco Medico exercitatissi-  
mo summiq[ue] iudici[um] conuersa,  
& illustrata com-  
*Joanne* mentarijs. *L. Laribeyrie*

Adiectæ sunt annotationes IACOBI GOV-  
PYLI medici Parisiensis, in aliquot sin-  
gulorum librorum capita.



LVGDVN I,

Apud Guliel. Rouillium sub scuto Veneto.

M. D. L I.

Cum Privilegio Regis.

*Antonius Laribeyrie D.m.*



EXTRAICT DES LET-  
tres du priuilege du Roy.



PAR grace & priuilege du Roy est permis à Guillaume Rouille libraire de Lyon, de imprimer, ou faire imprimer vne foys ou plusieurs, les œuvres de PAVLVS AEGINETA en Latin, avec les corrections & annotations de Monsieur M. IAQVES GOVPIL Docteur en Medecine, que ledict Rouille a recouuertes depuis quelque temps en ça. Et faict defences de par ledit seigneur, à tous autres libraires, imprimeurs & personnes quelconques, de non imprimer, ne faire imprimer, vèdre ne distribuer, en ses païs, terres & Seigneuries, lesditz liures de PAVLVS AEGINETA, avec lesdictes annotations & correctiōs, sans le vouloir & consentement dudit Rouille: sur les peines contenues esdictes lettres de priuilege: & ce iusques au temps & terme de six ans, à compter du iour & datte que sera paracheuée la premiere impressiō: comme plus à plein est contenu esdictes lettres de priuilege, sur ce données à Saint Germain en Laye le xj. Iour de septembre, Lan de grace M. D. L.

*Par le Roy, l'Euesque de Bayonne, Maistre des  
Requestes ordinaire de l'hostel present.*

Signé Guyneau

*Et seelé du grand seau, en cire  
jaune, à simple queue.*





# AD ILLVSTRIS. ET REVERENDISS.

CARDINALEM D. O. COLLI-  
GNIVM CASTILLIO-

NAEVM,

\*

IACOBI GOPYLI MEDI-  
CI PRAEFATIO.



*V*M apud me reputo, qua ratione doctissi-  
mi quidam homines medendi artem, eiusq;  
scriptores restituere nō ita pridem aggressi  
sunt, eandem illos viam, qua qui artes pri-  
mum constituerunt, tenuisse video. Nam  
prisci earum inuentores & quasi architecti, parua quaedam  
initia posuerunt, quibus noua in singulos dies posteri adstruē-  
tes, quod inchoatum tantum erat, perfecerunt. neq; enim ar-  
tes & disciplina tam perfecte absolui potuissent, nisi multi ad  
eam rem certatim operas suas contulissent. Quod Hippocrates  
quoque significare videtur, nō solum inueniri artes in hoc tam  
exiguo, tamque breui vitae momento non posse, sed ad discen-  
dum, quae ab alijs inuenta sunt, breuem hanc vitam esse, dicti-  
tans. Huius autem rei fidem ex historia facere nobis licet, ar-  
tium initia cogitantibus. Et ne longius abeamus, rudis initio  
& vulgaris medicina fuit, ut imperitissimae etiam gentes  
herbas, aliq; prompta in auxilium vulnerum morborum-  
que nouerint, veruntamen apud Gracos vetustissimus auctor



*Aesculapius eam excoluit, ut ob diuinum illud beneficium,*  
*quo genus hominum affecerat, in Deorum numerū receptus*  
*fit. Huius deinde duo filij Podalyrius & Machaon bello troia-*  
*no ducem Agamennonem sequuti, non mediocrem opem cō-*  
*militonibus suis attulerunt: quos tamen Homerus non in pe-*  
*stilentia, neque in varijs generibus morborum aliquid auxi-*  
*lij attulisse, sed vulneribus tantummodo ferro & medicamē-*  
*tis mederi solutos esse proposuit. Post eos nonnulli clari viri me-*  
*dicinam exercuerunt, donec maiore studio literarum discipli-*  
*na hac agitari, & pars sapientiæ haberi cœpit: ut & morbo-*  
*rum curatio & rerum naturæ contemplatio sub iisdem aucto-*  
*ribus nata sit. ideoque multis ex sapientiæ professoribus peri-*  
*tos huius fuisse accepimus: clarissimos Verò ex his Pythago-*  
*ram, Empedoclem & Democritum, cuius (ut quidam credi-*  
*derunt) discipulus Hippocrates Cōs vir arte & facundia in-*  
*signis, primus quidem ex omnibus memoria dignis artem*  
*hanc diligenter exercuit, & per eum salutaris ista nobis pro-*  
*fessio multum increuit. Post quem Diocles Carystius, deinde*  
*Praxagoras, & Chrysippus, tum Herophilus, & Erasistrat-*  
*us eam horridam adhuc sic excoluerunt, ut magnum*  
*splendorem ei accersuerint. qui cum aliquandiū luxisset, desi-*  
*nentibus præsertim Græcorum scholis obsoleuit, ut non minor*  
*postea opera ad restituendum huic arti nitorem suum confe-*  
*renda fuerit, quam studium in ea absoluenda positum fuerat.*  
*& certè nisi viri quidam egregiè cordati intra hos centum*  
*annos in eo euigilassent, ut rei medicæ auctoribus à prioribus*  
*seculis malè habitis opem aliquam ferrent, nulla ægris medi-*  
*cina salutariter adhiberetur. quanquam hi quidem efficere*  
*non potuerunt ut in medicorum libris, quasi in tenebris homi-*  
*nes præsertim parum videntes nihil offenderent. Quod ta-*  
*mē in eā partē accipi velim, ut nemo me illis insultare putet.*  
*Pro magno enim illo beneficio, quo vniuersam τῶν φιλία πῶν*  
*natio*



nationem affecerunt, maximas ijs gratias agēdas & habē-  
 das iudico. Nam & nisi Timotheus (quemadmodum Ari-  
 stoteles ait) fuisset, non haberemus tam absolutam musicam:  
 & nisi Phrynis eum antecessisset, talis non euasisset: ita nisi  
 principes illi viri viam ad huius auctoris lectionem, tanquam  
 ad inaccessam antea locorum difficultatibus regionem, muni-  
 uissent, labor Herculis hic exantlandus fuisset, atque stabulum  
 quoddam Augiæ repurgandum, tantum abest, ut hoc bel-  
 lum à me profligatum & confectum dicam: tamen quod à  
 me præstitum est non leuem victoriam iudicabunt hi, qui  
 multos huius auctoris locos, peruersos & conturbatos, à nobis  
 restitutos atque explicatos intelligent. Quem laborem eò lu-  
 bentius suscepi, quod cum ab hinc tres annos Alexandri  
 Tralliani libros ex Regia Bibliotheca depromptos emēdassent  
 atque edidissent, sic studium hoc meum doctis quibusdam ho-  
 minibus, qui mihi pro centum millibus sunt, probaui, ut ni-  
 hil tam artis medicæ studiosorum interesse censuerint, quàm  
 ætatis illius auctores restituere, in qua naturalis nitor medici-  
 næ inerat, non fucatus. Ad te verò patrone benignissime  
 quod commentatus sum ob eam maxime causam mit-  
 tere volui, ut nihil mihi antiquius esse intelli-  
 gas, quàm ut tuæ voluntati paream, hoc  
 est, ut ex hoc otio, quod mihi tua  
 benignitate cōrigit, aliquid  
 ad communem fru-  
 ctum afferam.  
 Vale.







AD HONORA-  
TISSIMUM VI-  
RUM IOANNEM  
BELLAIUM CARDI-  
NALEM ET EPI-  
SCOPUM PA-  
RISIEN-  
SEM,

\*

IOANNIS GVINTERII  
*Andernaci Medici in Paulum  
Aeginetam præfatio.*

\*



QVAM olim Pauli Aeginetæ  
interpretationem latinam  
tibi dicaui, vir honorate, &  
omni dignitate princeps, eā  
rursus maiore nunc cura, &  
fide ad vetusta exemplaria,  
ipsiusq; artis rationem exa-  
ctam, recognitamq; ac bre-  
uibus quibusdam commentariis illustratam offe-  
ro: non dubitans, quin illam eo sis animo exceptu-  
rus, quo olim veluti rudimenta, & prima operum  
nostrorum exercitia solebas. Hoc autem nomine  
potif



potissimum offero: vt egregiis tuis in me beneficiis, literata quadam remuneratione, ac debita beneuolentiæ memoria gratiam reponam. Tu siquidem iuuentutis nostræ studiis ad optimas quasque artes celebrandas, recolendasq; fauere nunquā destitisti: per te labores nostri, qualescunque in Græcis medicinæ autoribus suscepti, clarissimo Francorum Regi Francisco innotuerunt. Vnde mihi non vulgaria præmia, & data sunt, & proposita, siue ad opes, siue ad gratiam. Ergo quicquid à me vnquam exactius eruditiusque prouenerit, id omne iure tibi optimo debere me libenter agnoscam. Cui enim potius aliquis otij sui fructum acceptum referre poterit, quàm Meccænati suo, & patrono, ei que eruditione, prudentia, & pietate excellentissimo? sub cuius etiam nominis celebritate, & patrocinio tutior, à maleuolis, & vitilitigatoribus esse possit. Nam hodie ita comparatum est, vt statim vbi quis ingenij sui foeturas magno partas sudore in publicū ediderit, nonnulli malefieriati homines, acutius atq; acrius vitia quàm recta videant: auctori potius, quàm codicum deprauationi ascribentes, quanquam nullius hactenus fuerit philosophiæ, aut medicinæ interpretes, quem non sæpius aberrasse demonstrare possem. Nullus autem labor in disciplinis veteribus instaurandis, magis quidē negotii, & molestiæ plenus, minus autē auctori gloriosus suscipi queat, quā qui in autoribus cōuertēdis insumitur. Id quod ego annis iā fat multis experior, dū cōmunibus hominū studiis & publicæ vtilitati prodesse cogito. Cū enim olim Lutetiæ



medicinam publicè docerem, non paucos obiter  
Græcorum libros scholæ nostræ quasi latinitate  
donauī, ac in hoc præsertim excudendos permisi:  
primum vt amicis aliquot gratificarer: deinde vt  
haberē ex veteribus medicis, quos studiosis præ-  
legerem. Eos tamen libros ex tempore sic potius  
quàm cura translato, interim per interualla reuise-  
re, ac recognoscere decreueram, maius aliquando  
otium, & meliorum codicum exemplaria nactus,  
sine quibus nihil posse quemlibet ingeniosum pu-  
to. Inter cæteros Paulum quoque Aeginetam,  
excellentem medicinæ scriptorem, annis mille de-  
sideratum, primus integrum latinum facere sum  
aggressus: ea sanè causa & ratione, vt post ampla  
illa Galeni theorematum compendiosum aliquem au-  
thorem scholæ nostræ haberent, ex quo meden-  
di rationem, quam practicem vocant, fideliter con-  
discerent. Paulus siquidem omnes recentiores à  
Galeno citra controuersiam compendio, ordine,  
artificio, perspicuitate, & doctrina superat. Adde  
quòd multa eruditè tractet, aliis aut intacta, aut  
etiam incognita. Quid de parte chirurgica di-  
cam? quam ita feliciter & dilucidè persequitur, vt  
Auicenna ille Arabicæ familiæ princeps non pau-  
ca in suum librum mutuare sit dignatus. Porro  
quòd ad partes meas attinet, in hisce septem Pau-  
li libris plurimum laboris mihi subeundum fuit,  
tum exemplarium vitio, quamuis tria contige-  
rint diuersa, tum quòd in Chirurgica vel instru-  
mentorum nomine difficillima, nulli fere Latini  
autores habeantur, quos tutò queas imitari. Quip-  
pe is



pe is semper mihi in vertendis Græcorum monumentis fuit animus, vt præter fidem, purè omnia Latine & planè quoad eius fieri potuit, exprimerem. Quanquam hodie multos agrestes hircosósque philosophos, si diis placet, videre liceat, quos impolita, & rudia magis delectant. Ex horum numero nonnulli grauiore disciplina exponere aggressi, vocabulis sordidis, & à politiore humanitate alienis fœdarunt, contaminaruntque. Vnde fit, vt qui paulò humanius educati, institutique sint, non reformident illas adeò sed fugiant, oderint, & despiciant: cum magis referret egregias mentes, præclaræque ingenia, sermonis venustate, & elegantia, ad seueriores illas, vt ita dicam, matronas allicere. Quod

an nos in hoc opere præstitimus, aliorum esto iudicium: certe sedulò


conati sumus. Vale vir clarissime apud Medi-

diomatri-

ces.

\*

2 5







PAULI AEGI-  
NETAE PERIODE  
VTI IN SVVM DE  
RE MEDICA  
OPVS,

PRAEFATIO.

*Pauli laborem nosce me, qui plurimas  
Inuisit orbis terras, Aegina satus.*



NON EQV IDEM opus hoc, quasi veteres aliqua arti necessaria pratermiserint, componere sum aggressus, sed totam vè disciplinam in compendiu redigerem. E' contrario enim illi rectè quidem omnia & integrè elaborauerunt: recentiores autem praterquam quòd illos ne legere quidem curant, etiam loquacitatis adhuc coarguunt. Quæ ratione impulsus volumen istud elucubraui, quod illis fanè qui ipsum, vt verisimile est, habere velint, eorum quæ legerunt commentarius, mihi verò exercitij loco erit. Absurdum nanque fuerit rhetoras quidem compendiosis vti libellis iudicialibus, & ad circumferendum accommodis, in quibus legum capita continentur, vt dum vsus postulat, in promptu habeât, nos verò, nullam eorum habere rationem: quum illis non pauco tantum, sed iam longo etiam tempore, legibus inspiciundis immorari, ac differre iudicium liceat, nobis neutiquam, aut certe rarò ea facultas concedatur. Etenim necessitas in quibusdam morbis frequenter nullam ferens dilationem, subitam concertationem opemq; postulat. ob quod rectè Hippocrates occasionem dixit præcipientem.



## P R A E F A T I O.

tem. Illos præterea in solis ferè vrbibus rerum vtilitas incitat, & vbi libri nequaquam desiderantur: medicis autem non tantum in vrbibus, aut agris, aut etiam locis desertis, verum iam quoque per mare frequenter in ipsis nauibus subita morborum necessitas ingruit, in quibus dilatio mortem, aut omnino extremum adfert discrimen. Quoniam igitur vniuersas medendi rationes, aut particularem omnem materiam memoria tenere vel difficillimè, vel nequaquam aliquis possit, compendium hoc ex veteribus collegi. Nulla enim de meo inserui, nisi paucula quædam in artis operibus mihi & visa & comperta. Nam in pluribus egregiis authoribus, magisquæ in Oribasio versatus, qui & ipse librum totum, quo vniuersam de tuenda valetudine rationem comprehendit, aliunde collegit: vtpote Galeno posterior, adeoque recentior adhuc, optima quæque ex ipsis selegi, nullum quatenus licuit, ex morbis prætergressus. Et enim Oribasij ipsius volumen, à septuaginta libris quos continet Hebdomecontabiblon appellatum, quod totam in se artis materiam complectitur, non omnes, quod grandius sit comparare sibi possunt. In huius autem Epitome ad Eustatium scripta, præterquàm quod plerique morbi non attingantur, etiam imperfectam reliquorum præceptionem videas, partim causarum, partim signorum, nonnunquam & curatio integra desideratur, ceu alia in memoriam venerint.

P R A E S E N S autem commentarius notas, causas, & curationem omnium morborum continet, simularium, instrumentariorum, & eorum quæ ad vnitatis diuortium pertinent: idque non summatim, sed quatenus licet amplè & diffuse. Ante hæc autem omnem victus rationem quæ sanitati tuendæ facit, exposuimus. Postremum autem librum de simplicibus compositisque medicamentis conscripsimus.

*Quid singuli septem totius operis libri, nam totidem  
habentur, contineant.*

P R I M V S omnem sanitatis tuendæ rationem tradit. item quomodo morbi peculiare ætatibus, anni temporibus, temperaturis, aliisque nonnullis, caueantur, emendenturque. Præterea ciborum omnium vires & vsus habet, ut in capitibus comprehensum est.

I E C



## P R A E F A T I O.

**S E C V N D V S** febreis vniuersas enumerat, ita vt præponantur ipsis, quæ eò conferunt, exempli gratia, notæ ex recrementis, diebus decretoriis, & id genus aliæ. Subiunguntur autem casus qui febribus superueniunt.

**T E R T I V S** affectus declarat, qui singulis corporis partibus obueniunt sic vt à summo capite ad imos pedes, adeoq; vngueis descendat.

**Q V A R T V S** agit de exterioribus, & veluti in aperto contractis vitiis, quorum non certæ sedes assignari possunt, sed plureis particulas infestant. In quo & de tineis & dracunculis tractatur.

**Q V I N T V S** de animalibus ictu, morsive venenum relinquentibus differit, vbi & de rabiosi canis morsu, & metu aquæ, adhæc de non rabidi canis morsu hominisq; agitur. Inibi de venenis eorumq; remediis disputatur.

**S E X T V S** chirurgicam omnem exponit, tum quæ carnis vitia curat, vbi & teli extrahendi ratio comprehenditur, tum quæ ossium fracturas, luxationesque artuum completur.

**S E P T I M V S** omnium medicamentorum vireis continet, primum quidem simplicium, deinde & compositorum, eorumq; potius quæ in sex aliorum librorum discursu commemini, præsertim maiorum & nominatarum compositionum. Scio enim illic non omneis diffusè explicari, ne disciplina tedium afferat: tum, vt quærens aliquis vnâ, aut etiam plureis nobileis confecturas, faciliè inueniat. In fine adduntur nonnulla ad medicamentorum compositiones utilia. Item de alternantibus inuicem remediis agitur, vt totus liber in disciplinam de ponderibus & mensuris desinat. Incipiemus itaq; primum volumen.

**P R I M V S** totius operis hic liber est, in quo omnia sanitatis tuendæ præcepta tradidimus, quemadmodum iam in præfatione dictum est. dicenturq; iterum capita, vbi tantum hoc prælibauerimus; quòd in primo, & secundo volumine plurima ex Oribasio mutuati sumus. Non enim peculiarem volumus constituere opinionem, sed ex omnibus utilitatem indipisci. In reliquis quinque libris paucissima tantum ex illius commentariis huc transtuli.

C A P I





# CAPITA PRIM LIBRI.

\*



VAE grauidis superueniāt, & quæ victus ratio con- ducat.	cap.1
De nutrice.	cap.2
De lacte nutricis.	cap.3
Quomodo lac vitiatū cor- rigatur.	cap.4
Educatio pueri.	cap.5
De pustulis puero obortis quæ exanthemata di- cuntur.	cap.6
De tussi & grauedine pueri.	cap.7
De pruritu gingiuarum.	cap.8
De dentium ortu.	cap.9
De oris vlceribus, quæ aphthæ dicuntur.	cap.10
Ad femorum intertrigines.	cap.11
Ad aures humentes.	cap.12
De Syriasi.	cap.13
Ratio victus infantium, atq; reliquarum deinceps ætatum ad vsq; declinantes.	cap.14
De frictione præparatoria quæ parasceuaſtice di- citur.	cap.15
De exercitatione.	cap.16
De ex	



# C A P I T A

De exercitationum generibus.	cap. 17
De generibus frictionum.	cap. 18
De vocis exercitatione.	cap. 19
De lassitudinibus ob exercitationem.	cap. 20
De cute astricta.	cap. 21
De spontaneis lassitudinibus.	cap. 22
Ratio victus senum.	cap. 23
De rugoso corpore.	cap. 24
Qua ratione corpus suauius oleat.	cap. 25
Quomodo habitus recalescat.	cap. 26
Quomodo color malus emendetur.	cap. 27
Ad liuores.	cap. 28
Quomodo dentes ab iniuria afferantur.	cap. 29
Quomodo grauis auditus corrigatur.	cap. 30
Ad oculorum caligines.	cap. 31
De repletionem.	cap. 32
De ebrietate.	cap. 33
Quibus cibi corrumpuntur.	cap. 34
De Venere.	cap. 35
Ad eos qui venerem exercere nequeunt.	cap. 36
De iis qui immodicè coierint.	cap. 37
Si semen genitale redundet.	cap. 38
Si perfrictio nocuit.	cap. 39
Si insolatus adussit.	cap. 40
De pituita in superiore ventriculo redundante.	
cap. 41	
Quomodo facilè quis vomat.	cap. 42
Quæ fanis aluum subducant, & quæ vrinam moueant.	cap. 43
De clysteribus.	cap. 44
De glandibus.	cap. 45
	De iis



# PRIMI LIBRI.

De iis quæ per os, & nareis caput euacuant: quæq; eisdem partibus delinuntur.	cap. 46
Quæ menses ducunt.	cap. 47
Quæ sudorem mouent.	cap. 48
De aëre.	cap. 49
De aquis.	cap. 50
De lauacris.	cap. 51
De balneis naturalibus.	cap. 52
Quæ victus ratio quolibet anni tempore sit utilis.	cap. 53
Victus eorum qui in laboribus vitam agunt.	cap. 54
Proficiscentium victus ratio.	cap. 55
Nauigantium victus.	cap. 56
Quomodo extenuetur corpus.	cap. 57
Quomodo tenues impleantur.	cap. 58
De partium attenuatarum curatione.	cap. 59
Optimi temperamenti notæ.	cap. 60
Intemperatorum corporum notæ.	cap. 61
De capitis formatione.	cap. 62
Temperaturæ cerebri notæ.	cap. 63
Ventriculi temperaturæ notæ.	cap. 64
Pulmonis notæ.	cap. 65
Cordis notæ.	cap. 66
Iocinoris temperaturæ notæ.	cap. 67
Testiculorum temperaturæ notæ.	cap. 68
Quæ prætermiffa sunt.	cap. 69
Quomodo calida intemperies corrigatur.	cap. 70
Quomodo frigida intemperies emendetur.	ca. 71
Quomodo	



## CAPITA I. LIBRI.

Quomodo ficca intemperies in ventriculo veluti exemplo, deinde & alia corrigantur.	cap. 72
De alimentorum facultatibus.	cap. 73
De oleribus.	cap. 74
De asparagis.	cap. 75
De radicibus quæ cibi rationem obtinent.	cap. 76
De tuberibus & fungis.	cap. 77
De frumentaceis.	cap. 78
De leguminibus.	cap. 79
De fugacibus fructibus.	cap. 80
De arborum fructibus.	cap. 81
De animalibus, & primò de volatilibus.	cap. 82
De ouis.	cap. 83
De terrestribus animalibus.	cap. 84
De partibus animalium.	cap. 85
De lacte, & terrestrium sanguine.	cap. 86
De lactis potione.	cap. 87
De lacte scissili.	cap. 88
De caseo.	cap. 89
De piscibus.	cap. 90
De testaceis.	cap. 91
De malaciis.	cap. 92
De cartilagineis.	cap. 93
De cetaceis.	cap. 94
De vini viribus.	cap. 95
De melle & mulsa.	cap. 96
De somno.	cap. 97
De vigilia.	cap. 98
De sopore.	cap. 99
Dioclis epistola, ad valetudinem tuendam con- scripta.	cap. 100

PAVL



P A V L I A E G I-  
N E T A E L I B E R P R I

M V S, I O A N N E G V I N-  
T E R I O A N D E R N A C O

M E D I C O I N T E R-

P R E T E.

\*

*Quæ grauidis superueniant, & quæ victus ratio  
eis conducatur. C A P. I.*



VANDOQ V IDEM inter ea  
quæ grauidis superueniunt, hæc  
potissimū infestare solent, sto-  
machi exundatio, continuæ vo-  
mitiones, sputa crebra, oris vē-  
tricoli rosio, & cibi fastidiū: non  
alienum fuit remedia quibus ab  
eis vindicentur, præscribere.  
Profunt itaq; obambulationes,  
cibi non nimium dulces, vina

fulua, odora, maxime quinquennia, & moderata potio. Hæc  
enim omnia ne mulier stomachi exundationem experiatur  
vomatq; impediunt. At medicamenti nomine, vincit poly-  
gonium herbam aqua elixam bibere. item anethum & pon-  
ticam radicem, quæ indigeti vocabulo rha nuncupatur, hæc  
tum ante, tum post cibū licet assumere. Extrinsecus præcor-  
dia adiuuari debent cataplasmate ex ænanthe balauftio,  
† cytisi smyrniiq; coma, & fœniculi semine, siue per se, siue  
quomodocūq; voles miscere, cū palmulis & vino veteri, Ad-  
uersus stomachi rosiones confert, calidā aquā bibere, quiete  
inambulare, præcordia contegere lana molli. At eas quæ ci-  
bum fastidiunt, variis & ad voluptatem quæsitis cibis amy-  
loq; sicco sollicitabis. magis autē hoc obruleris iis quæ ter-  
rā edere cōcupiscunt, vt in malacia, quod viciū Græcis Citta  
dicitur, accidere cōsuevit. id tertio à cōceptu mense potissi-



PAULI AEGINETAE

num contrahitur. Nam tunc id quod in utero est, quicquid ratione alimentum ad ipsum fertur, tanquam imbecillius, nequit consumere, unde fit, ut quum varia ex eo recrementa in stomacho grauidæ redundent, varia & naturæ aliena appetat, exempli gratia, carbones extinctos, cretam Cimoliam, aliaque; complura. Hanc enim ob causam appellationem huiusmodi affectus accepit, vel à picæ auis varietate, vel quod eadem subinde hoc malo corripiatur. Iam labor, & longior peregrinatio etiam stomachum ad cibos excitat. Quæ verò mulier citra labores agere consuevit, ea si uterum gerat, haud commode repentinas subibit motiones. Verum acria quandoque gustare, præsertimque sinapi, cibum fastidienti non fuerit alienum. Ceterum eximios pedum tumores, quos œdemata Græci dicunt, anthyllis quæ in aceto maduerit, foliaque; brassicæ in latum super deligata discutiunt. Item Cimolia creta ex aceto illita, similiter alumen cum aceto proficit. Rectè etiam pedes malorum medicorum, quæ Citria aliàs dicuntur, in aqua decoctorum iure lauantur.

† Hic locus sic legitur in veteribus libris manuscriptis, ἐξωθεν δὲ οὐ  
 γὰρ διὰ τὴν βαλάντιον, καὶ λυγρὴν, καὶ οὐκ ἐστὶν λόγος, καὶ παραδίδωμι σπέρματι,  
 διὸν τε καὶ ὡς ἂν μίσηται ἐν δόξῃ μὲν πρὸς τοὺς, καὶ οὐκ ἔστιν ἡ ἀνάγκη  
 πλάσσει, &c. Quæ lectio magis probatur, quod cytius accommodatio  
 sit huic medicamento, quam cytisus.

De Nutrice.

CAP. I I.

**D**Eligi nutrix debet, nulli morbo obnoxia, ætate nec vetula nimium, nec adolescens, ita ut iunior quinq; & viginti annos compleuerit, grandior quinque & triginta non excedat: pectore sit amplo, mammis magnis, papillis neque conuiuentibus neque; auersis: reliquo corpore nec admodum obeso, nec nimium gracili. Præterea magnum est infanti commodum, si nutrix non multo antè pepererit, maiusque; si masculum. Vitanda ei sunt, admodum siccantia, salia, acria, acerba, acida, amara, & validè calefacientia. Item odores tum fædi, tum suauis præter modum, condimenta, aliaque acria nocent. Ad hæc venere nutrix abstineat, manus humerosque molendo texendoque; exerceat: puerum vlnis gestet, preis iam menses quatuorve natum.

De lacte Nutricis.

CAP. I I I.

**L**audatissimum lac est, moderatum spissitudine, copia, colore, odore, & gustu. Commendatur & quod in vnguem



quem pollicis instillatum, eo inclinato ad lucem, neq; subito neque tarde videtur defluere. Iam verò in hunc modum probari potest: infuso lacti in vas vitreum coaguli exiguum admiscetur, digitisq; agitur. in quo postquam cōcreuerit, inspicietur, num casei portio minorquàm serum fuerit. hoc enim lac inutile est: contrarium huic, concoctu contumax: probatissimum quod utraq; habet mediocria,

*Quomodo lac vitiatum corrigatur.*

CAP. II II I.

**L**ac vitiatum hoc modo corrigi debet, si crassius fuerit, pituita vomitu elicietur, qui optime oxymelite epoto citatur: laboribus etiam cibum præcedentibus eadem extenuabitur. Tunc nimirum in cibo conducunt, origanum, hyssopum, satureia, scandix & thymus, item raphani momentum, vetusq; salsamentum cum oxymelite. At si acrius tenuiusque lac euaserit, multis quidem tunc laboribus nutricem leuare, sorbitionibus autem & carnibus suillis, sapæque & vini dulcis potu, reficere conuenit. Si lac fuerit imminutum, sorbitionibus & pleniori modo sustentanda est, vinum dulce potui dabitur: pectus & mamillas perfricare oportet. Iisdem cucurbitula quoque defixa abundè præstitit. Medicamenta verò etsi lacti generando proficere quidem aliquid sciam, non tamen frequenter ipsis uti præceperim, ut quæ violentius consumant. est autem fœniculi radix, & semen, ptisanæ incocta: item cytisi folia ex vino nigro aut ptisana: melanthium in passo & anethum, pastinacæ radix atque semē, quæ calida prius irroratis admouenda sunt. Omni verò lacte vitioso, siue crassum, siue acre fuerit & fœtidum, prius emulcto, puer mamillis admouendus est. Lac autem acre nunquam ieiuno adhiberi debet, fœtorem eius vinum odoratum & cibi dulces emendare possunt. Porro de caseato lacte tertio volumine in capite de mamillis tractabimus.

*Educatio pueri.*

CAP. V.

**P**rimum infans recens natus melle nutriri debet: mox lacte, idq; bis die, aut plurimum ter, cum autem promptè & alacriter puer assumit, ac spes est eum posse quod oblatum est concoquere, tunc iam & cibus solidior rectè datur qui non ipsum repleat. At si fortè imprudentibus nobis puer repletus fuerit, somniculosior autem statim &



PAULI AEGINETAE

torpidus magis euadat, venter intumescat, inflaturque, & urinae aquosiores reddantur, quae repletionis notae sunt, nihil exhibere oportet, donec cibos prius ingestos consumpserit. Abundè autem fuerit, duobus annis lacte puerum enutrire, inde ad cibos solidiores transgredi.

*De pustulis puero obortis quae Exanthemata dicuntur.*

CAP. VI.

**P**ustulis quae quòd puero per cutem veluti efflorescunt, Graeci *ἑξάνθηματα* nominant, primum sanè nullū facessere negotium oportet, vbi verò probè ad summa eruperint, tunc iā curare tentabimus, balneis, quibus iniiciantur myrtum aut lentiscum, aut rosa. deinde rosaceo aut lentiscino vtendū: ceratoq; cum cerussa, ad hæc nitro abstergere lenius expedit: nam valentiora non sustinebit. Optimum verò est nutricem dulciori victu vti. Laudatur autè maximè si puer etiam ipse neq; plenior, neq; nimis tenui cibo alatur. At si venter ipsius non respondeat, tunc mel cibo infusum simul coquerere oportet: si ne sic quidem descenderit, terebinthinæ instar ciceris iniicies. Humectata aluo, milium potissimū offerre conducit.

*De tussi & grauedine pueri.*

CAP. VII.

**Q**uod si quandoque tussicula aut grauedo puerū affligat, melitismi dicti adhiberi debent. Conuenit igitur puero liberaliore aqua calida loto caput ipsius melle copioso calido illinere, deinde digito linguam leniter premere: multum enim hoc pacto pituitæ vomitu egeret.

† *De gingiuarum pruritu.* CAP. VIII.

**P**urientibus gingiuis fomento vtendum est, & liberali vntione ex oleo discocto, in quo ceræ momentum cliquatum sit.

† *In margine alterius exemplaris manuscripti hæc verba leguntur, ὁ δὲ ἑξ ὧν οὗτος ἔστιν ὁ ἀπὸ τοῦ οὐλοῦ ἐπὶ τοῦ μέντοι οὐλοῦ ὁ δὲ. Id est, Odaxesmus est supernuacanea quedam caro adnata gingiuis similis dentibus.*

*De dentium ortu.*

CAP. IX.

**D**entiunt septimo quidem mense pueri: experiuntur autem tunc inflammationes gingiuarum, maxillarum, & tendinum, aliquando etiam cōuulsionones. Tunc igitur puero nihil dandum, quod mādi postulet. digito autem in lauacro gin



gingiuæ continenter contrectari, & gallinaceo adipe vel leporis cerebello emolliri debet. Vbi iam dentes prodierint, ceruix, caput, & maxillæ delicatis lanis puris contegentur, oleoque dulci & calido fouebuntur: idemque meatibus auditoriis instillabitur. Cæterum plenius infantem tunc alere, & calida lauare oportet: & si alui profluuiū experiatur, tentabimus eam epithematis quæ præcipuè sistunt, contrahere, inspergendo lanæ cuminum, aut anethum, aut apium.

Salutare est etiam semen rosarum admiscere, & summum † calidè desiccare. At si venter nihil reddit, melle in glâdis figuram coacto inferius leniter irritabitur, aut nepita detrita cum melle illinetur. Porro conuulsionibus puero- rum optimè videtur auxiliari heliotropium in aqua elixū, si puer in hac lauetur. confert & irinò aut cyprino, & sycio- nio perungere, & vniuersum calefacere. Cum autem exortis dentibus digitos mordet vulneratque, bene faciet radicem iridis derafam, nec admodum siccam, ore cōtinere. Hoc re- medium vlceribus quoque opitulatur: butyrumq; cum mel- le illitum adiuuat. Gingiuarum autem pruritus, veteris sal- samenti caro lenit.

† In veteri codice hoc loco duplex est scriptura: prior enim *ngēi dñwē dēpuaivay ngēi xpōivay*. Posterior *ngēi dēpuaivay xpōivay*, calido de- siccare.

*De oris vlceribus quæ Aphthæ dicuntur.*

C A P. X.

**O** Roritur puero etiam vlcus quod aphtha vocatur, nunc subalbidum, nunc subrubrum, alias crustæ modo nigre- scēs, quod omnium periculosissimum & lethale est. Reme- dio erit, iris cum melle, & sicca inspirata. Item rosarum fo- lia contusa, earumq; flos, crocum, myrrhæ exiguum, galla, lachryma thuris & cortex eiusdē, & simul & priuatim sin- gula melle tincta: adhæc mulsa, & mali pūnici dulcis succus proficit.

*Ad femorum intertrigines.*

C A P. X I.

**F** Emorem intertrigines myrtus arida iuncus angulosus, & rosæ inspersæ iuuant.

*Ad aures humentes.*

C A P. X I I.

**A** Vriū humiditates lana ex alumine imposita, aut mul- sum, aut vinum vetus instillatum, aut crocum ex vino detritum, desiccant.



**S**Yriasis, est inflammatio partium circa cerebrum eiusque membranas: concavum in ea fit sinciput, concavi itidem cum pallore oculi, accedit & corporis totius siccitas. Succurrit huic malo vitellus oui sincipiti cum rosaceo, tomenti modo impositus: sic tamen, ut continuè renouetur.

*Aliud ad syriasis.*

† Oportet eidem loco imponere folia herbae quam Graeci heliotropion, latini solarem nuncupant, cucurbitaeamenta, cucumeris, quem peponem dicunt, cutem carni adiacentem, aut hortensis solani succum cum rosaceo.

† In veteri codice hic locus sic legitur, κατὰ τὸ βέρυματος ἰπιδέναι καὶ κλισίονος καὶ ῥῆκαλαμέν. sed legendum suspicamur ut est apud Aetium κλισίονος καὶ ῥῆκαλαμέν, id est, heliotropij quod scorpiuron vel scorpio des dicitur.

*Ratio victus infantium atque reliquarum deinceps*

*etatum, ad usque declinantes.*

**P**OSTeaquam lacte nutriri infantes desierint, liberiore eis modo & suo ingenio hilariter vivere permittemus: exercitia autem & alimenta leuiora. Ab anno sexto & septimo, tum pueri, tum puellae, literatoribus blandis humanisque tradentur, tales enim cum animi remissione & gratia docent. Animi autem relaxatio ad probam corporis educationem plurimum adfert momenti. Duodecimum annum egressi, ad grammaticos iam & geometras mittendi sunt, corpusque eorum exercere oportet. A quartodecimo usque ad primum & vigesimum, mathematicis disciplinis & sapientiae studio incumbant: exercitiis pluribus propter corporis robur credentur, ut & animo & corpore laborantes, à libidinis impetu coerceantur: his etiam vinum circuncidendum est. Aetate florentibus educatio absoluta tum animi, tum corporis congruit. eoque exercitiis omnibus, praesertim quibus quisque assuevit, utendum cibo pleniori & valenti. Declinantibus autem remissa competit & animi & corporis educatio. Exercitia enim qualiacunque fuerint pro horum ratione imminuere oportet: alimento detrahendum, ut quorum habitus iam frigescere incipiat.

De



De frictione preparatoria, quæ parascenastice dicitur.

CAP. XV.

**A**Nte exercitationem corpus mediocriter calefacere oportet frictione linteis adhibita, deinde nudis manibus oleo intinctis perfricare, usque dum bene incalasciat emolliaturq; colore viuido rubescat, & in tumorem attollatur.

De exercitatione.

CAP. XVI.

**E**Xercitatio motus est vehemens: vehementiæ autem finis est, respiratio crebra. Id verò cōmodi præstat, quod parteis instrumentarias morbis non opportunas efficit, & functionibus obeundis validas: præterea ut alimenta fortius attrahant, promptius immutent, & liberalius reficiantur, caloris beneficio quem illa excitauit. adde quod meatus expurget, recte menta, propter validam spiritus motionem, expellat. Quoniam igitur alimentorum per corpus membratim digestionem adiuuat, non debet crudi incoctique, siue cibi siue humoris copia, in ventre, aut vasis contineri. periculum enim est, ne priusquam probè fuerint concocti, in vniuersas animantis particulas distrahantur. Vnde manifestò liquet exercitationem cibum præcedere oportere. Notæ autem quæ opportunitatem laboris subeundi ostendant, ex vrinarum colore petuntur: etenim aquosa nondum coctum humorem qui ex ventre distributus est, significat: rufa autem & biliosa, iam pridem elaboratum esse notat: mediocriter pallida, concoctionem modo factam indicat. Tunc igitur ad exercitia veniendum est depositis prius recrementis: tum quæ in vesica, tum quæ in aluo continentur.

† Veterum librorum aliter habet hanc scripturam *ἀλλ' οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ σπλῆνός, οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ σπλῆνός, οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ σπλῆνός, οὐκ ἔστιν ἀπὸ τοῦ σπλῆνός.* Id est non debet crudorum & incoctorum neque ciborum, neque excrementorum, neque humorum copia &c. Quam lectionem meliorem esse facile quicquid ex secundo libro πρὸς γυμναστικὴν intelligere potest.

De exercitationem generibus.

CAP. XVII.

**O**Mnis exercitationis commune est, quod animali ex ipso caloris augmentum excitat. Singulæ autem exercitationes proprium habent officium, valida sanè, hoc est, violenta musculis & nervis robur præstaret,



cuius generis est quum quis fodit, & maximo onere sublato aut eodem loco manet, aut paululum procedit: item acclivis ambulatio huius quoque generis existit: præterea per funem manibus apprehensum scandere, aliâq; plurima consimilia. Celeris autem exercitatio citra robur violentiâmq; peragitur: id genus sunt, cursus umbratilis, armorum meditatio, aut quum duo summis manibus concertant, tum que per corycum & parvâ pilam fit exercitatio. Composita autem ex valida & celeri, quâdo quas validas diximus iis omnibus ut vehementibus uti licet, morus modo celeritatem adiciat. Præterea per alias exercitationes lumbi magis quam brachia crurâve laborant: per alias spina tota, aut thorax tantum, aut pulmo. Exerceri verò oportet quousq; corpus in tumorem attollatur & rubescat, motus præptè equabiliter & concinnè ædat. Inter hæc autem sudorem cum calido vapore mixtum cernes. Pausandū verò ab exercitatione tunc primum est, quum aliquod horum fuerit immutatum, nempe si contractior corporis moles videbitur, ilico desistendum est: similiter quum coloris gratia deperit, cessare oportet. Quinetiâ quum motus remittere quippiam cernitur, protinus desinere conveniet. Itidem si in sudore vlla qualitatis eius, aut quâtitatis mutatio accidat: quū enim is aut minor, aut frigidior factus intelligitur, tunc desistendum scias. oleo mox corpori superfuso, apothera pia uti deinceps oportebit, inde frictionem apothera peuticam adhibere, ut prædottibâ factitare solent.

*De generibus frictionum.*

C A P. X V I I I.

**I**Nter frictiões, dura ligare corpus potest: mollis, solvere: I quapropter quæ supra modum resoluta sunt, duriter perfricare oportet: quæ autem astricta, molliter. At si mediocri quis corpore præditus sit, neque molliter neque duriter fricandum id esse constat, sed quatenus licet uterque excessus vitari debet. Siquidem multa & dura frictio, corporis molem deprimit: modica verò & mollis, e contrario implet. Porro tres quantitatis frictionum differentias, si tribus quæ à qualitate ducuntur, iunxeris, novem coniugationes effeceris, ut subiectum est. Etenim vna iuxta quantitatem, nempe multa, si tribus quæ à qualitate sumuntur, duræ dico, molli, & mediocri, adiungatur, treis secundum duritiem differentias efficit: modica rursus si eisdem tribus addatur, treis alias



alias procreat. At mediocris qualitate eisdem tribus iuncta, alias treis progignit, vt in formula subiecta videre licet.

## Q V A N T I T A S

Multa

Multa

Multa

Paucā

Paucā

Paucā

Mediocris

Mediocris

Mediocris

&amp;

&amp;

&amp;

## Q V A L I T A S

{ Dura

{ Mollis

{ Mediocris

{ Dura

{ Mollis

{ Mediocris

{ Dura

{ Mollis

{ Mediocris

## De vocis exercitatione.

## CAP. XIX.

**I**Nter vocis exercitationes suavis lenisque modulatio nihil ad sanitatem tuendam proficit: grauioris autem vocis sonus utilis habetur, eoq; exercere eū oportet. Ita enim aēr copiosissimus inspiratu in corpus attractus, thoracem, ventrem, & meatus totius corporis diducit, dilatat, aperitque. Quapropter ipsa lectione humiditates quæ redundant, excernit. fortius igitur legentibus, magis & per sudores: lenius autem, per latentem totius corporis perspiratum. Accidit enim propter extenuationem multa recrementa, nempe sputa, mucos & pituitam, per screatum excerni consumique. Iis verò qui propter frigiditatem exalferi desiderant, quodnam aliud præsentius remedium esse poterit, quàm functio quæ respiratione peragitur? Consilium igitur est, hos frequenter legere, vt toto corpore relaxato, fusaque carne, arteriam & alios spiritus transitus studiosè rarefacientes, per grauiiores vocis actiones modulentur. Vti autem oportet vocis officio neque temere neque inconsideratè: sed quum nec vitiosis corruptisque humoribus repleti sunt, neque magnæ & euidentès stomachi cruditates apparent, ad vocis exercitationem accedendum est, ne corrupti vapores per corpus largius distribuuntur.

## De Lassitudinibus ob exercitationem.

## CAP. XX.

**V**Lcerosa lassitudo ab excrementorum tenuium simul & acrium copia contrahitur. Tensoria nullum quidè excrementū, cuius ratio aliqua sit habenda, in corpore contineri indicat, sed in musculis neruisque affectus quidam



quo tendi videntur, residet. Ea verò quæ inflammationis speciem præ se fert, in qua nimirum ceu contusas, aut inflammatione obseffas parteis sentimus, tunc solet incidere, quum musculi impendio excalfacti, aliquid ex circumfusis sibi recrementis attraxerunt. Est & alia quædam præter has quarta affectio, quæ oritur, quum musculi supra quàm par est, siccantur, ita vt vestibis exutis squalens corpus contractumque appareat, atque ad motus pigrum. Remedium vlcerosæ lassitudinis est, si quæ redundant, euapores frictione multa mollique cum oleo copiosiore, quod omnis astrictionis sit expers. Altera lassitudo in qua tētio sentitur, hoc pro curatione desiderat, vt relaxetur. sanè relaxatur quod distentū est, pauca & molli frictione, eaq; ex oleo dulci atq; egelido: item intermissione omnino, quiete, balneis temperatis atque in calida, mora longiori: adeò si bis terv ipsum laues, plus profeceris. Tertiæ lassitudinis inflammatorix curationis consilium, ad tria dirigitur, nempe, superuacanei euacuationem, extenti remissionem & inflammationis refrigerium: itaque & oleum copiosum tepidumque, & frictiones mollissimæ, & lenta in temperatis aquis mora, eiusmodi lassitudines per sanant. pari modo & multa quies, vnctiones assidua. Quarta affectio nihil sanè à priori consuetudine immutari postulat, nisi calidiorem aquam quæ sensim contrahat: altero die, apothera piæ exercitationem, protinus autem in lauacra frigidi solij exiliat. omnes autem qui lassitudinibus laborant, cibo boni succi resciri debent.

† Vetus codex hanc scripturam habet, ἐν δὲ ἂν ἐν βάντες οἱ νενοπώμενοι ἄνωται τροφῆς. Id est, simul atque balneo excesserint cibo indigēt. Quam lectionem Copus sequitur sed scriptura quam Orosius restituit ἐν χόρῳ ἂν ἀπώτες οἱ νενοπώμενοι ἄνωται τροφῆς, melior est.

De cute astricta.

CAP. XXI.

**A** Strictio, quam Græci σlegnosin vocant, accidit, aut obstructis, aut densatis meatibus. obstructio quidem ex copiosis crassisque humoris crudis concoctionemque non expertis, oritur: densatio autem, ab iis quæ refrigerant, aut astringunt, aut desiccant. Ac deprehenditur sanè iam dictus affectus, statim vbi se exuerint, ex colore albo, & cutis tum duritie, tum densitate: tum quòd in ipsa exercita



citatione vix incalescant. Succurrit huic affectioni calefactio, quæ valentiore exercitio, balneisque calidioribus petenda est. Mora verò in frigido folio diuturna non fit. imò nec ipsa aqua nimium sit frigida. Vbi vesteis sunt induturi, vngentur aliquo quod mediocriter calfaciat oleo, dulci ac tenui. Cutis autem densitatem abundè etiam sanat oleum anethinum, præsertim si viride fuerit anethum, oleumque ex populo nigra confectum.

*De spontaneis lassitudinibus.*

CAP. XXII.

**Q**uoniam vlcerosa lassitudo ex acrium recrementorum vitio contrahitur, siquidem paucus omnino vitiosus humor fuerit, apotherapiæ exercitatio suffecerit: si copiosior, & altius in corpore redundarit, cuiusmodi malo obnoxius, nec exercitationem, nec vllum omnino motum iniugemus, sed quiete, somnoque recreatos abstinere cibo totum diem cogemus, deinde vesperi pinguiter vinctis, temperatoque balneo lautis, cibum boni succi & sorbilem modicum dabitur, non tamen à vino eos arcetes. hoc enim semicrudos humores, si aliquid aliud, concoquit. Si ergo his peractis symptoma conquieuerit, ad consueta munia paulatim reduci sunt: sin in posterum etiam diem remaneat, de valentiore iam remedio considerandum est. Si enim vires constet, duorum alterum, aut sanguis mittendus est, aut purgatio exhibenda, sed ita ut discernamus, utrum magis expediat. Quod si vires inualidæ sint, sanguinem dimittere haud quamquam oportet, sed deiectionem mediocrem tentare. At si crudi humores omnino fuerint, neque sanguinis detractio, neque purgatio, neque exercitium ex usu est, imò ne mouere quidem in totum, aut lauare expedit. Tales igitur in quiete omni seruandi sunt, cibis, potionibusque, & medicamentis quæ extenuent, incidantque sine manifesto calore, reficiendi. Pro cibo igitur oxymel, modicum ptisanæ, nonnunquam, & mulsæ exhibebitur. Quoniam verò præcordia eiusmodi omnibus turgida, inflataque sunt, ac facile quicquid assumpserint in flatum conuertitur, satius fuerit cum cibo piperis aliquid offerre. Vtilius autem erit, & medicamento quod diospolites dicitur, uti: item dia trion pepereon, simpliciter: vtilissimumque ipsis est oxymel. Potui sument apomel, præsertim ubi coacuit, vinumque leuiter acescentia. ciberunt qui sine calore attenuent, cuiusmodi est capparis si ex oxymelite, aut oxelao



oxelæo assumatur. Porro tensionis lassitudo quæ sine exercitiis oboritur, copiam innuit solidas corporis partis distendentem. Constat autem omnibus, optimum esse præsidium quum sanguinis copia subest, aut venam incidere, aut malleolos scarificatu sauciare. Quæ verò inflammationem repræsentat lassitudo spontanea, ea ne paucis quidem horis, nedum duobus, tribusve diebus eodem tenore consistit, sed protinus febrem accendit vehemētissimam, nisi sanguinis detractione malo prius occurreris. Præstiterit autem, si fieri queat, bis eodem die sanguinem detrahère: ac primū quidem ita mittere conuenit, ne animi defectu homo periclitetur: secundò autem, ne defectio quidem ipsa formidari debet. At qui sic affecti sanguinem non dimiserint, hi ut periculum euadant seruenturq; bonæ fortunæ beneficio opus habent.

*Victus senum ratio.*

CAP. XXIII.

**S**enectus quum sicca, frigidāq; existat, per calefacientiā, humectantiāq; corrigi debet. Frictio itaque adhibenda est; citra lassitudinem: imbecilliores ter die cibo refici debent: ad tertiam quidem horam, panis exiguo cum melle attico: septima verò hora vbi frictionem, exercitationesque ipsis congruas, & balneū fuerint experti, primū sanè quæ aluum emolliunt, assument, deinde pisces, aut auiculas, hinc in cœna ea quæ optimi succi sunt, & agrè corrumpuntur. Non prohibeo item vinis ex melle præparatis vti. præcipuè quibus de calculo in renibus creato, aut etiam podagra suspitio est, quando petroselinum vino rectè iniicitur. At si quando pituita in ventriculo contracta, necessitas est aliqua quæ eam incidant, deligere, protinus ad humectantem victus rationem digrediendū est: ac fici maturæ ante alium cibum ipsis exhibentur: per hyemem verò caricæ, si nullum in dextra præcordiorum parte symptoma accidere sentiāt. At quia serosa pituitosāq; in senili corpore excrementa colliguntur, vrinam quotidie promouere consilium est, & alium subducere, præsertim oleo quod ante cibum absorbent. Clarum verò est, omnia olera ante cibum ex oleo, garōq; sumi oportere: item oliuas muria seruatas, quas halma-das dicunt, & damascena. Quod si venter magis astrictus nihil deiecerit, & mercurialis herba, & cnicum abundè sunt. benefacit etiam resina terebinthina, interim vnius auellanae

nae



nae, interim duarum triumve magnitudine sumpta. Iam oleum quibus alius contracta est, per clysterem vtilissime infunditur.

*De rugoso corpore.* CAP. XXIIII.  
**E**Rugat corpus erui farina, viti albae mista.

*Aliud smegma quo continuè corpus abstergitur.*

**F**ICI pingues simul cum bryonia contusae, farina erui, combusta sepiæ testa cum mellis momento affuso.

*Quomodo corpus suaviter oleat.* CAP. XXV.

**V**T corpus bene oleat, eidem vntioni cupressi comam aridam contusam admisceto, aut piceae corticem. Meminisse verò debes, vt manè postquam corpus vestimentis munierint, paucillum casiae aut sabinæ herbæ degustent.

*Quomodo habitus recalescat.* CAP. XXVI.

**Q**Vandoquidem verò habitui senum succurrere oportet, vtatur dum lauat, puluere calefacienti, aquae indito, qui constat, nepita, sampsocho, hyssopo, baccis lauri, rore marino, lapide pyrite, sale, faece combusta, nitro, pumice, pro cuiusque ratione: item sinapis, herbæ pediculariæ, & cocci gnidij momento. à balneo, acopo quod calefaciat vtatur. vinum fuluum vetus potet, sumatque propoma ex mulso pipere, ruta, & consimilibus.

*Quomodo color malus emendetur.* CAP. XXVII.

**C**ORpus decoloratum pallidumve vita lata & cibus gratus emendat, miscetur autem huic radícula, porrum, & viride cicer. Iam mali punici dulcis succus sorbitionis modo sumptus, bonum colorem efficit. Proficit etiam oleum cui bryoniæ radix diutius sit incocta. idem & corporis cutem intendit, erugatque. Iis autem, qui corpori nitorem conciliant miscere conuenit pastillos, qui fiunt ex cuiusdam abstergentis farina, bulbo, narcisso, & bryoniæ radice. bene colorant, si copia datur, tum radix, tum semen amaræ amygdalæ in aqua elixa, qua pro lauacro vtitur.

*Ad liuores.* CAP. XXVIII.

**L**uescere senum corpora prohibemus, si cutem ipsorum crassam, & iniuriis haud facile opportunam, habitumque calidiorem reddiderimus. Vt autem celerius id assequamur, sale in balneis, super partem quæ nigruerit vt conueniet, eandemque fomentis per spongas decocto raphani aut absinthij immerfas, adiuuare.

*Quomodo*



*Quomodo dentes ab iniuria asserantur.* CAP. XXXIX.

**D**entes ab interitu vindicabis, si primum caueas ne cibi quos ingesseris corruptionem experiantur, adhuc ne continuè vomas, deinde escas dentibus incommodas, nempe ficus aridas, mel coctum quod durum nimis sit, palmulas vix fragiles, adhuc omnia glutinosa, quæq; adeo frangi contumacia sunt, ut dentibus commoueant. insuper vitare oportet, quæ dentibus stupefaciunt, perfrigida cuncta & putrida. Conducit itidem secundum cibum dentibus purgare.

*Quomodo grauis auditus corrigatur.* CAP. XXX.

**A**d grauem auditum corrigendum, vincit primū meatus per quos audiendi facultas est, sordibus expurgare: per interualla autē lintheum dropaci intinctum ipsis demittere, atq; prius expressum retrahere. summè enim meatus purgat, & simul auditum auribus reddit. Deinde aliquo erui instar inserto, meatum ad diem obturabis: postea ipso exempto, quotidie oleo amygdalino, aut nardino, aut chamæmelino, aut pingui anserino, cum exiguo fellis bubuli perunges. Rursus diebus aliquot interpositis, sinapi, & ficis contritis factum penicillum ad horas duas imponis, inde hoc exempto infundis oleum, quod in asphodeli radice excavata efferbuerit.

*De oculorum caligine.*

CAP. XXXI.

**N**E caligine oculi corripiantur, quum in aquam frigidā te mergis, illos diu in eadem apertos esse conueniet. hinc enim robur visui adiicitur. Lestione verò non te fatigabis, vino crasso & dulci abstinebis. similiter cibis qui in superiore ventre diu remorantur, cōcoctu difficiles, & qui humores lentos, crassosq; generant: item cauebis erucam, porrum, & omnia quorum acrimonia sursum effertur. Vitare etiam oportet supinum incubitum diuturnum, frigus, ventos contra oculos flantes, fumum, & puluerem. iam verò aquam oculis instillare quotidie ad mensem totum, iuuat. quæ in hunc modum præparatur, fœniculum viride fistili vasi extrinsecus picato, cum aqua cœlesti demittitur, deinde exempto fœniculo quod reliquum est repones.

*De repletionē.*

CAP. XXXII.

**P**lurimum noxæ ciborum repletio conciliat, quamuis enim probè quippiam ventriculus concoquat, venæ tamen nimium repletæ, laborant, distenduntur, rumpuntur, obstruuntur.



obstruuntur, flatu implentur, & valde grauantur. deterri-  
 mum autem habetur in morbis, venas esse repletas, at ven-  
 tris repletio si vrget, interim vomitu quod redundat, inte-  
 rim per aluum excernitur: in totum inualidior hæc, ea est  
 quæ venis accidit, non ramen & ipsa admitti debet, sed si  
 quis impendio plura assumpserit, statim cum vomere oportet.  
 periculum etenim est, ne obita concoctione venæ reple-  
 antur: magisq; si intemperantius cibis continuè assumptis,  
 nullam deinde vacuationem experiatur. vomitu igitur sol-  
 licitari debet priusquam cibi corrumpantur. At si aliquid  
 eum impediat, aluus soluta frequenter succurrit. sin minus  
 illa fluxerit, certè diutius dormire & potui aquam calidam  
 frequenter sumere, consilium est. Vbi iam abundè conco-  
 xerit, præsertim aluo largiter fusa, lauacris fomentisq; ad-  
 iuuare, salsamenti parum ac potionem dilutam exhibere o-  
 portet. At si neque descenderit aluus, neque celeriter obita  
 est concoctio, sed corpus vniuersum graue, ad motus pigrum,  
 & somnosentum fuerit, mens præter rationem quodammo-  
 do torpescat, venarum repletionem esse cognoscas. Qui ve-  
 rò præter hæc lassitudine premuntur, eos conquiescere dum  
 ventriculus ingesta concoquat, deinde laboribus inanire  
 expedit.

## De ebrietate.

## CAP. XXXIII.

**E**brietatem vomitus repente obortus discutit: item a-  
 quam & mulsam liberalius superbibere vincit, atq; sic  
 vomere, vsque dum plurima reiecerint, ac stomachi vellica-  
 tus obtundatur. à vomitu solum ingressi copiosè vngen-  
 tur, reliquo tempore conquiescent, & accuratè cooperti  
 diutissimè dormient, quousq; temulentia discutiatur.

## Quibus cibi corrumpuntur.

## CAP. XXXIII.

**C**ibis in ventre viciatis, si quæ corrupta sunt deiiciun-  
 tur, maximum ad sanitatem est compendium: sin mi-  
 nus, iis quæ leniter subducunt aluus irritanda est. Huius-  
 modi autem malo affectis vomitus ante cibum, vini dulcis  
 potu excitatus, conducit. Nullum præterea cibum vel ni-  
 dorosum, vel graueolentem, vel in totum corruptioni op-  
 portunum assumere ipsos consuluerim, sed ea quæ boni  
 succi sunt deligere. Iam per interualla temporis mediocria  
 aluum subducere, ex iis quæ mediocriter purgant, ita affe-  
 ctis confert.



**V**eneris hæc sunt commoda, repletos inanit, corpus agile præstat, in augmentum promouet, & virile magis efficit. Quantum verò ad animum spectat, impeditam intelligentiæ vim dissoluit, iratos mitigat, eoque melancholicis coitus, si quid aliud, remedium est accommodatissimum: item alio modo infanientibus integritatem sensuum restituit. Iam ex pituita morbis venus est utilissima: ceterum alij etiâ cibum respuentes, eius cupiditatem hinc recuperarunt: alij, continuis per somnum veneris imaginibus liberati sunt. Porro natura veneri idonea est calida, & humida, ut quæ reliquis salacior sit. Minimè verò coitum excitat victus qui ficcet refrigeratque, ætas senilis, tempus autumnale. Quapropter victus ratio humida calidaque adhiberi debet, mediocritas, & laborum, & ciborum. Quemadmodum verò moderari labores, ita etiam concubitus ipse mediocris, conuenit. Nam & ad opus incitat, & facilitatem quandam consuetudini præbet. Requirit autem libido, si quid aliud, alimenti exuberantiam, eoque cibi potissimum valentis materiæ utiles sunt: ex piscibus autem polypodes, ut qui alioquin etiam ad venerem incitare credantur. his adduntur, molli cute præditi: ex oleribus autem, orminum, erysimum, eruca, & rapum, quæ in medicamentorum vicem dantur: ex leguminibus profunt, faba, cicer, ochri & dolichi, & pisæ, quæ præterquam quòd largiter corpus alunt, flatibus etiam replent. Ruta igitur quia flatu discutit abolètque, ideo etiam veneris ardorem obtundit. magnificè autem probo vuas, ut quæ humectent, & spiritu sanguinem repleant, qui in venerem proritat. Quum igitur concubiturus es, nimiam satietatem, cruditatem, lassitudinem, cauebis: item ne vomitus, aut purgatio præcesserit. similiter repentinum alui profluuium: inueteratum enim fluorem venus desiccet. At vehemētis coeundi cupiditates non laudo, sed potius resistere eis consulo, præsertim iis quos morbus aliquis infestat. Saluberrimum igitur post exercitationem, balneum, moderatūque cibum, venerem exercere. ita enim viribus conducit, & frigus obortum minus efficitur. Tempus autem concumbendi opportunum est, secundum cibum, ut suprà dixi, antequam somnus inuadat. lassitudo siquidem ex coitu contracta, obdormienti statim remittitur. Id verò tempus etiam liberis procre



procreandis accommodum est, tum aliis de causis, tum quod mulier consopita, genituram facilius retinet.

<sup>†</sup> Hic locus sic legitur in antiquis codicibus, *ἡγεῖ πνεύματι & ἐμπιπλάσει τὸ σῶμα, ὃ δὲ ἐξορμαῖ πρὸς ἀποσπείρα.* Id est, corpus statu implent, qui ad libidinem excitat. Qui sensus simplicior est.

Ad eos qui venerem exercere nequeunt.

## CAP. XXXVI.

**N**aturalia continuè pingui vngentur, cui adiectum sit narcissi radices momentum, aut cocci gnidij, aut pyrethri, aut herbae pediculariae, aut seminis vrticae, aut viticis. Præbiberè autem ante venerem oportet piper, aut satyrion, aut erucam, aut cnicum, aut simul omnia. esse confert ante cibum bulbos tostos, rubentes ac exiguos, cum sale & oleo, aut scillae marcidae modicum: item compositis aduersus hoc vitium inscriptis remediis vtendū est: item subinde lasciuia legere competit.

De ijs qui immodicè coierint.

## CAP. XXXVII.

**Q**uonia ex immoderata venere corpus rarius, frigidius, siccus, & imbecillius euadit, ratio est admouere nimirum quæ densent, calefaciant, humectent, confirmentq;. Qui igitur immodico concubitu exhausti sunt, vestimentis calidis operiti conquiescent, somnoq; satis indulgebunt, donec corporis contentio subsidat, & illi ab imbecillitate sese recollegerint.

Si semen genitale redundet.

## CAP. XXXVIII.

**N**onnulli semine copioso & calido collecto, in venerem prouunt: quod cū in coitu egresserint, corpus inualidū & stomachum resolutum obtrinent, extenuantur siccanturque, ob quam causam si rursus à concubitu abstinerint, capite grauantur, & anxij fiūt, deinde statim veneris insomnia experti eodem modo afficiuntur. Nihil igitur his quod semini augendo efficax est, sed potius & cibi & medicamenta quæ id corrumpant, offerri debent, à balneo lumbos oleo rosaceo, melino, & omphacino perungere oportet. Satius autem est oleum cera addita, ne defluat, crassius efficere, miscereque succum aliquem refrigerantem, nempe semperuiui, solani, cotyledonis & psillij: ac horū quidem per æstatem, reliquis autem anni temporibus, tum aliorum, tum lactuca succum: item lini semen quod aqua fuerit incoctum. nam hoc quoque refrigerantem succū exhibet. Ad hæc la-



mina plumbea lumbis subiecta, veneris insomnia cohibet. Iam herbae refrigerante vi praeditae si cum ruta substernantur, & teneris viticis surculis, idem praestant. Praeterea semine viticis & rutae in cibo sumptum. Cauendum verò est, ne lumbis vehementer refrigeratis, renes offendantur.

*Si perfrictio nocuit.*

CAP.

XXXIX.

**Q**ui frigori nimio patuerunt, locis calidioribus decumbent: cyprino aut irino peruncti. postea ubi modice incaluerint, piper, myrrham cum vino dulci odorato & veteri assument, aut liquorem cyrenaicum cum vino vel aceto, aut pyrethrum castoriumve ex aceto: cibo autem calidiori recreandi sunt.

*Si insolatus adusit.*

CAP.

XL.

**S**i qui verò exusti in sole sunt, his locis aëri expositis decumbendum est, perfundendaque frigida, facies, manus, & crura: si siti conficiuntur, frigidam aquam qui assuerunt, bibent. atque haec paulatim, & non una vice ac subito facere expedit. cibum assument modicum, qui facile in membra distribuatur, humidiores potius quam solidiores.

† Vetus scriptura hoc loco habet, *σκληροτέρων*, id est, duriores, *ἀντὶ τῶ παχύτερον καὶ σκληρότερον*, quibus nominibus medici cibum solidiorem significant. vix unquam inuenitur *σκληροτέρων* in hac significatione.

*De pituita in superiore ventriculo redundante.*

CAP.

XLI.

† **Q**uod si in aliquem interdum incidas fastidientem, qui quidem cibos valentis materiae auersetur, & si assumere compellas, nausea afficiatur, sola verò acria appetat, & iis quidem oblectetur, sed ventris inflationem experiatur, nauseetque ac paululum ructibus solis leuetur, interim verò & ipsi cibi quos assumpsit, praesertim in acoem conuersi, vitientur, omnino intelligendum tibi venit summam curationis existere, ut pituitam à ventriculo abstergas. Ego quandoque ita affectum noui, qui raphanis ex oxymelite sumptis, incredibili crassioris pituitae copia vomitu egesta, integrae statim sanitati restitutus sit.

† Hic locus sic descriptus est in veteribus libris. *Εἰ τιμὴ περιτετὸν χυμὸς ποτὶ τὰς μὲν τῶ τροφίμων στίων προσφορὰς ἀποστρεφόμενῳ, ἀποσίτω ὃ μόνον.* Id est, Quod si aliquem incideris, qui cibos valentis materiae auersetur, atque non alatur. ἀπόσιτ' enim videtur positum ἀντὶ τῶ ἀτρέφει.

Quo



*Quomodo facile quis vomat.*

CAP. XLII.

**Q**uoniam validè vomentibus multa solent absurda superuenire, commodum fuerit quomodo quis facile vomat, exponere. Etenim vomitus pituitam inanit, caput leuat, & ne qui auidius nonnunquam cibum ingesserint cruditate laborent, item ne qui vinum liberalius sumpserint, offendantur, prohibet. At quæ offerentur, neque acerba, neque sicca erunt, sed partim dulciora humidiora quæ, partim acriora. Commendatur ad hæc raphanus, eruca, fassamentum vetus, origanum viride, cepæ momentum & porri. Promouet vomitus etiam ex leguminibus ptisana cui mellis aliquid additum sit, ferculum ex fabis fressis confectum, magisq; carnes ipsarum. verum non solum cremores ipsarum, sed ipsas quoque integras deglutire oportet, eoquæ vomiturus non diu mandendis ipsis immorabitur. omnia verò per coctionem mollia flaccidaquæ erunt. Iam constat, vina dulciora deligi oportere, vt quæ in stomacho magis supernatent, atque eam potionem tepidiorem assumi. Confert etiam amygdalas melli intinctas comedere, ac placentas gustare: item peponis & cucumeris semen maceratum detritumque cum melle assumere, radicemque cucumeris contritam ex melle. At qui valentioribus vti volunt, narcissi bulbo aque incocto, vinum temperant. Mouet autem vomitiones irinum quoque vnguentum, si digitis eo perunctis, irrites. Porro vomentis interest, ne cesset vel intermittat, vsque dum omnia eiecerit: à vomitu os colluat, faciemque posca aut aqua abstergat. id nanque dentibus conducit, & caput releuat.

*Quæ sanis aluum subducant, & quæ vrinam moueant.*

CAP. XLIII.

**V**eterum nonnullis satis esse ad secundam valetudinem tuendam visum est, si aluus quotidie & vrina pro ingestorum tum cibi, tum potus copia, sine vitio & abunde responderet. ac quum vœuatio iuxta assumptorum proportionem accidebat, commendabant: sin minus, promouebant, vrinam quidem scandice, apio, asparago, petroselinio, aniso, nepita, origano, absinthio, graminis carduique radice, cytiso, adiantho, omnibus in aqua elixis,

b 2



quorum decoctum cum vino potui exhibebant. hæc enim per urinam sanguinem repurgant, vnde non parum utilitatis percipitur. Aluum adiuuabant terebinthina: ex qua oliue magnitudinem dormituri deglutiendam offerebant. At quum magis subducere eam cogitamus, rheu momentū admiscebimus. Accommodata deiectioni sunt, oua forbilia: ex oleribus, beta, malua. item cochlearum ius, atque hæc fortè abunde erūt. Efficacior est herba mercurialis, in aqua cum sale elixa comestaq; eiúsque decoctum potui datum: similiter folia sambuci. idem præstat polypodij radix duarum drachmarum pondere, fassamento inspersa, aut etiā in ptisana sorpta, adhæc serum lactis cum sale aut melle, ad treis heminas quatuorve assumptum: veteris quoque gallinacei ius, tum per se, tum cū cnici drachmis duabus, nonnunquā & aloë triū cicerū instar secūdū cœnā rectè assumitur. Præstantissimum verò est epithymum in vino post mediocrem cœnam potum: qui vehementius vacuare desideret, manè epithymi drachmam ex oxymelite, verno tempore ebibat.

*De clysteribus.*

## CAP. XLIII.

**I**N quibus venter ægrè descendit, & stomachus imbecillis medicamenta ad subducendum efficacia non sustinet, clysteribus vtendum est, quum pituita quidem in intestino residet, iis quæ fiunt decocto caricarum, betæ, nitri, sylvestris cucumeris radicis, melle, oleo chamæmelino, aut anethino: quum siccitas magis vrget, iis quæ constant althæa, fœnu græco, chamæmelis, oleo, mellis exiguo. interim etiā oleum per se dimidiæ heminae mensura iniectum, abunde proficit. nō tamen continuè id faciundum est, ne natura his irritata, spontaneæ excretionis obliuiscatur.

*De glandibus.*

## CAP. XLV.

**V**Timur etiam glandibus subinde stercoris excernendi gratia, & in quibus id quod per clysterem inditum est, non egeritur. Finguntur autem glandes ex sale tosto, melle, & nitro: item thymus discocto melli additur. Fiunt etiam ex resina terebinthina, & nitro: interdum & cocco guidio modico. Sed quia vellicatus mouet, parteis ipsas oleo delinere conuenit, præterea pyrethrum aut piper admiscetur, conuenitque resolutionem expertis, & iis qui ex perfriktione inflationes contraxerunt. Insuper centaurium pici & ce-

ræ



æ commiscetur, ac naturalium relaxationibus aptum est præsidium. Infantibus autem etiam salis grumus ano imponitur. Fit quoque glans ex ficu cum nitro.

*De ijs quæ per os & nares caput euacuant quæq; eisdem partibus delinuntur.*

CAP. XLVI.

**H**umores in capite residentes per sputa vacuamus. quod si modicè facere voluerimus, piper cum mastiche temperabimus: si largius vacuare libet, pyrethrum aut herbam pediculariam mandi præcipiemus. item anemonæ omnis radix mansa pituitam prouocat, capparisque radicis cortex. Itaque huiusmodi remedia ferosum excrementum vacuant. crassam verò lentamque pituitam, sinapi cum oxymelite gargarizatum, aut sapa in qua origanum, aut hyssopum sit incoctum. Ego autem saram cum sinapi & oxymelite misceo. At si cerebrum mucò purgari desiderat, acribus eum remediis, quorum nonnulla etiam sternutamenta mouent, euocabimus. Itaque anagallidis vtriusque & anemonæ cuiusvis, & betæ, succus per nareis purgat: item cucumeris syluestris foliorum succus naribus ipse & per se & cum betarum decocto succove infunditur. sternutamentum verò crudis humoribus qui in thorace, pulmone, & capite continentur, non expedit. Quod autem ori illinetur tale est: sapo cum betæ succo palati regionibus & columellæ delitus bene facit. idem etiam per nareis purgat, melanthio verò quod facile paratur, ad narium illitionem subinde vsus sum, interim aceto acri pridie macerans, deinde postridie cum aceto rursus lauigans infundensque naribus. Nonnunquam oleo veteri idem melanthium detritum, similiter illeui. Sic igitur & Archigenes eo in narium obstructione vsus est, priori autem, ex aceto, Crito in morbo regio vti solebat.

*Quæ menseis ducunt.*

CAP. XLVII.

**Q**uæcunque vrinæ ciendæ sunt, eadem omnia menseis ducunt, nempe brassicæ radicis decoctum potum, persicæ radix, ruta, chrysanthemum, dictamnium, & erucæ semen: item quæ ori vuluæ subiiciuntur, menseis commouet, ut ruta cum melle trita, aut porri succus, aut allium tritum subiectum, aut myrrha cum vino lauigata, aut leporis coagulum.



*Quæ sudorem mouent.*

CAP. XLVIII.

**S**udorem eliciunt chamæmelum aridum tritumque, oleo inspersum, si summæ cuti validè infricetur: seseli, pyrethrum, cachry, anysum, similiter oleo inspersa. item nitrum tostum non nimis tenue, cum oleo efficax est: adhæc salis flos oleo temperatus, & liquor cyrenaicus aqua dilutus corpori infricatus epotusque ciceris magnitudine: Pari modo nepita & pota cum mulla, & extrinsecus cum oleo infricata proficit.

*De aëre.*

CAP. XLIX.

**L**audatissimus aër est, qui exactè purus: is autem nimirū erit qui non ex stagnorum, aut paludum vapore turbidus exurgit, neque ex profundo quodam specu pestilentem auram exhalante prouenit: ita qui ex cloaca quadam magnam ciuitatē expurgante turbidus exit, vitiosus est. Quinetiam nebulosus similiter sanitati nō facit, quemadmodum item qui in cauo loco altis vndique montibus inclusus, nullam auram recipit. Hoc igitur modo vitiosus aër omni ex æquo ætati nocet, omniq; temperaturæ: sicut optimus prodest. At qualitate varians aër colore dico, frigiditate, siccitate, & humiditate, non similiter vniuersos afficit. Etenim temperatis corporibus aër temperatus utilis: intemperatis, qui contrariam temperiem habuerit confert.

*De aquis.*

CAP. L.

**A**quarum præterea & virtutes & vitia cognita habere expedit, ut quæ ex multiplici ipsarum vsu magis fere quàm omnia alia ad quamlibet victus rationem requirantur. Ea igitur optima aqua censenda est, quæ nullam aut gustu, aut odore qualitatem representat, sed protinus bibenti suavis est, & visu pura limpidaque, quum verò etiam à præcordiis statim descendit, melior alia quærenda non est. Nam quæ in præcordiis residet diutius, ventrem ferit, inflat, grauatque, vitiosa censebitur, huiusmodi aqua neque citò calefit neque refrigeratur, sed quæ in ipsa elixantur, tardissimè peiusque decoquuntur. Præstat itaque talem aquam experimento discernere. Qui verò notis quoque eam volet agnoscere, iis quæ dicentur attendat. quæ enim ad septentrionem spectat, à sole auersa, tardè permeat, ægræ concoctionis lentè calefcit & refrigeratur: quæ autem ad orientem erumpit, ac per meatum quendam, aut terram colatur puram



ram, eadēq; citissime calefit, iterumq; refrigeratur protinus, hanc optimam esse existimandū est. Probatur item quæ æstate frigidior, hyeme calidior est. Nonnulli & pondere aquam examinant, leuē præstare credentes, hoc igitur si aliis à me commemoratis accedit, cōmendatur, verū sola hæc bonæ aquæ nota non sufficit. At imbrium aqua autote Hippocrate leuissima est, dulcissima, limpidissima, tenuissimāq; eò quòd sol leuissimum & tenuissimum attrahat, ac id non ex alia aqua solum, verū ex mari quoque & corporibus: quapropter etiam omnium promptissimè computrescit, ut quæ diuersis ex qualitatibus sit conflata. Nemo autē aquam putrefactioni opportunam deterrimam esse existimet. nam mutationis facilitas virtuti potius, quàm vitio tribuitur. Quæ igitur aqua optimæ notas habet, si promptè etiam putrescat, ea cēsebitur saluberrima, etsi quum mutari incipit, occasionem raucedinis, tussiculæ, & grauitatis vocis illis quibiberunt præbeat. At inter imbrium aquas, æstiuæ quæ tonitru decidit, præstantior est, quàm quæ nimbis demissa est. Ex glacie & niuib; aqua, insaluberrima est. Nam ea congelascente, tota pars tenuior exprimitur. Porro palustrem fœdique odoris & absurdas recipientem qualitates, rectè decoques, atq; ita meliorem redditam potui dabis vīno temperatam: si adstringit, dulciori: aliam verò, acerbiori. Nonnullas percolare expedit, nempe limosas, salvas, & bitumen referentes. At frigidæ nimium à cibo assumi debent, non tamen subito ac vna vice. Non desunt quī cibos & potiones aduersus aquarum vitia inuenerint: ac alij ciccerum decoctiones præbunt, vel eadem quoque edunt: alij caucalidem similiter cum pisciculo quodam elixam, item fœniculum: reliqui betam & cucurbitam sale conspersam cum vino dilatiore præsumunt.

De lauacris.

CAP. LI.

**F**Rigidam lauationem ita quidem laudo, ut non iis quibus nullo victus delectu agunt, ex usu esse dicam, verū solis illis qui accurate viuunt, & laboribus, & cibis sicut expedit, vtentes. Porro multis qui amplius interdum refrigerari desiderant, abunde est natare per æstatem, si iuuenes sint, carnosī & frictionibus ante excalfacti. Sint autem qui aquam ingredientur, neque venere, neque alio quodam modo lasi, neque cruditem sentiant, neque vomitu,

B 4



aut aluo inaniti, neq; vigiliis defatigati. Periculosum enim si quis ita affectus frigidae lauacro utatur. Calidum vero balneum & optimum & tutissimum est: lassitudinem soluit, humorum repletionem per halitum digerit: item excalfacit, mitigat, emollit, flatus vbicunque decubuerint diffundit, somnum conciliat, carne replet. Est autem aptissimum omnibus, & viro & mulieri, & puero & seni, & priuato.

*De balneis naturalibus.*

CAP. LII.

**N**aturalium balneorum alia nitrum, alia salem, alia alumen, alia sulfur, alia bitumen, alia æs, alia ferrum representant: nonnulla composita ex his omnibus reperiuntur. Itaque aquarum naturalium vis est quæ desiccat & calefaciat ampliter, ac humidis frigidisque affectibus maxime conducit. Iam vero quæ nitrum & salem obtinent, capiti, thoraci fluxione tentato, stomacho humentiori, aquæ inter cutem, tumoribus laxis, œdemata Græci vocant, qui ex morbis proueniunt, & pituitosis sunt accommodata. Aluminata sanguinis reiectioni, stomacho vomitioni opportuno, immoderatis mulierum purgationibus, continuisque abortibus, vtilis existunt. Sulfurata ueros emolliunt, calefaciuntque, & dolores mitigant, stomachum vero enervant euertuntque. Bituminata caput replent, instrumenta sensibus distribuendis dicata, offendunt: calefaciunt autem continue, & temporis processu emolliunt. Quæ æris naturam occupant, ori, tonsillis, uis, & oculis præcipue cōferunt. Ferri virtutem sortita, stomacho & lieni sunt vtilis. Oportet autem in aquam sine tumultu, & lentè descendere, quo virtus corpori relaxato accedens immergatur.

*Que victus ratio quolibet anni tempore sit utilis.*

CAP. LIII.

**N**on alienum est, pro singulis quoque anni temporibus victum instituere. Ac hyeme quidem pluribus ut laboribus, plus esse conuenit præsertim diebus aquiloniis. Nam austrinis laborare quidem similiter, sed minus cibi & potus assumere oportet. Summatim humido tempore corpus omnino siccum reddere, quemadmodum in frigido, calidius: carnes calidas comedere & olera, plus vini bibere oportet. Vere autem ineunte, alius vomitu, alius per



per aluum euacuari debet, alius sanguinis demissione, pro-  
ut cuiusque consuetudo & voluntas fuerit. Per æstatem à  
laboribus conquiescendum, cibóque demendum est, qui  
rectè frigidioris erit naturæ: potione largiore vtendum,  
ac omnia fieri debent, quæ ad refrigerationem humidita-  
temq; conferunt. At in autumno, quoniam prorsus inæqua-  
lis inordinatusque est, & omnigenios morbos inuehit, ma-  
gna victus habenda sollicitudo est: frigus vitare, concubi-  
tu & frigida potu prorsus abstinere expedit. item frigidus  
auroræ aër, meridianusque ardor rectè cauebitur, poma ac-  
fatim assumere noxium est, vt quæ non copia tantum ob-  
sint, verum etiam vitiosos procreent humores, & inflatio-  
nes. Etenim præstantissima ipsorum, nempe ficus & vux,  
flatus pariunt corrumpuntque cibos, nisi ante alios præsu-  
mantur: ita verò neque inflant neque corrumpunt. Vbi aër  
frigidior euadit, corpus pro frigoris ratione calefacere,  
omniaque peragere oportet, ceu hyeme aduentante. Ni-  
hil mali autem fuerit post æquinoctium vacationem ex  
commemoratorum aliquo tentare, ne aliquid superfluum  
in corpore retentum, hyeme faceffat negotium.

*Victus eorum qui in laboribus vitam agunt.*

CAP. LIIII.

**S**I quis in laboribus vitam transigit, considerandum est,  
priusne is exerceri consueuerit, an nullo exercitio se cre-  
dens, mediocriterque eiusmodi consuetudinem ferat, ita vt  
non morbo implicetur, continue, facili præditus perspira-  
tu meatuum, eiusmodi enim corporis naturam ad aliam  
consuetudinem traducere non oportet, imò nec eos qui ex  
longiore temporis interuallo ægrotant. At si assidue quis  
morbo confictari videtur, in humorum quidem redundan-  
tia *πληθώρα* græci appellant, eò per totam salubrem victus  
rationem, consilium diriges, vt humorum mediocris sit & co-  
pia: in eorum verò prauitate, *κακοχυμία* græcis dicitur, vt o-  
ptimos efficias. Qui igitur humorum redundantià labo-  
rant, in balneum deduci, deinde frictionem adhibere, &  
paululum dimoueri prius debent. Qui verò eiusmodi fa-  
cere antea sunt aggressi, iis hæc eadem paululum augere,  
cibo autem detrahare, eumque imbecillis materiæingere,  
re consulemus. At qui prauos humores colligunt, non vno  
consilio tractantur, quoniam neq; vna vitiosi humoris spe-

b 5



cies est. Nonnulli siquidem frigidiorē magisque pituitosam colligunt, alij calidiorē biliosiorēque, quemadmodum alij melancholicam magis accumulānt. Quapropter singuli, cibo potuque abstinebunt, quæ collectam ipsis humorum colluuiem solent generare. In omnibus autem his commune est præsidium, alui subductio.

† *Vetus scriptura est prædix, id est, facile, non pergitur.*

† *Ante hoc verbum in manu scripto est vox ài, id est, semper que omissa videtur à librarijs.*

*Proficiscientium victus ratio.*

CAP. LV.

**F**acillimè quis profectiōem inibit, si inunctus sit, & non fortiter incedat, Præterea ad proficiscendi facilitatem conducit per æstatem fascia mollis digitos sex aut septem lata, quinque autem cubitos non minus oblonga, lumbos ad ilia usque complexa. Item baculus ad iter utilis habetur. Etenim per decliua præmissus, corpus quod præceps ruit, ceu conto cuidam innixum retinet. quum ascendendum est, ipsi innitentes facilius in accliua corpus promouemus. Porro cum in itinere cessamus, vinctio & paxillum cibi cuiusdam æstiu, potiōque modica eo tempore conuenit: à prandio antè quàm iter arripiamus, conquiescendum est. Si verò necessitas abeundi fuerit, & sitis vrgeat, tenuis polenta ex aqua cum salis momento bibetur: æstus ardorque solis caueri debet, cui nec corpus nudum exponere sed contactum esse oportet, ne ex itinere siccescans indurescat. Hac enim ratione, & minus lassatur, & nullum ex prædictis affectibus similiter percipit. Hyeme quum frigus vrit, antequam itineri te accingas vêtre subducto, & vinctiōe adhibita hyemaleis cibos copiose assumes, potionem modicam. Cæterum fascia longiore non solum lumbos sed spinam quoque & pectus rectè inuolues. Requiescenti autem, si interea vehemens frigus vrat, neque vngi, neque cibum potumve assumere præstat. neque alio quodam modo refici debes, si inibi mansurus es. At secundum longas profectiōes, aliosque validos labores, etsi lassitudinem quis non sentiat, non aliter quàm lassi curabitur. minus enim sic periculis erit opportunus.

*Nauigantium victus.*

CAP. LVI.

**V**omitionibus quibus nauigantes premuntur, primum oboriētibus nec facilè, nec vtiliter succurrimus: vt que  
omni



omnino magna ex parte præsidio esse soleant. A vomitu autem cibi non copiosi, nec quilibet offerri debent, sed aut lenticula uti sicca, decoctâq; cui pulegij modicum sit adiectum, aut panem ex vino aquoso, & odoro maceratum ingerere oportet: potione uti modica, eaq; vel ex vino prorsus aquoso, vel aceto mulso. Lenticulam incoqui dum emollescat, conueniet: mox in tenuem puluerem redigere, inde siccare, postea in vas fictile condere. At si diutius crebriusq; vomitus urgeat, cibo magis subtrahendum est, eadêmq; potione modica utendum, vel aceto mulso cum aqua, in quo thymum aut pulegium commaduerit: item aqua cum polentâ polline aut vino odorato, eôq; aquoso cum illius polline similiter, recreatio tentabitur. Ad graueis autem nauium odores, aut mala cotonea naribus admouetur, aut thymus, aut pulegiû. Mare nequaquâ aspiciendum est, vsq; dum in nauibus versari assuescas. Aquis porrò cura adhibenda est, ne turbidæ, fædi odoris, ac salis existant.

*Quomodo extenuetur corpus.*

C A P. LVII.

**Q**Uum immodicè corpus plenum est, extenuare id atq; imminuere oportet. Quia ergo calidior temperatura & siccior gracile corpus reddere demonstrata est, crassis eam, si mediocres reddere voluerimus, inducimus. Didicisti autem citas exercitationes, victum extenuantem, similiaq; medicamenta, & animi curas, temperamentum siccus, & calidius, eôq; corpus gracilius efficere. Quæ igitur victus ratio extenuet, nulli non cognita est: medicamenta verò vehementiora hæc sunt, rutæ semen, præsertim syluestris, cum ipsis corymbis, aristolochia rotunda, tenue centaurium, gentiana, polium, quæque ad vrinam ciendam valentiora sunt, uti petroselinum: singula namq; hæc, & per se, & cum aliis omnia, humores abundè extenuant, inaniuntque corpus. Quinetiam sales ex crematis viperis largiter extenuare solent: ipsaq; adeò theriace. digerit autem, extenuatque oleum cui radix syluatici cucumeris, hibisci, gentianæ, panacis, & aristolochiæ sit incocta, si illinatur: sic polium & centaurium. At cibus non statim à balneo dari debet, sed prius somnus est indicendus. Præstaret etiam aquam balnei ex iis esse quæ digerant, si quidem sponte sua scarurientem habeamus, qualis est Mitylenæ: sin minus, salis florem aquæ marinæ commiscebimus. Vino  
vtemur



vtemur tenui & albo. Caterum frictio sicca linteis crassioribus durisq; adhibita, idē abūde efficit. Adhuc oportet cibi minus quā pro exercitiorū ratione ipsos assumere: iuvat etiam obafos insolatus. prābire autem non debent. sed epulas semel tantum die sumere, magis expedit. itē corpus nitro & sale asperiore infricare. In balneis copiosum nitrū extenuat, modicum verò probam corporis nutritionem excitat. Postremo extenuat & medicamentum, quod recipit piperis & petroselini duas portiones, assari & anisi dimidiam. Hoc & vrinæ & aluo promouendæ efficax est.

*Quomodo tenues impleantur.*

CAP. LVIII.

**Q**Uum extenuatos implere volumus, vinum quidem crassum, cibus autem crassi succi, exercitatio modica, frictio mediocris, & vt summatim dicam, omnia prādictis contraria expediunt. Commodum est iisdem & pice diebus tribus quatuorve interpositis, obleni. Si ieiunus aliquis lauetur, ante balneum linteis corpus donec rubescat, infricare debet, deinde frictione durā non tamen multa cūtem cogere, quō densa durāque euadat. Expedit igitur iis qui pallido sunt colore prādicti, nec alimentum sentiunt, iram animique motus excitare.

*De partium attenuatarum curatione.*

CAP. LIX.

**E**Xtenuantur plerunque partes nonnullæ, vel diuturna ipsarū quiete, vel deligaturæ modo quo confracta fasciantur. Itaque virtus partis extenuatæ firmari, sanguisque ad eam elici debet copiosus, frictione moderata, aptoque motu, & calentis aquæ mediocri superfusione. Hæc sanè tantisper faciēda sunt, dum rubescens corpus attollatur. cessandum verò prius quā collabatur. Iam & picationem prādictis membris, adhibere congruit. Quum autem frigidiorē partē senseris, linteis ipsam confricare, ac calefacienti quodam medicamine oportet. Vfusum aliquando & thapsia, nunc cum melle, nunc cum cerato illinens.

*Optimi temperamenti nota.*

CAP. LX.

**T**EMperatissimus homo est, cuius corporis compositio omnium extremorum exactē medium occupat, nempe gracilitatis, crassitie, mollitudinis, duritiæ, caloris, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis, in vniuersum naturæ ac animi functiones habet inculpatas: medius quoque est glabri & hirsuti, nigri & albi: pilos in pueritia rufos magis quā



quàm nigros habet: in vigore, è contrario.

*Intemperatorum corporum notæ.*

CAP. LXI.

**C**orpora moderato calidiora citius dētiēt, increscētq; similiter: tangentibus autem calidiora, minúsq; pingua apparent; colore sunt rubido, pilis nigris, mediocriter hispidis, & latis venis, At si quis simul & pinguis, & crassus latiores venas habeat, is ob consuetudinem, non natura pinguis euasit. Frigidioris temperaturæ nota est, si ad tactum frigidius apparet corpus, glabrumq; sit & pingue, color vnà cum capillis rufus, si multa inest frigiditas, liuens quodammodo & plumbeus, venæ angustiores: si gracilis est eo temperamento præditus, neque is necessario talis, sed ex consuetudine factus est. Sicca autem temperies durior est, graciliórq; temperata, atque hirsuta, durities igitur à sicca temperie omnino separari nequit, gracilitas autem non modo naturaleis temperaturas, sed etiam ex longa consuetudine acquisitas comitatur. Indicium siccitatis est, si corpus ægrè mouetur, siccum, & squalidum à siccantibus equadat. Humida temperies, cætera quidem temperatæ similis est, sed mollior, corpulentiórq; ac ab hac separari nequit, mollieties, quæadmodum, & crassitudo, non insitum modo temperamentū, comitatur, sed etiam ex longa quadam consuetudine constituitur. peculiare verò humiditatis signum est, corpus maxime hirsutum, facilis pilorum capitis prouentus, iiq; nigri sunt, & per iuuentutem copiosi: processu temporis caluitium sequitur, venæ latæ sunt, sicuti & arteriæ grandes, simulq; vehementissimè pulsant. prætereà totum corpus validum, articulatū, musculosum, pinguedinis expers apparet, cutis dura, & nigrior. Frigidam humidamq; temperaturam testatur thorax angustus, sicut etiam totum corpus glabrum, cutis tenera & alba, capilli subrubi, præsertim in iuuentute, hac præditi in senio non caluescunt, verum statim timidi, pusillanimes, pigri, venis latentibus, crassi pinguesq;, & femoribus, & musculis indistincti, inarticulati, blesique fiunt. At si humiditas frigiditasq; magis fuerit adaucta, color vnà cum pilis rufus videtur: si plurimum increuerit, liuescit. Porro calidum ac humidum temperamentum mollius carnosiusq;, optima temperie existit: auctum amplissimè, putridis affectibus opportunum est. Quum autem paulo quidem humidius, multo autem calidius fuerit, eo donati mollio



molliores paulò, corpulentioresq; temperatis existunt; non paulò verò hispidiores, imò etiam ad tactum calidiores apparent, nigri ipsis pili existunt, & caro pinguitudinis expers. Quod si paulò quidem fuerit calidius, multo autem humidius, mollis his caro, multaque existit, & color ex rubro, & albo commistus, tangentibusq; paulò calidiores apparent. At si frigiditas pariter cum siccitate ex æquo augefcit, corpus erit durum, gracile, album, non musculosum nec articulatam, pilisq; vacuum, tangentibus frigidum deprehenditur: pinguedo tamen, graciles licet eiusmodi existant, per carnem dispersa est, color autem & capilli frigiditati proportionem respondent. Quod ad animi mores pertinet, pusillanimes, timidos & tristes eiusmodi temperamentum efficit. Ac, ut semel expediam, in coniugatis temperaturis semper euincens qualitatibus notæ superare solent.

*De capitis formatione.*

CAP. LXII.

**E**Xiguum sanè caput prauam cerebri structuram propriè notat: magnum verò non necessariò bonam testatur. Si nanque tale insitæ virtutis, materiam probam, multamq; efformantis robore factum est, bonum est indicium: si ex solius materiæ copia, non item. Verùm distinguere ea conuenit figura, & iis quæ ex illo processerint. Figura quidem, si concinna, aptaq; fuerit, hæc enim semper bona est constructio: iis autem quæ ex illo procedunt, si optimè sit disposita, & si neruosum genus ipsi integrum, bene habitum, valens, siq; oculi acriter cernant. In acutum fastigiata capita, deficientem in fronte, vel occipite habent eminentiam, aut magis quàm decens est, auctam. Plerunq; igitur, ut magnam, ita has quoq; deprauatas comperiemus. fit tamen, sed rarò ut nonnullæ ex his bonæ proueniant cum formans scilicet vis, non inualida fuerit.

*Temperatura cerebri notæ.*

CAP. LXIII.

**C**erebrum temperatum moderatas habet, & animi functiones, & excrementa, minimèq; ab omnibus exteris offenderur. Talium pili capitis in infantia subrubi, pueritia subflauii apparent: ubi adoleuerint flauescunt, medijs quodammodo inter crispas exactè ac simplices, nec tamen facile caluescunt. Si verò calidius temperato extiterit, omnia quæ circa caput existunt, & calidiora, & rubicundiora apparent, oculorum venæ sensibilibiter apparent, capilli his in lucem



lucem æditis protinus in capite oriuntur. Iis autem qui multò sunt calidiores, nigri, validi, & crispi: qui non multò, iis flauï primum, deinde nigri proueniunt, procedente ætate caluescunt, interim his recrementa sunt exigua, & inculpatâ fruuntur valetudine: capite verò à calefacientibus cibis, potu, odoribus, & foris accedentibus implentur grauanturque, modicus somnus in huiusmodi temperaturis sufficit, neque is profundus admodum. Frigidius autem quàm conuenit cerebrum fatentur, excrementa copiosiora per meatus ei peculiareis manantia, capilli recti, rufi, firmi, & facile à frigidioribus causis læduntur, destillationibus, & grauedinibus continuè infestantur, oculorum venæ latet, somno maximè premuntur. Siccioris cerebri nota est, si nihil excrementi emanat, sensuum acrimonia, vigiliæ, capilli sunt robustissimi, statim ab ortu, ac iis crispi magis, verum ex facili caluent. Humidioris autem, capilli simplices planiq; , & nequaquam caluitium experiuntur, sensus turbulenti, excrementorum copia, somnus multus & profundus. Calido, & sicco cerebro præditi, recrementis carent, exactos sensus obtinent, vigilantissimi sunt, facile caluent, primum verò capilli celerrimè ipsis proueniunt, & optimè habiti, plenissimiq; , nigri, calidi ad tactum capitis, rubriq; vsque ad vigorem apparent. At si calori humiditas accesserit, ita vt vtraq; paululum excedant mediocritatem, colorati calidiq; sunt, venæ oculorum grandes, excrementa pleniora, mediocriter concocta, capilli recti, subflauï, caluitium haud facile experiuntur, verum capita ipsorum calefacientibus, humectantibusq; implentur, grauanturq; . Vbi verò humiditas, caliditasq; accreuerit, caput morbidum euadit, facileq; ex calidis & humectantibus noxam contrahit. eiusmodi temperamento præditi, vigilare diu nequeunt, dormientes autem imaginibus, per insomnia torquentur, oculi caligant, non exactos sensus obtinent. Frigida verò simul & sicca temperamenta cerebri, frigidum decolorq; caput efficiunt, oculorum venæ non extant, à frigidis causis promptè offenduntur, eoque inæquali valetudine fruuntur, sensibus per adolescentiam exactis inculpatisq; , processu temporis subito contabescunt: summam circa omnes capitis partes citò consenescent, capilli à natali die vix erumpunt, exorti non alantur, rufescuntq; . Humidum frigidumque temperamentum cerebri, reddit



reddit soporosos, somnolentos, sensibus vitiosos, excrementicios, frigori opportunos, capita habentes quæ faciliè repleantur, destillationi, grauedini obnoxios, non tamen hi caluitium experiuntur.

*Ventriculi temperatura nota.*

CAP. LXIII.

**V**entriculi natura siccioris indicium est, si confestim eo donati sitiant, & modico sint contenti potu, largiore grauentur, fluctuationes experiantur, vel id quod redundat in ventriculo supernatet, cibisque delectentur siccioribus. Humidiorem notant, si nulla sitis vrget, & largior humor non molestat, cibique placent humidiores. Calidior natura ventriculi melius sanè concoquit, quàm appetat, & dura potius, quæque difficulter possint immutari, calidis cibus, & portionibus oblectatur, neque à frigidis quicquam incommodi percipit, si modicè vtatur. Frigidior, appetendo quidem valet, concoquendo minus, præsertim si contumacia frigidaque alimenta assumpserit, quæ faciliè in eo acescunt, frigidis quidem gaudet, sed immoderatus assumptis promptè offenditur. At intemperies ex morbo contractæ hac ratione ab insitis differunt, quòd contraria sibi, non similia appetant. Si igitur venter probè concoctionem obit, temperatus: si non concoquit, intemperatus est. Item si nidorosos ædat ructus, immodicum etiam feruorem igneum fatetur: si acidus, contrarium. Rursus si rebelles concoctioni cibos probè concoquat, immodicum: si pisces concoquat, illos minus, imbecillum. quod num ex humore quodam aliunde influente accidat, considerare oportet. Etenim pituitosi, acidum: biliosi nidorosum, graueolens, aliasque extraneas qualitates ructant. Communiter autem vtrisque nausea superuenit. verum si vitiosi humores in concauo ventriculi spatio supernatent, vomitu reiciuntur, qui autem corpore ventriculi contenti, tunicis eius adhærescunt, frustra cum obinamem ad vomitum nauseam conturbant.

*Pulmonis nota.*

CAP. LXV.

**N**on modo ventriculus sitim vel adfert, vel arcet, ac frigida calidaque portionis appetentiam facit, sed etià quæ in thorace continentur viscera, cor, pulmo, & iecur. Verum qui ob horum caliditatem sitiunt, largius inspirant, expirantque longius, item sentiunt in thorace ardorem: non sicuti qui in ventriculo subter præcordia illum experiuntur.

† Quia



† Quinetiam si biberint, non statim sitire desinunt, ac frigida potio magis quàm calida admodum sitim ipsorum restinguit: frigidus autem aër inspiratus refocillat, quum nihil ventriculi vitio sitibundos soletur. Hac ratione qui è contrario affecti sunt, à frigido inspiratu sensibilem molestiam percipiunt, quod maximum pulmonum frigiditatis indicium est, adéoq; pituitam secreta & cum tussi reiciunt. Sicci autem pulmones excrementis carent, & pituita, quemadmodum humidi excrementicij sunt, & obscuram raucamque vocem efficiunt: ac recrementa ipsis interueniunt, ubi aut vehementius, aut acutius loqui studuerint.

† Hac verba ita leguntur in vetusto codice. καὶ μὴ δὴ καὶ πίνοντες, οὐκ, αὐτίκα πίνονται, καὶ τὸ ψυχρὸν ὀλίγον ποτὶν ἵσχοιεν αὐτῶν μᾶλλον τὸ δριψ. ἢ περὶ τὸ πολὺ δριμύς. Id est. Quinetiam si bibant, non statim sitire desinunt, ac frigida pauca potio magis quàm multa calida sitim ipsorum restinguit. Qui sensus huic loco magis conuenire videtur.

Cordis notæ.

C A P. LXVI.

Cordis calidioris notæ sunt, respiratio magna, pulsus velox & creber, itidē audacia, insanaq; ferocitas: thorax ipsis hirsutus, præsertim pectora existunt, ac præcordiorum regio his vicina: magna verò ex parte totum quoque corpus calidum, nisi iecur valide renitatur. Quinetiam thoracis latitudo calorem notat, nisi & hic cerebrum valde resistat. Porro cor frigidius, pulsus habet mediocribus minores, ac qui tale habent, † timidi natura sunt & pusillanimes, negligentes pectore glabro. Cor ficcius pulsus ædit duos, iram excitat non procliuem, sed feram & quæ non facile queat placari, magna verò ex parte, vniuersum corpus reddit aridius, nisi iecur repugnet. Humidius cor testantur, pulsus molles, mores ad iram proni, sed quæ facile pacari possit, ac totum corpus humidius, nisi iecur resistat. Calidum & ficcum cor ostendunt pulsus duri, magni, veloces, & crebri, item respiratio magna citata & frequens. hoc donati corde, maximè hirsutum pectus, nec non præcordia obtinent, impigri tractandis negotiis, furibundi, temerarij, moribus tyrannicis: etenim ad iram procliues, quæ non facile conquiescat. Si autem humiditas cum calore superauerit, tales minus hirsuti sunt, quàm commemorati, prompti autem functionibus obeundis, neque tamen fero animo, sed ad

c



iram prono duntaxat existunt, pulsus in eis magni, molles, citati & crebri. Humidioris frigidiorisque, pulsus quidem molles, mores autem pusillanimes, timidi, & pigri: talium pectora pilis vacant, ac nequaquam iram retinent diu, quæ admodum neq; ad eandem procliues sunt. Frigidum & siccum cor, pulsus duriores & exiguos efficit. huiusmodi corde donati minimè omnium iræ sunt obnoxij, sed ubi semel eam conceperint, diu retinent: pectora ipsorum omnium maximè pilis vacant.

† *Auctor earum annotationum in Paul. Aeginetam, quas Cratander formis expressit anno 1543. et Orosius locum hunc peruerterunt. Ita enim legendum putant, ἀτολμοὶ καὶ ἀμελῆσαι. cum ex fide exemplaris vetustissimi artis parua Galeni (ex qua totus hic locus desumptus est) quod Aldus sequutus est, legendum sit μελῆσαι. μελῆσαι enim significat ἐπεβλῆσαι, id est, cunctatorem. Et μελῆσαι vel μελῆσαι, id est, cunctatio propria eorum est, qui cor frigidum habent ut scribit Gal. lib. 2. περὶ κρῶσεων. Quod autem Orosius ex Oribasio legendum putat καὶ ἀτολμοὶ εἰσι καὶ ἀδαρτοὶ καὶ ἀμελῆσαι, æquè magnum vitium in ea scriptura. Nam pro ἀδαρτοὶ omnino legendum est ἀργοὶ, id est, pigri (Nam ἀδαρτος affectus est cerebri potius quàm signum, quo cognoscas cordis frigidam intemperiem) pro ἀμελῆσαι verò legendum est μελῆσαι, ut iam ostendimus. Ferè enim fit ut curiosi hi ἀπορῶσαι, παρὰ διορῶσαι inueniantur.*

*Iocinoris temperatura nota.*

CAP. LXVII.

**I** Ecoris calidi notæ, venarum latitudo, flauæ bilis copia, per ætatis autem vigorem, etiam atræ, sanguis calidior, eoque totum etiam corpus existit, nisi cor obstiterit: præcordia & venter pilis obrita sunt. Frigidioris indicium, venæ angustæ, pituita copiosior, sanguis, totusque corporis habitus frigidior, nisi à corde incalescat: præcordia & venter pilis vacant. Siccus iecur testatur, sanguis crassior minusque redundans, venæ duriores, ac vniuersa corporis habitudo aridior. Humidioris notæ sunt, sanguis copiosus & humidus, venæ molliores: sic etiam totum corpus, nisi cor resistit. Calidi simul & sicci indicia sunt, præcordia maximè hirsuta, sanguis crassior simul & paucior, amara bilis copiosissima, ac in ætatis vigore, atræ, venarum latitudo duritiæque: pari modo & totum corpus calidum siccumque. Siquidem calor à corde procedens, frigiditatem à iocinore  
pro



prouenientem potest euincere, quemadmodum & frigiditas caliditatem, siccitatem verò non potest cor humidius ad contrarium perducere. Constat autem quòd si in idem vtriusque principij temperamenta concurrerint, totum omnino corpus, illorum ratione affici. At humidum simul & calidum iecur, minus quàm calidum & siccum præcordia efficit hirsuta, plurimum verò sanguinis, venas grandes, habitum humidum & calidum, nisi cor obstat. Quòd si vtraque qualitas longius à naturæ modo recesserit, morbis qui ex putredine vitioque humorum habent originem, corripiuntur: idque magis, si plurimum humiditas, parum calor increuerit, ac humoribus vitiosi fiunt. Cæterum humidius frigidiusque glabra habet præcordia, sanguinem magis pituitosum, nec non venas angustas, totumque corpus similiter afficit, nisi cor ad contrarium deducat. Frigidum simul & siccum iecur corpus efficit, modico sanguine, venisq; angustis, & frigidius, præcordia glabra, nisi & hic cor superauerit.

*Testiculorum temperatura notæ.* CAP. LXVIII.

**C**alida testiculorum temperatura; ad libidinem proclivis est, fœcunda, & masculos procreat, parteis genitalis celeriter hispida efficit, ac vicinas etiam attingit. Frigida contrà. Humida, copioso ac humecto semine abundat. Sicca, pauci & crassi seminis efficax est. Calida & sicca temperies mediocriter crassum semen progignit, estque fœcundissima, ac celerrimè ad libidinem iam inde ab initio animal incitat. Tales itaque testiculi hispida statim genitalia, eorumque viciniam efficiunt, sursum, vsque ad vmbilici regionem: infra, vsq; ad media femora. ac eiusmodi temperamentum abundè venerem commouet, sed celerrimè satiatur, & si cōpellas, offenditur. Porro si humiditas calori fuerit coniuncta, hispidos quidem minus tales reddit: copioso autem semine magis abundant, non tamen magis quàm alij appetunt, minus autem frequentiori concubitu læduntur: si autem vtraque & humidum & calidum impense creuerint, non sine noxa à venere abstinent. At humidi frigidique temperamento testiculi, vicinas parteis glabras reddunt, ac tarde concumbere incipiunt. neque ad actionem excitantur, † aquosum, tenue, & inualidum semen, ac fœminæ efficax proiciunt. Siccum frigidumque temperamentum, alia



quidem similia predicto, crassius autem semen & planè exiguum progignit.

† Scriptura vetus huius loci est, ὁδὰ τῶδες ἢ ἡγεὶ λεπτὸν αὐτῶς τὸ σπέρμα ἡγεὶ ἀγόνου ἢ ἡγεὶ δυνάγονου, Semen ipsorum est aquosum, tenueq; ac infæcundum, quem locum ita legendum esse faciliè ex arte parua Gal. atque adèò ex re ipsa intelligi potest. Sed id erratum Orosius prius emendauit.

*Quae praetermissa sunt.*

CAP. LXIX.

Singulae corporis nostri partes peculiarem quandam & Temperaturam & vim sortitae sunt: omnium verò notas hoc loco exponere necessarium non esse duco, quum infinitae propemodum sint, & nos compendium scribere proposuerimus. Porro de iis egimus, quae potissimum totum corpus consortij quadam lege afficiunt, de reliquis eadem ratione & via considerare praecipimus, temperamenta ipsorum tum ab excrementis, tum ex reliquis functionibus, tum iis quae superueniunt dignoscetes. Tempestiuum igitur est, ut oratione conuersa, doceamus quomodo totius corporis intemperies corrigi debeat.

*Quomodo calida intemperies corrigatur.*

CAP. LXX.

Qum itaque in calida intemperie bilis superet, si per inferiora descendit, notum est omnibus, nullū oportere negotium faceßere: si ad superiorem ventriculum tendit, vomitu euacuare, qui post exercitationem ante cibum factam aquae potu ciatur. Vtilius autem exercitium ipsis est, quod non velox ac validum est, sed remissius leniusque. Nonnulli vehementer calidi nequaquam exercitationem requirunt, verum obambulatio balneumque ipsis sufficit, iidem lauacris quoque secundum cibum oblectantur. Quibus adiuncta est siccitas, hi ratione victus humectante indigent, ex cibis humectis, balneis, & exercitiorum valentium & multorum abstinentia. Quare per aestatem citius lauare, & à cibo rursus debent. frigida hos potius iuuat, Venus autem siccis temperamentis maximè est inimica: cauenda ipsis lassitudo, insolatus, sollicitudo, & vigiliae. Humidae & calidae natura intemperies in pueritia morbis patent rheumaticis, plethoricisq;, & praeterea iis qui putredini feruntur accepti. Itaque pluribus egent exercitiis, exacta in ventre coct



coctione excretionēque per vrinas. quapropter si etiam ante cibum bis tēve lauent, vtanturq; aquis natura calidis, magnum sentiunt præsidium. Porro defluxionibus prospiciendum est, lauacris, multa exercitatione etiam ante cibum, vrinæ, aluique excretionibus. Nihil autem prohibet, etiam apophlegmatismis nonnunquam vti, & purgationibus, cibis boni succi, & vino quod vrinam moueat.

*Quomodo frigida intemperies emendetur.*

CAP. LXXI.

**I**Nter frigidas intemperies, tres numerantur differentia; ex quibus sicca est deterrima. quod enim processu temporis senescentibus obuenit, id statim ab initio hos affligit. Itaque humectare eos & calefacere oportet, quod commode fiet exercitiis mediocribus, cibo humido & calido, vini calidioris potu, somno pleniore, cura tamen adhibita, vt quæ in corpore recrementa quotidie procreantur, omnia euacuentur. Cæterum venus omnes sicciore, & præsertim qui præterea frigidi sunt, offendit: solis autem calidis humidisq; tuta. Porro vitiosa quoq; frigida temperamenta sunt quæ humiditatem habent coniunctam: & hæc potissimum rheumaticis corripuntur morbis. prodest ipsis balneo abstinere, largius exerceri, victus tenuior, vnctiones mediocriter calidæ. Qui autem frigidiores natura sunt mediocriter verò sicci humidique temperamento, horum calor suscitari firmarique debet, ac in humiditatis siccitatisque totius victus specie, media deligi debet.

*Quomodo sicca intemperies in ventriculo, veluti exemplo, deinde et alia corrigantur.*

CAP. LXXII.

**I**Ntemperies sicca, alia est, vbi solida similarium partium substantia reddita est sicciore, quæ nihil in medicina spei habet, alia cum substantia, quæ ex humore concreto constat, est colliquata: tertia præter has cum propria humiditas vnde partes nutriuntur omnino est absumpta: quæ continetur in omnibus animalis partibus, roris modo eis inspersa. hanc igitur particulis sine nutrimento inferere, nulla ratione queas, ideoq; difficillima est omnium eiusmodi affectuum curatio. At quæ in exilibus arteriis venisque consistit siccitas, curationem recipit, si singulas similarium partium, propria humiditate, humectantis alimenti auxilio repleas. Bal-



neum igitur temperatum conuenit, in quo diutius versari hominem expedit: inde statim lac exhibere asininum, quod recens mulctum fuerit, & pauxillum mellis tepidi adiectum habeat: postea conquiescere ad secundam vsq; lauationem permittes, tum modice fricabis simul & pinguiter, utique si lac quod sumpsit, iam omnino confecit, id quod tum ex ructu tum ventris mole licet coniiicere. modicum verò temporis inter primam & secundam lauationem, interuallum erit, ut quatuor, aut quinque æquinoctialium horarum spatium intersit, scilicet si tertio adhuc lauare paras: sin aliter, plurium. Quinetiam post vnāquāque lauationem, hominem, priusquam se vestiāt, oleo perungemus: ac si quidem lactē oblectatur, post secundam quoque lauationem id exhibebis: sin aliter, ptisanam diligenter incoctam, aut chondrum ptisanæ modo præparatum. hinc ubi rursus conquierit, ad tertiam reducendus est lauationem, aut ilico ad cœnam. Sit autem panis præparatus illi purus, & qui curiose in furno sit coctus. obsonium quoque ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure asellus, & ut paucis alimenti summam complectar, concoctu sit facile, nutriendus, minimeque glutinosum & excrementitiū. potus, vinum aquosum & album, purum, & quod minimam, si diluitur, aquæ mistionem sustinet, oligophoron Græci nominant, modicæ astrictionis particeps: atque hæc maximæ siccitatis curatio est. Modica verò non tam exacto victu indiget, & plenior cibum admittit. Proponatur autem & nunc siccitas priori similis, copuleturque ei frigiditas mediocris: in qua ad calefacientiū materiam transeundū est: ac commemoratis modo adiiciemus: in lactis quidem usu, mel copiosius: vinum autem minus aquosum priore dabimus. Quinetiam esculenta omnia calidiora, idque non naturalibus modo ipsorum temperamentis, verum recentibus etiam qualitatibus, exhiberi debent. Nardino præterea vnguento vngendus assidue venter est, aut mastichino. At verò si cum siccitatis intemperie multa sit frigiditas, primum ipsam difficillimam & vix emendabilem censeto: eisdem verò utere, & melle per se discocto despumatoque; vinū autem eliges antiquius. Optimum sanè medicamentum talibus est, quo picatores assidue vtuntur. & illinere eo ventrem conueniet, ac post auellere etiamnum calidū. Cæterū iuuat eos probè carnosus puellus  
vnā



vnà sic accubans, vt semper abdomen contingat. Iam verò multæ ficcitati moderata caliditas iuncta esto. In eiusmodi sane intemperie primum curationis modū seruabimus, ita vt mel prorsus nō degustetur, vinum verò exhibeatur quod minime sit vetustū. Porro cibos tepidos, lactis modo offere mus, & ventriculū oleo tum crudo tum melino perūgemus. Verūm hos vehemēter admodum refrigerare periculosum est, quandoquidem hæc affectio, febris quodammodo naturam, vbi calor superarit, imitatur. Fingamus itaque rursus calidam intemperiem præpollere, huic autem adiunctam esse humiditatem, talem, frigida aquæ potu curabimus. huc optime facit vsus ciborum astringentium, sed qui citra calorem sint austeri. Quum humida sola intemperies est, ficcantes cibi, ita vt non calefaciant, aut refrigerent valide, auxiliantur. adhæc consuetæ potionis penuria. Si cum frigiditate humida vrget intemperies, optima remedia sunt, omnia acria. misceri autem his debent etiam quæ sine manifesto frigore astringunt. optima simul his est exigua potio, eaq; vini valide calfacientis. Hoc igitur modo intemperies qualitatū curantur. Quoniam verò sæpe in ipso vetriculi sinu contentus humor, interim autem in ipsas ventriculi tunicas absorptus, intemperiem procreat, non alienum est de his differere. Prior itaque affectio si semel radices egerit, purgatione per vomitum facile conquiescit, si autem rursus ex alia quapiam aliisve particulis confluxerit, exactam requirit dignotionem, curatio verò statim subsequetur. Et enim vniuersam eam parti affectæ oportet accommodare, cura adhibita, iis quæ recipiunt, ne facile quæ confluunt, admittant. Fiet autem hoc astringentibus & iis quæ totum corpus ad bonam habitudinem perducunt. At vitiosos in ventriculi tunica humores mediocriter purgantibus eduemus, cuiusmodi est aloë & ex ea confectum medicamentum amarum quod hiera picra dicitur. Verūm quibus lenta simul pituita ventriculo impacta est, iis prius exhibenda sunt quæcunque hanc dissecent. deinde purgatio tentanda. Quod si ad vomitum sunt idonei, ex sumpta radícula vomant. Sin nec lentus humor sit nec crassus, vtique abunde est à ptisanæ cremore vomuisse, itē à mulsâ. proficit & ab synthij succū in mulsâ bibere, reliquarū verò partium intēperies haud absimiliter curare oportet, ita vt humoribus



idoneos effluxus inuentas. Nam si particula sensibilem, effluxum non habeat, redundantem in ea vel saniem vel humores, quemadmodum si id quod continetur, spiritus sit flautulentus, euaporatu discutere ac vacuare conuenit.

*De alimentorum facultatibus.* CAP. LXXIII.

**Q**UUM de alimentorum facultatibus sermo, pars sit operis quod de sanitate tuenda praecipit, proximū est ut iam dictis eum subnectamus, ubi prius quā particulatim ipsa persequamur, paucula quaedam praelibauerimus. Quippe alimentorum vireis, si quid aliud, perceptas habere conuenit. Quae igitur attenuandi virtutem obtinent, meatus aperiunt, viscosa adhirescentia abstergunt, crassa incidunt extenuantque. Quod si diutius ea in cibo adhibeas, serosa biliosaque; contrahes recrementa. ac si vberius ingeras, sanguis atra bile vitiosus redditur. Quare cōtinuus ipsorū vsus praesertim biliosis temperamento vitari debet, conueniunt enim solis iis, qui pituitam, humoremque; crudū, lentum, & crassum collegerunt. Porro quae incrassandi viribus cōstant, valentis admodum materiae sunt, & si in ventriculo ac iocinore decenter fuerint concocta, boni succi sanguinem producant, sed lienem & iecur obstruunt. Ex his alia sunt crassifuntaxat succi, ut lenticula: alia viscosa, sicuti maluae quibusdam utraq; cōtingunt, nempe ut & crassi sint succi, & glutinosa, ut testaceo tegmine praedita. Itaque victus extenuas ad sanitatē tuendam tutior quā qui incrassat, existit. Quum verò imbecillis sit materia nō robur nec vireis corporibus suppeditat, ac oportet nonnunquā valentis materiae cibum, quum inedia quēda pressit, mediocriter exhibere. praesertim verò citra periculum assumunt, qui se exercent, & quātum libet dormiunt. omnes autem quibus ante cibum exercitari non licet, crassi succi alimenta euitabunt. Imò neque in otio degentes eiusmodi cibos assument. Porro quemadmodum summum otium maximē valetudini tuendae obest, ita mediocris motus summum adfert praesidium. Cæterum cibi inter eos qui incrassant & attenuant, medij, omnium sunt laudatissimi, ut qui mediocrē substantia sanguinē procreet. Talis itaque cibus corporibus nostris congruit: qui autem vitiosos humores gignit, noxius est, eoque semper cauere debet. Iam & varia ciborum genera assumere, cautio est, praesertim si ex diuersis consistant facultatibus. ingesta enim



enim concoctionem non, vt par est, sortiuntur.

*De oleribus.*

CAP. LXXIIII.

**L**Actuca manifesto & refrigerat & humectat, eoq; somnum accersit. vt autem inter olera valenter nutrit, ita boni succi sanguinis efficax est. Intibum frigidi humidique temperamenti, sed minus quam lactuca existit. Malua refrigerat quidem, sed non euidenter, magis autem humectat: vnde etiam aluum subducit, idque propter genuinam eius viscositatem. Beta vi abstergens ventrem subducit, eoq; stomachum largius comesta erodit, iecoris lienisque meatus aperit. Brassica bis cocta si edatur, aluum cohibet: semel autem non tamen vehementer cocta, cum oleo & garo, vel sale comesta, magis subducit, quemadmodum succus ipsius etiam lenticulae efficacius purgat. Hac magis adhuc marina brassica aluum emollit: manifesto salsa, & subamara: idem praestat halimon, amplioris autem salsae qualitatis particeps, aluum subducit, magis quam brassica stomacho conducit, ceu astringentis modicae compos: lac & semen producit. Blitum & atriplex humida quidem & ventrem soluunt, sed parum alimenti praestant. Omnia spinosa vt scolymos, attractylis, eiusque generis alia stomacho praeter cinaram conducunt, quae cum dura euaserit, improbum succum procreat, quapropter optimum est, incoctam cum oleo, garo, & coriandro assumere. Apium, hipposeelinum, sion, & smyrnium, omnia urinae ciendae sunt, sed smyrnium aromaticum spirat, magis acre, urinae ducendae proficit, & mulieribus mensis commouet: apia suauiora sunt, ideoq; stomacho magis amica. Eruca calida est, & seminis efficax, ob quod libidinem & capitis dolorem, quam cephalaeam dicunt, excitat. Nasturcium, ocimum, & sinapi, calida quidem & acria, sed maxime nasturcium: concoctu vero difficilia, stomacho inimica, & vitiosi succi. Vrtica extenuat, ventrem subducit, modice alit. Gingidion simile est scandici, astringentis & non parum amarae qualitatis particeps. praeterea stomacho congruit, vt etiam cibum fastidientibus cum aceto assumptum, proficiat: parum vero alimenti corpori ministrat. Porro syluestria dicta olera maxime vitiosos gignunt humores. Capparis cibi cupiditatem proritat, iecoris lienisque meatus aperit, pituitam subducit. Utendum vero ea est ante cibum alium, ex oxymelite aut oxelaeo.



*De asparagis.*

CAP. LXXV.

**B**Liti, lactuca, atriplicis, malua & beta, planta quidem humida est, asparagus autem siccus. Contra, raporum, sinapis, radiculæ, nasturcij, pyrethri, brassicæ omniumque aliorum quæ calida sunt planta quidē sicca, asparagus autem humidus est. At à spinosis stirpibus palustris & hortēsis, asparagi, item qui à bryonia decerpuntur, stomacho quidem vtilēs sunt, & vrinam citant, sed inualide alunt. At si probe coquantur, magis quàm ij qui ex oleribus sumuntur nutriunt. Consimili modo & chamædaphnes asparagus agit.

*De ijs quæ radices esculentis habent.*

CAP. LXXVI.

**N**apus & rapa si bis coquantur, nihilo minus quàm reliquæ stirpes alunt, continue autē assumpta, crassum succum procreant. Bulbi astringunt, abstergunt, cibi cupiditatem mouent, stomachum confirmant, & viscosos pectore humores eliciunt: bis incocti valentius quidem nutriunt, sed nihil emolliuntur, amara ipsorum qualitate sic abolita, præterea semen genitale augēt, libidinemque excitant, si largius vtare. item inflationes & tormina, pariunt. Quod si ex aceto cum garo & oleo edantur, suauissimi sunt, flatu non generant, valenter alunt, concoctu faciles. Pastinacæ verò, dauci & cari radices quidem minus quàm rapa nutriunt, calidæ autem aromaticæque manifeste sunt, & vrinam cient: Si verò immoderatus vtatur aliquis vitiosos humores gignunt & ægrè concoquuntur cōmuni radicum ratione. Nonnulli syluestrem pastinacam daucum nomināt, efficaciorē ad vrinam ciendam virtute præditum. Radicula quæ græcis raphanis dicitur extenuandi calefaciēdiq; vireis obtinet. sumitur recte ante cibum ex aceto & garo, alui ducendæ gratia: secundum cibum, nequaquam. Cēpa, allium, porrum, & ampelopræsum acri virtute donata, corpus calefaciunt, extenuāt, & crassos in eo humores incidunt, bis cocta, parum alunt: cruda, omnino nihil. Atqui allium magis meatu referat, humoresque discutit. Sunt autem porris sicciora ampelopræsa, utpote syluestria. In totum omnia cruda olera, si edantur, peiores quàm cocta succos procreant, ac plus humoris excrementitij continent. Verum quæ condita vel muria vel oxalme reponuntur, stomacho prosunt & appetentiam excitant, crudos humores incidunt, sed ægrè concoquuntur: & si abutare, vitiosos succos gignunt.

De



*De tuberibus & fungis.* CAP. LXXVII.

**T**vber humorē de se reddit qualitatis expertem, sed frigidiorē & crassi succi. Fungi verò frigidi pituitosi & mali succi sunt: in his ipsis minus nocentes boleti sunt, qualitatis expertes, si probe coquantur. Qui verò ammanitæ dicuntur, secundum ab his ordinem obtinent: aliis fungis abstinendum, plerique siquidem ipsorum lethales. Ac ipsi boleti nisi exactius decocti edantur, periculi occasionem frequenter præbent.

*De frumentaceis.*

CAP. LXXVIII.

**E**x iis quæ frumentacea nominantur, chondrus egregie nutrit, & glutinosos parit humores, verum elotus, praeuus habetur, quoniam promptè crassescens, concoctionis expertus permanet. probatur magis cremor chondri, si totus probe ptisanæ modo fuerit decoctus. Alica in cæteris chondro quidem respondet: sed aluum magis astringit. Triticum, elixum sanè, concoctu difficile est, & inflationes creat: ubi verò concoctionem expertum est, alimentum præbet valentissimum. In panem autem coactum minus inflat, minusque agrè concoquitur, utpote fermenti & salis particeps. Inter panes firmissimus est siligineus, deinde ex simila, tertius à quo cribro nihil excussum est, Græci syncomiston quasi dicas confusaneum appellant. Sordidus panis minus quidem nutrit, sed magis per aluum deiicitur. Amylum parum alimentum præstat, quemadmodum & panis elotus. Ordeum frigida facultatis est & absterforiæ ptisanæ modo incoctum, humectat: torrefactum, quemadmodum in polentis fit, desiccatur. Polenta per ætatem ante balneum cum aqua pota, siti medetur. Panis ordeaceus fragilior est, & parum nutrit. Maza difficilior concoquitur statumque magis quam panis ordeaceus gignit: melle autem adiecto aluum citat. Avena & calida est, & imbecillis materiæ. Milium & panicum refrigerant, siccant, paucillū nutriūt, & aluū cohibēt. Omnino autē milium panico est præstantius. Oryza vix concoquitur, parū nutrit & ventrē retinet. Porro ptisana in hunc modum coquitur: vni eius parri aquæ quindecim & olei momentum adiiciuntur, ubi ebullierint acetum quoque addes. quum iam exactè cocta fuerit, sal tenuis superiniicitur, in quibusdam porram & anethum ei miscent. Ceterum avena chondrusque in ptisanæ modum decoquantur.

De



*De leguminibus.*

## CAP. LXXIX.

**E**X leguminibus lenticula vitiosum succum, & melancholicum producit, imò etiam, præferrim bis cocta, aluum cohibet. decoctum verò ipsius cum oleo & garo potum aluum proritat. at quia inflationes mouet, satureia, vel pulegium admiscendum est. Fabæ leues sunt, inflant & abstergant. Aegyptia autem faba humidior nostra est, & excrementicia. Pisum laxum quidem, non tamen adeò flatuosum est. Cicer inflat, abstergit, genitale semen auget, libidinem incitat, & calculos confringit: frictum, minus quidem inflat, sed ægrè concoquitur. Lupinum concoctioni rebelle, haud facile per aluum transmittitur, crudi humoris efficax. Fœnugræcum si ante cibum sumatur, calefacit, & aluum mouet: Ochron & phaselum macerata donec etiam radices succreuerint, ex garo ante cibum sumpta, aluum subducunt, ac plus quàm fœnugræcum alimenti exhibent. At phaselum & dolichon integra cum filiquis viridia comesta, excrementitia magis redduntur.

*De temporarijs fructibus.*

## CAP. LXXX.

**C**ucurbita refrigerat humectatq; , & ventrem subducit, sed parum alit. Pepon totus vitiosi succi est, frigidus, humidus, & vomitioni dicatus: non coctus, bilem generat. semen eius vrinam citat & calculos in renibus confringit, ac in totum, abstergit vehementer. Melo pepon omnia quæ de pepone dicta sunt, inualidius efficit. Cucumer minus pepone frigidus, humidusq; est, sed acrius cit vrinam, difficilis concoctu & vitiosi succi, etiam si concoctus fuerit. Summatim omnia poma refrigerant humectantq; , imbecilliter alunt, & vitiosum humorem progignunt.

*De arborum fructibus.*

## CAP. LXXXI.

**F**icus & vuæ inter omnia poma principatum obtinent, ut quæ minus vitiosos humores generent, & magis nutriant. Inter hæc ipsa ficus probioris succi sunt, valentiorisq; materiæ aluo, & vrinæ ducendæ, renibus purgandis, idonea, præferrim admodum matura. Idem præstant carica, quam inflationes & sanguinem non probum pariant: eoque frequentius usurpata, pediculos procreant. Vuæ, si non descendunt, non quidem cōcoquuntur, verum etiam crudum humorem generant: sin autem deiciantur, moderatiores sunt. Vuæ passæ aliis calidiores sunt, stomacho gratiores, valent



valentius alunt, sed minus subducunt aluum. Mora quæ aliàs sycamina Græcè appellantur, impensè humectant, mediocriter refrigerant, ac antè alios cibos præsumpta, ventrem soluunt, non admodum ingrata stomacho, sed exigui alimenti. Ex cerasiis, dulciora quidem aluum subducunt, verùm stomacho inimica: quibus inest astrictio minus quidem stomachum lædunt, sed non ventrem citant. Atq; hæc ratio tum in vuis & moris, tum in aliis compluribus seruatur. In vniuersum, astringentia si prius ante alium cibum aut eduntur, aut bibuntur, aluum comprimunt. quibus autem ob imbecillitatem venter non responder, ij molliendi virtute prædita, nempe olera aut pisces, aut id genus aliud præsumunt: deinde astringentia, quæ dum ipsum firmant, deorsum propellunt, & ad excretionem incitant. Pini nucleus, qui & strobilus dicitur, boni quidem succi est crassiq; , & ad nutriendum valens, non tamen ex facili concoquitur. Persica prauū succi, acidiq; sunt, & facile corrumpuntur. eoque primum exhiberi debent, quo protinus deiiciantur, nullamq; in ventriculo diutius immorata, corruptionem sentiant, præcocia, duracina & armenia, persicis præstant, neque enim acescunt, neque similiter corrumpuntur, ac sunt etiam gustu gratiora. Malorum, dulciã fanè aliis calidiora sunt, & facile in corpus distribuuntur, præcipuè vel assa, vel elixa: acida, magis refrigerant, & humores ventriculo impactos incidunt: austeria stomachum firmant, & ventrem reprimunt, atque his magis cotonea. Idem præstant pira grandia maturaq; , præterea etiam valentius nutriunt. Mala punica frigefaciunt, & parum alimenti præbent. Mespila sorbaq; vehementius astringunt, eoq; aluo fusæ accommodantur. Palmulæ, nisi admodum sint pingues, stomacho profunt, ventrem retinēt, crassos, glutinososq; humores gignunt, capiti faciunt dolores. Ex oliuīs, druppæ stomacho aduersantur, crassi humoris efficaces: muria conditæ, & colymbades, si ante cibum sumantur, appetentiam faciunt, & aluum subducunt, ac magis quæ ex aceto & oxymelite præparantur. Inter nuces, iuglans, auellana minus nutrit, stomacho gratior. Nux viridis humidior est, & ventrem citat: arida, si vbi in aqua commaduerit membrana ipsius interior adimatur, consimilem viridi potestatem obtinet. Amygdala incidendi extenuandi; viribus pollent, ideoq; viscera & thoracem expurgant, idq;



idq; efficacius amara. Similiter & pistacia, verum iecur efficacius obstructione liberant. Damascena ante cibum sumpta & cruda, & in mulla elixa ventrem soluunt. Syrica ægrè coquuntur, stomacho noxia, modicq; alimenti. Siliquæ ægrè conficiuntur, aluum cohibent, & humores creant vitiosos. Sycomora manifestò & frigefaciunt & humectant. Citrei mali pars exterior acris & concoctioni rebellis est: caro valenter alit, & ipsa ad concoquendum contumax: interior pars siue acida, siue aquosa fuerit, abundè refrigerat. Glandes non minus quàm frumentacea alunt, sed concoctu difficiles, crassi succi, & tardè permeant. Castaneæ omni ex parte his præcellunt.

*De animalibus, & primò de volatilibus.*

CAP. LXXXII.

**A**Nimalia quæ volatu nituntur, minus quidem quàm quæ pedibus fidunt, & præcipuè quàm sues, alunt, sed promptius concoquuntur, magisq; perdix, attagena, pullus columbinus, gallina & phasianus. At turdi, merula, & exigui passerres, inter quos sunt etiam à turribus vbi nidificant pyrgitæ appellati, durius alimentum præstant, atque his magis adhuc, turtur, palumbus, & anas: sed multò durius, cōcoctu difficilius, magisq; fibrosum pauo exhibet. Anserum verò & struthiocameli caro excrementicia, ægrius quàm omnia commemorata concoquitur, si alæ excipiantur, quæ non minus quàm aliarum auium probi succi existunt. Porro gruum caro fibrosum durumq; præbet alimentum. In totum iuniora veteribus humidiora sunt, promptius concoctioni parent, valentiorum cibum præstant, atque per aluum facile descendunt. Similiter elixa ab asis, & in sartagine frixis differunt. Iam quæ in siccis locis & montosis proueniunt, citius concoquuntur, minúsque excrementicia sunt, quàm quæ in paludibus nutriuntur.

*De ouis.*

CAP. LXXXIII.

**O**Va gallinarum, phasianorumq; omnibus præstant. Anserum & struthiocamelorum praua habentur. Ex omnibus autem recentia veteribus multo sunt præstantiora, ac tremula plus alimenti habent: sorbilia magis descendunt, ac faucium asperitates læuigant. Reliqua omnia ad concoquendum rebellia, tardè transeunt, & succum gignunt crassiore, præter ea quæ pnieta dicuntur, hæc autem sunt si  
cruda



cruda immergantur in aquam calidam cum garo, vino, & oleo, & in vase mediocriter coagulentur. Huiusmodi enim coqui facilia & boni succi habentur. Omnia verò quæ facta gine friguntur deteriora sunt.

*De pedestribus animalibus.*

CAP. LXXXIIII.

**I**Nter animalium quæ pedibus fidunt, carnes, suilla maius quàm alij cibi alimentum præbet, eò quòd gustu & odore familiaritatem cum humanis corporibus sortita est, ut nonnulli qui imprudenter humanas carnes gustarunt, cognouerunt. Alimentum verò quod ex illis contrahitur, viscosum est, & non facile in membra potest distrahi. Ouilla excrementicia prauiq; succi est. Caprilla acris est malumq; succum efficit. Deterrima hircina, siue succi bonitatem, siue concoctionem respicias. Bubula melancholicum humorem facit. Leporina crassi succi est, sed minus quàm ouilla & bubula. Ceruina dura est, & concoctioni rebellis. In totum, iuniora vetustis humidiora, mollioraq;, & ad concoctionem faciliora sunt. Hoc modo etiam castrata non castratis, bene habita macris præstant.

*De partibus animalium & sanguine.*

CAP. LXXXV.

**S**VMMAE corporis particulæ neruosæ sunt, citra pinguedinem, & excarnes, eòq; glutinosæ, exigui alimenti, ac ad aluum mouendam efficaces, si excipias quæ volatu nituntur, ob nimiam siccitatem. Rostra & aures cartilaginossæ, & ad concoctionem sunt pertinaces. Lingua, est fungosa laxave, exanguis: parum alimenti habet. Glandulæ suaues sunt, & friabiles, sed mammarum, præcipuè scropharum, quum lacte scatent, dulciores habentur, hæ autem non minus quàm carnes alunt. Renes & testiculi gustu insuaues & coqui difficiles. At saginatorum gallinaceorum testiculi & suaues sunt, & probum corpori alimentum præstant: quemadmodum taurorum, hircorum, & arietum concoctioni resistunt, & vitiosos creant humores. Cerebrum pituitosum, crassi, vitiosiq; succi, lentè transit, concoctioni aduersatur, stomachum lædit, & nauseam excitat: si autem probè coquatur, plurimum exhibet alimenti. Medulla pinguis, & cerebro suauior est, in cæteris ei respondet. Pinguedo & adeps pauci alimenti sunt, & stomacho nocent. Cor & iecur crassi succi, agrè concoquuntur, & lentè transeunt. At suillum iecur aliis



aliis præstat. Lien tum vitiosi succi est, tum melancholicum humorem efficit. Pulmo facilius quidem, utpote fungosus, concoquitur, sed leuiorem cibum præbet, pituitæ generandæ efficax. Ventriculus, vulua, intestinâq; dura, concoctioni aduersantur, pituitæ efficacia. Summatim fera animalia siccius, quàm domestica alimentum exhibent, minúsque excrementicium. Sanguis quilibet, vix concoquitur, præsertim crassus, & melancholicus, qualis nimirum est bubulus. Leporinus utpote suauissimus cõmendatur. Ac multi ipsum cum iecore solent incoquere, quidam vero, & cum aliis visceribus. nonnulli & iuuenis porci sanguinem edunt. Caprillum verò nonnullos comedisse, etiam Homerus testatur.

*De lacte.*

## CAP. LXXXVI.

**L**Ac coctum probè nutrit, gingiuis autem & dētibus nocet. quapropter ubi assumptum est, primum mulsa, deinde vino astringenti os colluere oportet. Item caput tentat, præcordia, ventrémque inflat, calculos in renibus gignit. Ac humidius, minus quidem alimenti præbet, sed magis aluum proritat: crassius autem è contrario, magis alit, minus descendit. At caprillum lac, mediocri consistentia est, sicut ouillum, crassius: & quod statim à partu redditur tenuius est, procedente tempore crassius, deteriusque efficitur.

*De lactis potione.*

## CAP. LXXXVII.

**Q**ui lac potare voluerit, ab aliis abstinere cibis debet, donec concoctum fuerit, & inferius descenderit. Satiùs itaque est manè recens multum bibere, ac post id nihil assumere, nec non labores nimios deuitare, ut quòd laborantibus necessario acescat, sed lentè obambulare satius est, & interea vigiles conquiescere: hoc enim pacto quamprimum per aluum descendit. Vbi deiectum fuerit, aliud bibendum est: ac si hoc quoque descendat, aliud. Initio itaque purgat utiliter, non quidem copiosum ex reliqua corporis mole, sed quæ in ventre continentur: mox, venas ingreditur, ac optimè nutrit, atque non amplius deicitur. Porrò in biliosis fluxionibus, & quum syntexes, hoc est colliquamenta corporis ad ventrem concurrunt, coctum lac exhiberi debet. Coquetur autem primum lentè paulatimque ut pars descendat, pars consumatur, deinde magis, ac magis incoquetur, cura adhibita, ne aduratur, aut in caseum coalescat. quod optimè fiet, si leniter ipsum coquamus, & agitando id  
quod



quod recesserit vndique abradamus. Agitabitur autem ferula leui & tenui: & si quid oris ollæ inferueſcat, hoc quoque ſpongia adimere oportet, id enim ſubinde etiam reliquum lac corrumpit. Eo igitur modo quo dixi, lac coquendum eſt, vſque dum æquabiliter craſſius dulciuſque crudo euaserit. Quod in eo tenue eſt & ſeroſum, calculis marinis ignitis in id demiſſis, ebibitur conſumiturque. Atque hoc alui fluxionibus, præſertim bilioſis eſt accommodatum.

*De lacte ſciſili.*

CAP. LXXXVIII.

**S**eroſa lactis portio à caſeo diſcernitur, ſi vehementius ad ignem largiorē citra fumū excoquatur, deinde colo, aut panniculo exactē traiciatur. Porro miſcetur ſero mellis momentum, aut oxymelitis aliorūve, daturq; ſubducendi ventris gratia, ætate quidem florentibus ad duos ſextarios: iunioribus, non minus ſextario. Quod verò marinis calculis ignitis aut ferro candenti demiſſo lac increaſſatum eſt, inteſtinorum torminibus & alui profluuiis recte exhibetur.

*De caſeo.*

CAP. LXXXIX.

**O**mnis caſus acris eſt, ſiſim facit, agre concoquitur, vitioſos ſuccos, calculoſq; generat. Laudatior eſt recēs, laxus, mollis, ſuauiſ, & modici ſalis particeps: qui ſecus habet, peſſimus eſt.

*De piſcibus.*

CAP. XC.

**O**mnēs piſces frigidioris, humidiorisq; temperamenti eſſe, nulli non conſtat. Omnium verò optimi ſunt, ſaxatiles, ad concoquendum prompti, bonique ſucci, modice humectant, vbi non duram carnem occupauerint. Verū ex non ſaxatilibus, pelagii, multum ab iis variant, qui in limo nutriūtur, vel in fluuij oſtio, ſed omnium deterrimi qui vel in ſtagnis vel mari ſtagnante viuunt. Particulatim verò capito, ſi pelagius fuerit, mediocriter ſuauiſ eſt, minus concoctioni rebellis, & boni ſucci, ſanguinem verò gignit tenuiorē imbecilliorēque. ſimilia & lupus præſtat. Mullus qui & ipſe pelagius eſt, aliis piſcibus durior eſt, fragilis, concoctu facilis, validæ ad alendum materiæ, ſuauiſ & pinguedinis expers.

*De teſtaceis.*

CAP. XCI.

**G**eneratim piſces qui teſta conteguntur, Græci vocant Oſtracoderma, falſum crudumq; humorem producūt.

d



Ex his ostrea mollissimam carnem obtinent & facilius descendunt. Chamæ verò, purpuræ, vugues, spondyli, buccina, cochleæ, atq; huiusmodi alia dura. Ac quæ molli testa integuntur, malacostrata græcis nominantur, nempe gammari, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, concoctioni repugnant, sed alimentum præbent & ventrem comprimunt, si in aqua dulci sæpius decoquatur. Omnibus verò crustatis inest succus, aluo subducendæ utilis, eoque etiam terrestribus cochleis. Ac quum hæc duram carnem, concoctu difficilem, valentis materiæ & succis vitiosam fortiantur, nonnulli ius ipsorum cum oleo & garo conditum, ad aluum subducendam adhibent. Echini modice frigefaciunt, exigui alimenti, & urinæ ciendæ efficaces.

*De mollibus, quæ malacia dicuntur.*

CAP. XCII.

**M**olles cute pisces, utpote polypi, sepia, loligines, dura carne & cōcoqui difficiles sunt, præcipue polypi, falsum humorem modicum obtinent: concocti autem non parum alimenti corpori exhibent.

*De cartilagineis.*

CAP. XCIII.

**C**artilagineorum, quæ selache Græci dicunt, torpedines, pastinacæ, mollem suauemq; carnem occupant, quæ celeriter descendit, facile concoquitur, & probe alit. Raia, leuiraia, squatina, atq; eius generis reliqua, duriora sunt, cōcoctioni renituntur, & valentius nutriunt. In summa, quibus dura caro est, & ægre concoquuntur, & plenius alunt: ubi verò concocta fuerint, copiosum solidumque alimentum præbent.

*De cetaceis.*

CAP. XCIII.

**C**etacea, utpote balenæ, vituli marini, libellæ, delphini, & prægrandes thynni, duram, concoctu difficilem & crassi succi carnem habent. Sale condita eiusmodi modiora efficiuntur, iam qui ex aliis piscibus humidiores habentur & magis excrementicij, ad condituram magis sunt accommodi. Talis autem in condituris est differentia, qualis & piscium, ynde conficiuntur.

*De vini viribus.*

CAP. XCV.

**Q**ui sanitatis tuendæ curam suscepit, eū quoq; vini facultates cognitās habere expedit. In vniuersum itaque vinum omne nutrit, verum rubens & crassum, magis: bon



boni autem succi nō est efficax. Item dulce & ipsum quidem impense nutrit, sed stomacho nocet. Austerum stomacho quidē amicum est, verū ægrè in corpus distribuitur, leuius- que alit: hoc autem minus, album. Præstantissimum est colore fuluum. Porro vetustius nouo magis & calefacit & desiccatur. hæ igitur vini sunt facultates, veluti summatim expositæ. Cæterū vinum calorem genuinum refocillat, vnde cōcoctio melior, & sanguis probus euadit, cibum per omnia corporis membra, vt quod facile penetret, deducit. Quamobrem ex morbo emaciatis reficit, corpūsque ipsorum augeat. Etenim cibi cupiditatem facit, pituitam extenuat, bilē per vrinam educit, & bonum colorem conciliat, animo læticiam, voluptatemque parit, & robur adiicit. Harum itaq; commoditatum moderata vini potio, immoderata verò cōtrariarum occasionem præbet, eoque temulenti, animo turbantur. desipiunt, & graui somno quæ cataphora dicitur premuntur. qua de causa immodica vini potio diligēter vitanda est, quanquā longiore temporis spacio interposito liberaliter bibere conducat. ita namque vrina largius & sudores promouentur. Vincit autem mox vomere, assumpta prius mulsa, quò ne paululum quidem ab eo noxæ percipiatur. Qui igitur potationi indulgebit, alio cibo non admodum repleti debet, sed inter potandum brassicam elixam esse, & bellaria præsertim amygdala assumere, vt quæ capitis dolores leuent, & vomentibus nihil adferant molestiæ. Præstaret autem absinthij dilutum ante potionem bibere, vt quod omnium maximè crapulæ discutiendæ sit efficax. At si quis rosionem à vino sentiat, frigidam biberet: insequenti die, absinthij rursus dilutum, obambulatione itidē, frictionibus, balneo, & exiguo cibo reficietur.

*De melle & mulsa.*

CAP. XCVI.

**M**EL coctum valentius nutrit, quā subducat aluum: non coctum, è cōtrario, ac frigidis humidisque temperaturis conducit: calidis, in bilem vertitur. Mulsa verò nō admodū biliosis vtilis est, vt quæ in bilē degeneret. Itaq; in eiusmodi naturis dilutior mulsa recte dabitur: iis qui viscera habēt affectibus opportuna, incōmoda est. Cæterū hoc modo preparari mulsa debet. Octupla aque portio melli admiscetur, incoquiturq; donec spumare desinat. spumam verò continenter ab ea tollere, simul atque orta est oportet.

d 2



**P**rostea quam omnia quæ ad victus rationem spectant, sumus executi, superest ut de somno, eo quod omnium potestremus magna ex parte initur, disseramus. Itaque somnus virium animalium (ut ita dicam) requies est, utili humiditate cerebri madefaciente proveniens. Qui si recte ineatur, multa præstat commoda, cibum elaborat, humores excoquit, dolorem lenit, lassitudinem solatur, intenta laxat, animi verò ægritudines obliterat, rationem vitiatam corrigit. Porro tempus somni optimum est à cibo, sed diurnus haud omnibus est idoneus. Tempus enim quo obdormiscunt ad absolutam ciborum concoctionem non sufficit. interrupta enim ante horam suam concoctione, à meridie resurgentes, subinde acidos ructus ædunt, & flatibus replentur. Nonnulli verò fluctuatione ventris infestantur, nisi vel ex consuetudine, vel sufficienti somno usi, eiusmodi mala effugiant. Cæterum optimus somnus est nocturnus, quoniam nox naturali humiditate, silentioque animum in somnum deducens, absolutam molitur concoctionem. Item post somnum nocturnum plurima parte ad excretionem recrementorum infestamur. Terminus autem somni esse debet perfecta ciborum concoctio, quæ tum ructibus, tum ventris contractione deprehenditur, secundum quam vigilantia non inutilis, ut quæ recrementorum ex concoctione deiectionem molitur.

**V**igilias quæ laborantes iam affligunt, ex dolore, aut febris, aut acutiore quodam casu oborientes, secundo libro de febribus persequemur. quæ autem sanos infestant, hoc loco nobis exponendæ sunt. Si igitur aliquis ob incertam, aut curam, aut quandam animi ægritudinem vigilaaverit, primum id quod molestat, quatenus licet protinus amputabimus, deinde suavi sonorum auditu mens à sollicitudinibus abducenda est, id quod nonnulli leni aquæ murmure machinantur. qui enim sic permulcentur somno facile capiuntur. Præterea balneis præsertimque vespertinis, quum bene concoxerint utentur, ciboque humectanti ut pote lactuca & id genus aliis, nonnunquam nigri papaveris folia viridia obsoniis admiscebunt. Piscibus ad concoctionem promptis, vino largiore tenui & non vetusto recreari debent.



bent. Dormituri rosaceo caput perungent, aut oleo in quo papaueris capita, aut mandragora sint incocta. item anethinum non vetus somnum accersit. Noui autem qui post lassitudinem quiete subito succedente, somno caperetur. Ad hæc venus moderata id ipsum præstat. Alij caput aut pedes refrigerantes, facile somno corripuntur. At si ex cibi copia vitiòve stomacho grauato vigilauerint (nam hoc etiam accidere nouimus) quemadmodum rursus alij præter consuetudinem inedia pressi, aut modico cibo sumpto, vigiliis sunt infestati, considerare id, ac causam succidere, oportet.

*De sopore vehementi quæ cataphora græcis appellatur.*

C A P. X C I X.

**A**T si è contrario alti vehementesque somni, quæ cataphora dicitur, vrgeant, ab assiduis lauacris & refrigerante vnctione abstinemus, medicamentis pituitam per os elicientibus utemur, atque in totum ad calidiorem victus rationem, sicciorem imbecilliorémq; ipsos traducemus, quandoquidem huiusmodi affectio à frigidiorē, ut plurimum & humidiorē materia cerebrum imbuente, accidit.

*Dioclis Epistola ad valetudinem tuendam conscripta.*

C A P. C.

DIOCLES ANTIGONO REGI.

**Q**Voniam tibi omnium regum literatissimo esse contigit, & multū iam ætate prouecto, omnis philosophiæ disciplinarumque mathematicarum peritia excellere, existimaui eam philosophiæ partem quæ valetudinis tuendæ præcepta tradit, haud alienam à regia maiestate fore: eoq; tibi perscriptū, vnde morbi hominibus oriantur, & quibus signis præcedentibus, quomodoq; ipsis succurrere cōueniat. Quæadmodū enim in cælo nunquā tempestas ingruit, quā non indicia quædā præcedant, quibus nautæ cæteri; probe periti homines certiores reddantur, ita humanam naturā nullus inuadit morbus, quem non signū aliquod denūtiarit. Tu itaq; si iis quæ à nobis dicentur, animum attendas, exactam illorū cognitionē indipisceris. Hominis corpus in quatuor parteis diducimus, caput scilicet, thoracē, ventrem & vesicā. Igitur vbi caput morbo conflictaturū est, hæ plurimū notæ solent præcedere, vertigo, capitis dolor, superciliorum grauitas: aures sonant, tempora salunt, oculi mane illachry-



mant, caligantque, nares oppletæ odorem non sentiunt, dentium gingivæ attolluntur. Quum ergo ex his aliquod accidit, caput purgari oportet, nullo quidem medicamento, sed vel hyssopi vel origani summitatibus tritis, quæ in ollula cū musto, aut sapæ hemina dimidio deferbuerint, atque hoc absorbens ieiunus os colluet, & gargarizando humores ex alto deducet, eaque capitis affectuum curatione, nulla leuior est alia. Optime facit etiam si sinapi, mulla calida dilutum, ieiunus absorbens gargarizet, pituitamque ex capite eliciat. Cæterum caput operimētis prius calefacere oportet, quo pituita liquefacta, prompte effluxioni pareat. Si quis hæc signa neglexerit, huiusmodi ægritudines solet experiri, lippitudinem, glaucomata, aurium vomicas ac eruptiones, in ceruice strumas, cerebri cariem quem σφακελὸν græci vocant, grauedinem, anginam nyctilopa, teredines, vuam, capillorum defluxus, capitis vlcera, & dentium dolorem. Quum autem à thorace morbus nascetur, totum corpus incipit sudare, thoraxque, lingua fit crassior, sputum falsum aut amarum aut biliosum existit, dolor costas aut scapulas sine occasione inuadit, oscitatio frequens, vigiliæ, suffocatio, sitis ex somno, animus tristior: pectus frigidū, brachia & manus tremiscunt. Succurrendum est prudenter hoc modo, vomitus quàm optime fieri potest, post cœnam si ne repletionem, sineq; medicamēto citari debet: vtilis sunt & vomitiones ante cibum, quas Græci syrmaismos appellant. Oportet autem eum qui sic vomet, radículas tenuis præsumere, nasturtium, erucam, sinapi, & portulacā, mox aqua tepida superbibita, vomere. At si huiusmodi indicia contemnantur, hi morbi solent obuenire, pleuritis, peripneumonia, melancholia, febres acutæ, phrenitis, lethargus, febris ardens cum singultu: Quod si à ventre morbus orietur, hæc erunt signa, venter prius cruciatur, turbaturque, cibis & potio amara videntur, genua grauantur: lumbi nequeunt flecti, totumq; corpus etiam sine occasione laborat, crura torpent, febriculæ exiguæ affligunt. His itaque cognitæ, ventrem prius emollire oportet, non medicamentis, sed victu. Tutius enim est uti iis quibus nullus error committi potest, utpote betis mullæ incoctis, alliis elixis, maluis, lapatho, mercuriali herba, & ex melle confectionibus. Omnia siquidem aluo subducendæ sunt. Si quod è signis intendatur



tut, cnicī succum omnibus decoctis admiscere oportet, ut quæ suauiora & sine periculo sint. Iam & læuis brassica in aqua largiore cocta, eiusque succus ad heminas quatuor potus cum melle & sale, utilis est: vel ciceris aut erui decocti aquam eodem modo ieiunus vtiliter bibit. Qui nullam eiusmodi signorum rationem habent, in his morbis tentari solent, alui profluuium, intestinorum torminibus, eorumque læuitate, ilio, coxendice, febre tertiana, podagra, apoplexia, hæmorrhoidibus, morbo articulari. A vesica qui nascuntur morbi, hæc dabūt signa: pleni ex cibo modico esse videntur, inflationes ventris vrgent, rictus, pallor totius corporis, somni graues, vrina liuida & vix erumpens, naturalia tumēt. Quum itaque huiusmodi notæ apparuerint, odoratis vrinam cientibus tutissime occurrere malo oportet. Itaque fœniculi apiique radices, vino albo odorato madefacito, atque huius diluti cyathos duos, mane ieiuno singulis diebus propinabis cum aqua dauci, smyrnij, helenij, quodcunque horum habueris, nam omnia proficiunt: adhæc aqua ciceris macerati cum vino idem efficit. Qui hæc signa negligunt, hos morbos expectent, aquam intercutem, lienem magnum, iecoris dolores, calculos, renum cruciatus vrinæ stillicidium & ventris tumorem. In omnibus huiusmodi indiciis infantes sane leuiori, adultos, acriore curatione tractabimus. Cæterum anni solstitia in quibus hæc solent ingruere silentio prætermittenda non sunt, sed quæ in singulis alimenta conueniant, paucis exequemur, auspiciati ab hyemali.

*Solstitium hyemale.*

SOLSTITIVM itaque hyemale vsque ad verum æquinoctium auget in hominibus destillationes humiditatisque ac propterea calidioribus vti cibis, parciori potu sed meraciori, atque ex origano bibere oportet, necnon veneri indulgere. Numerantur dies ad æquinoctium, nonaginta.

*Æquinoctium verum.*

HOC tempore pituita in hominibus crescit, & dulcis fauies sanguinis, vsque ad vergiliarum ortum, eoque tunc maxime succosa actriaque assumi debent, corpus exerceri, & Venus. Sunt autem ad vsque vergiliarum ortum dies sex & quadraginta.



*Vergiliarum exortus.*

HOC tempore bilis amara augetur, amarâque sanies, vſque ad æſtium ſolſtitium, dulcia omnia tunc quæ aluum moucant, conueniunt, venus quàm parciffimè exercenda, hinc ad ſolſtitium æſtium dies quinque & quadraginta exiſtunt.

*Solſtitium æſtium.*

HOC anni tempus atram bilem aduſq; æquinoctium autumnale promouet, quapropter aqua frigida atque odoratis omnibus vtendum eſt: venus pernicioſa: aut innocentius ſaltem quæ de ea præſcripſimus adhibeto. Porro ſunt ad æquinoctium autumnale, dies tres & nonaginta.

*Æquinoctium autumnale.*

HÆC anni pars pituitæ copiam generat, tenueſq; deſluxiones, donec vergiliæ occidant. Conuenit igitur tunc humores ex capite elicere, atque acerrima, maximeque ſuccoſa aſſumere, vomitum rariffime citare, exerceri, atque concubitum vitare. Numerantur ad vergiliarum occaſum dies ſex & quadraginta.

*Vergiliarum occaſus.*

HOC tempore pituita aduſque ſolſtitium hyemale in hominibus redundat, quam ob rem acerbiffima quæque, vinum ſuauiſſimum, aſſumere oportet, pinguibuſque vti & exercitari. Sunt autem ad ſolſtitium hyemale dies quinque & quadraginta.

LIBRI PRIMI FINIS IOAN-

NE GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

PAV



PAVLI AEGI-  
NETAE LIBER SE-  
CVNDVS DE FEBRI-  
BVS, IOANNE GVIN-  
TERIO ANDERNA-  
CO INTER-  
PRETE.

\*

CAPVT I.



**A**B SOLVTIS de valétudine tuenda præceptis, exequi aggrediemur, quomodo eos, qui morbis iã cõflictantur, restitua-  
mus, à similaribus vtpote simpliciori-  
bus morbis exorſi. quales nimirũ sunt,  
quos febriles appellât. Rursus igitur nos  
Oribasij compendio, quod ex Galeni  
sane potissimũ, & aliorũ præterea cõpluriũ commētariis est  
excerptũ, vtētes paucula quoq; ab illis omiſſa adiungemus.

*Quot & quæ principalia in morbis potissimum febrilibus per-  
quirenda.*

CAP. II.

**P**Rimum quidem perquirere conuenit, morbus salutē-  
ne promittat, an mortem minetur. & si polliceatur salu-  
tem, vtrum acutus sit, an longus. Hæc sane in aliis quoque  
magnis affectibus commode quærantur. Tertium quoque,  
nunquid vna vice crīsim experturus, quod febribus potissi-  
mum peculiare est, an particularim soluetur.

*Ex Galeni cōmētarijs, quale morbi principium dicamus.*

CAP. III.

**N**Eque enim capitis dolores & febris idē existunt, quē-  
admodum neq; vigilia, & cibi fastidiũ totiũsq; corpo-  
ris grauitas, aut sensus lassitudinis: verũ vnumquodq; ha-  
rum licet à febre sit diuersum, ipsam tamē denuntiat. porrò  
febris inuadēs, præsertim acuta, neq; nos potest, neq; impe-  
ritum aliquē latere. Sed sīge, si placet, etiam latere, miracu-  
lum tamen iudicauerim, si hora amplius ægrum subterfu-  
gerit. Quamobrem illud tempus morbi esse principium di-  
cemus, quo manifestò febricitare incipientes decumbant.

d s



*Vnde cognoscendum, morbusne sit sanabilis, an perniciosus.*

## CAP. IIII.

**L**ethales notę sunt, facies cadauerosa, nares acutę, oculi concaui, reliquęque ab Hippocrate commemorata: si hæc neque ex vigilia, neque euacuatione, neque inedia acciderint. Item in propinquo mors est, si ægri lumē refugiunt & illachrymant, non ex quadam à foris accidente causa. neque tamen oculis peculiari vicio obnoxiiis. Adhæc si alter ex his minor appareat: quęque in iis alba esse debent, rubescant, aut liueant, aut nigricent. Aut si pituita ipsis inhærescat, perque somnum alba oculorum appareant palpebris extrorsum non commissis, nisi ea larga vacuatio expresse-rit, aut ex consuetudine ipsis hoc acciderit. Iam illa mortis sunt indicia, dentibus stridere, aut desipere, aut in veste floccos legere, aut festucas carpere. Attendendumq; est ad in cubitum: nam si æger supinus cubat, & veluti resolutus, vel si etiam deorsum à lecto ad pedes delabatur, extremam imbecillitatem fatetur. Multo adhuc peius est, frigidum spiritum ex naribus, & ore elidere: item pulsus languidus creberque, & deficiens: item si æger ad animi deliquium sudore digeratur, perniciem præstat. Si igitur omnia, quę retulimus indicia, aut plura ex his appareant, aut etiam pauciora, sed valida, nullumque salutis argumentum affulserit, periculum mortis inuitabile signat. Contrà spirandi facilitas, pulsus vegetior, mens, sibi constans, bene erga cibum oblatum affici, adhæc facies iacentisque habitus, sani similis, bona indicia sunt, & salutaria. In vniuersum quę à naturali habitu maxime abhorrent, pestifera sunt. quę verò ipsi respondent, salutaria. Cæterum præstigia ex vrinis, deiectione, & sputo, paulo post exequemur.

## †De signis longę valetudinis. CAP. V.

**Q**uatuor notis morbi dignoscuntur: ipsorum motu, egrotantis habitu, pulsu, febrium specie. Motu quidē in eum modum: si quatuor particularis accessionis tēpora, ocyus & breuissimo spatio inuaserint, peracutus erit affectus, cuius extremus terminus est, Septimana, magna verò ex parte quarto die crīsim experitur. At si lōgius quidē quā hic affixerit, sed duodecim horarū spaciū non excedat, acutus prædicatur qui intra quartumdecimum diem potissimū iudicatur, si vero in plures horas prorogetur, vt initium duntaxat, & in



& incrementum longiore tum diei, tum noctis tempore absoluat, talis morbus longus existit. at si particulares accessiones morbus non habeat, sed inde ab initio ad usque finem continuet, tanquam vna sit accessio, veluti in continuis, etiam hunc nimirum acutis adscribes. Aegrotantis habitu hoc pacto deprehenduntur. Si quidem facies, & totum corpus reliquum collabatur, acutum morbum præfagire est. Si prorsus nihil emacrescit, longus erit. quippe copia materiæ longiore spatio concoquendæ signatur. Ex arteriarum motu ita diuineris. Magnus pulsus, vehemens, citatus, creber, acutum morbum indicabit, contrarius, longum. A febrium specie hunc in modum, quatenus calidæ & vrentes, acutum signant morbum, mitiores autem & veluti delitescentes, diuturnum.

† Hic titulus sic legitur in vetusto Cod. πῶς ἐξαρτιώσονται ἐν τῷ καὶ χρόνῳ νόσους, id est, de signis acuti & longi morbi. Qui quidem titulus huic capiti maxime conuenit.

*Quomodo præsciemus an morbus iudicium subiturnus soluentur sit.*

CAP. VI.

**H**OC quoque præscire licet ex iis quæ modo sunt nobis dicta, nempe ex febrium specie, & tempore. Forſan autem totum ex febrium specie. Siquidem calidæ, & perurentes, breui finiuntur, & excretionibus solui solent. Mitiores, leuiorésq; prorogantur diutius, & in abscessus magna ex parte erumpunt. Hinc liquido constat, non solum quando morbus soluetur, sed etiam quo pacto. acuti enim potius per excreta iudicantur: quemadmodum rursus longiores, per abscessus.

*De diebus decretorijs.*

CAP. VII.

**D**IERUM decretoriorum alij de ægris frequenter, cum fide, salubriter, perfecte, manifesto, & insigniter iudicant, alij contrario his modo. Tertius decimus medium quædam inter vtrunque dierum genus ordinem habere monstratus est. Ac sunt ex ipsis, qui vel exiguum naturæ impetum nacti de morbo possunt decernere: quemadmodum septimus, & quartus decimus: plerique verò, nisi in vehementibus naturæ motibus, morbos neutiquam possunt per crism solvere. Verum nec vniuersi boni, simili inter se modo boni sunt: nec omnes mali, pari ratione sunt mali. item nec certo ordine



dine bonitatem malignitatēve obtinent. Qui igitur primi sunt ordinis, nempe bonorum numero cōprehensi, hunc in modum se habent. Præstantissimi omnium sunt, septimus, & quartusdecimus: mox nonus, vndecimus, & vigesimus: deinde decimusseptimus, & quintus. hos sequitur quartus, post hunc tertius, & decimusoctauus. His contrarij, ad secundum ordinem referuntur: pessimus, quique cum periculo, nec clarè de morbis iudicat, ac veluti ex aduerso septimo diei opponitur, sextus est. Huic confimiles, octauus, & decimus: secundum quos duodecimus, sextusdecimus, & decimusnonus habentur. Medius horum est, & tertiusdecimus, nec ita repudiandus, sicut ordini secundo ascripti: nec tam feliciter morbum potest soluere, quàm qui ad primam classem pertinent. Atque hoc dignitatis ordine Galenus est usus. Numerorum verò ordine boni sunt, tertius, quartus, quintus, vndecimus, quartusdecimus, decimusoctauus, vigesimus: mali autem sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextusdecimus, decimusnonus. inter hos medius consistit, tertiusdecimus. Porro ex his decretorijs nonnulli quoque aliorum sunt indices, quos Hippocrates appellauit speculatorios, eò quòd iudicia alio die decretorio futura prænuntiant: contemplandaque exhibeant: exempli gratia, quartus, iudicium septimo die futurum præmonstrat: dum videlicet sudores quosdam, aut madores, aut eiusmodi particulares vacuationes molitur, aut significationes prius non factas, aut concoctionis notas repræsentat. Iam verò Galenus etiã sexti, licet non boni, quartum esse indicem asserit. Vndecimus quartidecimi index est: septimusdecimus autem, vigesimi. Itaque ad quartumdecimum vsque diem valentissima de morbis fiunt iudicia. proximè succedunt, qui vsque ad vigesimum habentur. Qui post hunc adusque quadragesimum porriguntur, paulatim vehementiam remittunt. Primæ dignitatis sunt, vigesimusseptimus, trigesimusquartus, & quadragesimus. Hos sequuntur, vigesimusquartus, trigesimusprimus, trigesimusseptimus. Qui verò dies reliqui à vigesimo adusque quadragesimum intercedunt, omnes iudicij sunt expertes. Sicut qui post quadragesimum habentur, omnes prorsus elanguescunt, concoctione potius & abscessu, quàm crisi morbum finientes. Atque alios quidem à quadragesimo die Hippocrates omnino negligere videtur, sexagesimi verò,



verò, octuagesimi, centesimi, & ceteri vigesimi rationem habet. Ab his deinde alios morbos septem mensibus, alios septem annis, alios, ut verisimile est, duobus & tribus annorum septenariis iudicari tradit.

*Decretoria indicia in morborum principio esse prava.*

## CAP. VIII.

**C**oncoctionis signa nunquam sinistrè apparent. quippe omnis concoctio, naturæ vincentis opus est, eoque semper securitatem pollicetur. Decretoria verò signa aliquando incommodè apparent, propterea quòd crisis ipsa ambigat, nunc bona, nunc mala contingens, ut prius in capite de iudicatoriis diebus est comprehensum. Neque igitur per initia, neque in augmento ipsa commodè apparent, sed ubi morbus inclinaverit, quo tempore natura morbo valentior est.

*Quemadmodum futurum iudicium prænosendum sit.*

## CAP. IX.

**S**i accessiones vrgeant, præveniántq; tempus consuetum, & multo fiant vehementiores, ac tertio quoque die significationem sui præbeant, tum concoctionis signa in urinis, aut deiectionibus, aut sputis cernantur, sine mora plane morbus iudicabitur. Sin accessiones lentè moueantur, eademq; hora inuadant, ac quotidie affligant, longiore temporis spatio interposito morbi solutionem expectabis. Item iis qui ob rigores vehementer febricitant, fieri non potest, ut morbus ante solvatur, quàm illi fuerint leniti. si enim rigor nihil remittat, haud quaquam morbus ad statum pervenerit, multòq; minus inclinatio ipsius speranda est.

*Quomodo instans morborum iudicium agnoscatur.*

## CAP. X.

**A**n te quamlibet iudicationem ægrotus graviter excrucietur. Atque si interdum illa contingeret, noctu affligitur: si per noctem futura est, interdum exagitur. Ac superveniunt symptomata, utpote capitis dolor, quem prius non sensit, præterea collum simul dolet, præcordia sursum conuelluntur, spirandi quædam difficultas repentina oritur, aliaq; gravia accidentia, quæ superiori tempore non percipiebantur, apparent. Atque his obvenientibus, si pulsus non concidant, sed sublimius attollantur, vehementioresque fiant, adhuc si dies decretorius indicetur, isq; potissimum ex illo



illorum ordine, qui probè decernunt, non iudicium modo  
 futurum, verum salutiferum quoque expectato. Neque de-  
 terrere in his te debet, si ægrum delirantem, exilentemve  
 conspicias. Etenim & hæ succorum ad superiora tendentiū  
 notæ sunt: sicut è diuerso inferiora petentium, aliæ, puta imi  
 ventris rosio, circa vmbilicum tormina, lumborum dolor,  
 ventris murmuratio. Est cum alia quoque indicia confimi-  
 lia deprehenduntur. Adhæc si per hæmorrhoidas vacuari  
 laborans consuevit, etiam huius vacuationis circuitus vnà  
 incidit, repetitq;. Pari modo in menstruis, si mulier est quæ  
 laborat, † non absurdum fuerit per talem vacuationē mor-  
 bi fieri iudicium. Iam sudores tum ex corporis madore qui  
 præcessit, vt verissimile est, & præsertim in die cōtēplatorio  
 erumpentes, tum ex meatuum ad apertione prænoscedi sunt.  
 Ac quæ per superna vacuationes futuræ sint, ex his maximè  
 intelligas licet. Nam præter ea quæ iam nobis sunt exposi-  
 ta, etiam ægrotantis facies intuenda est. Item si qua partiū  
 ipsius palpitet, aut venæ in temporibus pulsent, aut gena,  
 aut nasus, aut oculus rubicundior appareat, maior spes va-  
 cuationis per superiora futuræ subest. Quod si etiam sine  
 voluntate illachyment, aut splendores oculis obduci ima-  
 ginentur, ac naribus veluti scabendi studio manus admo-  
 ueant: tūc quidem non amplius morari, sed iam adesse fluo-  
 rem sanguinis videbis. Vbi enim semel ac iterum scaberint,  
 erumpit. Rosio vero stomachi, & labri inferioris tremor, cri-  
 sim per vomitiones futuram subinde nuntiarunt. Atque de  
 his abundè est. Accedit ipsis, ægrotantis ætas & natura, quæ  
 spem nostram confirmant. præterea anni tempus, & præsens  
 aëris status. Nam si æger adolescens est, aut alioquin naturæ  
 calidæ, aut sanguinis copiosi compos, multo magis speran-  
 dum est. Quod si etiam antea, vel æger, vel sanus, vt supra  
 dictum est, vacuationem sanguinis expertus fuerit, hoc vel  
 solum ad profundendi sanguinis spem exhibendam satis  
 est. Iam verò si anni tempus æstas est, aut si non æstas, certè  
 calidus aëris status, ac sæpè illo tempore per sanguinis pro-  
 fluuium crīsim sustinuerunt, corpūsq; sanguine redundet,  
 quod *πληθυσμὸς* nominant, & consuetarum excretionum sit  
 retentio, hæc quoque spem tibi auxerint. Similis porro, &  
 in reliquis vacuationibus ratio habenda est. At si horum ni-  
 hil apparuerit, sed æger in aliquo decretoriorum, qui post  
 vigesi



vigesimum maximè sunt, dierum grauitèr morbum ferat, idq; cum consistit, ac dolores quidam in articulos aliquos decumbant, aut iuxta aures, aliàsve particulas hæreant, aut dolores quidem minimè infestent, verum sudores, particulares continuè ex particula quadam erumpant, per abscessum crìsim excipere oportet. Ac in illa potissimum particula abscessus se promet, quamcunq; vel sudores, vel dolores, vel tumores exercent.

† Hæc ita leguntur οὐδὲν ἄτοπον διὰ τὴν τοιαύτης νενώσεως προσδοκᾶν γίνεσθαι τὴν ἰγίω, id est, non absurdum fuerit per talem vacuationem expectare morbi solutionem: sed hæc leuia sunt.

*Quemadmodum optimum iudicium peractum agnoscamus.*

C A P. X I.

**S**I vacuatio competens post concoctionem accadat, & febris crìsim experiuntur soluantur: ægerq; aliis liberetur accidentibus, & coloratio euaserit pro vacuationis ratione, pulsùmque vegetiorem acceperit, ac tum insurgendo, tum sese erigendo fortior sit redditus, quòdque omnium securissimum est, si ad morbum ferendum facilitas subsequuta sit, ea sanè laudatissima iudicatio habetur. Quòd si horum aliquo deficit, tantum ab optima abest, quantum id valeat, quo deficit.

*De pulsibus ex Galeni commentarijs.*

C A P. X I I.

**P**ulsus motus est, quo cor & arteriæ attolluntur, submitunturq;. Vfus ipsius duplex est. Etenim eleuatione Græci Διαστολήν appellant, qua arteria veluti explicatur quodāmodo, ac patefcit, frigidus aër ingreditur, vitale robur euētilans, recreāsq;. ex quo etiam animalis spiritus habet originem. Submissione, συστολή Græcis vocatur, qua arteriæ extrema ad medium sui confidunt, conuiuentq;, fuliginosa recrementa expelluntur. Cæterum hæ arteriæ, oblonga sunt vasa, venarum modo concaua, sed duplici tunica muniuntur, tum prædicti motus gratia, tum quòd sanguinem, spiritumq; continent. Originem trahunt ex corde, sed per totum corpus membratim distribuuntur. Omnes igitur, & eodem pulsandi modo inter se, & cum corde conueniunt. Quamobrem ex vna ipsarum, omnium rationem queas colligere, nō item omnium ex æquo motum percipere. Sed earum quæ excarnes corporis partes perreptant, promptius.

quæ



quæ carnosæ subsunt, obscurius. Porro iis quæ per brachiale excurrunt omisissis, nullam, aut congruentias, aut vñ comodus attigeris. Primum pulsum genus ex motus tempore sumitur, vt quod eleuatione arteriarum, atq; submissione examinetur. Differentiæ ipsius sunt, citatus pulsus, tardus, & mediocris: quoniam omne quod motui est accommodatum, aut celeriter, aut lentè, aut mediocriter pro temporis ratione mouetur. Citatus est, qui exiguo tempore multum spatij motu emetitur. Tardus, qui longo tempore, paruum interuallum perficit. Mediocris, qui medium quædam motum inter citatum & tardum, peragit. Alterũ genus diastoles quantitate constat. Quoniam enim quodlibet corpus tria sortitur interualla, longum, latum, profundum, arteria autem corpus etiam est: ipsam quoque tribus constare interuallis, necessum est. Verũ in naturali animantis habitu, mediocriter ipsam vnde quaque eleuari reperies. Contrà, cum animal præter naturam habuerit, nonnunquam in aliqua horum distantia deficit, aliquando excedit. In quo statu, meminisse conuenit, qualis pulsus naturalis fuerit. si latitudine maior inueniatur, latum vocabis. si longitudine, longum. si profunditate, sublimem. Liquet autem contrarios quoque ipsis, & naturali minores, ad eum esse modum appellandos, arctum, breuem, & humilem. at inter eos qui omni distantia æqualiter in statum naturæ contrarium vertuntur, quicunque hac ratione imminutus est, paruus: quicunque auctus, magnus nominatur. Tertium genus pulsum, ad virtutis robur exigitur. Differentiæ ipsius tres sunt, vehemens, languidus, & mediocris. Vehemens quidem est, qui tangentis manum valide percutit. Languidus, qui inualide, & imbecilliter. Mediocris, horũ medio consistit, quem nonnulli naturalem esse putauerunt. Nam ira & exercitiis vehementiorem fieri pulsum asserunt, qui à naturæ habitu recedit, quorum dictis Galenus venit obuiam, non constantem inquires, sed promptè mutari eum pulsum, qui ex causis non naturalibus vehementior euadit. Pulsus igitur vehementior, qui non expeditè mutatur, is nimirum naturalis, & moderatus fuerit. Quartum genus, instrumenti constitutione constat: dico autem arteriæ corporis statu. differentiæ huius quoque tres sunt. Vel enim instrumentum durius est, quàm natura exigit, ac pulsus vocatur durus. Vel mollius,



lius, ac nominatur mollis. Vel mediocriter habet, ac moderatus inde nuncupatur. Quintum genus, ex quantitate humoris infusi arteriæ pendet. Hæc habet discrimina. Plenus est, vacuus, & mediocris: quoniã totum vas, aut plenum est, aut vacuũ, aut mediocriter repletum. Plenus itaque est pulsus, vt Archigenes definit, quĩ arteriã pleniorẽ repræsentat, & occursum eius humiditate plenum, vacuus qui aëris modo arteriam excitat, vt digitorũ impressione loci inanitas occurrat. Hæc igitur quinq; pulsuum genera, vno arteriæ motu constant. quoniã verò caloris, qui in corde habetur qualitas, ex arteria quodãmodo magis euidenter appareret, dignati sunt quidam etiam hoc pulsuum genus Sextum cõmemoratis annumerare. Ad reliqua verò genera, tum quæ ex vno, tum quæ ex multis pulsibus sumuntur, pertinet quod quietis tempore cõstat, & quod rhythmo, & quod equalitate, & inæqualitate, insuper quod ordine & inordinatione cõstituitur. Quod itaq; quietis tempus spectat, Septimum à primo numeratum diuiditur in frequentem, & rarũ, & moderatum. Nam cũ arteria duplici agitetur motu, qui ex cõtrariis constat particulis, necesse est vt duplex quies cũ ipso coincidat. Altera quæ post eleuationem, ante submisionem est: altera quæ secundum submisionem, eleuationem præcedit, quæ etiam quies plerisq; imperceptibilis esse videtur, vt inter duos motus quies aliqua media existat. Cui itaque longũ quietis tempus est, is rarus dicitur: cui breue, creber: cui mediũ, moderatus. Octauũ genus pulsuum ad rhythmũ pertinet. Est autem rhythmus summatim quidem dispositio, aut temporis ad tempus proportio. In pulsu autem, secundũ nonnullorum sententiam sane, temporis motus, ad quietis tempus, vt eleuationis & submisionis, ad aliquam quietem interpositam. Secundũ aliorum verò opinionem temporis motus, & quietis, ad motus quietisq; tempus, aut motus ad motum, nempe eleuationis ad submisionem, aut quietis ad quietem, puta interioris ad exteriorem proportio. Differentiæ rhythmĩ principes sunt due, pulsus boni rhythmĩ, & nullius rhythmĩ. Porrò vocatur pulsus nullius rhythmĩ, nũ quĩ nullũ rhythmum obtinet, id enim fieri non potest, sed malo rhythmo præditus, quemadmodum nullã habere vocem, nullam ceruicem, eum dicimus qui malam ceruicem malamq; vocem sortitus est. Ceterum pulsus cui nullus rhyth-



mus adest, triplex differētia existit. Alius siquidem est pararhythm<sup>9</sup>, mediocrē boni rhythmiperuersionē obtinēs. Alius heterorhythmus, id est alterius rhythmī, qui longius à bono recessit. Alius ecrhythmus, qui omnino bonitatē rhythmī corrūpit. Veluti cum puer significatur, peculiaris quidē puerili aetati secundū rhythmū pulsus eurhythmus appellatur: qui ad vigentē aetate pertinet, heterorhythmus: qui nihil huius seruat, ecrhythmus dicitur. Nonum pulsum genus est, quod in omnibus prādictis inuenitur aequalitate & inaequalitate constans, quod vel in vno pulsu spectatur, vel in pluribus id quod à collectione pluriū, systematicum quoque vocant. de quo prius tanquā manifestiore dicendum erit. Aequalis itaque pulsus est, qui consequentia par est siue magnitudine, siue robore, aut velocitate, aut reliquorū aliquo, aut etiam omnibus. Inaequalis, qui consequentia impar est. Si enim subsequentes vniuersi pares magnitudine qualicunque inciderint, eiusmodi pulsus aequalis vocatur. At si primus, secundus, & tertius pares fuerint, quartus autē impar: talis nimirū magnitudine inaequalis dicitur. Huius generis sunt, & deficiens, & coincidens. Non solum enim post vnū aut etiam plures magnos vnus minor apparet, sed nōnunquam totus quoque motus omnino aboletur, & pulsus deficiens appellatur, sicut alter huic cōtrarius coincidēs, cum expectata quiete in medio tanquam superuacaneus aliquis pulsus inciderit. Sin autem secundus primo paulo minor factus sit, tertius secundo, & quartus tertio pari modo, idque deinceps longius, illiusmodi pulsus myurizontas & myuros nuncupant, nomē à figuris, quę in mucronem desinunt trāferentes. Qui quidem perpetuo ex ipsis imminuuntur, ac nunquam decrescere cessant, in absolutam motus defectiōnem finiunt, ac vocamus ipsos myuros deficientes. Qui verō cessant, duplici continentur differentia. Nonnulli siquidem ipsorum in qua primum defierant paruitate, hanc perpetuō conseruant. Quidā verō augefcunt rursus, vel in parē priori magnitudinē redeūtes, vel ad minorē, vel ad maiorē, ij myuri recurrentes dicuntur. Iā verō & in vnius pulsus inaequalitate myuri pulsus fiunt, de quibus suo loco paulo post tractabitur. Huiusmodi sane quādā est pulsum inaequalitas, quę systematica appellatur: Atque vno in pulsu deprāhenditur, vel in vna arteriæ particula, vel in diuersis accidit. quē  
adm



admodū in motu, exempli gratia, in vna quidē particula arteriæ inæqualitas dicitur, cū aliter inceperit, ac aliter defierit moueri circa vnū digitum arteria, incipiens quidem citatior, definens autem tardior, vel è cōtrario. Atq; hoc triplici modo accidit, vel motus continue manet, vel intercidit, vel repetit, & veluti bis percutit. Si igitur manens continuus & nō intercisus, à celeritate ad tarditatē trāfierit, aut è cōtrario, impar citatus græce ἀνωστήχους eiusmodi pulsus, & est, & dicitur. Quod si quiescat, & quiete interpollata postmodū velocior appareat, Caprizans appellatur, ex capra animante sumpta trāslatione, quæ saliendo sublimis in aëre cōsistit, & secundū quendā motū inopinatum priore citatiore molitur. Porro si ab eleuatione recurrerit, & ante submissionē absolutā, secūdo manū tangētis ferierit, dicrotus huiusmodi pulsus appellatur. Simile quippiā in incudibus fieri cernas licet, quippe mallei, simulatq; semel manu in ipsas incusseris, reciprocatur, incudū renixu, & secundū rursus, vel etiā tertiū feriunt. Atqui nō solū inæqualitas quæ vno ictu in eademq; arteriæ particula accidit in motus tempore, potest fieri, verū & illa quæ virtutis robore cōstat: nō autē ea, quæ distantiarū quantitate cōprehenditur. Nullo enim modo idē pulsus eadē in particula magnus & paruus queat effici: neq; in alio genere, sed in diuersis particulis. porro in variis arteriæ particulis vnoq; in pulsu duplex fit inæqualitas. nūc quidem cū motus manet continuus, & arteria iuxta quosdā digitos citius mouetur, iuxta quosdā verò tardius. nūc autē cū motus quoq; interciditur, vt nōnulli quidē digiti motū apprehendant, nōnulli verò nō. Ac iuxta eleuationis quantitatem in pluribus quidē particulis inæqualitas manifesta est. Ex quo genere sunt myuri vno in ictu inclinantes, quos Græci vocant ἐπιγινώσκοντας, & περιγινώσκοντας. Si nāq; interna digiti parte magnus occurrit pulsus: & curuatus inde iuxta rationem minuitur, vt in exteriori quæ ad egrotātis pollicē spectat arteriæ parte, minimus idē appareat, myurus vocatur ad muris caudæ similitudinē, vel meius quod caudæ modo imminuat. At si iuxta medios digitos magnus occurrat, curuatusq; vtrobq; minuatur, minor apparēs, hūc Archigenes περιγινώσκοντας quasi dicas latinē inclinātē, & περιγινώσκοντας appellauit, manifesto significare volēs eleuationis breuitatē, cū extremorū vtrorūq; veluti inclinatione. Nō em̄ vt abscisus vniuersim ac



subito, vtrinque; partibus, sed veluti inflexis in arcum contractus est, utpote myurus, hoc est imminutus magnitudine vtrisque; in partibus. Accum secundum magnitudinem inequalitas, id quod maturius est, aut tardius, assumpserit, tum vndosi, tum vermiculantes, pulsus oriuntur. quod si id quod in situ est, acceperint, conuulsorij & turbulenti, ut vocant, constituuntur. exordiendum igitur est ab vndosis, in quibus non simul apparet in tali inaequalitate arteria omnis eleuari, sed pars illius alia primum, mox alia, dein alia, postremo quarta, ut motus continuus maneat in modum vndarum sese eleuantium. ac nonnulli vnam in rectum tendentem obtinent. quidam in latus inclinantem, & alij in breui longitudinis distantia, altitudinem magnam habent, alij contra, aliqui latitudinem, aliqui angustiam. Similiter etiam celeritate & robore inaequales sunt. Vndosus totus in paruitate cessans, vermiculas appellatur, vermis gressui assimilatus. Quemadmodum vero vndosum pulsus minorem factum vermiculans excipit, ita vermiculante formicans, ubi motibus multis abolitis in unum eundemque; perquam exiguum defierit. Vocatus hic quoque est a formicae animalis similitudine, tum ob paruitatem, tum ob motus speciem. Est enim formicans admodum exiguus, ut quo minor alius non extet. Pari modo languidissimus omnium creberrimus non tamen citatus, ut Archigenes existimauit. Huic confinis est Hecticus. quemadmodum enim febris, sic etiam pulsus Hecticus est, qui nullam magnam mutationem subit, sed perpetuo consimilis manet, trahitque ut ab initio incepit, & nunquam soluitur, toto habitu in morbum conuerso. Porro conuulsorij pulsus vtrinque; ab extremis sursum retrahi, tendi, & conuelli videntur, ceu chordae cuiusdam tensae sensum praebent: at in turbulentis nihil tale reperitur. Sed maior in his eleuatio est, ut arteriae particulae quaedam sursum ferantur, vno eodemque tempore, ac motum ipsarum spiculis rectissime assimulaueris: quae validius emissa, celeriter feruntur vibrata. Serratus pulsus est cum alia pars arteriae elata, alia minus, ob duritiem nimirum ipsius esse videtur. Caeterum pulsus hic etiam turbulenti quippiam possidet, ac citatus quidem est, creberrumque; non semper autem magnus. Decimum genus pulsuum ex inequalitate profectum commemoraris succedit, quod ordine, & in ordinatione constat. Nam ordinatus & inordinatus inaequali in circuitum paritate: & prorsus imparitate diuiso, ex vtraque; sect



fectione originē trahūt. Ex circuituū paritate ordinatus: ex absolutaverò imparitate inordinatus. etenim pulsus equalis omnino est etiā ordinatus, siquidē subsequētia parē ipsū dicebamus: inæqualis autem non omnino inordinatus est. Si nanq; paritatē corrūpat, circuitū verò seruet aliquē, ut in eleuationis quantitate, verbi gratia, si duo magni, & vnus paruus sit: deinde rursus duo magni, & vnus paruus, atq; sic deinceps, vocabitur inæqualis quidē, sed ordinatus. At si præterquā quod paritatē corrūpat, ne ordinē quidē aliquem inæqualitatis cōseruet, cū inæqualis tū inordinatus talis est: similiter in aliis quoq; generib<sup>9</sup> se habet. Inordinatorū quidē, alij sunt ex toto inordinati, ne vel exiguū quēdā circuitū cōseruātes, alij verò secūdū circuitus ordinati. Quatenus enim cōtinuam ordinationem nō habent, inordinati vocabūtur: quatenus autē diu circuitum quendā tuentur, secūdū circuitus, ordinati vocari queant. Exempli gratia, si contingat duos magnos fieri, duos item paruos, deinde tres magnos, & tres exiguos: quatuor magnos, & pares exiguos, & rursus tanquā reflectentes duos magnos, & duos exiguos: tres magnos, & totidem exiguos: & deinceps similiter. scire verò cōuenit, inter alios quidē contrarios singulos, quendā esse mediū. Aequalis autē & inæqualis mediū nullū: neq; ordinati, neque inordinati: nisi voles secūdū circuitus ordinatū mediū dicere ordinati & inordinati. Cæterū aliorū omnium mediū, secūdū naturā sunt, præterquā vehemētis & languidi, ut à nobis ostensum est. Inter hos autem æqualis solus secūdū naturā est, reliqui præter naturā, inæqualis ordinatus & inordinatus. Hæc pulsū genera vniuersa sunt, & generales ipsorū differentię. Nonnulli verò his etiā alia duo annumerarūt. Primum à situ arterię sumitur, quatenus sursum, deorsum, dextrorsum, sinistorsum deducta esse videatur. Alterū quo maturius, aut tardius: ex quorū numero vndosos turbulentosque pulsus esse diximus, ac nos cōpendij gratia simplices solū differētiās prodidimus. ex dictis autē si cōiugamus has, facile erit etiā compositas inuenire. † Porro opportunū erit deinceps, causās quoq; pulsibus cōuenientes exponere, quas comitatur etiā præfagiū ab ipsis desumptū, ac initiū à magnitudine capiemus, quoniā hæc aliis est manifestior. Magnus igitur pulsus redditur, vel propter vsum vrgentem, qui calor est in corde exuperans, externæ



appetens refrigerationis, & veluti euentilationis, aut propter corporis gracilitatē, vt posterius ostendetur. Porro augetur calor, aut ex causis naturalibus, vtpote ætate florida, aut puerili, aut simpliciter calida, anni tēpore, regiōe, & tēperamento calidiore. Aut causis nō naturalibus, veluti aëre qui nos ambit calidiore, balneis calidis, exercitiis, cibis vino, medicamentis calfaciētibus. Aut causis naturæ cōtrariis, puta intemperie calida, aut humorum putredine, aut ira, aut similibus. Discernes vnus cuiusque pulsus hoc discrimine, quod causæ naturales magnitudinē ipsius faciunt stabilem, & quæ difficulter mutari queat. Reliquæ verò, ex facili mutabilē, vt etiā manu adhuc admota frequēter, aut certe paulopost subsidat. Iā verò pulsibus, qui sane ob balineas calentes magni sunt, mollities quoque accedit, quemadmodū iis, qui ob calidā & præsertim cum siccitate intemperie magni existunt, durties. Exercitatis verò mediocriter, aut perfricatis, nec duri, nec molles sunt, medio statu præditi. Pectoris autem regio, multo calidior est, quod iam & iratis accidit. Ex cibo autē magnis, aut vini vsu, aut ira, præter magnitudinē etiā vehemētia inest. Qui verò occultare irā studēt, aut aliud quid præter medici permissionē factū, verbi gratia medicamē calidū sumptum, eundem medicū simulatque manū attingat, interrogantem celare volētes, iis præter magnitudinē manifesta quoque oboritur inæqualitas. Ad hæc ægrotantis mores & consuetudo nō mediocriter ad pulsus dignotionē faciunt. Cōsuetudo quidē, si medicaminū appetens sit si & rudis mores, si opinionis eximendæ peritus & callidus sit. Ex humorū putredine magnus, ad magnitudinē adhuc submissionē magis citatā habet. Verū ad magnū pulsus efficiendum, non solū vsus abunde est, sed etiā virtutis ministeriū desideratur, instrumētūque cōmoderatio inter siccitatē & mollitiem. Aucto igitur cordis calore propter quālibet causam ex cōmemoratis, primū quidē magnus pulsus efficitur: vbi verò magnitudo vsui nō suffecerit, statim etiā celeritas ipsi accidit. At si ne sic quidem satis fuerit, mox frequentiam assumit, parui autem, tardi & rari pulsus, itidem à contrariis fiunt. Sed quandocunque à magno citato & crebro ad contrarios fit mutatio, vsu nimirum postulante, non amplius id quod in pulsu primum factum est, id etiam primum cessat, verū quod postea acquisiuit, id primum abiicit, statim



statim quidem rarus euadens, deinde tardus, postea quoque  
exiguus. Sin autem tarditas paruitasque accreuerint, è con-  
trario raritas in crebritudinem trāsmutatur, ut per eam ut-  
cunq; vsui fiat abunde. Hę igitur magnitudinis, celeritatis,  
frequentię, & contrariorum ipsis pulsum causę habentur.  
At iūgetur ipsis ea quoque pulsus immutatio, quę una so-  
lum distantia constat. Itaque latitudo sola augetur, dum hu-  
miditas potissimum, vel secundum naturam, vel etiam ab  
exterioribus causis redundat, quemadmodum sublimita-  
tis pulsus ob instrumenti mollitię virtute ad hoc opitulante,  
longitudo à siccitate, & carniū circumpositarum emaci-  
atu palam efficitur, reliquis distantis collapsis. Non enim  
arteria longior, quā postulat natura fieri potest, ac proprie  
magis pulsum huiusmodi gracile appellaueris, quēadmodū  
ipsi contrariū secundū latitudinem solā, & profunditatem  
adauctū, amplū. Contrariis autem horum affectibus pulsus  
nonnunquā incidit, & in aliqua, aut aliquibus distantiis pro-  
hibetur, humilis, aut arctus, aut brevis apparet, cū talis non  
sit, sed ob pinguedinis cuiusdā, aut carniū, aut membranarū  
oppositarū crassitię apparet. interim, etiam totus paruus vi-  
detur, cū re vera paruus non sit, & languidus similiter. Quid  
opus est verbis: sæpe absoluta pulsus defectio quibusdam ef-  
fe putatur in omnibus arteriis, cum vere non sit, & maximē  
iis qui negligentius ipsum tangunt, sed cum motus ob car-  
niū copiam delitescit, re vera obscurus existit. non enim  
extrema pulsus defectio homini potest accidere, quoad vi-  
ta fruatur. quēadmodum igitur rursus in locis excarnibus,  
etiam parui pulsus, magni esse videntur. Corpore itaque ve-  
hementer emaciato, arteria spinam perreptans, sæpe tan-  
gentibus abdomen, motum representat, ac nonnulli etiam  
ex his, quę prius in artubus non erant conspicuę. Quamob-  
rem omnibus causis diligenter attendendum censeo, ne di-  
gnotio ipsorum nos lateat. Pulsus autem vehemens virtu-  
tis robore efficitur, si nulla ex causis reliquis renitatur, ut-  
pote vsus dissolutus, aut instrumenti durities. Languidus au-  
tem pulsus, imbecillę virtutis & solius soboles est, aliud li-  
cet nullum adfuerit. Siquidem vehemens omnibus causis  
ad sui generationē indiget, languidum etiam sola imbecil-  
litas efficit. Qui igitur per initia vehemens est, ætates anni  
tēpora, regiones, & temperamenta moderata comitatur,



languidus immoderata. Porro qui à languore in vehementiam incidit, virtute vindicata ab imbecillitate prius occupante efficitur. Vindicatur vero, aut ex his quæ in ipso corpore continetur, veluti humorum cōcoctione, vel excretionem vel ira: aut ab exterioribus, nempe vino, cibo, exercitiis, ac aliis quæ intemperie corrigunt. Vires dissoluunt, inedia, vigiliæ, vacuationes immodicæ, tristitia, curæ & dolores, maxime animæ defectionem inferentes, ac omnia quæ intemperiem faciunt. Quidam vero ex rudibus ac in exercitatis, durum pulsum vehementem esse putauerunt, quod discrimen exercitatum, tum ratione, tum tactu, nunquam latuerit. Nam vehemens magna ex parte cū magnitudine in sublimitatem attollitur, tactum valide percutiens: durus magnitudinem non recipit propter arteriæ contumaciam: fit igitur durus, ob instrumenti duritiem, quā refrigeratio immodica, aut siccitas, aut tensio ab inflammatione profecta, aut conuulsio generat. Statim vero duritiæ etiam paruitas, & celeritas nonnunquā, & frequentia magnitudinis loco propter usum sequitur. Mollis pulsus, arteriæ humiditatis comes est, quā humidiorē reddūt ex iis quæ secundū naturā sunt, humectiores cibi, balnea frequētia, somnus multus, victus copiosior & animi oblectatio, ex his quæ præter naturam sunt, sopores, lethargi, aquæ subter cutem, & reliqua pituitæ vitia. Plenus pulsus, aut humorum copiam, aut ciborum aut vini potionis abundantiam indicat, quæadmodū vacuus contraria, aut enim inediam, aut vacuationem. Vbi calidius arteriæ corpus occurrit, multam in corde caliditatem, reliquo corpore refrigerante, aut conuulsoriam quāpiā arteriarum violento motu incalescentium, dispositionē fatetur. Archigenes vero tradit arteriæ locū proprie in catochis calidiorem deprehēdi, quemadmodū in iis, qui conuulsionem cum graui animi in somnū delatione quā cataphorā appellant. At rhythmus, de quo disputatum est, si par sit motu & quiete, probam totius corporis temperiem præ se fert, quantum ad se pertinet, vel non magnam à bona declinationem, sicut in ætate puerili, & corporibus alioquin temperatis. Ac si longius quietis tempus fuerit eo quo motus peragitur, calorem præpollere notat, quæadmodū in ætate florentibus, & his proximis, veluti igitur in corporibus senilibus æquabiliter frigidis, diuturnius motionis tempus est quā quietis. Notare autē



autem oportet rhythmī inæqualitatem mensuram esse eius quæ celeritate & frequētia consistit. hanc autē veluti materiæ rationē ad rhythmū obtinere. Iam vero deficientes, coincidentēsq; pulsus fiunt, viribus oppressis, & veluti aggrauatis, sed coincidentes minorem offensam, deficientes maiore significāt, ac in vniuersum virtus oppressa grauataq; pulsus mutat ad inæqualitatē inordinationemq; , tum aliā quamlibet, tum eam quæ vehementia & magnitudine constat. Ac ex myuris pulsibus genere duplicibus demonstratis ( vel enim in systematica, vt vocant, inæqualitate, vel in ea quæ vno fit ictu, deprehenduntur ) deficientes quidem extremam virtutis internitionem notant, repetētes autem recurrentēsq; , & ipsi quidem imbecillē, sed repugnantem adhuc resistantēq; , & renuentem indicant. in vno autē ictu myuri & inclinantes, quos *πινυδνότης* vel *πριγινυδνότης* appellamus, maxime iis fiunt, qui paulatim contabuerunt, inflammationibus nō solutis, præterea plurimis quomocūq; tabescentibus, dū partes quæ circa arterias habentur, emarcescunt. Porro inæqualiter citati & caprizantes, febriles potissimum calores comitantur: verū si pulsus eleuationis principia dissoluens, extremum ipsius acceleret, & submisionis initium, putredinem exuperantem notat, natura fuliginosis recrementis excernendis incunabēte. Sin autem ē contrario submisionis initium dissoluerit, ad eleuationem vero magis instet, calorem præpollere scias, qui refrigerationē desideret. Comitatur hæc in febris etiam crebritudo plurima ex parte, interdū magnitudo quoq; , nisi virtutē instrumenti durtitia impediāt. Cū autē hæc in arteria intenditur, & virtus non sit inualida, pulsus fit qui à bis feriendo dicrotus appellatur. Porro vndosus humidiores potissimum affectus sequitur, atq; his magis aquæ subtercutem genus, quod Anasarca vocant, itē lethargos, & peripneumoniam. At cum virtus dissolui inceperit, sed paululum adhuc resistat, vndosus in vermiculantem decedit, vbi extreme collapsa fuerit, etiam hunc formicās excipit. Hecticus autē proprie cōtabescētes & alioqui emarcescētes sequitur. Cōuulsorius fit, quū nervorum origo inflammatoria quadā affectione cōflatur, sicut in phreneticis, & acuta epilepsia correptis, quando etiā moriuntur, adhuc calentes, qui hoc vitio sunt occupati, contrario his modo quos syncope inuadit. illi nanq; vehemēter



etiam frigidi, adhuc viuunt. Turbulentus autem pulsus efficitur, cum vsus magnam eleuationem requirit, ac vitale robur eam potest creare, solum vero arteriae corpus praeduritie, in magnam attolli diastolen, vt in magnis inflammationibus, obstructionibusque diuturnis, impotens refragatur. Pulsus serratus in totum index est inflammationis, & praesertim partium quarundam nervosarum: quinetiam pleuritidi peculiaris est: remittens quidem, leni & ex facili concoquenda: intensus autem difficili, & concoctu peruiaci: quae cum imbecilla quidem virtute, subito in periculum praecipitat: cum valida autem longo tempore concoquetur. Vel enim in vomitam transijt subinde, vel marcida tabes ipsam excepit. Iam vero sciendum venit, in ordinationem commitari inaequalitates. raro siquidem inuenire est inaequalem pulsum, ordinatum. Minores offensa, inaequales pulsus & ordinatos: maiores, inaequales & inordinatos procreant. Haec igitur simplices pulsum causae sunt & praesagia. Ex his etiam compositas, vt in sermone de differentiis ipsorum dicebamus, haud negotiosum est inuenire.

† Rectior est haec scriptura quae in vetusto codice est. ἔστι δὲ αὖ ἐν λέ-  
γῳ ἡ τὰ αἰτία τὰ γέγοντα τὸς σφυγμῶν. Porro opportunum erit deinceps  
causas pulsum immutantes exponere facile enim fuit librario scribere γέ-  
γοντα pro γέγοντα.

De deiectionibus. CAP. XIII.

**A**luus optima est: mollis, coharens, & eodem tempore quo in secunda valetudine affluevit, reddita. Talis nimirum est quae leuiter ruffa est, simul & conuenienter spissa, non nimis foetida: quae talis non est, mala censetur. Quae igitur colore similis cibo ingesto cernitur, & tenuis, & non exucata & celeriter descendens, cruda est, At mere ruffa, initio quidem biliosorem morbum indicabit. sin autem in declinatione talis excernatur, corpus probe expurgari denuntiat, viridis æruginosae bilis nota est. nigra, vel atræ bilis, vel sanguinis cuiusdam indidem adusti. liuida, refrigerescere quodammodo, & emori non parum interiora significat. oleosa pinguisque, corporis pinguitudinem consumi inuit: quemadmodum rursus viscosa, pingui cum sit deterior, animantis particularum consumptionem praese fert. Nimis foetida haud exigua fatetur putrefactionem. Porro in omnibus hisce, si alius qualitate cibo assumpto non respondeat eodem



eodē iam modo affectio quoq; considerabitur. Omnīū deterrima & pestifera, erit nigra, liuida, oleosa, celeriter trāsiens.

*De vrinarum notis.*

CAP. XIII.

**Q**uemadmodum in deiectionibus, ita in vrinis quoq; regula sanorum vsi, de ægrotis indicia sumemus. Vrina igitur præstantissima est, quæ sanis simillima. Talis nimirum est subrufa simul & subflaua. nimirum vero hæc & crassitiem moderatā habet. At cum triplex turbidarum vrinarum sit differentia, (vel enim redditæ tales, paulopost subsidunt, vel consimiles perpetuo manēt: vel puræ excernuntur, deinde vero turbantur) praua quidem existit tertia ordine dicta, moderata benignaque, prima: medio vtriusque consistit secunda: summe cruda est, exacte aquosa, veluti desperatæ cōcoctionis venosi generis accidēs. Quando autem celeriter descenderit, diabetes, vt Græci appellant, efficitur. Verum hæc sane inter vrinas crudas deterrima est, succedit autem ipsi, tenuis admodū & aquæ modo exalbida. Huic vicina est alia vrina, quæ multis in morbis apparet, tenuis admodum, & albæ propinqua. Subpallida verò hanc sequitur: quæ pallida quidem modo erit, & subrufa, concoquitur autem tam quantum ad colorem ipsius attinet. Tantum verò crassitie ipsam ab aquosa recessisse oportet, si probè concoqui debeat, quātum etiam colore, sin autem hoc secundum naturam adamussim seruat, subsidens album, leue, equale, & copiosum reddit, exactæ nimirum concoctionis nota fuerit: largius autem crudum, humorem, expurgari signat. Iam verò si vrina crassa modicè fuerit, habeatque subsidens aliquod, non cruda, iam ex toto erit. Si enim subsidentia parti farinæ crassiori, aut laminis similia, aut fursuri, aut nigra, aut liuida, aut viridia, aut fœdi odoris, habeat, præterquam quòd quæuis huiusmodi in cruditate est, etiam mortis periculum aliàs ostendit. Porro boni coloris vrinæ quæque simul, vel subsidentia alba, leuia, & æqualia repræsentent, vel nebulas quasdam similes, vel suspensa, omnium vrinarum sunt laudatissimæ, & præcipuæ, quarum subsidēs, tale extiterit. Deinde commendatur vrina cuius suspensa huiusmodi cernuntur. Tertium bonitatis locum habet, cuius nebulae tales apparent. Ac, vt vno verbo expediam, quæ vrinis probè innatant, quanto inferius subsiderunt, tanto magis laudantur.

De



**S**putum subflauum, subrufum, leuiter spumans, & tenue, solam cruditatem, malum vero nullum insignius denuntiat. At syncere flauum, rufum, spumofum, viride, glutinosum, rotundum, atque his adhuc magis nigrum, prauum est. Etenim præter sanguinem, quisquis alius humor syncerus est, prauam ostendit affectionem, caloris flammæ sobolem. Cruenta igitur sputa mediocria sunt: flauæ, aut nigræ bilis, difficilia. Cæterum quomodo ipsa ædantur, inspicere simul expedit. Nam si prompte excreentur, liquido constat talia quidem esse salubria. contraria vero periculum testari. absolutam itaque concoctionem fatetur sputum leue, album. æquale: & substantia neq; liquidum, neque valdè crassum. Summæ vero cruditatis nota est, si nihil prorsus expuitur. At si expuatur quidem, sed tenue, languidæ concoctionis argumentum est, Sin autem Syncere rufum prodierit, aut flauum, nihil boni pollicetur. Si liuidum, aut æruginosum aut atrum, summam perniciem portendit.

**D**iaras febres, vrinarum in primo die concoctio, calorisq; suauitas seu propriæ ipsarum & inseparabiles notæ testantur. Verum à prima febris solutione, certiorē habiturus es earū cognitionem. Quippe arteriarum in hac motus ei qui in secunda valetudine fuit, ex toto respondet, cum nulla ex aliis febribus in naturalem statum reuertatur. iam verò quòd facile morbum fert æger, maximum & id indicium est. Opportuni sunt id genus febribus, in quorum corpore quod defluit, halituosum non est, sed mordax & acre, fumi instar. Hi autem sunt calidi & sicci temperamēto: breuiter, biliosi, quos *πυροχολός* Græci vocant. qui igitur ob lassitudinem febricitarunt, pinguius simul ac molliter fricandi sunt, in balneumq; ducēdi. Quibus siccitas febrē intulit, fricandi hi quidem minus, sed lauādi sunt liberalius. Quos curæ mærores, vigiliæ & ira exercuerunt: lauare quidem non subinde oportet, verum oleo copiosiore tepido, cui minime astringens vis inest, tum paululum fricare, tum ex consuetudine lauare conuenit. Ab insolatu vsti, protinus ab initio refrigerationem desiderant, tum crebriorem lauationem minime, verò aut oleum largum, aut crebram frictionem. Sint autem quæ refrigerent & rosaceum & ompha



omphacinum sine sale confecta: eadem vero sincipiti vehementer refrigerata superfundere oportet, & ubi febris inclinauerit, in balneum æger ducendus est. Si quis ex frigoris iniuria febrem concepit, etiam is in remissione lauandus est. At si cum grauedine, & destillatione febriat, priusquam hæc concoquantur, lauatiōi non committetur. Porro qui ex æstu Solis febricitant, ij, etiam cum hæc adsunt, lauandi sunt: qui autem ex frigore, iis quoque caput mediocriter calefacientibus perfundendum est, cuiusmodi irinum est, & nardinum vnguentum. Verum in quibus meatuum constipatio febrem excitat, his conuenit ex aqua dulci, & temperata lauatio, tum frictio, quæ rarefaciat, & exercitationes modicæ, victusque bonis procreandis succis idoneus. At cui propter inediam, febris contracta fuerit, ei opus est statim, ubi prima accessio remiserit, in balneum perducī, & tepente oleo largissime perfundi, tum molli manu perfricari, diutissime in calidi solij aqua immorari. Simulatque exierit, ac sese recollegerit, denuò balneum ingredi, postea aquam calidam potare, mox ptisanæ cremorem, deinde lactucam assumere, & aliquid piscium eorum qui molli sunt carne, ex albo iure. Omnium verò communis esto victus species, quæ & boni sit succi, & cōcoctu facilis, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus inhæreat. Vinum propinetur & aspectu, & viribus aquosum. Oportet autem in primæ febrium accessionis insultu nonnunquam aliquos horum nutrire, in quibus corporis intemperies ad calidius, sicciusque transiens, febres accendit. Qui ob bubonem hoc est inguinum inflammationem febrem conceperunt, ne medicum quidem interrogant quid sit faciundum, sed vlceri, quod bubonis occasio fuit, prospicientes lauant, ubi accessio declinauerit. Caterum à vino ipsi sunt arcēdi, donec inflammationes inguinum fuerint, solutæ, & tenuiore victu enutriendi.

*De putridarum febrium agnitione.*

CAP. XVII.

**P**utridæ febres dignoscuntur eo quòd nulla ipsas exterior causa præcedat: item quòd à rigore incipiant, neque insolatu, neque vehementi frigore prægresso. id quoque peculiare est febrium putridarum indicium, sicut & pulsuum depressio. Nominant sic, cum incipiente accessione perexiguos quidem ipsos & inæquales obtinent: hoc enim singulariter huiusmodi febrium est proprium, maxima autem putrida



tridarum febrium nota est etiam qualitas caloris, qui fuliginosus adeo existit, ut manū erodat. Similiter ad ipsas propriè spectat etiam vinarum cruditas, & obscura concoctio. Magnum verò & notabile concoctionis indicium, in primis vrinis nunquam eiusmodi febres repræsentant.

*Curatio febrium putridarum.*

CAP. XVIII.

**S**I vires sint validæ ei qui ex putredine febricitat, sanguinem dimittes protinus, modo cruditas in ventre nō existat. At si vires imbecillæ, aut ætas prohibeat, sanguinem non detrahes: à cuius vacuatione, putrida per vrinas, aluum, & sudores expurgare conuenit. Sin autem sponte sua nonnunquam impetum ad os ventriculi capeffant, etiam per vomitum: alioqui non oportet ea præter naturam irritare: cæterum deligi materiæ debent, quæ sine calefaciendo siccandoq; valenter, prædictas vacuationes moliri possunt, veluti ptisanæ cremor, aqua mulsa, oxymeli, & apomeli, apiiq; radix in aqua potabili incocta. Cū alius nihil deiecit, ex aqua mulsa cum oleo clystere ducenda est. verum totum corpus rarefacere prius non expedit, quàm vacuatum fuerit: ubi vacaueris, rarefacias utique licet, medicamento tepido calore prædito, quale est, quod ex chamæmelo conficitur. in hoc tempore vinum aquosum potui datum, vniuersas promouet vacuationes: eiusdem facultatis est temperatum dulcis aquæ lauacrum. Quòd si vero febris magnitudo obstiterit, neque vino vtendum, neque lauacro, neque vnctionibus rarefaciendi virtute præditis, sed aqua frigida his in febribus commodè bibitur, nisi quid & hanc prohibeat. Ergo si quidem & vires robustæ omnes fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis signa planè euidentia, frigidam cum fiducia exhibebis. Præterea si bona corporis habitudine sit æger, tum status cœli calidus ac siccus, etiam si in frigidâ natationem hunc dimittas, haud quaquam lædetur: sin autem mediocris existat febris, & vires inualidæ, sed cum notis concoctionis, iis qui ita habent balneum prodest, & vini portio. Tum verò ex vnctionibus eæ quæ rarefaciunt.

*De tertianarum agnitione.*

CAP. XIX.

**T**ERTIANA febris cum sit flauæ bilis commotæ soboles, protinus ab initio rigorem, haud exiguum iufert. hoc discrimine à quartanæ rigore variat, quòd pungere videatur, & cutem conuulnere. In quartanis autem, accessionis  
insul



insultus vehementem perfrictionem habet. Quotidianas vero nequaquam rigor præcedit: sed solum perfrigescunt. Cæterum tertiana etiam exactum pulsum ordinem obtinet. fiti verò vehementi in statu affligit, & hominem perurit, ac paulò post confistit, calorq; æquabiliter per omnes corporis partes diffunditur. Et si manum iniicis, primo quidem contactu, calor copiosus & acris occurrit, veluti cum vapore quodam erumpens, sed paulò post à manu remanente vincitur. Vbi portione æger fuerit recreatus, statim copia vaporis calidi per cutem emergit, sudorum nuntia. Bilis vomitio superuenit, aut aluus soluitur, perq; vrinam biliosa redduntur. Præterea ad integritatem tertiana desinit, vbi accessio- nis tempus, horarum non plurium duodecim expedierit. Fe- brem igitur quæ intra duodecim horas terminatur, exactã tertianam nominamus: quæ verò diuturniorem accessione habuerit, illam simplici vocabulo tertianam nuncupamus. quæcunque autem longissimè productam accessionem ser- uauerit, exiguum vero interuallum, hanc rursus extensam tertianam dicimus.

*Curatio tertiana.*

## CAP. XX.

**E**Xquisitam tertianam, vt quam flauabilis procreet, hume- ctare oportet ac refrigerare. & sanè quod in ventricu- lum confluit, vomitionibus, & inferius elicere. Item per vri- nas, & sudores deducere idipsum conuenit. Aluus itaq; mol- libus clysteriis euocatur: vrina portionibus, in quibus apiũ, & anethum maduerunt, & si concoctionis signa deprehen- deris, magna iam confidentia etiam absynthium dabis. Bal- nea vero ex aqua calida potulenta conueniunt: quibus neq; nitrum, neque sal, neque sinapi adiici, sed ægrum oleo quam maxime calido perfusum in solium descendere oportet. At qui balneis admodum gaudent, eos etiam si bis die laueris, haud peccabis. Vbi verò concoctionis notas perceperis, tũc, vel si sæpius laueris, nihil offendes. Porro vinum priusquam morbus concoquatur, ex toto circuncidendum est. simul- atq; vero concoqui inceperit, tenue, aquosum, modicum, primo die exhibendum. Cibi humectantes, refrigerantẽsque vtiliter assumuntur. A melle abstinentum, sinapi, salis & acribus omnibus. vinis autem admodum vetustis, & natura calidis. Cæterum nihil miri est, si in hominibus primũ exer- citis, inediãmq; expertis, nunc autem ordine conuerso otio- sis



sis cibóq; vñs pleniore, bilis maxima ex parte mixta pituitæ reperiatur. Cuius rei gratia complures tertianæ, aut citra rigorem sunt: aut perexiguus ipsis oboritur, vnde etiam ani maduersionem propriam desiderant. Neq; enim balneum, neque cibus aliquis liberalior tertianis spuris ante concoctionem conuenit: quoniam ne panis quidem micæ, oua, & consimilia.

*Curatio tertianæ nothæ.*

CAP. XXI.

**L** Auare in tertianis spuris per initia salubre non est, sed quando iam concoctionis notæ apparent, neque cibum quotidie exhibere, sed alternis diebus abundè est. Quies autem, & præcordiorum forus ipsis conducit, tum sorbitiones concoctu faciles, & clysteres aluo inditi non admodum molles. Atque si sanguinem detrahère opus est, neque hoc omittere oportet. Tota vero victus ratio erit, non quæ refrigeret in totum, humectetq; verum etiam modus aliquis qui magis incidat, ac calefaciat, adhibeatur. Maxime verò conduxerit ipsis ptisanæ cremor pipere iniecto. vel hyssopum quoq; nonnunquam, vel origanum, vel spica nardi, aquæ mulsæ admixta, incoctaq; potui exhiberi, & alia quæ vrinæ ciendæ sunt, præterquàm ea, quæ vehementer calefaciunt, exiccantque. Potissimum verò absynthium, post septimum diem porrigi debet. Iam & oxymel epotum, multis fuit auxilio. ad hæc nonnulla ex his quæ molliter ventrem subducunt. Porro vomitus secundum cibum, iis quibus hæc febris in vetustatem incidit, vtilissimus est.

*Quartanarum cognitio.*

CAP. XXII.

**Q**uartana inuadit multa cum perfrictione, vt quæ ex frigido humore, atra bile originem trahat. Calorem verò feruoremq; febrilem tertianæ modo non obtinet, imò nec bilis vomitus eam comitatur. Adhæc si vrinæ tenues, albæ, & aquosæ fuerint, quartana erit febris. Eximia verò ipsius nota est, pulsus exiguus, & rarus, Cæterum in autumno potissimum incipit, erraticis superueniens febribus, ac nonnunquam in forma eius potissimum subsistit quæ quarto die reuertitur: aliquando etiam plurium dierum intervallo, iuxta quosdam circuitus accessionem habet.

*Curatio quartanarum.*

CAP. XXIII.

**Q**uartana laborantes leniter tractandi sunt, neque medicamento vllò fortè sollicitandi, neque vacuatione, nisi



ne, nisi forte sanguis vehementer exuperare videatur, cum venam dissecare conuenit. Victus eis offeretur optimus, qui nō inflat, & venter his quibus vti consuevit, emolliri debet. Quod si hæc nihil proficiant, clysteribus per initia quidem mollibus, deinde verò acribus vtēdū est. A' suilla carne prohibeantur ægri, atq; ab omnibus cibis qui glutinosi, ad exitum tardi sunt, tum qui refrigerant corpus, siccantq;. Vinū vtile est tenue, album & modice calidum. Item salsa & sinapi ex usu sunt, tum per dies aliquot assumptum medicamentum diatrion pipereon, id est, quod triplici cōstat pipere, vel quod diospoliticō appellant. Iam & piper solū recte ex aqua quotidie sumitur. In morbi statu victus ægro tenuissimus præcipietur, statim verò etiā vt diu conquiescat, iniungendū est, tum visceribus prospiciendum per ea quæ emolliunt, relaxantque. Insecutis diebus medicamenta conferunt, quæ vrinam cient. atq; si cōcoctionis notæ apparuerint, cū fiducia tunc quoq; iis vti expedit, quæ atros humores vacuant, idq; non semel duntaxat, verū etiā sæpius. Porro secundū validam purgationem, & medicamentum quod viperis cōstat, exhibetur, & alia quæ ad eiusmodi febres commendantur, inter quæ est & nobis familiare, omnium probatissimū, quod succum cyrenaicum recipit.

*Quotidiane agnitio.*

## CAP. XXIII.

**Q**uotidiana haudquaquam cū rigore primo statim die inuadit, sed procedente tempore perfrictio magis quàm rigor oritur. Aegre verò incalescit, & diuturnū habet incrementum: imò neq; adurit ægros, neq; multū, & crebro spirare compellit, neq; efflare, vel frigidam bibere. pituitosi autē vomitus hic accidunt, & quæ per aluum vacuantur, frigidiora, crudiora, aquosiora cernuntur: totum corpus crudis humoribus redundat: sudores minimè primis diebus erumpunt, neque ad integritatem venit, cutis ægrotantibus albicat, vrinæ vel tenues sunt & exalbidæ, vel crassæ, turbidæ & rubræ.

*Curatio quotidiane.*

## CAP. XXV.

**Q**uotidianā curantes, oxymelite primis diebus vtimur, tum iis quæ vrinā probe eliciunt, ac vniuersa victus species incisoria esto, circa statū verò ventriculi habenda est ratio, præsertim ipsius orificij, deinde ægris iubendū est, vt à radícula & cibis assumptis vomant. Itidem vtantur iis quæ

f



pituitam subducunt, idq; tamdiu quam febris cessauerit,  
*De hepialo febris & rigore qui aegre potest excalescere.*

CAP. XXVI.

**S**I vitrea pituita, quæ omnium aliarum frigidissima est, nondum putrefacta toto in corpore exundauerit, rigorem qui aegre excalescere potest, sine febris excitat. In febribus enim, quæ humoris vitio accenduntur, putrefactio maxime febrilem calorem suscitatur. At si tota hæc pituita putruerit, quod tamè rarò fit, ob immensam frigiditatem quotidianæ febris causa redditur. Quando verò non tota æqualiter, sed ex dimidio ipsius putrida fuerit, aut aliqua ipsius partes, nonnullæ verò non putruerint, Hepialum febrem hanc facit: in qua simul & rigent, & febricitant. Particulæ quidè humoris eius necdum putredinem expertæ, omnibus venis, vel etiam reliquo corpori communicatæ & sparsæ, rigorem creant: putrefactæ verò febrem accendunt. † Dicta est autem Hepialos per translationem à sale: dico autem mari, quod tranquillum quidem apparet, in principio autem difficile turbulentumque erat. Vel ab Hepios, quod est molliter & aleanin, quod significat calefacere, quasi dicas, quoniam blande & leniter calefacit. Atque hæc febris cum ex quotidianarum genere existat, utpote ex pituita nascens, illarum curationi subiicitur speciali, nisi quod tanto commemorata quotidiana calidioribus magisque incidentibus præfidiis indiget, quanto etiam pituita frigidior illa existat. Hepiali verò rigor multo magis calefacientia requirit. Itaque medicamentum ex triplici confectum pipere, ex calaminthe præterea, & quod liquore cyrenaico constat, his sunt accommodata. Item ex castoreo, similibusque præparata remedia conueniunt. Latius autem diffusiusque explicatam curationem horum reperies in capite quadragesimo quinto de rigore & perfriktione. Insuper Lypyrie & Tiphodes, quæque præter commemoratas febres dicuntur cum sint ex relatarum numero, etiam curationes, tum in illis expositas, tum exponendas postulant.

† Locus hic multò rectius in libris manuscriptis quam impressis, quos interpretes sequuntur, exaratus est. Sic enim legitur in antiquis cod. λέγειται ὅτι ἡπιάλῳ ἢ ἀπὸ μελαφοῦς ἢ ἀλὸς, λέγει ὅτι θαλάσσης, ἡπίας μὴ φαινομένης, χαλεπὴς ὅτι κατὰ τὰς ταραχὰς αὐτῇ ὑπαρχούσης, κατὰ τὰς ἀρχὰς. quibus verbis significatur mare esse molestum & difficile cum turbulentum est & agitur.

De



**C**ontinentes finitimæ sunt singulis intermittētibus: tertianæ quidem exactæ ardens, quæ causos dicitur: quotidiana, ea quæ singulis diebus accessionem habet, nō autem ad integritatem desinit. Sic etiam quartanæ, ea quæ quarto die accedit. Exactus nanque causos: cum omnes alias exquisitæ tertianæ notas seruet, hoc solo discrimine variat, quod non cum rigore inuadat, neque ad integritatem veniat. Qui singulis diebus accessionem obtinet causos, omnes similiter exactis quotidianis notas præse fert. quod autem ad integritatem non peruenit, hac re à quotidiana specie consimili differt: ea ratione & quæ quarto quoque die accessionem habet, verum ad integritatem non cessat, finitima est quartanæ. Continens itaque febris est, quæ non ante ad integritatem terminatur, quam ex toto fuerit soluta. Quum autē ne declinatio quidē accidit, quæ sensibus queat percipi, hæc quoque ex ardentium genere habetur, sed acumine ab ipsis variat.

*Agnitio febrium continuarum quas synochos græci vocant, & curatio.*

**C**ontinuarum febrium, synochos græci appellāt, origo ex sanguine est, nunc efferuescente, nunc putrefacto propter obstructionem. Qua propter accessio ipsis adusque finem vna est. Indicia vero sunt, pulsus maximus vehementes, citati, crebri, æquabiles, non mordaces. Urinæ non multum adeo à sanis recedunt. Curatio est, sanguinis quousque deficiat anima, dimissio. Qui si non fuerit detractus, febricitantes in summum veniunt discrimen. At si quid per venæ sectionē vacuare prohibuerit, aliis vti remediis oportet, quæ meatus recludunt, copiam materiæ vacuant, & febrium feruorem leniunt. Cum autem euidentes humorum concoctionis notas in ipsis videris, neque in principe particula inflammatio quædam, aut tumor œdematis speciem repræsentans, aut scirrhus fuerit, neque particula aliqua adeo frigida, ut in hanc noxa procumbat, cum fiducia frigidam propinato: maxime si ager eius potioni assueuerit.



*Ardentium agnitio*

CAP. XXIX.

**A**rdentibus hæc superueniūt, arida lingua, aspera & nigra, ventris rosio, deiectiones pallidæ, sitis vehemens, vigiliæ, nonnunquam etiam delirium.

*Ardentium curatio.*

CAP. XXX.

**H**orum alterutrum fieri necessariū est, si perfectè morbus solui debet: aut biliosos excerni humores, aut eosdem extingui. Excernuntur itaq; per sudores, vomitiones, & imum ventrem. Extinguuntur autem frigida potu: quoniam nos vrentes febres, causas appellant, ex toto curauimus. Sustinere eos qui his cruciantur, non aqua sola conuenit: neq; mulla duntaxat, verum aquosa mulla exhibita. Nam qui huiusmodi morbis conflantur, sola portione sustentandi sunt. Porro balneum illis solū vsui est, qui citra tumore inflammationis, aut erysipelatum, ardenti febre laborant. Quod si verò concoctionis noctæ percipiuntur, multo magis ipsis conducet. Qui ex falso humore, febrim ardentem conceperunt, his est inutile. Verum iisdem ptisanæ etiam cremorem cibi loco offerre conuenit.

*Febrim quibus ex affectu erysipelaceo origo est, curatio & agnitio.*

CAP. XXXI.

**F**ebres quæ ex Erysipelaceo viscerū affectu procreantur, his notis agnosces, interna feruent immodice, dolor urget vehemens, præterea sitis excruciat, & ardor immoderatus. Summatim ex indiciis accerrimæ bilis cū pauco sanguine putrescentis deprehendes. Hunc in modum curabitur. A balneo in totū abstinere decet. Aqua frigida per morbi statum vehementi, hoc est frigidissima vtendū est: per initia non item. Extrinsecus vero refrigerantia imponentur: & si nihil hæc promouerint, etiam intro eadē sumere ægri cogentur. Maximè ipsis cōueniunt lactucæ, & quæ parem his facultatem obtinēt. à foris & ipse lactucæ succus idoneus est, ad eoque intybi & semperuiui, & reliqua refrigerandi virtute prædita, sed præstantissimo parte plurima vtimur. Nam liquorem refrigerantis alicuius expressum pilæ cum portulaca iniicimus, deinde contusa exprimimus, cū vsus exigit, modico polentæ mixto hæc in aqua frigida mersa, refrigeramus. Linteum verò duplicatum in ea intinctum extrinsecus, aut vbi calor sentitur, præcordiis obtendimus, non diu adhærere sinentes, verum aliud frigidū eius loco applicantes. Iam vero



ro & oleum omphacinū medicamini nōnunquā miscemus:

*Hecticarum febrium agnitio.*

CAP. XXXII.

**H**ECTICA febris non in humoribus, & spiritu solum, sed iam partibus etiam solidis consistit. Hæc absq; dolore consistit, & qui ea detinentur, nequaquam febricitare se existimant: neque enim calorem percipiunt, cum vniuersæ ipsius particulæ æqualiter sint excalfactæ. Duplex hecticarum febrium species est, prima ardentibus magna ex parte superuenit quæ prorogantur adeo vt tempore corporis ipsius cordis madorem absumanr, vel etiam multo adhuc permanente. Quæ vero manente etiamnum humiditate fiunt cordis corpus occupantes, inde potissimum acceduntur: Vnam sane ipsius generationem prodidimus. Reliqua vero est cum statim ab initio inuadit, primam originem diariis similem, ex mœrore, ira lassitudine maiore, vna cum exustione in sole, sortita. Hæc igitur non difficulter cedit remediis. Quæ verò ex ipsis in marcorem qui Græcis dicitur *μαγὰς* deuenit, omnem respuit curationem. Atque hæc sane cognitu est facillima: oculi siquidem præter modum concaui eam testantur, & lemæ ipsis inhærescentes aridæ, tum dispositio quædam squalida, viuidi ipsorum coloris flos emarcuit, frons sicca est & intenta. Quinetiam conuiuent plurimū, hac occupati, quemadmodū dormituriens. verum affectio, somnus non est, sed vigilandi impotentia: tempora collapsa sunt & quid enim aliud præter ossa & cutem solam habent? Nam si denudatis ipsis ventrem inspexeris, neque intestinum, neque viscus vllum superesse tibi videbitur: præcordia sursum conuelluntur, & cutis ipsis extrema resiccata est, pulsus gracilis, creber & durus. Caliditas autem primo occurso languida, paulo post acris & rodens erumpit. quousq; igitur humiditatis aliquid reliquū est, hectica solum febris dicitur. Cum vero periclitatur, ne nihil amplius humoris superfit, absolutus iam marcor constituitur.

*Hecticarum febrium curatio.*

CAP. XXXIII.

**H**ECTICA febre laborantes, statim ab initio nutriri desiderant, humorū rodentiū gratia. Maximum vero remediū huius est, victus humectans. Conuenit igitur quàm maxime ptisanæ cremoris halicæq; sorbitionibus, & pane præterea adiecto agrū nutritū, moderato frigida potu curare: si neq; inflammatio quædam, neq; humorū putrefactio sub-



est, at si magnam inde offensam fore coniecturaueris, frigida abstinere oportet, extrinsecus autem impositis, quæ refrigerant auxiliis, uti. Balnea verò hoc morbo obnoxiiis, quolibet tempore sunt idonea.

*De semitertianis.*

CAP. XXXIII.

**Q**uandoquidē tertiana cū rigore, quotidiana verò citra illū inuadit: quæ ambarū mistura cōstat, horrorem inducit, qui minor quidem res est rigore, maior autē perfrictione. Quapropter cū horror equali ab utrisq; extremis interuallo, mediū amborū rigoris nimirū & frigoris occupet, quod cōtemperatis inuicem extremis accidit, nō abs re nomen huiusmodi febris semitertianæ indiderunt. Porro duplici modo generatur. vel enim duæ accessiones in idē tempus concurrunt, vel statim ab initio ambæ inuicem iunguntur. Quando igitur tertiana præpollet, magis horrida febris efficitur, & rigoris etiam nonnihil per accessionem assumit. Protinus autē talis calidior est & ardentior, tum vomitionē quandā bilis, aut deiectionem, aut madorem adfert. Quando altera pituitosa superat, perfrictiones quidē summa exercent, pauci verò horrores: neq; tamen sitis, neq; ardor in his affligit. Cum pares magnitudine sunt tertiana intermittens, & quotidiana cōtinua, insultus quidem accessionis cū horrore accidit. At cum ex pituita proueniens febris præcelluerit, depressiones pulsum fiunt, & horrores. Si verò calidior præualeat, subito ac vna vice incalescūt. Talis sanē est exacta semitertiana, ex æquivalente duarū febrium, puta tertianæ intermittentis & quotidianæ continuæ temperatura proficiscens. Nō exquisita verò vel bilem largiorem, vel pituitam causatur, quæ iam magis etiā curationi renititur, cū modicus humor à copiosioris dominio artiq; auxilio expedite vinci possit. Si enim pituita sit superior, præfidiis maxime utemur quæ in quotidiana exposuimus: sin autem flaua bilis, iis quæ in tertiana cōprehensa sunt: In totum ei quod vrget incumbentes, sed ita, ne alterum prorsus negligamus.

*De morbis publice grassantibus.*

CAP. XXXV.

**P**ublice grassantes communēsq; morbos nominant, qui multis simul obueniunt, quorum ut generatio, sic etiam causa cōmunis est. Cibiq; igitur communes prauī, illiusmodi morbos cōmunes pariunt: item aquæ vitiatæ potio, exercitia immoderata, labores quibus quisq; afflueuerat omīsi,

inc



inedia, repletio, idque dum fames grassatur, aut fœcundus annonæ prouentus est. Item regionum naturæ, communes subinde morbos intulerunt, quæ nonnunquam palustres sunt, aliquando barathrum habent vicinum, quod vaporem exitiosum prauumque exhalet. Hæc quidem non continue accidere consueuerunt. † aër vero nos ambiens, temperamenta corporum commutat, vel calidior impendio, vel frigidior, vel humidior euadens, siquidem in alias causas neque omnes simul incidimus, neque eis toto die immoramur. aër autem quoniam omnibus circumfusus est, & per inspiratum attrahitur, ut animalium corpora, pro temperamenti ipsius immutationibus simul afficiat, necesse est. Qui igitur hæc intelligit, non solum morbos ex vnoquoque aëris statu futuros præfagiet, sed etiam ne fiant prohibebit, contrarium immoderatis circumflui aëris temperaturis victum accommodans. Itaque corpora morbo alicui ex propria intemperie vicina, hæc à simili circumdantis nos aëris temperamento deprehenduntur. Quæ contrariam cœlo temperiem obtinent, præterquam quod nullam offensam experiuntur, etiam meliora fiunt, dum repugnans aëris immoderatio temperamēti immoderationem punit. ac qui hoc nouit, secundā valetudinem tuebitur, contraria corporibus inducens, nunc refrigerantia scilicet, nunc calida: aqua quidem superinfusa refrigerans, itidem ocio, ciborum inedia, & potu largiore: calefaciens autem, operimento, laboribus, cibo liberaliore, & interdum parcio. Præterea lignorum acruatim constructorum incendio haud mediocriter aërem ad calidum & siccum mutaue-  
ris, si tunc humidus fuerit, quo modo Acronem agrigentium factitasse ferunt.

† In antiquo codice hæc aliquanto explanatiora sunt. in eo enim hæc verba ita leguntur. ὁ αἰὲρ περιέχων ἡμᾶς ἀνὰ τρεῖς τὰς ὑπάρχουσας ἡτοὶ δεῖξι μόντος ἀμείγρους, ἢ ψυχρότερος, ἢ θερμότερος, ἢ ὑγρότερος διέκρινος: id est, Aër qui nos circumstat vel calidior, vel frigidior, vel siccior vel humidior temperamenta immutat. Quam huius loci veram esse scripturam vel ex ijs quæ de eadem re scribit Aëtius intelligi potest.

De pestilentia ex commentarijs Ruffi.

CAP. XXXVI.

**P**estilentia grauißima omnia superueniunt: nihilque in hac sicut in aliis morbis singulis occultatum. Etenim



delirium accidit, & bilis vomitio, præcordiorum intentio-  
 nes, labores, sudores largi, extrema algent, alui profluvia vr-  
 gent biliosa, tenuia & flatulenta, urinæ cernuntur aquo-  
 sæ, tenues, biliosæ, nigrae, mala habent subsidia, suspensa  
 pessima, nares destillant, pectus ardet, lingua torrida est, si-  
 ticulosa, remissa, torquent vigilæ, cōuulsiones violentæ, a-  
 liaq; multa praua. †At si quis pestem vêturam prænosceret, ex  
 malignorum anni temporum, & vitæ studiorum ad sanita-  
 tem haud conducentium animaduersione, aliorumq; ani-  
 malium præcedente interitu, his apud se consideratis, & il-  
 lud præterea perpedito cuiusmodi sit præsens anni tempus,  
 qualisque vniuersus annus. Inde si quidem qualis victus ra-  
 tio esse debeat, optime deprehēdes: vtpote cum anni tēpus,  
 si quidem recte ortum est, ex sicco humidum nunc euaserit  
 necessum est victus ratione desiccare, vt humor superfluus  
 absumatur. item ventris quoque habenda est ratio. Quibus  
 superior ventriculus pituitam continet, vomitionibus sol-  
 licitare: quibus autem sanguis inundauerit, secare venam  
 oportet. Iam per urinas purgatio, aliaq; , & totius, corporis,  
 proficiunt. Quod si etiam æger ardore æstuet, & flamma  
 vsque ad pectus pertineat, haud abs re fuerit refrigeria pe-  
 ctori applicare, & potionem frigidam offerre, idq; non pau-  
 latim, nam magis hoc pacto incendit, verum vna vice ac se-  
 mel, vt flammam extinguat. In quibus autē ardor interio-  
 ra occupat, summa vero inalgescunt, cutis in superficie fri-  
 gida percipitur, præcordia contrahuntur, venter colliquata,  
 partim supra, partim inferius transmittit, vigilæ vrgent,  
 mens desipit, lingua est aspera, hi calefacientia requirunt re-  
 media, vt calor per totū corpus distrahatur, †ac si alio quo-  
 piam modo ab internis foras poterit elici. Iam vero & hæc  
 potio vtiliter præsumitur. Aloës partes duæ guttæ ammo-  
 niaci partes duæ, myrrhæ pars vna. Hæc in vino odorato  
 contrita instar dimidiæ fabæ exhibetur. nimirum quotidie.  
 Haud noui, inquit Rufus, qui hoc potu pestem non supe-  
 rauerit. Hæc quidē Rufus memoriæ prodidit. Galenus autē  
 tradit ad pestilenciales putredines bolum armeniacum sa-  
 lubriter potari. Simili felicitate etiam Theriacē ex viperis  
 magnam prodesse. Etenim in pestilentia quæ Romam inter  
 necino morbi genere depopulata est, omnes quos nullum  
 ex his medicamentis adiuuit, interiisse scriptum reliquit.

†Sim



†Simplicior & meo quidē iudicio huius loci sensus verior est in exēpla-  
ribus manu scriptis. Sic enim ea habent, *οὐκ ἔστι δ' ἄν τις μέλλοντα ἡ-*  
*ξῆν τ' ἄλλοις προσέχον τῶν τε ἄλλων* &c. id est. conijciat, autem quispiā  
futuram pestilentiam, si attentē consideret temporum &c.

†Quod est in impressis *ναδωδεν*, in manu scriptis magis explanatum  
est, *ἐν τῷ βάθρῳ*, id est ex profundo.

De ijs qui ex redundantia crudorum humorum synco-  
pe periclitantur. CAP. XXXVII.

**N**onnulli, febricitare incipiunt, vbi magnā crudorum  
humorum copiam ore ventriculi simul offenso, con-  
gesserunt. His & præcordia inflantur, & os ventriculi va-  
fioze mole, quam pro naturæ modo cernitur: adhæc co-  
lor ipsis ad albidius, aquosiusque, magis est, mutatus. qui-  
busdam ad nigrius. Nulli talium sanguis mitti sine maxi-  
mo dispendio solet, etsi vacuationem desiderent. Verum  
nec sanguinis dimissionem, nec purgationem sustinent, vt-  
pote quos etiam sine his syncope subito adoriatur. Ratio  
igitur medendi talibus est, quam frictione molimur. In-  
cipere vero per initia statim morbi oportet, ac primum à  
superiore crurum parte deorsum, idque linteis non admo-  
dum mollibus, sed modice asperis. Deinde tota brachia ab  
humeris vsque, & superiore parte deorsum simili modo  
sunt fricanda. Vbi vero artus omnes abunde calidi viden-  
tur: & metus est, ne quis ex ampla frictione lassitudinis sen-  
sus superueniat, oleo relaxante vteris, ab astringentibus au-  
tem abstinebis. per hyemem vero etiam digerentium vsus  
erit, quod genus est siccionium, & chamæmelinum. Cum iam  
artus plurimum perfricueris, postea oleum detergetur, in-  
de ad spinam dorsī transitus est: hæcque tota perfricabitur  
similiter, ab hac rursus ad crura te cōferes: & hinc ad bra-  
chia. exinde rursus ad spinam. ita toto die facies. Porro mul-  
sa, in qua coctum hyssopum fuit, his est aptissima, cauē-  
dūque, ne vel cibum, vel sorbitionem, vel aquam exhi-  
beas, vel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mulsam tri-  
bus primis diebus duntaxat, tuis ipse manibus, quas dixi  
partes ordine perfricans. Sin autem robore mediocri sit,  
& alius sua sponte commode non deiciat, cum fiducia ali-  
quid ab inferioribus partibus infundes. Quod si maior iu-  
sto recrementorum impetus ad aluū citetur: principio qui-



dem percoquere mulsam amplius oportebit: minus enim ea subducit. At si plenius superuacua descendant, ne sic quidem sistenda, alius sed exhibendus pro aqua mulsam prisa-na cremor est. Si vero fluere pergant, chondri sorbitione nutries. Si ex pulsu vires collapsas ob imbecillitatem didicerimus, panem ex vino diluto exhibere conueniet: utique si nec venter nec iecur inflammatione laboret quando si hac infestentur iam corpore crudis succis refer-to, nulla plane medicina periculo subtrahit. Sin autem quandoque crassi abunde humores deprehendantur, oxyme-li pro mulsam continue exhibebitur. Ergo si aestas sit, & æger calidi temperamenti frigidaque potioni assuetus, frigidum huic oxymeli dabis. sin hyems sit, calidum omnibus. Sane balneum his est aduersissimum. Porro iis quos syncope iam premit, si partes modo commemoratae inflammatione vacent, panis exhibebitur modicus, isque ex vino quod celerem in corpus digestionem adiuuet, statimque ad frictionem veniundum est, quæ pro tradito quoque iam modo administrabitur, verum quibus ex flaua bili, quæ os ventriculi, infestet, syncope incidit, is frigida offerenda potio est vinum tamen tenue, fuluum & vetus.

*De his qui ob pretenues humores syncope opprimuntur.*

CAP. XXXVIII.

**Q**ui tenuium humorum vitio syncope premuntur, diuersam à supradictis curandi rationem desiderant, ut quos dignoscendi notæ illis contrariæ testentur. Nutrire hos oportet paulatim & continue. Porro ad exitium spectare existimandi sunt, si vel iecur ipsorum, vel venter inflammatione obsedit, viribus iam languentibus. In eiusmodi affectibus emortua illa species in facie celeriter apparet. Sane nutrire est necesse: sicut etiam corporis summa densare, non secus quam priorum rarefacere, & frigidum ipsis aërem accerere. Vngendi sunt præterea astrictoriis vnguentis. tum cibi iis dandi, qui non admodum prompte diffluant, non aqua mulsam, non prisa-na cremor, sed panis & sorbitio ex chondro, & fructus austeri, qui non facile corrumpantur, tum ipsi per se, tum vero & cum pane. Vinum iis aquosum necessarium inter initia est, sumptum post cibum.

DI



## LIBER II.

91

*De reliquis occasionibus, quibus syncope succedunt.*

CAP. XXXIX.

**R**eliquæ occasiones, quæ syncopas cōcitāt, quatuor sunt numero: dolor vehemens, vigiliæ, immodica inanitio, ac in iis qui aliena loquuntur, aliquando motus. Sed & quintam, si placet, addas, nempe principiorum intemperiem. Celerrime igitur cor affectum in perniciem præcipitatur, mox cerebrum, deinde breui iecur.

*De dolore.*

CAP. XL.

**I**Taque dolor stupidus ex frigida oritur affectione. Pulsatilis autem dolor magnæ inflammationi peculiaris est. Sin autē tanquā à palo impacto, aut veluti à terebro forari putes, crassi intestini species doloris est. Punctorius autem, circa membranas constituitur. Pertundens vehementissimis nō heterocraniis solū, sed cephalæis quoq; accidit. Est autē pertundēs dolor, cū à parte primario affecta, ceu à radice subito in vicinas perfertur. Porro distendentes vtrinq; nervorum dolores sunt, cum & laborant, & ad vtrāq; extrema tenduntur. minime vero in latitudinem porrectos nervi dolores percipiūt. at tensuos, stupefaciētesq; dolores mēbrana quidē sub cute porrecta inducit. quæ vero inter carnē hærescit, tanquam diuellentes cruciatus excitat. multæ si quidem existunt inēqualiterque inhærescūt, & ipsam carnē amplectuntur. Membranarum vero quæ ossibus circundantur, profundī sunt, ipsorumq; ossium tanquam dolentium imaginem representant. Quando igitur nulla extrinsecus doloris occasio fieri apparet, præcedēs vītus ratio venit inspiciēda, fueritne præter cōsuetudinē otiosa, aut cibus homo vsus sit largioribus, iisq; ex valēti materia, vel solita excretio sit re-tenta. Nam si ex his aliquod, vel omnia quoque appareant, doloris causa est repletio: ac quācitissime homo vacuari debet. Sic enim licebit tibi maxima cum securitate iis vti remediis, quæ fluxiones dolentibus particulis incūbētes repellāt. Si igitur sanguinis sit copia, quod distēdit, veluti in inflammatione oriri solet, protinus si vires patiuntur, sanguis dimittendus est, per magnam venā patienti particulæ propinquam. Vbi autē vitiosus humor duntaxat affligit, purgādus est. Si vtrāq; coēant, ambabus vtēre vacuationibus, sanguine prius emissō. Quod si his peractis dolor etiam remanet, cōstat profecto in ægrotante particula impactum esse, quod



quod afficit. Patet verò curationem ipsam per digerentiâ quoque medicamenta esse moliendam. Pari ratione, & qui ex flatuoso spiritu dolores contrahuntur, curabimus: auxiliantes simul in his potius tum extenuantibus cibis, tum per sedem iniectionibus, item cataplasmatibus irrorationibus atque fomentis ambiens ipsum corpus rarefacientes. Sin moles grauando, contundendove dolorem exciter, moli eidem est medendum. Sin rodens humor est qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant, & calefaciunt. Anethum oleo incoctum, dolorem lenit, & somniferum est: & viride sicco magis.

*Ad syntexes, hoc est corporis colliquamenta.*

C A P. X L I.

**Q**Uum per ventrem aliquid non ex esculentis, poculentisque, verum ex ipsius corporis substantia excernitur, humore in aluum ipsam confluente: qui quidem flauæ bili continuè per vomitum, & infra erumpenti consimilis est, odoris autem foeditate ab ipsa differt, tum quod detectus rufus magis, & crassitie glutinosus, interim verò oleosus appareat, tunc nimirum caro pinguis & recens coacta ab ardenti febre resoluitur, & eliquescit. Malo inueterante, nonnihil etiam ex ipsis solidis partibus absimitur. In hac perniciosissima febre frigida potio utilis est, quæ ex fonte frigidissima petitur. Huiusmodi quoque esse conuenit cataplasmata, & epithemata, quæ refrigerent, thoraci, & præcordiis imposita. Item cibi refrigerantes, rectè offeruntur.

*De vigilijs in febribus.*

C A P. X L I I.

**A**T vero eorum, qui immodicis torquentur vigilijs, crura & brachia vincire, † quò tempore somnum captare solent, iubemus, & excitari. nonnunquam palpebras aperire, si conuiueant compellimus, donec abundè fatigentur. Inde subito vincula soluimus, lucernamq; tollimus, & altè esse quietem iniungimus. si nihilominus vigiliae pertinaciter vrgent, vbi accessio remiserit, frons nigri papaueris capiti decocto illuitur, naribusque offertur papaueris albi cortex torrefactus, detritusq; , & mandragoræ radicis leuigata tantundem cum vino, & rosaceo malagmatis fronti applicetur, serpillóq; cum meliloto in passo decocto. Hoc etiam in accessionibus est vtendum, vel trita papaueris capita excipientes pane cum rosaceo, vel eiusdem cerato illinimus.



linimus. Cibus quodammodo sit magis accuratus. Adiciatur autem sorbitionibus capitum papaueris albi seminis cochlearium trium instar. † oleribus commisceatur papaueris nigri, si quidem folia fuerint viridia, quantum tribus digitis potest comprehendi: sin minus, tria quatuorve papaueris capita sicca, simul incocta deligantur. Si ne sic quidem somnus accesserit, papaueris lachryma, aut succo mandragoræ circumlinentur. Iam linctus ex papaueris capitibus compositus, & præsertim ex sapa, mensura cochlearij, vel vnus, vel dimidij potus, somnum frequenter accersuit. In quibus autem caput non facile humoribus repletur, & vigilia infestant, vt in declinationibus etiam tali suffitu. folij amomi, costi, arnabo singulorum vncia. carpobalsami drachma, styracis, amomi, ammoniaci, bdellij scythici, mandragoræ radices, lachrymæ papaueris, singulorū drachmis quatuor. Ex lignis cupressi accensis suffito.

† Hæc verba sic leguntur in veteri codice, ὁ περιβαλλόντων ἢ ἀγρυπνούντων, σκέλη καὶ χεῖρας δεσμεύειν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ κατ' ὃν ἰδί τ' ὑπὸν εἰσάγειν ῥέπειδάς κλεινόμεν ἢ ἐγρηγορέναι διοίχον τι πολλὰς μῦσαι ἀναγκάζουσαν τὰ βλέφαρα, id est, eorum verò qui multis vigilijs torquentur, crura & brachia iubemus, quo tempore somnum capere solent, ligari, & excitari, palpebrasq; saepe aperire & claudere cogimus donec &c. Qui sensus magis concinnus est.

† Id sic legitur in antiq. libr. τοῖς ἢ λαχένοισι συνενξέειν μὴκρον μελαίνουσιν, simul coquatur & ferueat cum oleribus papaueris nigri.

Curatio soporis noxij, qui cataphora Græcis dicitur.

## CAP. XLIII.

**F**Rons posca lactis modo tepenti abstergitur, & summa valide ligamentis excipiuntur. naribus admouetur quæ incisoriæ facultatem obtinent. In remissionibus etiam cucurbitulæ valenter dorso, & spinæ defiguntur. Si vero morbus his non cedit remediis, etiam quæ sternutamenta excitant, obiciuntur. Ciborum materia sit, quæ incidat, diuidatque, veluti in præceptis de sanitate tuenda est comprehensum.

Curatio doloris capitis in febribus.

## CAP. XLIIII.

† **S**I capitis dolor in febribus affligit, post conuenientem sfebrium vacationem in accessionum declinationibus, caput inungi debet, primum communi oleo crudo, vel rosaceo, cui etiam aceti paxillum sit admixtum: si æstas sit,

&



& febris ardens, frigidus: si hyems, neque febris ardens, calido, aut tepido. Incoquatur nonnunquam oleo & serpilli polygoni; succus, per æstatem etiam papaveris capita, vel ipsum papaver: quemadmodum hyeme peucedani momentum. Quod si verò dolor in fronte perseveret, sinciputq; pilis careat, hoc quoque obducendum est veteri polenta, & polygonio: vel pane similiter & rosis, vel modica myrto, vel serpillio. Quosdam & pulegium applicatum magis leuauit. Nonnullis etiam cum igneus sensus inest, psyllium polenta temperatum profuit, vel ipsum per se in viscum coctione redactum, & continuè mutatum. Item coriandrum similiter cum polenta, & aloë cum aceto illinitur, myrrhæq; & ammoniacum pari modo, necnon crocomagma. Pulsatiles autem dolores ruta, mentaq; cum pane difflat, rosaceo quoque superaddito. Atqui si dolor commemoratis auxiliis non eliditur, primum caput ad cutem attondere oportet, deinde pinguioribus asperginibus totum ipsum foueri, mox cucurbitulae occipitio agglutinari, & summæ partes deligari debent, permulceriq;: iam verò hirudines recte affiguntur. Cæterum si defluxio quædam à capite, vel grauedo oborta capitis dolorem suscitauerit, iis vtendum est auxiliis, quæ aduersus hæc suo loco perscribentur. Sin autem à stomachi regionibus vapores sursum tēdentes caput offenderint, etiam horum ratio habenda est, veluti præceptum à nobis est.

† Vera scriptura huius loci est, *μὴ δὲ τὸν προσήκοντα τῶν περιττῶν νέρωσι*, id est, post conuenientem excrementorum vacationem, facilis enim fuit librarij lapsus.

Quomodo stomachi curam habere conueniat.

C A P. X L V.

**S**I stomachus imbecillis fuerit, corroborantibus oblinetur, quod genus palmulae sunt, vinum, polenta, crocus, mastiche, & aloë. aspergiq; debet oleis ex absinthio, melino, mastichino, nardino, & vino. At si ardorem experiatur, miscendum aliquod ex refrigerantibus, puta cucurbitulae succus, lactuca, portulaca, solani, fereos, † & vix immatura. Sin autem inflammatorium quiddam in visceribus appareat, etiam relaxantia quædam adiungenda sunt: aspergionibus, oleum chamamelinum, cyprinum, adipēs gallinae, aut anseris, bdellium, vel ammoniacum, & similia. cataplasmatibus autem, apij semen, fœnugræcum, althææ, chamamelorum

ros,



hos, & vt vno verbo expediam, compositam habeant facultatem, tum relaxantem subtilium partium, amarâmq; tum astringentem.

† Hic locus integer est in veteri exemplari: sic enim descriptus est, *οἷον κολονόνδης τε τὸν χυλὸν, καὶ δριλχνίνους, καὶ αἰ ἀνδράχυνους, καὶ τὸν τρύχυν, καὶ αἰ σίριον, καὶ τὸν δρυφάνος, οὗτος μὲν γὰρ οὐ ψύχας μένον, ἀλλὰ καὶ τὸν σφῆ, id est, vt succus cucurbitæ, lactuce, portulacæ, solani, sereos, & vna immatura. Hic enim non solum refrigerat, sed etiam adstringit.*

*De immodica perfrictione in febribus, & rigore.*

CAP. XLVI.

**R**igori, qui crisis ratione obuenit, remediis occurrere non oportet: nec concertationem naturæ dissoluere. Quod ex sudore frigus prouenit, promptè remittitur, ac nihil adfert molestiæ. In solo autem rigore, aut perfrictione (ex frigidiorē vero, copiosâq; maxime pituita nascitur) primum quidem artus plurimis in locis constringendi sunt, mox oleo delinendi chamæmelino, aut cyprino, aut irino. Sin autem maiore auxilio tibi opus sit, etiam piper oleo admiscebis, vel cachry, vel adarcen, vel castoreum. mollitêrque totum corpus infricabis. Porro ne facile oleosum istud præsidium defluat, haud fuerit absurdum & ceræ momentum colliquefacere. At si per hæc rigor non possit excalferi, valentioribus quoque ex his factis acopis, necnon dropacibus, & sinapismis vti consilium est, aliâque fomenta ritè admoliri. Item acriora ex iis quæ admoventur naribus, comodè faciunt, calaminthe, pulegium, & hyssopum. Potui dabitur ante accessiōem mulsâ, in qua piper, & ruta sit incocta. adhæc liquoris cyrenaici cocto melle formati instat milij duabus horis ante accessiōem præstabimus. Similiter & liquoris silphij. Adhæc quod in quartanis ex liquore cyrenaico componitur, multis fuit auxilio. Iam verò in oleum largius, quod incaluerit nonnulli descendentes, rigores pertinacissimos absterferunt, vt Archigenes memoriæ prodidit. Galenus autem ante accessiōem, cutem abrotano infricandam præcipit, vel calamintha arida, vel cunilæ tum foliis, tum floribus, vel costo, vel pyrethro, vtroque horum cum oleo. vnde fiet, vt vel nequaquam, vel certè minus rigeant.

De



**S**vdores, in crisi erumpentes excipere oportet, quandiu satis vacuatum fuerit, adiutaréque calore mediocri, & quiete, adeò vt neque abstergantur, quoniam alius quoque alium elicit. item calido clystere in aluum dato, & sorbitione, & somno. At sudores in remissionibus morborum apparentes idem quod in crisi provenientes, administrationem capient. Itaque præsidia quibus sudores euocantur, libro superiore, capite quadragesimo octauo abundè sunt comprehensa. Cum verò sudores largius eruperint, tunc abstergendo, leuandóque operimenta recreare conuenit. Etenim lassant, supra modum excidentés, vt in syncopen frequenter agros perduxerint. Tenui velamine madidóque debent esse coniecti, perflatus aëris frigidior accedat. his somnus adiungatur, & euentilatio. Insuper myrtus nigra in pollinem coacta, corpori inspergatur. Similiter galla, piceæ cortex, electrum, & polenta cum vino astringente, particulis sudores recipientibus imponantur, faciesq; posca per spongiam aspergatur. Archigenes etiam calcem non restinctam, & floces vini combustas, tum in his, tum in rigore, quem nullus euincit calor, assumit. Ambæ siquidem inquit, recalescentes, siccantur. Media verò corporis loca delinenda succo plantaginis, vel coriandri, vel portulacæ, vel brassicæ præcipit, vt vndique concreta, sudores reprimant. † Per somnum verò creta cimolia aqua dissoluta, dorso, & thoraci subiecta proficit. Totum verò corpus rosaceo perungitur, vel melino, vel myrteo, vel lentiscino, vel ceratis quæ ex his confiunt. Nam magis sunt his idoneæ reunctiones, quæ latentes meatus obstruendo, humidi exitum prohibeant. Pater autem omnibus, quòd cibus quoque sicior his conuenit, & vina mediocriter astringentia. Ceterorum largiore potu, & præsertim humidioré, tum crebris iniectionibus abstineant. Si autem fieri potest, gestatione corpus agitandum, in frigidioré aëris statu, & summæ his partes potissimum refrigerentur. Qui per validam expressionem sudores fiunt, (hi autem vel ob dolores excitantur, vel conuulsiones) facile curantur, † si extrema deligentur, calfiant, & per laneos panniculos reficiantur.



† Scriptura quæ in veteri exemplari multò melior & sincerior est. Sic enim habet. ἐν δὲ τοῖς ὑπνοῖς κλωτῆα ὑδατι διχλυθῆσαν πικνόμενα ῥάκη ὑποβάλλεται μετὰ φρένα καὶ θώρακι. Id est, panni pingues facti cimolia dissoluta aqua subiiciuntur dorso & thoraci. librarius enim indolus ex ῥάκη fecit ἀρὰ καὶ.

† Concinnior sensus est in veteri codice. ita enim in eo scriptum est. καὶ δάλφει τὸ ἄκρον καὶ ἀποψύξει διὰ ῥαυιδίων ἀραιῶν κοῦφως θεραπεύειν, id est, leuiter curare oportet extremorum deligatione fotuq; ac exicatione per pannos raros.

De tussi in febris.

CAP. XLVIII.

**T**Vsi in febris, præsertim cum rigore obueniētibus, occurrere cōuenit. Nam tussis intentione, febris quæ inclinabat vires resumit, ac redintegratur. Aduersus hanc formulæ medicamenti ex melle cocto coactoq; hypoglotia vocant, offeruntur. Linguae autem supposita, vnde nomē habent, eliquescent: & quod spirandi impedit facilitatem, discutiunt: tempus ipsarum est in accessionum statu, & spatio quod paulum accessionem præcedit. datur etiam hydro meli discoctum. Quibus autem de neruoso genere metus nō est, temporis processu exhibebis cum fiducia & oxymeli. sin minus, hyssopi decoctū, quod etiā rigentibus auxiliatur. Item castoreum cum febris ardens non est, neruoso quoque generi cōfert. Adhæc linctus ex piceæ fructu, nucleis pineis, iride, semine, lini, amygdalis amaris, & vrticæ semine plurima vero ex parte cibis quoque hæc simul adiungentur. Ac resina quoque terebinthina in ouo exhibetur. Extrinsecus autem thoraci, & locis arteriæ vicinis, lana sulfure imbuta imponatur, ac pingue, oleūve rutaceum esto, vel irinum, vel anethinum. Præterea deligatura valida in longum porrecta, tussim exactè cohibet: dico autem per medias partes extremasq;. Non ratione caret, & vna syluestri quæ staphis agria dicitur, tussis gratia vti, simul cum domestica, aut cum mastiche mansa. summa debēt infricari, permulceri, & ligaturis intercipi. deinde rursus soluenda est in contrarium retractio. At si propter febris acrimoniam tussis concitatur, vtendum est gargarizationibus ex aqua tepida, necnon frigida subinde profuit, & ex posca, & palmularum decocto, vel rosarum, vel dulcis radicula. Visceribus autem, vel etiā cordi ipsi iniiciuntur quæ modice refrigerant.



**S**ternutamenta febribus saepe incidentia, molestant. Et-  
 enim caput replent, & virtutem arguunt. Nonnullis san-  
 guinem quoque eliciunt, & alia huiusmodi inferunt incom-  
 moda. Quare aduersus ipsa remediis pugnandum est. Co-  
 hibet itaque sternutamentum irruens, nasi, frontis & oculo-  
 rum perfricatio, item oscitatio, studiosa palati, frictio, ru-  
 ctus, ilium intentio, capitis in altum eleuatio, inclinatioque  
 ad latus, summarum partium mollis contrectatio, maxillae  
 musculorum perunctio, calentis olei in aures infusio, pului-  
 num calidum mento subiectum. Caueri debet repentina ex  
 fomno excitatio, fumus, puluis, acrior odoratus piperis, ca-  
 storei, sinapis. Mentis autem malorum, & polenta odor co-  
 ducit. obtundit enim sternutamenti elisum: Idem spongiae ex  
 mari vacuae efficiunt. Vbi vero cupiditas sternutandi obor-  
 ta fuerit: non autem sternutamentum erumpat, labij quies  
 accommodetur, & continue acriorum odorum experientia,  
 & mentis remissio.

## De cibi fastidio.

**Q**uibus vitiosi humores fastidium procrearint, iis illa  
 & esculenta & poculenta dare conuenit, quae huiusmo-  
 di succos vel abstergendo per vomitiones, seu per aluum ex-  
 cernere soleant, vel attemperando, meliores reddant, quorum  
 materiam libro superiore, qui totius operis primus est, com-  
 prehendimus. At si ob virtutis imbecillitatem, cibum re-  
 spuant, quoniam omnis facultas ex particularum intempe-  
 rie infirmatur: conuenit in temperamenti speciem, contra-  
 riis medicari. Plura de fastidio, in stomachi vitiis libro ter-  
 tio pertractabimus. In febricitantibus autem, statim per ini-  
 tia cibi cupiditas, iis quae odorem mouent, recuperanda est.  
 Potissimum vero polenta in aquam mersa, vel posca, vel di-  
 luta vini potione. Aut cuiusdam odorati pomi, & astringen-  
 tis decocto, item perunctione odore grata, & moderata to-  
 tius corporis frictione, ac blanda contrectatione tum faciei  
 collutione, aquae sorbitione modica. Iam stomachus digito  
 immisso turbatus, ad cibum assumendum quodammodo  
 conuertitur, praesertim, vbi biliosum quid, aut acidum sur-  
 sum eiecerit. Secundum primos dies, † cataplasmatibus quoque  
 a foris stomachus ad cibum sollicitetur, ex palmulis, malis  
 cotoneis, cenanthae, absinthio & aloe confectis. Cibi autem  
 pra-



præparentur plures simplicēsq; & frumentacci: qui alterius quoque generis varietatem quandam habeant non tamen ab iis multum recedant, qui in febribus dantur, in quibus & poma conueniunt, quæ non ex facili aceſcunt, neq; nimium dulcia ſunt, ſed matura, neque ad ſatietatem exhibenda, verum ſolum quod ad aliorum ciborum cupiditatem excitandam ſufficit. Præſto autem ſint ægris dum alentur familiariffimi, qui tum corripere eos, tum inhortari queant. Porro febribus ſolutis, ſi in viriū recreatione perduret faſtidium, etiam fiſarum cum oxymelite coctum, lactuca, oliuæ halmades, capparis, ſaſſamentum, bulbi, & quicquid ad bonitatem ſtomachi facit, accommodetur. Necnon & illud ipſum in memoriam reducatur, quibus cibis per ſanitatem maximè uſi ſint. item ambulationes, geſtationes, vociferationes, dropaciſmi, frictiones & exercitia adhibeantur. Præterea abſinthij ſucci potio, vel aloës, acetiſque ſcillitis inſtar myſtri abſorbentum, in id vehementer efficaciſſeſt.

† Simplicior ſcriptura eſt, *νεῖ κατὰ πλάσματος ἐξωθεν ὁ ὥμαχος* *κατὰ πλάσματος*, id eſt, cataplaſmatis à foris ſtomachus curetur. Nam quod eſt in exemplari typis expreſſo *κατὰ πλάσματος* omnino deprauatum eſt.

*De grandi fame, quæ græcis bulimos dicitur.*

C A P. L I.

**S**I verò in grandem famem, quā bulimon appellant Græci (dico autem cum minus quā par eſt, cibos corpora ſentiūt) faſtidium deuenierit, hiſce reficiemus, tum aliis, quæ naribus admoventur, tum ſuillis carnibus aſſis, & hœdinis. In ſumma omnibus, quæ nidoſum odorem repræſentant: ſauitia ſane febriliū præterita, extremæ partes deligari, ipſiq; excitari debent, maxillas pungendo, & crines, vel auriculas vellicando, recollectis autem, panis ex diluta vini potione, vel aliud quippiam diſtribui facile exhibetur.

*De canino appetitu.*

C A P. L I I.

**E**T ſi hoc ſymptoma febribus non adeo ſuperueniat, ſed nonnunquā ſecundum ipſas, attamen gratia cognitionis, quā cum faſtidio habet, nil fuerit mali, etiam de immodico appetitu, quū ambo naturæ modū excedant, ſermonem inſtituere. Quoniam igitur à pituita potiſſimum



acida constituitur affectus, iis vtendum est, quæ hanc incidunt, abstergeantq; Talia autem sunt maximè, dulcia, salsa, † & alioquin detergētia calida. Vinū igitur ipsis recte datur copiosum, ex eorum numero, quæ impense calefaciunt, cuiusmodi habentur colore fulua aut rubra, astrictionis exper-tia. Verū dulciora potius propinantur, etiam non sitienti-bus. At cum ad prandium venerint, primū ipsis pingua, mox alia omnia ex oleo largiore præparata, quibus nihil austerū, aut astringens sit adiectū, offerentur. Hæc etenim, licet aduersus ipsam causam manifeste non pugnent, attamē impotentem ad cibos animi impetum dissoluunt. Inedia verò spissitudinem pituitæ stomacho inhaerentis absomit, minuitq; Iam salsamenta ipsis commodè exhibentur, ab his vina commemorata liberaliter assumpta prosunt: quod vbi longiori tempore fecerint, caninus appetitus finitur.

† Codex manu scriptus habet, *ἢ ἄλλως τριπτικὰ θερμαίνοντα*. id est, & alioquin incidentia calida. qui sensus huic loco conuenit, quanquam *τριπτικὰ* etiam rectè legi potest.

## De siti.

## CAP. LIII.

**S**itim admodum longam fieri existimabis, ex siccitate, aut caliditate particularum, per quas humor ex ore in ventrem defertur, & siccitatis quidem remedium est somnus, caliditatis autem vigilia. Nonnulli verò sitibundi ex vino, ciborumque caliditate fiunt, quibus medetur frigida potio. Prauas autem potiones appetunt, quemadmodum & cibos, præpollenti in eis humorum vitio respondentes. Cæterum siti pressos inextinguibili quandoque vidimus, ex quorum numero etiam mortem oppetierunt, tum qui viperas dipsandas deuorant, tum qui vino veteri sese inebriant. adhæc qui in nauigio ob aquæ potabilis defectum, marinam bibere ausi fuerūt. Verū sitim in febribus placare solet, aspersio ex oleo frigidissimo, vel rosaceo cum impetu salientis modo super caput deturbata. Optime facit ad sitim nigræ lactuæ semen commanducatum. item glycyrriza appellata. adhæc cucumeris semen in ore retentum. Datur etiam ad sitim hoc catapotium. cucumeris domestici drachmæ octo, tragacanthi drachmæ quatuor: tragacanthū soluitur ouorum crudorum recentium albumine. & cum fuerit dissolutum contritūmq; cucumeris semini prius leuigato adiūgitur.



tur. Postquam emollieris, pilulæ formantur, in vmbraq; siccantur, ex his vna sub lingua tenēda exhibetur: humor paulatim salua solutus deglutitur. Iam dilutum malorum cydoniorum, vel pirorum, vel mēspilorum, vel pampinorum vitis, vel malignanati succus sorbitioni datur.

*De linguæ scabritie.*

CAP. LIIII.

**H**umectanda est linguæ scabrities, lini seminis decocto ægris vt in ore teneāt dato: melius autem facit myxiō cum lini semine incocta, ac digito in hunc succum demerso lingua infricata, aqua puriore abluitur, vel spongia vndiquaq; abstergitur, deinde rosaceo illinitur. iam ipsum rosaceum melle cōtemperatum, in id valde efficax est. & portulacæ succus in ore retentus, item rhu obsoniorū mulsæ admistum bene facit. insuper Damascena, & myscli (hoc autē est myxa) ossa ore retenta & linguæ circundata. His adde etiam lactucæ cauliculum. Archigenes autem tradit etiam salem indicum, colore quidem & substantia communi similem, gustu autem melleum, lenticulæ instar, vel plurimū ad fabæ magnitudinem deuoratum, vehementer posse humectare. Cæterū in latus decumbere prodest, nam supinus cubitus exiccat. item os conuiuere. hiatus enim madorem absumit. Sternutamenta porro accersita, linguas quouis alio plenius humectant.

*De nausea.*

CAP. LV.

† **C**um sine cibo assumpto nauseabundus æger efficitur, cuius licet, arbitror, ratiocinari prauos humores ventericulum infestare. Nonnulli verò turbantur, sed nihil euomunt, humore ipsis tunicis imbibito. Pituitosos itaq; succos concoquere oportet, seruando ægrum in quiete, inedia, & somno. tenuiores autem vomitus eiicit, qui nonnunquam ex ptisanæ cremore, vel mulsæ excitatur. glutinosi humores & crassi, attenuantia desiderant. quod genus est oxymel, & similia. Humiditate autem praua in tunicis absorpta, picra ex aloe utilis est. verum quæ astringunt, haud mediocrem noxam conciliant, quemadmodum rursus, cū humiditas multa citra malitiam inest, astringentia quidem quam utilissima sunt: medicamentum verò ex aloe in marcorem perducit. Cum verò frigiditas humori adest, astringentibus misceri etiam debent calefacientia. Nota est frigidi affectus, quòd neque sitim, neq; ardorem eo detenti experiantur.







tum scillites, vel oxymeli potum conuenit. denique spiritus retentio, præsens est remedium.

*De aluo in febribus astricta, & cita.*

CAP. LVIII.

**Q**Uæ arefcentem aluum proritant, libro priore quantum res exegerit comprehendimus. quoniam vero eadem quoque liquida febribus incidit, in præsentiarum mentionem ipsius facere oportet. Multi enim non febris ratione, sed ob hoc solum accidens in perniciem præcipitati sunt. Principio igitur excipiemus quæ egeruntur, nullo remedio occurrentes ut quæ a corruptione & cruditate emanent. Sin autem vacuatio modum excedat, cohibenda alius est, & si quidem acriora efferuntur boni succi esse, & alioquin crassioris conuenit, quæ assumuntur. huiusmodi existunt ex chondro, & ptisana sorbitiones. balnea his post morbi concoctionem sunt idonea. Cum verò pituitosiora & fluida erumpunt, contra sicciore calidior esq; cibi erunt, quatenus febres permittant. Huius generis habetur, quæ ex condimentis calidis confiunt. Balneis hi prohibendi si nihil aliud compulerit. Porro ubi concoctrix facultas infirmatur, astringentibus tum cibis, tum remediis utendum est. cibis sane, in quibus maxime malum granatum, aut mala cydonea, aut pira, aut mespila sint iniecta. vel etiam hispis, & vino tenui odorato astringente: remediis autem cataplasmatibus, nimirum ex polenta, palmulis, absinthio, rosæ, myrtis, & consimili materia. Cæterum considerandum venit, quibus potissimum particulis cataplasmata debeant imponi. dico autem stomacho, aut imo ventri: nonnunquam & circa lumbos applicamus. Cruentæ autem excretiones reprimunt ex thure confecta, desiccantque, vel subtilior portio polentæ cum thure, vel manna vino macerata, vel posca. Porro acriorem humiditatem etiam iniectione per aluum, edulcare competit, nunc ipsa aqua, nunc ptisanæ cremore, vel chondri, vel oryza, vel tragi, idque non semel verum saepius. Postea vero adiunguntur etiam rosæ sicca, vel myrti, nonnunquam & gallæ, & ouum simul cum rosaceo vino, quæ tenui astringenti, vel rosarum decocto inditum vel sedi quoque subiectum excernenti cupiditates retundit. Cum frequens desidendi est appetitus, Agathium sedi accommodatum ex calidis spissamentis immittatur.



**Q**Voniam sanguinis distillatio totius corporis, aut caritis redundantiam innuit, per contusionem, vel densitatem eueniens: largior autem excretio habilis est laxare & minuere copiam, ratioque est inde ipsam moliri, vnde natura proclinauerit, his ego consideratis ausus sum in quartanarum distillationibus thyphe, vt mos est, narium vasa conuulnerare: oportet autem non exiguo fluore contentum esse, sed pro viribus detrahare. Spontanea vero in febribus per nares sanguinis profluvia, si in crisi fiant, excipere conuenit. si autem sanguis immodice erumpat, sistere conandum est. Primum itaque extremæ partes valide deligabuntur, æger sublimi capite figurabitur. Videtur etiam præputij deligatura sanguinis peculiariter ex naribus profluvia cohibere. æger non expurget narium foramina, neque locum irriter, verum sanguinem concreescere sinat. nasus spongia, quæ in posca maduerit, refrigerat, ac obturamentum ex panniculo naribus profluētibus demittatur, medicamento quodam ex eis quæ sanguinem comprimunt, inuncto: horum materiam, & reliquam curationem inter remedia vnicuique loco affecto conuenientia libro subsequenti verbosius persequemur.

*Si anima deficiat.*

C A P. L X.

**Q**Vi ex cholera, alui profluvio, aliisque multis, & vniuersim factis vacuationibus, resoluuntur, iis aqua frigida aspergitur, & nares comprehenduntur, os ventriculi infricatur, vomitus præcipitur, stomachus turbatur, vel digitis immisissis, vel pinnis. præterea pluribus vinculis valide deligari debent. Cum per imas particulas vacuationes fiunt, brachia: cum per superiores, crura. Cæterum sanguinem fundentibus prospicienda est & figura sine dolore sursum vergēs, & cucurbitula defigetur, quæ ad particulas retrahat situ contrarias vacuationem experiuntibus. Curat etiam vinum aqua temperatum resolutiones ex subitis vacuationibus ortas, nisi viscerum inflammatio, aut vehemens capitis dolor, aut mentem turbans aliquis affectus, aut febris ardens, in crudo morbo prohibeat: in his siquidem magnavinum adfert incommoda. Et si æstus fuerit, calidiq; temperamentum æger, ac frigida assueuerit, frigidum vinum  
exhi



exhibebitur. sin contraria euenerint, calidum. At si ex sudoris copia anima deficiunt, cutis densanda est, quemadmodum à nobis prius est dictum. Tum vt frigidus aëris perflatus accedat, prospiciendum est. Porro in ventriculum defluxionibus nihil horum conuenit, præterquam ipsi ventriculo stomachoque corroborantia admouere, & affectos in balneum ducere. Hoc si quidem illiusmodi fluoribus est accommodatissimum, verum sanguinis profluvia, & sudores vehementer proritat. Qui ob plenitudinem animo destituuntur, vino ciboque abstinebunt. item balneis, si febricitent. Potio autem mulsæ datur, in qua vel thymus, vel origanum, vel pulegium vel hyssopum sit incoctum. Propitium vero iis est & oxymeli. At si propter humores vitiosos in stomacho contentos anima defecerit, iubendi sunt vomere ab hydrelæo, digitis aut pinnis in os demissis. Sin autem vomere nequeant, oleum quamlaudatissimum ipsis propinabitur. hoc enim & aluo ex inferioribus partibus infusum, subinde vacuat. Iam vero absinthium ipsis auxiliatur. Porro si propter stomachi imbecillitatem dissoluantur, iis vti expedit quæ firmando ipsi sunt: veluti antea in capite de eodem comprehensum est, summæque perfricare oportet. Exusti in sole ad balneum ducuntur: qui perfrixerunt, medicamen diatrion pipercon, ipsumque piper assument. Qui vero ob caliditatem largiorem, æstumve, aut lentam in balneo moram animo deficiunt, curantur frigida aspersa, & si ad ventum conuertas, stomachi frictione, vini cibique vsu. Sin autem propter inflammationis magnitudinem, aut febris malignitatem in accessionibus animus deliquerit perfrigescantque, artus fricare valenter iubeto calefacere & deligare. Adhæc vigilias in ediamque præcipito. Ea vero & ante accessionem faciunda sunt. Quibus ob siccitatem anima deficit, duabus tribusve horis ante accessionem, cibus offeretur, vel chondri cremor, vel panis ex aqua simul cum mali granati nucleis, aut malis, aut piris. Si autem magni periculi metus sit, etiam vinum dabitur. item iis qui subito animam perdunt, his remediis succurrendum est ac ubiq; causam considerare conuenit, propter quam animæ defectus accadat, atque contra hanc pugnandum est. Nonnunquam vero & symptomatis maior habenda est sollicitudo, nempe cum periculum, vel etiam mortem minatur.



*Quomodo vlcus circa os sacrum proueniens curetur.*

CAP. LX.

**E**T hic affectus, febribus potissimum lentis, ex diuturno decubitu superuenit. Cum itaque sacri ossis regio incipit rubescere, circulum ex lana iustae magnitudinis, parti subiiciemus, postea rosaceum, vel myrteum ceratum, quod argenti spumam, aut cerusam habeat superaccommodabimus. Inflammatione autem oborta, cataplasma ex pane cum solano, vel polygono, vel plantagine, vel tenera brassica applicatur. Si vlcus serpat, lenticula cum malicorio instar cataplasmatidis inducitur.

\* \*

## FINIS LIBRI SECVNDI

IOANNE GVINTERIO ANDER-

NACO MEDICO IN-

TERPRETE.

\*

PAVLI



# PAVLI AEGI- NETAE LIBER III.

IOANNE GVINTERIO

ANDERNACO IN-

TERPRETE.

\*

## DE PILORVM AF- FECTIBVS.

\*\*

*De alopecia, & ophiasi, & caluitio.*

CAP. I.



VEM ADMODVM stirpium nonnullæ  
succis defectu inarescentes contabescunt:  
nonnullæ vero alienis à natura sua hu-  
moribus infectæ emarcent, haud dissi-  
mili ratione idipsum quoque pilis usu  
venit. Etenim Caluitium, humidi penu-  
ria fieri consuevit: prauitatem autem,  
vitiôq; succi, Alopecia, & Ophiasis, fi-  
gura tantum inter se differentes. Quoniam in Ophiasi, par-  
tem oblesam, serpentis modo glabram, ostendit: alopecia,  
quod vulpes continuè infestet, sic appellata est. Itaque con-  
iecturam de humore, qui superat, ex cutis colore facientes,  
vacuationem medicamento purgante prius moliemur: de-  
inde loco, vitiatò auxilia inducemus. Si igitur color ad ni-  
grius, albidiusve mutatus fuerit, Antidoto Hiera quod pi-  
tuitæ educendæ, humorisq; melancholico est, utemur: sin ad  
pallidius, catapotia ex Aloë exhibebimus: singulorū autem  
ipsorum descriptionem in libro de medicamentis composi-  
tis inuenies. Vbi corpus iam totum inanieris, medicamenti  
quod pituitam per os extrahit, apophlegmatismum Græci  
vocant, vsus erit, ex aceto, sinapi, & melle: isq; non semel, ve-  
rum



rum crebrior. Satius autem fuerit, si etiam in aceto origanum, vel pulegium, vel thymus, vel hyssopum commaderit. Cæterum in aliis quoque capitis affectibus eadem utemur curandi ratione: primum humorem, qui præpollet euacuantes, vel purgatione, vel etiam sanguinis emissionem, si eius subest redundantia, dein ad præsidia quæ parti extrinsecus iniiciuntur, transgredi conuenit.

*De alopecia*  
 CVTIS nitro confricata, lintheoque aspero, lanæve potius deterfa, & iterum defricata, adeo ut ruborem contraxerit, verbenaca in Sole ex aceto detrita, illinitur. Aut alcyonio primæ asperitatis combusto, reductoque in puluerem cum oleo lex lucerna inungitur. Aut arundinis radix, aut amygdalæ amaræ cortex torridus, oleo, vel adipe vrsina exceptus inducitur. Hæc itaque sunt mitiora medicamina, verum ex euphorbio, thapsia, & adarce, oleo leuigata laurino, vel pice liquida, vehementiorem vim repræsentant. ALIVD. Eriaceorum marinorum testa ignem experta cum adipe vrsino excepta, loco prius nitro exterso illinitur. ALIVD. Piperis, stercoris ouilli ficci, erylini, ærucæ seminis singulorum drachmæ quatuor, veratri albi drachmæ treis, murium stercoris drachma. Excipiuntur felle taurino, aut hircino, aut suillo.

*Aliud experientia probatum ad alopecia.*

*adipio vrsi  
 ad gaur infor  
 mis*

MANDRAGORÆ, radicis, mæli terræ, ari radicis, ceræ, picis liquidæ singulorum vnciæ octo, axungia porci subrumis, nerij herbæ medullæ modicum. Axungiam, & nerium incoquito, donec herba intabescat: deinde exemptam proiicito: & reliqua axungia adiungito, incoquitoque, mox ceram, & picem liquidam. Vtitor in sole audacius. Vbi iam vlcera ad cicatricem venerint, caput vulpeculæ vrito, & alcyonium, anchusæque nigre folia omnia contrita super inunctioni inducito, ut capiti pili succrescant. ALIVD. Muris capitis combusti pars vna, testarum marinarum tantundem, cum axungia porcina. omnia in fictili coctis vtitur inspergens etiam ex ipsis ficcis aliquid.

*Medicamentum ex thapsia ad omnes inueteratos affectus.*

EUPHORBII, thapsiæ, baccarum lauri singulorum vncia, sulfuris ignem non experti semuncia, veratri tantundem, ceræ vnciæ sex, laurini, vel ricinini aut veteris olei quod



### LIBER III.

quod satis est. In validioribus etiam uti vincit nasturtij vicia, alcyonij combusti vncia: iisq; non solum ad Alopecias, verum etiam ad omnem diuturnam perfrictionem. Summatim in Alopeciis cutis prius nitro est extergenda, infricandaque, & frequenter pili nouacula radendi. Si quidem plerisque noui ex sola infricatione, frequentique rasura pilos prouenisse.

Quomodo caluitium abigatur, & pili crescant.

Ex Critonis commentationibus.

LEPORVM ventriculi quinque arefacti diligenter olla fictili friguntur. His adiecto, myrstorum, myrti, summitatum, acaciae fructus, acaciae succi, rubi canini, aequalem modum, adianthi vncias tres. Haec omnia accurate seccata in pollinem coguntur, & subtili cribro incernuntur: deinde adipis vrsini libris quatuor, & phocae totidem admistis denuo tunduntur. Excepta pixide plumbea reseruantur. Cum vsus postulat, quolibet oleo aromaticis imbuto diluuntur.

Quae pilos conseruent.

POLYTRICHI herbe pars vna, ladani partes duae, vino myrteoq; oleo excepta in vsum adhibentur. ALIVD. Anemone flos tritius cum oleo inungitur: idem vero, & nigrefact. ALIVD. Verbenacam rectam vna cum radicibus torrefactam, tusamq; tenui cribro incernito, mixtam oleo ut sordium habeat spissitudinem aereo vase reposito. Cum liquefeceris, vitior inuicem olei similiter.

Aqua pilos augens, eosdemq; denigrans.

AQUAE pluuiialis sextarii sex, rhus alexandriini sextarii tres, polytrichi vncia quatuor, herbae fabinae tantundem, ladani vncia, myrti vncia, cucurbitae aridae tantundem. Sinito ad dies viginti vitreo vase commadescere, bis mouens quotidie rudicula tedacea. † In sequenti tempore in aquam pilos singulos tingens, vitior quotidie. Item semen althaeae in balneo illitum pilos coleruat, augetq; pari modo oleum inunctum, in quo semen ipsum althaeae decoctum est, vel simul impositum.

† Vera scriptura est in antiquo cod. τῇ ἡμέρᾳ ἐπιούσῃ λαταβάπσω εἰς τὸ ὕδωρ τὴν κτένα καὶ ἐν οὗτω ποίῳ καὶ ἐν ἑκάστῃ ἡμέρᾳ, id est, in sequenti die pectinem in aquam intingens vitere, atque ita fac quotidie.

Que



*Quae medicamenta pilos extenuent.*

**F**ICVS foliorum, vitis agrestis albæ corticis, pumicis, testarum buccinorum, terræ cimolix singulorum <sup>seu</sup> mina. Omnibus in nouam, crudamq; ollam coniectis, lutoq; oblitis, in camino coquito, teritoq; , adiiciens aphronitri minæ semillem, gallas immaturas numero triginta. In puluerem redacta excipito, ac vtitor. **ALI V D.** Aphronitri minæ septē, pumicis tosti minæ quatuor, aluminis filsi, iridis siccae, myrti syluestris nigræ, gummi, bryoniae radicis singulorū drachmæ quatuor, lupinorum erudorum in pollinem detritorum, congi pars quarta: Vtere absque pingui.

*Ad fluentes pilos.*

**A**L O E ex vino nigro austero illinitur, vel purpuræ tegmina ex oleo cocta, vel myrrha, & ladanum cum vino, myrteoq; , vel caprillum stercus in testa combustum ex oleo lenigatur ac cuti prius rasæ inungitur.

*Quomodo pilicrispi fiant, & tincturis inficiantur, ex Cleopatrae libris, quos de capillis crispis faciendis prodidit.* CAP. III.

**C**apite prius deterfo, spondylii radix cum mero pilis inungitur. **ALI V D.** Nux pinea recens ad cinerem vsque comburitur, iniectaque pilæ teritur, myrteum vnguentum superinfunditur, donec mellis fiat spissitudo. Atque sic piliraso capite absterfoque delinuntur. **ALI V D.** Myrti, & betæ pari mensura cum oleo pilos abstergens vtitor. **ALI V D.** Gallæ viginti numero, adianthi vncia duæ ex aqua marina in mellis crassitiem coactæ inducuntur, sed pilo vrina prius deterfo, vel lixiuio, & aqua calente abluto, oblinetur medicamentum ad biduum, per quod vbi ipsum retinuerit, tertio die ablui debet. piliq; resiccari myrteo inungi. Id tenerū crispūmq; & nigrum efficit capillum. At si prius caput nouacula raseris, crispior euadet.

*Quae canos arcent, & eosilem denigrant.*

**O**L E I, quod immaturæ oliuæ fuderunt sextarij tres, Ipi cæ nardi drachma, vnguis odorati drachmæ quatuor, iunci rotundi floris tantundem: incoquuntur cū oleo. seorsim habebitur. Acaciæ succi vncia vna, vino soluta leuigatq; diligenter. Vbi vero tertia pars olei fuerit relicta, hanc percolato, & acaciæ mixtam in fidelia excipito, ac vtitor quotidie pilos inungens. **ALI V D.** Nucum viridium corticis vncias tres, ilicis radicis tantundem, vini nigri sextarios tres, ad tertias



tias decoquito, ac vbi id quod reliquum est, expresseris cum olei myrtei sextario iterum subiges, vsus eius est quotidianus.

*Aqua pilos denigrans.*

GALLAE sextarius vnus, rhus coriarij sextarij duo, myr-  
ti nigra totidem, cyperi foliorum æqualis mensura, cinaræ  
manipulus, papaueris nigrorum in floribus capitulorum  
tantundē, aquæ lacustris sextarij duodecim. Omnia multis  
ante diebus macerata, ad tertias decoquuntur. Deinde illi-  
nuntur, absterfis, siccatisq; crinibus. Ac cimoliæ terræ ac-  
tabulum cum vina calce pari mensura inungitur. Hæc au-  
tem succo betæ enitæ soluta illinuntur. Deinde betæ folia  
tegminis gratia super accommodantur. ac vbi satis adhæse-  
rint, in balneo abluuntur.

*Vt rufi capilli tingantur, & flavescant.*

MYRRHAE pars vna cum salis floribus altera, accuratè  
teritur. vbi sordium facta est crassities, caput prius deter-  
sum medicamento inungitur. siniturq; per noctem, & diem,  
postea tunc ablui præcipies. ALIUD. Lupinos crudos cum  
aqua illinito. ALIUD. Argentæ spumæ drachmam, terræ  
creticæ drachmas quatuor, calcis vitæ drachmam. Ex aqua  
mellis crassitiem faciens inungito, & betæ foliis adiectis ad  
duos, tresve dies abluito.

*Vt pili nigri flavescant.*

FLORES vini in balnei sordes mittuntur, & spissitudine  
cerati facta sub somnum illinuntur, & mane pili flavescent.  
ALIUD. Cyperi folia succo herbæ lanariæ fruticis made-  
scunt. Et diluto vteris.

*Quæ capillum reddunt colore aureum.*

ALUMINIS, sandarachæ, singulorum drachmæ sex, cro-  
ci drachmæ duæ, thapsi qua tinctores vtuntur, Romani vo-  
cant herbam rubiam, drachmæ octo, è cinere lixiuij quo pi-  
learij vtuntur sextarij quatuor. Lixiuium cum thapso con-  
tusa incoquito. vbi dimidia portio relicta fuerit, humorem  
exprimito. quo alumen, sandaracham, & crocum dilues.  
Deinde vase vitreo condes. Vbi vsus venerit, pilos prius ab-  
sterfos illinito. postquam verò combiberint, ablues decocto  
scenugræci, hordei, & cumini, aquæ prius tepidæ superfusæ,  
quod sufficit, ad hæc saponis quantum satis est adicies.  
ALIUD. Flores vini vsæ vnâ cū oleo balanino, pilis obli-  
nuntur.



nuntur. ALIVD. Sapone gallico cum aqua in singulis balneis pili abstergantur.

*Aliud valde generosum.*

*Res.* RHUB. rubri sextarius, gallarum libra vna, Selydrij vnciae duae, herbae aurum colore imitantis (quam Romani rubiam vocant) vnciae duae, polytrychi fasciculi duo, absynthij vnus, lupinorum quibus cortex fit detractus cyathi duo, aquae sextarii septem. Omnia in vitreum vas coniecta, dies nouem finito commadescere: quotidie bis rudicula agitans. cum vsus exigit, auferes quod satis est. & hoc spongiam madefaciens, pilos confricato, humectosque combibere finito. vbi siccati fuerint, sapone calida aqua soluto, abluuntur.

*Quae pilos albos faciunt.*

VERBASCI candidi flos combustus aceto mergitur, & in saponem miscetur. ALIVD. Verbasci seminis, aluminis, raphanorum corticis singulorum drachma. Contundito, & glutini quod ex tergoribus bouum confit, ταυγονόνην Graeci vocant, drachmas quatuor misceto.

*De capitis affectibus cutem infestantibus, porriginem, quae pityriasis dicitur.* *& fletu. Dicitur vna res.* *Cap. 1. 1. 1.*

*Cap. 1. 1. 1.*

**P**orrigo, quae pityriasis Graece dicitur, est, cum tenues, & furfuraceae squamulae ex capitis, vel etiam reliqui corporis superficie citra exulcerationem reloluuntur. Id autem euenit vitioso corporis humore, salsaue pituita, aut bilioso, & melancholico sanguine caput subeunte. Itaque corpore toto (ut dictum est) euacuato, subscriptis remediis vtetur. Cimoliam aqua prius maceratam betae succo miscebis illinesq; & tantisper ita permittes, donec inaruerit. Deinde postquam ablueris, thus ex vino oleoq; detritum perunges: die in sequenti itaphida agriam, hoc est herbam pediculariam ex oleo inunges. ALIVD. Nitri, fecis concrementatae, myrobalarum, singulorum libra, herbae pediculariae libra vna semis. vino dilutis caput abstergitur. si autem reliquum corpus pruritu vexetur, accis. Ad humidiores vero pityriasis, muria, vel lupinorum decocto caput abluendum est. hoc enim subinde sum expertus.

*Ad psudracia & exanthemata capitis.*

PSYDRACIA & exanthemata capitis sunt, pustulis similia, quae summam cutem excedunt. Exanthemata vero

*Ad psudracia & exanthemata capitis.*



cutis sunt exulcerationes, subrubicundæ, & asperæ. Vtrun-  
que vitium præfidiis infra positis exteritur. Argentea spu-  
ma, cerusæ singulorum drachmæ quatuor, aluminis drach-  
mæ duæ, rutæ foliorum viridium totidē. ex aceto myrtéoq;  
oleo leuigata cuti illinuntur. A L I V D. Ruta & alumen cum  
melle trita, capiti prius raso inunguntur. Sin autem cutis à  
capite abscedit, oleæ folia elixa cū melle cataplasmatibus mo-  
do inducuntur. A L I V D. Argenti spumæ, cerusæ singulo-  
rum drachmæ duodecim, sulfuris viui drachmæ octo, cera-  
to myrteo excipiuntur.

Ad huiusmodi capitis densa rubraq;.

HÆC papillis sunt similia, ex quibus sanies eliquatur.  
Capite prius nouacula raso, & aqua nitroq; absterfo, sulfure  
viuo ex hominis vrina contrito vtor. Vel cretam sulfurata,  
μικαντηρίαν vocant Græci, cum aceto inungito.

De manantibus capitis vlceribus, quæ achores  
græce dicuntur, & fauis.

INTER capitis vitia, quæ in cute oboriuntur, vnum est,  
quod appellatur Græcis Achor, à nostris manantia vlcera,  
tenuissimis cutē foraminibus perforans: per quæ glutinosa  
fertur sanies. Simile ipsi malum specie est, quod à faui, simi-  
litudine κύνιον à Græcis nominatur. quod magis amplis for-  
aminibus constat, quibus humor crassitudinem mellis refe-  
rens sicut in apium fauis, cōtinetur. Origo est ex nitrosa sal-  
saque pituita, victus igitur ratio ex cibis boni succi consta-  
re: omnia acris & salia vitari debent: præsertim si inflamma-  
tionem affectus respiciat. postquam corpus superfluo decen-  
ter erit leuatum, derasis capillis caput fouendum bis tēvo-  
die, aut etiam sæpius, aqua calida, in qua myrtus sit decocta,  
vel rubus, vel lenticula, vel amari lupini, vel asparagi radix.  
Quum verò plus saniei emanat, salicis folia cum aqua, vel  
lenticula, instar cataplasmatibus applicantur. terra autē cimo-  
lia, vel cretica, vel samia, vel pompholyx, vel spodiū, vel ar-  
gēti spuma, vel cadmia, vel charta combusta, vel etiam me-  
dicamentum ex charta Xerion, omnia ex aceto inducuntur.  
Smegmate verò hoc vtendum est, sulfure viuo, & perdicij  
herbæ, saponisque æquali pondere. Composita hæc sunt, ar-  
genti spumæ drachmæ duodecim, rutæ foliorum drachmæ  
octo, herbæ pediculariæ quam staphida agriam Græci vo-  
cant drachmæ quatuor, chalchanthi drachmæ duæ, Aceto



myrteoque in sordium spissitudinem coacta illinuntur.  
**ALIVD.** Sandicis drachmæ quatuor myrrhæ drachmæ qua-  
 tuor sulfuris ignem nō experti pondo drachmæ duæ, polli-  
 nis thuris drachmæ quatuor ex oleo veteri inunguntur.

*quod dicitur in fine fontis*  
**Ad achoras** *Alind ad achoras.* recrementum argenti, vel molibdenam con-  
 tritam oblineto. **ALIVD.** Ad achoras & humidæ scabies,  
 rhododaphnæ, rosarum vnciæ quatuor, sulfuris viui vnciæ  
 quatuor, picis liquidæ, & picis aridæ vtriუსq; vnciæ tres, ce-  
 ræ selibra, olei myrtei quantum opus est. in pueris autem,  
 lacte soluta illinuntur.

**De ficis.**

**FICVS**, nominant eruptiones, vlcerosas, rotundas, sub-  
 duras, rubentes, quas dolor etiam comitatur. Fit verò hoc  
 mali plurima ex parte in capite, nascitur tamen & in reliquo  
 corpore. Probatur maxime contra hos alumen fissile, æris  
 flos tostus, & glutinum pari mensura cum squamæ æris du-  
 plo. Teruntur ex aceto illinunturque. Præstans etiam reme-  
 dium est *ficinarum* capita combusta, elixique bulbi, & cinis  
 aceto mixtus.

*Aduersus capitis & menti ficosa exan-*  
*themata, xyraphium.*

**MISYOS** drachma vna semis, chalcitidis drachmæ duæ  
 semis, squamæ æris drachma, aluminis fissi. drachma. Bene-  
 loto, hoc medicamen aridum impositum dimittitur. Die in-  
 sequenti rursus pars lauatur, spongiaq; deteris idem appli-  
 catur. Decidit enim ramentum crassissimū. Et si diebus sub-  
 secutis idem fiat, sine cicatrice breui confanescit. Cæterum  
 medicamen hoc non mediocriter adhæret.

**Ad capitis pediculos.**

**LVPINORVM** in aqua coctorum diluto, caput deterge-  
 ri iubeto: vel herba pedicularia, vel sandaracha, vel vtraque  
 contrita ex oleo veteri, seu aceto illinitur, vel piperis mo-  
 mentum (ne exulceret) cum oleo, aut hederæ succo cum melle,  
 † aut minio synopico cum aceto, aut cedrino liquore, aut  
 pice liquida cum alumine, aut baccarum lauri expresso. aut  
 oleo raphanino. Ego pediculariam ex aceto oleoque tri-  
 tam inunxi, ac semper quod volui, sum affecutus.

† Græcus codex manu scriptus ἢ σίναπτι, id est, vel sinapi cum aceto.  
 quæ scriptura verior est.



# LIBER III.

De capitis dolore, quem greci κεφαλαλγία vocant.

CAP. IIII.

**C**apitis dolor qui grecis dicitur κεφαλαλγία, symptoma est grauissimum, ac nunc ex sola intemperata qualitate oritur, nunc ex nimia humorum copia. Interim ex vtraque causa: interim vero ex primaria causa: nempe solis aestu extrinsecus, frigore, ebrietate, aut ictu. Vehementissimi igitur capitis dolores ex efficientibus qualitatibus nascuntur, & potissimum ex calida: qui verò ob siccitatem contrahuntur, non aequè vehementes existunt. Humida qualitas sui ipsius respectu, nullum plane dolorem conciliat. nisi caliditati, aut frigori, aut humorum copiae adiuncta. Itaque de eo capitis dolore qui cum febre est eo loco explicatum est, quo febrium curatio exposita est, nunc de cæteris dicendum est.

*De capitis dolore ex insolatu contracto.*

**Q**ui ex insolatu capite dolent, eorum cutis tactu calida est, & primo statim manus iniectu aridior apparet: oculos habent rubentes, frigidis asperginibus, & inunctionibus oblectantur, sentiuntque ab ipsis præsidium. Cæterum curatio his conueniet, etiam ea, quam dolori in febribus præscripsimus. Si dolor perseverat, infra scriptis vtendum est cataplasmatibus. Prodest fronti & temporibus inductus panis ex posca, & rosaceo. Interdum cum amygdalis, vel rosis, siccis, aut teneris, vel cum menta cui pulegium sit adiectum, vel panis cum persici foliis. facit etiã ocymum ex aceto & rosaceo tritum, vel hederæ corymbi in aceto elixi. Iam farinam triticeam cum rosaceo leuigatam vel serpilli ex aqua decocto miscere conuenit, vel cardamomum torridum leuigatumque ex aceto & rosaceo: vel fermentum cum rosaceo, vel iridem aridam cum aceto. Sed mutantur continue singula: nam si diutius adhæreant, inefficacia redduntur,

*Pastilli ad capitis dolorem ex intemperie calida.*

**C**ROCII drachmæ quinque, chalchanti drachmæ decem, aluminis drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ septē, omphacii drachmæ tres, chalcitidis drachmæ tres, gummi drachmæ tres. Vini austeri quod sufficit. Ex posca sumuntur. Sin etiam vigiliæ infestent, aliquid ex somniferis applicatur.

*De ijs quibus caput ex frigida intemperie indolescit.*

**†** AT si frigus nocuit, contraria iis qui ex solis aestu dolent, affectos signa testantur. Etenim facies ipsorum non concidit,



sed colorem decoremque amisit. Item frigidis nec gaudent, nec iuuantur. Verum horum agnitionem tum victus ratio, tum reliqua concurrentia firmabunt. Inunctiones igitur adhibendæ ex oleo rutaceo, laurino, vel irino, vel nardino, vel etiam opobalsamo, præsertim si recrementa fuerint crassiora viscosaque. Frons autem tum hoc liquore, tum iis medicamentis debet illini, quæ ex pipere, & euphorbio præparantur. Vinum subtilius propinandum: corporis motione & balneis vti calidis præcipiendum. interim à radícula vomitu. In quibus autem qualitas citra humorum copiã diutius persistat, hoc vtendum est medicamine. Piperis albi drachmæ duæ, crocomagmatis drachmæ duæ euphorbij recentis drachmæ octo S, stercoris colubini drachma vna S, aceti acerimi quantum satis est. Illinitur pars laborans, sed prius infricata.

† Locus hic sic legitur in veteri græco exemplari, τοῖς ἐν ἰνὰν νοεῖ κεφαλαλγῶσι πνευμάτιος ἐξ τῆς οὐμῆς, ἢ ἡ δριγάντα τῆς ἐν ψύξης, id est, signa & curatio eorum, quibus caput ex frigore dolet, sunt contraria signis & curationi eorum quibus caput ab æstu dolet.

*Si biliosus humor dolorem inuexerit.*

NOTAE horum persimiles iis, quos ob solis æstum dolor affligit. Sed maior ipsis rosio accedit, & faciei pallor. interim etiam os inamarefcit. Porro affectus hic ætatibus potius videntibus, & temperaturis calidioribus, vitæ sollicitæ, & bilem flauam coaceruantibus solet accidere. Quamobrè balneum temperatum his, inunctiones, aquæ potus, & vniuersa victus ratio humidior, bonique succi adhiberi debet. Biliosus humor absynthij diluto, vacuabitur: vel aloe, aut ipsa Picra, antidoto per se, aut cum modica scammonia, aut catapotiiis quæ ex aloe constant. Inungenda frons, aut crocodi pastillo, aut trigono, aut quodam simili.

*Si caput consortij lege indolescat.*

SI caput consortij lege cum toto corpore afficiatur, cura adhibenda, vt contra intemperiem, & superantem materiam pugnemus. & si copia quidem premit & maximè in venis, sanguis mittendus est: sin autem magis qualitas vrgeat, purganti vtendum medicamine. Quod si particula laborante aliqua simul condolescat, veluti iocinore, aut ventriculo, aut stomacho, his succurrendum est. Vbi calida afficit intem



intemperies, panis ex aquoso vino exhibetur, vel etiam ex chondro forbitiunculae. Extrinsecus vincit superfundere, quae modice refrigerent, virēsque confirment, sicut à me prius comprehensum est. At si glutinosi, crassi que humores in stomacho infarcti, capitis dolorem concitent, hos quoque amoliamur potu oxymelitis, tum simplicis, tum Iuliani. Insuper medicamentis ex hyssopo & origano, & his adhuc calidioribus magisque incidentibus. Iam vomitus à radícula utilis, superfusiones calidiores, & cataplasmata.

*De capitis dolore ex vino.*

SI vinum adhuc incoctum in stomacho fluctuet, tepentis aquae potu vomere dolentem iubebis. Quod si etiam post concoctionem caput indoleat, refrigerantibus, repellentibusque utemur, quale est rosaceum priuatim sumptum, & cum aceto, vel hederæ succo, vel brasiçæ. Quin & ipsa brasiçæ folia in aquam calidam demersa, & capiti circumdata ligataque, naturaliter ebrietatem arcet. eiusdem decoctæ esus in id efficax est. Item lenticula hos adiuuat, potissimumque ventriculo humidiorē præditos. Adhæc alica, mallicorium, & mala ipsa, piraque, tum aquae potio, vtiliter assumentur.

*De capitis dolore ex ictu.*

QUI ex ictu capitis dolorem conceperunt, iis, nisi summa omnino cute percussi sint, sanguis statim emittendus est, & conuenientes aspergines capiti sunt adhibendæ. Oléoque dulci irrigandum ipsum lanisque contegendum. Vino ciboque pleniori, præsertim si febris adest, ægros coercere expedit. Et tota curatio ceu ad neruosarum partium inflammationem & præcipue membranarum cerebri quas meningas appellant, adaptabitur. Si verò & vulnus factum fuerit, huic quoque decenter medebimur.

*Malagma ad capitis dolorem.*

CERÆ drachmæ septem, amygdalini olei vnciæ tres, terebinthinæ drachmæ octo, æruginis rasæ, cimoliæ, chalcididis singulorum drachmæ quatuor, pumicis drachmæ tres, aris vsti, squamæ stomomatis singulorum drachmæ duæ. Si videtur paulo esse durius, amygdalino emolliendum.

*De cephalæa; & hemicrania.*

C A P. V.

**V**Terque hic affectus, stabilis ac permanens capitis dolor est, qui strepitu, clamoribus, claritate lucis vini po-



tu, & implentibus caput odoribus excandescit exacuiturq;  
 Ac aliis totum feriri caput in hoc dolore, aliis alterā ipsius  
 partem duntaxat excruciarī videtur, quos etiam hemicranio-  
 cos nominant. Quibus sane intra caluariam malum consi-  
 stit, iis dolor ad oculorum radices porrigitur: quibus extra  
 est, circa ipsam caluariam indolescent. Quapropter dolores  
 cum grauitate molesti, plenitudinem testantur: cum erosio-  
 ne infestantes, vel humorum, vel vaporum acrimoniam: qui  
 cum pulsibus obueniunt, inflammationem: qui cum tentio-  
 ne, si quidem grauitas & pulsus non adsit, spiritus tenuis, &  
 flatulenti redundantiam innuit. si cum pulsu, membranosa  
 partis inflammationem: cum grauitate vero, copiam intra  
 membranas contineri. At si putridus etiam humor, calidior  
 euaserit, & cum febris simul capite dolitant: febriunt autem  
 omnino, & quibus inflammatio dolorem parit. Quum igitur  
 corpus totū succis æquabiliter omnibus redundat, quod  
 plethoricum dicitur, venā secare si vires patiantur, & acio-  
 ribus vti clysteriis conuenit. Inde si adhuc sanguis videtur  
 exuberare, etiam vena narium adaperita, quantum satis esse  
 videtur, detrahes. Mox hiera, quam exacueris, intenderisq;  
 exhibēda, deinde pituitæ educationibus, apophlegmatismos  
 vocant, vtendum est, tum iis quæ per nares vacuant, ἑρπύλλæ  
 græcis dicuntur. Eiusmodi est elaterij succus, cum lacte in-  
 fusus, vel etiam aridum elaterium inspiratum, succusq; cy-  
 clamini & porri. Hæc quæ sequuntur, sunt composita. Me-  
 dicamentum quod naribus inditur ad veteres cephalæas,  
 lippitudines & morbos comitiales. melārthij drachmæ octo,  
 salis ammoniaci drachmæ quatuor, elaterij drachmæ qua-  
 tuor. Tunsa, oleo fycionio, vel irino, vel cyprino excepta, vt  
 cerati fiat spissitudo, naribus demittuntur.

*Medicamentum quod pituitam extrahit,  
 naribus inspiratum.*

CYCLAMINI sicci drachmæ octo, nitri rubri drachmæ  
 quatuor. Sin autē in vicem nitri elaterium indideris, magis  
 proficiet. Tritum accurate calamo scriptorio naribus inspi-  
 ratur. Porro epithemata quoque capiti admovento, & inu-  
 ctiones, vbi morbus in vetustatem magis inciderit.

*Epithema ad cephalæam.*

VNGVENTI irini, peucedani, castorei singulorū drach-  
 ma, baccarū lauri drachmæ duæ rutę summitatum drachmæ  
 qua



quatuor. Excipitur cerato rosaceo, rasq; capiti, toti ipsi imponitur. Mulier quædā in hemicranicis hoc etiā quod sequitur epithemate vsa, mirandū in modū inclaruit. Radicē cum syluestris viridē minutim cōcisam, absinthiūq; cū hydrelæo incoquebat: dum intabescerent. Ac hydrelæo calente mediocriter partem affectam irrorabat. radicē vero & absinthium, in puluerem contrita oblinebat. Atq; hoc solo medicamine, hemicranicos, id est altera capitis parte dolentes, & cū febre, & sine ipsa, curauit. At si malum maxime increuerit, vt dolorē ferre nequeāt, vtitor medicamētis etiā quæ lenire possunt, & noxia euocare, quale est quod sequitur.

*Unguentum ad cephalæam.*

**L I Q V O R I** speucedani drachmæ sedecim, lachrymæ papaueris, anisi, alterci quod hyosciamū græci vocant, croci, myrrhæ, scammonia singulorum drachmæ duæ. Aceto excepta in pastillos coguntur. Cum vsus postulat, ex aceto vel posca illinuntur iis, quibus humores crassi, vel spiritus flatulentus dolorem fecit. Iam dropax & sinapismus iisdem benefacit: & pastillus ex thapsia. Iam qui ex atramento scriptorio sit mirifice eidē causæ medetur, quo post hæc vtendum est sicut in opere de compositis docebitur. **Q u i n** & istud mirabilem in modum ad hemicranicos ex crasso glutinosoq; humore dolentes efficax est. Euphorbij portio vna cum pari castorei modo aqua excepta auriculæ demittitur qua parte indolescit, inde balneum adeundum, vbi paululum immorati ipsum assument, & consueto more lauabunt. Sic quidem expertum est, verum non alienum absurdumque fuerit, & oleo ipsa excepta, in aurem instillare. Item quod medicamen ad coxendices inscribitur, etiam longo capitis dolore laborantes, & hemicranicos ex toto perlsanat.

*Ad hemicraniam veterem.*

**A L L I O R V M** drachmæ quatuor, ceræ drachmæ duæ, axūgiæ veteris drachmæ duæ, cātharidū drachmæ duæ. Vespere illitū finito per noctē adhærere. Mane rupta papula, malagmate, quia liquidū est, *καρυγδον* appellāt, ei medeberis. **A L I V D.** Baccarum lauri quibus cortex sit ablatu, drachmæ duæ, rutæ foliorū, drachmæ duæ, sinapios, drachma. Aqua dilutum oblinito. At iis qui frigori patuerunt, vtilissimum est infra scriptum medicamentum vt plerunq; semel ante balneas illitum, confestum affectui medeatur, & ægrotantes



omnino sani post lauacrum euadant. Olei sabini pondo, ceræ quadrans, euphorbij vncia. Hoc dimidiæ frontis partempe qua temporum musculus habetur, delini debet. Qui vero frigoris iniuriam non senserunt, iis gallæ, & crocōmagmatis parem portionem cum vino detritam inungito. Sed qui ex calidis vaporibus, vel succis capite dolitant, iis medicamenta quæ euphorbio constant, non applicabis.

*Apoplegmatismus, id est medicamentum quod salivam movet contra cephalæam.*

SINAPEOS cōtriti & in succū redacti ex aceto & melle drachmæ quatuordecim, herbæ pediculariæ drachmæ quatuor, pyrethri tantundem. Tusa, cribratâque misceto, & in sole gargarizato. Porro si ob biliosum humorem aut quandam in temperiem orta Cephalæa diutius prorogetur, eorum vsus veniet quæ in sermone de dolore capitis cōprehensa sunt. Si ne sic quidem dolor finitur, neque cucurbitulis, neq; hirudinibus adhibitis, sed suspicio sit humores per arterias in caput esse distributos, non absurdum fuerit & arteriam post aures incidere. Porro humidioribus, etiam balineæ naturales recte adhibentur.

*De phrenitide. CAP. VI.*

**P**hrenitis, membranarum cerebri, quas meningas græci appellant, inflammatio est, nunc quidem ipso quoq; cerebro simul eam experiunt, nunc autem calore præter naturam in eo consistente. Causa morbi est, vel sanguis superans, vel biliosus humor: nonnunquam & flaua bilis perusta, adeo ut in nigram degenerauerit, quando etiam grauißima phrenitis nascitur. Aliquando cerebrum septi transuersi consortio dolens, ex nervis qui in ipsum sparguntur vitium concipit. At quæ mentis alienatio in ardentissimarum febrium statibus accidit, quæque ex stomachi consensu exoritur, phrenitis non est, sed hoc solum, puta delirium. Comitantur proprie phreniticos vigiliæ quidē plurima parte: interdum vero & somnus turbulentus accedit, ut consurgant, exilient, & furibunde vociferentur. Quibus sanguineus humor morbum fecit ij cum risu insaniunt: quibus flaua bilis ferociter, quēadmodum quibus atra vitium contraxit, tam immaniter sæuiunt ut coerceri nequeant, omnium quæ dicunt, faciuntve, obliuiscuntur. Oculos habent sanguineo colore tetricos, ac perfricant: interim ari-

dos,



dos, interim lachrymantes, vel levis, hoc est crassiore pituita oppletos. Lingua est aspera, & sanguis è naribus destillat: floccos festucasque colligunt, febris per totum morbi decursum acuta conficiuntur: sed quæ in alto maligna delitescat. Pulsus ædunt exiguos, languidos, & quadantenus etiã duos. Respirationem magnam & raram, cum cerebrũ primariò afficitur. At si phrenitis septi, transuersi, quod græci phrenas vocant, consortio concitetur, & respiratio inæqualis est, & præcordia sursum conuelluntur, & multo calore ardent: sicut iis qui ex cerebri vitio insaniunt, facies incalescit, & subcruenta est, venæ repletæ. Quod si humor pituitosus sit temperatus bilioso, vti causam, ita appellationem quoque compositam habet. Nam vigilans coma, nominant, in vniuersum quidem cum biliosus superauerit, quippe tales ægri vigilantes phrenitide laborant: cum vero pituitosus præpollet, contra in grauiorem veluti somnum quem coma vocant græci deferuntur. Atque hoc malum antiquiores Galeno medici, Catochon vocauerunt.

*Curatio phrenitidis.*

Quod si vires ægri patiãtur, sanguis protinus è cubito mitti debet, & copiosior. At si desipiens brachiũ non porrigat, aut si porrigat, metus sit secundũ vacuationẽ, sanguinis profluuij, dum manũ æger subinde ob mentis turbationẽ iactitet, recta in frõte vena diuisa, vna vice quod satis est auferemus. itẽ clysteriis vtremur, ex hydrelæo, vel rosaceo cũ ptisanæ cremore. Si vigilantiæ vrgent, rosaceũ, vel oxyrhodinũ in caput dandum est. Aliquando calida ipsũ aqua prius superfundendum: & medicamentum quod ex papaueris capitibus vocatur diacodyon exhibebitur nisi virtus imbecilla prohibeat. Et alia quæ ad somnum conciliandum superius scripta sunt huc transferemus. Decumbat æger in loco, tum lumine, tum tẽperie moderato: & variis quibusdam picturis libero, vt quæ tales de terreant. Quod amici quidam gratissimi ingredientur, & commodum incident, qui nunc blande agrotũ alloquantur, nũc acerbius corripiant. Cibus primũ esto aqua mulsæ, deinde ptisanæ cremor, & sorbitiones ex chondro cum quadam dulci potione, vt apomelite, vel hydrorofato, vel rhodomelo, vel dulci hydromelo. Nam vinosum hydromelum, quod in paruis vasculis ex Cibra apportatur, repudiandum, vt quod grauiores vino no-



xas in talibus excitet, & maxime in capitis affectibus, idq;  
 ante concoctionem. Panis quoque aqua lotus recte exhibe-  
 tur, intubi, lactucæ elixæ. Si multus feruor conficiat, etiam  
 cruda hæc dantur. Item cucumeris medulla, peponis, dura-  
 cini, & similia. Aquæ frigida potu coercendi sunt, potis-  
 simum si septum transuersum consortij lege malo dedisse  
 originē deprehenderimus. Quod si vrina ipsis, vt consenta-  
 neum est, delirij vitio cohibeatur, †fota adhibito calēte hy-  
 drelæo & inferiorem ventris ab vmbilico regionem *ἡτρου*  
 græci vocant & vesicam superfundemus, deinde digitis ma-  
 nus, loco innixis ad reddendum vrinam incitabimus. Reli-  
 quum corpus ipsis decumbentibus calido oleo perungi de-  
 bet. Etenim in quiete, quoad eius fieri licet, seruari debent,  
 ita vt siquidem prædiuites aliqui fuerint, per famulos con-  
 tineantur: sin minus, vinculis constringantur. Nam inordi-  
 nata motio vires cōuellit. Iam vero alia etiam de causa pe-  
 des, prius forti, deligaturis constringi, manuq; contrectari  
 debent, nempe quò humores deorsum reuellantur. Porro si  
 longior affectus, & contumax fuerit, ab iis quæ soporem  
 accersunt, *καρποτὶνὰ* græci appellant, abstinendum: ea vero  
 quæ digerendi facultatem obtinent, capitis perfusionibus  
 miscenda, scilicet mentē succus, vel serpilli vel calaminthæ,  
 vel ruthæ. Tum iis quoque vtendum quæ naribus inserun-  
 tur. A septimo die si viscera sentiant inflammationem, cata-  
 plasmatis ex lini semine, & hordeacea farina cum hydreleō  
 leniemus. Deinde cucurbitulas leues, aut cum scarificatio-  
 ne, tum his ipsis, tum occipitio, & spinæ accommodabimus.  
 Si corpus squalidum perustūque esse coniecturaueris, fe-  
 brisque ad sit, etiam balneis vtendum aquæ potabilis, & vn-  
 ctione liberaliore. Vinum tenue & aquosum, quod *διαιτοφόρον*  
 appellant, viribus recolligendis propinabimus, nullam inde  
 mentis turbationem, vt est verisimile, futuram suspicantes.  
 Aut enim nulla sit, cum morbus declinat. aut certe si sit, ex  
 facili subsidet. Processu autem declinationis, gestatione cor-  
 poris vti expedit, & cōgrua virium recreatione. Sed ita phre-  
 nitici sese recolligent, vt ebrietatem, iram, ciborum corru-  
 ptiones, & in primis solis æstum caueant.

† Hæc sic leguntur in antiquo codice, *ποινισαύτης ἀλίας καὶ αἰαντῆσι*  
*μικρὸν ὑδατὶ καὶ ὑδρελαιο.* id est fota adhibita calente aqua aut hy-  
 drelæo.

De



## De inflammatione cerebri.

## CAP. VII.

**C**erebrum inflammatione laborans, sæpe ita intumescit, ut capitis futuræ distendantur. Dolor comitatur maximus, & diuturnus, multus angor, rubor in facie multus cum tumore molli: oculi fiunt emissicii, caput inturgescit. Qui hoc malo impliciti sunt, sanguinem ex cubito mittere, item ex naribus, & vasis linguæ subditis debent. Porro vti-  
tor & aspersioibus quæ per inflammationes capiti adhibentur, & cataplasmatibus. quæ humectare, & maturare sunt idonea.

## De erysipellate cerebri.

## CAP. VIII.

**A**ccidit quoque erysipelas cerebro, quo laborans hæc patitur: capite dolet vniuerso, adeo ut flammis id vri putet. facies frigida est, & subpallida, os siccescit. Quare sic affecto sanguis detrahendus est, & potissimum ex venis sub lingua sitis. Refrigerantia conueniunt: quibus in aliis quoque erysipelatis utimur.

## De lethargo.

## CAP. IX.

**L**ethargus itidem, cum ratiocinatricis animæ noxa sit aliqua, locum eundem quem phrenitis, nempe cerebrum, occupat: materia vero mali, contraria est. Nam ex pituita humidior, frigidiorque cerebrum madefaciente, contrahitur. Lethargicos comitatur febris lenta, non impensè acris erodensque, cum alto sopore, quæ cataphora Græcis dicitur. Pulsus his magni, rarique sunt, & vndosi, respiratio nimis rara & imbecillis. somno perpetuo præmuntur, à quo agere possunt excitari, & quocunque modo interpellentur vix respondent: obliuiosi, mente capti, oscitant crebro, & hiant ore nonnunquam persistunt, tãquam claudere id obliti. Deiciunt per aluum complures quidem, liquidiora: nonnullis autem contra venter inarescit. Vrinam reddunt iumentorum lotio similem. Quidam ex eis tremiscunt, & vndiquaque desudant. Huic affectui respondet Carus quasi dicas veterinosus sopor ex eadem materie proficiscens: sed hoc discrimine variat. Febris Carum præcedit, eaque vehementior: Lethargum subsequitur: item quod Carus etiam alia comitetur symptomata. siquidem frequenter febrium accessionibus superuenit comitialibus, cerebri compressioibus, modo ossæ quidem in fracturis, modo autem membranæ custode, quem *μηνυγγοφύλακα* Græci vocant, priorem cerebri ventriculum premen



premente. Lethargus autem peculiarem quandam constitutionem obtinet: superuenit comitialibus.

*Curatio lethargi.*

Vires si permittunt, etiā hic vena secari debet: sin minus, clysteriis acribus aluū ducemus. Aeger decumbet in domo spatiosa, mediocriter lucida. Caput eius oleo perfundi oportet, cui etiā castoreū sit adiectū. Nonnulli in vicem olei, oxyrhodino cū castoreo vtuntur: robur hinc capiti calorēque simul accersentes: reliquū vero corpus delinētes, & præcipue extrema, oleo veteri: cū nitro tosto, vel pyrethro, vel pipere, vel cocco gnidio extergūt. Licet & cerato quod his, & castoreo simul cōstet, vti. Porro naribus admoventur odoranda thymū ex aceto contritū, aut origanum, aut pulegiū. Os vngi cōuenit, & palati cælum detricto sinapi, cum mellis momento. Conariq; oportet pituitā indidē affixam digitis eiicere. Si admittāt, etiā apophlegmatismi vsus erit ex oxymelite cū hyssopo, aut pulegio, aut orygeno, aut ipso quoque sinapi. Potui exhibebitur aliquid ex iis quæ citō trāseūt præsertim diaspolites cochlearij, mensura cū posca. iis autē qui in vetustatem inciderūt, & tremuli sunt, castorei quoq; scrupulos duos, trēsve dabimus. Si humoris inest copia, nihilq; aliud prohibeat, scāmonei scrupulū, castoreo tēperatū exhibebimus. At si his affectus nō discutitur, caput radēdū fouēdumq; est sale, milio, & similibus per sacculos abhibitis: Adhæc sinapismis vti in capite prodest, tū iis quæ per sternutamenta euocāt. Postea cucurbitulas occipitio agglutinare partim leues cū multa flāma partim cū scarificatione. Præterea ad naturæ excretionem frequēter sollicitare oportebit tū iniectionibus, tū iis quæ vrinā mouēt. Inferiorē vētris ab vmbilico regionē oleo rutaceo, aut fycionio cui sit adiectū castorei paululū aspergere fouereq;: Iam vero vt deglutiāt, crebrius admonebimus, cū calida aqua dulciū portionum, aliquā præsertim apomeli ex angustioris vasculis, *βονβύλια* græci vocāt, instillātes. Quod si mediā infestet regionē quædā inflammatio, huic itidē medebimur superfusionibus & cataplasmatibus. Naribus sinapi aceto tritū, vel castoreū vstū admo- uere profuerit. Alimentū esto cremor ptisanæ, vel auenæ, vel alicæ cū oxymelite, vel salibus, vel pulegio, nunc quotidie, nūc vno die interposito. A cibo, vinciri debēt: summa cedere multū oportet, cruraq; pungere: nōnunquā pilos etiā in ipsis  
vehe



vehementius euellere conniti, quò excitentur. Iam femorum & crurum rubores excitati, *φωρίγμυς* Græci vocant subinde profunt. Cæterum vbi morbus inclinare inceperit, gestationibus statim congruis vtendum, & ad balneum reducendi sunt. Viētus qui vires recolligat, recreētq;, decenter adhibendus.

*De catocho, aut vigili comate.*

CAP. X.

**H**uius morbi causam, vbi de phrenitide sermo est habitus, sumus complexi. notæ, vt summatim dicam, communes quodammodo sunt phrenitidis, & lethargi. Sed pro materia abundante variant, peculiare autem hæ. Detinetur æger supinus, extensusq;, interim facies subtumescit, & modice lethargicorū modo liuet: interim rubore tincta est, & superior gena sursum conuelli videtur, ac excedere, vt ne coniuere quidem æger queat: respiratio nulla apparet, sed quasi emortuus decumbit. pulsus est exiguus, languidus, & creberrimus. Vrina & aluus cohibetur, aut certè modice redditur. ac qui sanè mediocriter habent, liquorem aliquem infusum deglutiunt: qui vero malo vīti sunt, ad nares regurgitant. Itaque affectus qui pīruita bilem superante constituuntur à lethargicis discernimus, eò quòd neque facies tumescit, neq; liuida est, sicut lethargicis: præterquàm quòd paulatim etiam leuiter desudant. In iis autem periculum maius est, quibus peruigilium adest continens, vrinæ non respondent, difficultas spirandi intenditur, sudores erumpunt, item quibus ad nares potus resorbetur. At si mulier hoc laborare vitio cœperit, ab ea quæ vuluæ strangulatu correpta est, hac nota discernes, quòd naturaliter iacere videatur, & inclamantes percipiat, excitetur, rursusq; somno gravi sopiatur. Est vbi dicunt catochon diuersum à vigili comate, quod simplicem non mixtam habet causam, nimirum frigidiorē, sicciorēq; materiam, quæ posteriore cerebri ventriculo obstruēto malum hoc excitarit. Ob quam etiam æger, si corripitur subito, in illa permanet figura, qua correptus est, stans scilicet, vel sedens, clausis oculis, aut respiciens. Quam ob causam antiquiores Græci hoc pressos morbo, catochos, vel catochomenos quasi dicas occupatos, detentōsque nominauerunt: recentiores affectum catochen, & catalepsi, veluti detentionem, & deprehensionem. Curatio prædictis quidem est, sed pro symptomatum

ratio



ratione quæ superueniunt, euariat.

*Curatio catochi.*

HVIC quoque malo sanguinis missione succurritur, præsertim quibus facies rubescit, modo vires suadeant: aut clysteres iniiciendi partim qui pituitam pollentem eliciant, partim qui bilem abundantem leniant: pari modo aliorum quoque præsidiorum usus erit. Similiter ægros nutrire confert, interim diebus singulis, interim vno interposito. Porro affectus admodum periculosus est, si ex quodam alimenti, aut potus errato acciderit, qui statim ad vomitum cogendi sunt, ac parciore victu continendi, alius irritari, ac viscera resperisionibus ex cumino, aut ruta foueri debent. Qui ex ebrietate vitium conceperunt, crapula dissoluta, humidior cibo tractandi sunt, qualis est ptisanæ cremor. Præterea caput inunctionibus accommodis per æstatem frigidis, per hyemem tepidis obducetur. Si crapula neutiquam fuerit soluta, neque ad sobrietatem reditus est, desperatæ valetudinis ægrum longe fugere oportet.

*De memoriæ iactura, & ratiocinationis, item de caro, hoc est, venenoso sopore, & fatuitate.*

CAP. XI.

**M**Emoriæ iactura partim per se, partim etiam cum aliqua ratiocinationis offensa accidit: quemadmodum, & mentis seu ratiocinandi facultatis noxa priuatim prius accidit. deinde memoriæ iactura insequitur. Verum cum vtraque pars, malè fuerit affecta, fatuitas seu stultitia, quæ Græcis morosis appellatur, oboritur. causam habent communem efficientem nempe intemperiem. Quod si humida solum fuerit, memoriæ & ratiocinationis vitiū creabit, torpores graues, animi sopores, cataphoras Græci vocant, longos, altosq; somnos. Si vero humori frigiditas etiā accesserit, caros & lethargos: eodēq; modo si sola quidē fuerit siccitas, vigilias tantum inducit: sin autem calor accesserit siccitati, deliria, & phrenitidas mouebit. Porro intemperies hæ nonnunquam obueniunt humoribus, nonnunquam cerebri ventriculis, vel ipsius vasis: vel utique in humiditate insparsa, vel in ipsomet cerebri corpore, vel etiam temporum musculis tali modo vitiatis. At si quando humores cum ipsis fuerint mixti, similem quoque morbum inferent: verum simplex, an composita sit intemperies, efficiens, ex specie excrementorum condiscēs. Quod enim memoriæ, & ratiocinationis



tionis iactura, frigiditatis soboles existat, compertum habemus: ea vero humiditatis ne, an siccitati iuncta sit, ex recrementis, agri habitu, temperatura, victus ratione, anni tempore, & loco deprehendemus.

## Curatio.

si frigida male habuerit intemperies, calefacere, si humiditati iuncta sit, etiam exiccare oportet. rursus si mixta cum siccitate, humectare simul, & calefacere. Pari modo etiam in calida intemperie refrigerare conuenit. si siccitas accesserit, pariter humectare. si humiditas, refrigerare simul & siccare. In quibus autem sanguineum humorem deprehendis abundantem, venam aperire, vel clysteriis acribus vti consilium est. deinde etiam hiera exhiberi debet, & apophlegmatismis vti conuenit. Item inunctiones capiti sunt inducendæ ex oleo, cui adiecta sint quæ refrigerant, exiccantq; rosæ dico, myrti, lentiscus, aliaq; similia: nec non toti corpori prospiciendum est. Quod si ex æstu, & lassitudine orta fuerit intemperies, caput oxyrhodino perfundendum, tum reliqua curandi ratione frigida, humectaq; vti conuenit: cum in aliis tum in cibo & potu. Quod si caros fatuitati, vel obliuioni accedat, huic etiam prospiciendum est, vt in lethargicis prius comprehendimus, vbi & ipsorum discrimen explicitum est.

## De vertiginibus.

## CAP. XII.

**V**ertiginum affectus nascitur cum frigidus, glutinosusque humor cerebrum occupat: vnde leui occasione protinus etiam concidunt. veluti quando aliqua circumagi extrinsecus aspexerint, vt rotas, verticēsve, aut quādo etiam ipsi circumaguntur. Interim vero etiam calfacti capite, cum humores in eo contenti, vel spiritus quoque commouentur: interim prioribus cerebri ventriculis, dum caluaria confRACTA perforatur pressis, in quibus etiam vehementes oboriuntur cruciatus. præcedit autem in eis, quibus caput primario afficiatur vehemens in eo dolor veternosus sopor, qui νάρξ Græcis dicitur, & aurium sonitus. & quidam sanè olfactu læduntur, quidam vero gustu, at quibus ex consensu ventriculi oris vertigines accidunt & stomachi rossiō, quam cardiogmon Græci appellant, & nausææ simul commitantur.

Cura



## Curatio.

VERTIGINOSOS in accessione quidem medicamentis quæ odore mouent idoneis, excitare conuenit. Item frictionibus uti, & id genus aliis. Vbi morbus remiserit, eius amoliendi gratia sanguis primum mittendus est: deinde purgatio ex hiera præstanda. Interposito tempore acri clystere ex centaurei, vel cucurbitæ syluestris decocto utendum est. Secundum huiusmodi vacuationes caput ipsum cucurbitulis ad occipitium cum scarificatione lancinari debet, mox apophlegmatismi, id est, medicamenta quæ saliuam per os eliciant adhiberi, & sternutamenta moueri. At quos capitis calor, auriumq; sonitus male habet, ceu vaporibus calidioribus per arterias sursum elatis, etiam arteriæ sectio retro aures iis adhibenda est: ut in parte chirurgica sumus dicturi.

## De morbo comitiali.

## CAP. XIII.

**M**ORBUS comitialis, cum totius corporis sit conuulsio, cum principis animæ functionum noxa, partim sanè in ipso cerebro, partim vero in vniuersis huius ventriculis causam habet constitutam: ea modo est humor pituitosus, modo melancholicus, præterea etiam ore ventriculi affecto consortij lege oboritur. quemadmodum in colicis quoque, sicuti cum de illis agemus exequemur. vel certè aliis quoque partibus contagionem impartientibus nascitur, cum aura quædam frigidior ad cerebrum ascendit, aliàs à crure, aliàs à manus digitis. Insuper visus est quandoque prouenire etiam in quadam muliere ab utero quo tempore esset grauidà: à partu autem cessauit. Occupat hoc morbi genus maximè pueros, eosq; adhuc paruulos. deinde vero adolescentes, & iuuenes, minime senes & decrepitos. Præcedit igitur comitiales inuitus corporis, animiq; status, tristitia, eorum quæ perceperant obliuio, turbulentæ insomniorum imagines, capitis dolor, eiusque repletio continua, ob iracundiam maximè, & pallor faciei, & inordinatus linguæ motus: nonnulli ipsam quoque commordent. Quibus autem à stomacho vitium oritur, etiam palpitatio ipsius præcedit, turbatio, & erosio: iam ex inedia seu cibo tardius assumpto, irritantur. ubi vero symptoma iam institerit, ægri de repente concidunt, conuellunturq;: interdum etiam exclamant voce nihil significante. at eximia, peculiarisq; admodum nota ipsorum existit, oris spuma: cum alia cōmuniter aliis quoque mor



morbis eueniant. Non desunt quibus etiam vrina & stercus præter voluntatem excernitur. nonnullis & genitura. In quibus igitur acutissimus est affectus, statim iugulat, & accessionum continuatione, & symptomatis, vehementia. In pluribus autem longus esse solet: eoque si non in pubertate, vel menstruis purgationibus, vel per conceptum solutus fuerit, aut si post hoc tempus contractus fuerit, sæpe vsq; ad mortis diem prorogatur, nisi congruam medici curationem consequatur. Coarguunt comitiales suffimenta, bitumē, vel lapis gagates, vel cornu caprillum, iecur hircinum comestum, & iecoris tosti odor.

## Curatio.

si infans adhuc fuerit qui ægrotat: nihil moliendum est. nam etate ad biliosiores, siccioresque statū transeunte, & victu moderatiore adhibito, sua sponte plerumq; morbus finitur. Conuenit autem victus etiam solum tum infantium, tum nutricum rationem habere. Qui verò post annos pueriles in morbum hunc prolabuntur, eorum partes conuulsæ ac distractæ pingui oleorum aspergine foueri, vinciri & in rectum dirigi debent. Deinde ore distento digitus demitti, aut penna oleo irino vncta, pituitæ auferendæ gratia. Quin & medicamentis quæ naribus adhibentur sensum mouere conuenit, vt peucedano, cyrenaico liquore, bitumine, pice cedrina. Post accessiones si nihil prohibet, sanguis utiq; è cubito mittendus est. At si nihil remittat accessio, summæ partes sinapismo delinendæ sunt: cucurbitula autē præcordiis defigetur. Quòd si nec his morbus comprimitur, minimum in medicina spei superest. nihilo secius tamen medicus animo confidente castoreum necessitate adactus, & liquorem cyrenaicum cum melle & aceto ori infundet. in anum centaurei decoctum, vel cucurbitæ syluestris dabit. vbi ad se redierint ex morbo comitali viribus ante recreatis purgatione ex hiera vacuandi sunt hæc sane est recentis & acuti morbi comitalis curatio. Deinceps quomodo inueterato succurratur, trademus. Itaq; ægrotos aquæ potu continere diu expedit. aggredientes autē curationē, si nihil obest, sanguinē dimittere. Interpositis quatuor aut quinque diebus corpusculū reficere, & sic purgante medicamēto euacuare, præsertim veratro nigro, vel cucurbita syluestri, vel certe scammonia. Porro veratrum sine medulla tunsum cribratūque



aquæ mulsæ cyathis quinque, vel sex inspargere oportet, aut melle discocto cum piperis momēto excipere. Cucurbitam verò syluestrem, semine eiecto, sed quæ medullam referuet, passo implebis, sinēsque totam noctem commadescere: mane passum auferetur potuique dabitur. Vel etiam medicamento ex veratro albo purgationē molieris: quod hæc recipit: baccharum lauri purgatarum, piperis albi, alypiados, euphorbij, veratri albi singulorum drachmas octo. Hoc totum datur cū passo quod in cucurbita syluestri pernoctarit, probe vacuat per vomitum. Vbi verò sat purgati sunt, ægri balneo credentur. Tertio die in præcordiis & dorso cute scalpello incisa cucurbitulæ affigendæ sunt. Deinde complusculis diebus interpositis corpusculum reficiendum est, & Hiera diacolocynthidos assumi debet, postea capiti & occipitio cucurbitula agglutinari. Sequenti die panis coctus in mulsa, tritus autem cū amaris amygdalis, vel serpyllo, vel menta, vel calamintha, vel ruta superdandus: atque id per triduum cōtinuabitur. ab hoc, caput radendū est, & peucedani liquore, ex aceto diluto, in quo spondylion sit coctum perungendum: rursus interposito spacio corpusculum reficitur: & antidoti diacolocynthidos oboli nouem ex aqua mulsa exhibentur: & interpositis diebus iterum tres ex antidoto offerre cōuenit. Inde medicamentis uti quæ sternutamenta citāt. post quinque decemve dies castoreum ex mulsa præbetur: tēpore rursus interposito in aluum dabitur centaurei decoctū & cucurbitæ syluestris: ab hoc iterum hiera offerretur mox vtendum iis quæ saliuam per os & nares educant, deinde sinapismus capiti inducitur. iam etiam acriū ciborū esus conuenit, cum opportunitas est, adhibitus. Auxiliatur his etiam oxymel scilliticum quotidie potum, & mel, in quo scilla intrabuerit, instar cochlearij assumptum. Victus autem ratio est quæ incidat, extenuetque. Capparis igitur frequenter esus & salsamentum prodest. Fugere oportet carnes, legumina, vinū copiosius, venerem liberaliorem, balnea, sinapi, & potum statim à balneo, præsertim vini meraci. Exercitia profunt & frictiones, sed capiti post reliquas omnes corporis partes adhibita.

*De ijs qui stomachi vitio comitali morbo corripiuntur.*

s i stomachus primariò affectus, morbū inuexerit, sollicitudo habenda est, ut ex facili æger concoquat. Panis igitur  
acc



accurate elaboratus ex vino temperato quod leuiter astringat, albūmq; colore sit ad horam tertiam assumi debet. medicamentum verò ex aloë bis, tēve singulis annis dare his expedit. Vidi autem quādoq; puellum (inquit Galenus) nequam hoc tentatum morbo posteaquā radicem glycydis (dicit autem pæoniam magnam recentēmq;) ex collo suspensam gestaret. Insuper agaricum opitulatur comitialibus, idem præstat sēsili, spondylii fructus, radixque aristolochia rotunda ex aqua pota, non parum huc facit, & cōtinua crurum scarificatio.

*De iis qui à particula quadam morbum concipiunt.*

INVASVRO quidem symptomate, vbi particulam communicare morbum, senserint, siue ea fuerit manus, siue pes, fune excipi valenter debet quæ superposita est. Cum autem remittit, recreare corpus oportet, adurens quoddam medicamentum particulæ inducentes, cuiusmodi est lepidrum, & diacantharidos dicta similiaq;. Ad hæc oxymel Iulianum comitiales vehementer adiuuat, particulatim materiā emolliens. Post omnia cōmemorata & Theriace, & naturales balnearum locū obtinent. per totum autem vitæ curriculum, cauenda maxime cruditas, cibus ante concoctionem obitam, isq; crassi succi, tarda cibi assumptio, corporis exagitatio, vinū largius & potus à balneo, sicut comprehensum est, maxime, meracus, præterea valde vetusta, crassaq; vina, tum acris ex his quæ odore mouēt, & caput replent, incōniuens è sublimi conspectus, in balneo mora, & capitis ex sole exustio.

*De melancholia.*

C A P. XIII.

**M**ELANCHOLIA mētis quēdā alienatio est sine febrī, ex melancholico maxime humore nascēs, qui mentē occupauerit: aliās cerebro ipso per se ægrotāte, aliās totius corporis consensu immutato. Tertia verò melancholię species est, quā flatulentā & à præcordiis hypochondriacā appellant, ob inflāmata circa stomachū præcordia proueniens. quæ modo aurā quandā maligniorem, modo substantiæ humoris partē ad cerebrū sursum transmittant. Communia omniū signa sunt, metus, tristitia, homines auersantur, alij se credunt animalia quædā bruta esse, & voces ipsorū imitantur: alij vasa fictilia, metuuntque ne rumpantur. adhæc mortem hi expectant, illi eandem expauescunt, nonnulli semper rident, nonnulli plorant. Alij verò putant à maiore quadam vi se inua-



di, & vaticinantur futura, non aliter quàm vates & diuina-  
culi quos græci *ὀρατῆρες* proprie nominant. Peculiares au-  
tem notæ eorum sunt, qui ex totius corporis consensu me-  
lancholia laborant, gracilis corporis habitus, niger, hirsu-  
tus, & ex toto melancholicus, vel natura, vel etiam ex acqui-  
sito per sollicitudines quasdam, aut vigilias, aut prauorum  
ciborum esus, aut hæmorrhoidum, aut menstruorum sup-  
pressionem. At qui ex præcordiis melancholici existunt, eos  
testantur cruditates, acidi ructus, ardor, & ipsorum graui-  
tas, tum quòd præcordia sursum conuellantur: interim etiã  
inflammatione conflictentur. Adhæc quòd incipientibus,  
deinde maioribus effectis melancholica comitetur sympto-  
mata, quòdque hæc leuentur, concoctione, vel alui excretio-  
ne, vel multis flatibus, vel vomitu, vel ructu. Cũ autem nul-  
lum ex his, aut certe pauca eueniunt, melancholica quæ ap-  
parent signa cerebrum primario affici in totũ succi conta-  
gione melancholici fatentur. Porro si quando flauæ bilis su-  
pra modum exustæ in nigram fiat mutatio, insaniam, dictã  
græce maniam inferet, ob quam ferarum modo efferuntur  
insani, vt etiam eos qui imprudenter ipsis occurrunt, manu  
violenter tractent.

*Curatio melancholiae.*

Qui igitur ex primario cerebri affectu melancholici sunt,  
crebris balneis, victu boni succi & humido curantur vnà cũ  
decenti animi delectatione, sine alio præsidio, cum certe hu-  
mor qui molestat nondum ob temporis longitudinem ex-  
cerni contumax est, quando etiam valentiora magisque va-  
ria tentare oportet remedia. Itaq; purgentur per initia epi-  
thymo, aut aloë. Nam vel pauxillum ex his sumptum quo-  
tidie maxime iuuat, & leuiter aluum subducit. vbi verò pur-  
gati fuerint, vti dictum est, absynthium propinabitur: nunc  
quidem herba ipsa in aqua macerata cocta; duorum cya-  
thorum instar, nunc autem eius succi drachma semissis,  
cum aqua continue liquefacta. Aceti quam acerrimi mo-  
dicum sorbitioni datur somnum inituro. Iam multa ob-  
sonia in id intincta, esse conuenit. præstantius autem fuerit  
aceto mixtam esse scillam, polium, & tenuem aristolochiã.  
At cum morbo quidem incipienti ex totius corporis affe-  
ctus cõsortio, vt supra dictũ est, incidis, corpus autẽ, viribus  
constat, à sanguinis missione incipiendũ est: post hanc, viri-  
bus



bus relictis, inferius purgare conuenit medicamento ex cucurbita syluestri, tū eo quod constat nigro veratro. ac si hæmorrhoidibus, aut mēsis suppresis malū fuerit concitātū, illas adaperiemus, hos proritabimus. Laudātur etiam facultates, tum quæ vrinæ ciendæ sunt, tū quæ per sudores purgant. Sin autē præcordiorum offēnsioni morbus debetur, & horū habenda erit sollicitudo: ac fouebuntur ipsa decocto rutæ, anethi, absynthij, pulegij, agni seminis, & fructus lauri perfundendo. Hæc etenim dolores quoque leniūt & flatus discutiūt, oleo incocta, & sic affectæ parti applicata. Cæterū præter hæc insunt, cataplasmatibus etiā ea quæ flatibus discutiendis faciūt. nēpe apiū, vel anisum, vel cuminū. Nil mali fuerit, si indatur cataplasmati & cyperus, & iris, & libanotis quam rosmarinum vocant. Cum hæc admoues lōgo tempore per diē & pasto & ieiuno adhærere sines. Vbi ademeris, aliud quoddam operimentum super accommodato, lanā scilicet latiorē. Cucurbitulis ad flatus digerēdos leuibus vtitor: ad dolores vero inflāmationesq; cū scarificatione. Porro adhibita curationi diligētia, nec sinapi obliuiscere, sed acribus smegmatis, & dropacibus super dorsum, ventrēq; vti cōuenit. Quibus vitiū inueterauerit præsentissimū est remediū etiā citato per veratrū albū vomitu purgatio. Vtus omnib' melācholicis cōferet probi succi, & mediocriter humectās. Vitāda sunt, caro bubula ceruina, lēticula brasiicę cochleg, vina crassa, & nigra: breuiter, q̄ atrā bilē generāt.

*Curatio insaniæ.*

INSANIENTES consimilē melācholicis curationem recipiunt. Propriam vero habent, vt caput ipsorum tum rofaceo tum oxyrhodino perfundatur. Itē ex antidoto picra purgabimus, verum sanguine prius misso: nec nō hīrudinibus in capite vtēmur. Vnice ipsos iuuat hippomarathri radix, semenq; eius ex aqua potum. Insuper Brioniæ radice drachma ex aqua quotidie assumpta. Sin autem delirantes purgantium medicamentorum potionem renuant, misceri debent ea nescientibus ipsis, cibis nempe buccellis vel ficibus pinguibus, vel palmulis, interdum vero potionibus adiicienda sunt. † Ante omnia vero aut in lecto vinciedī, ne & tibi, & iis quibus incidunt mali quippiam inferant: aut gestandi grabato intra lecticam quandam insaniētib' peculiarem γύραδον græci vocant, ex alto pensili.



† Plura leguntur in nostro codice. ita enim habet, πρὸ δὲ πᾶντων  
 παραδωσάτω ὑπὸ τινῶν παίδων, ἢ σκωδισμῶσιν &c. id est, ante  
 omnia contineantur à servis aliquot.

De incubone, qui ephialtes grece dicitur.

C A P. X V.

**E**phialten, qui latinis incubo est, aliqui à viro dictū affe-  
 runt, vel inde quòd hoc malo correpti ceu insipientem  
 aliquem se imaginentur. Themison autem decimo epistola  
 rum volumine à suffocando forte, Pnigalionem appellauit.  
 Constituitur id vitij ex crapula, & continua stomachi cru-  
 ditate. Comitatur eo detentos difficilis motus, torpidus in  
 somno sensus, suffocationis imaginatio, & veluti quodā su-  
 per incidente, oppressio, ita vt exclamare nequeant hoc de-  
 tenti, aut vocem edant nihil significantem. Nonnulli verò  
 etiam audire saepe eum qui super ipsos inciderit, ac venerem  
 exigere imaginantur, sed contractis eos digitis fugere. Cu-  
 ra itaque habenda est mali per initia. nam si diutius proro-  
 getur, continue per noctem incidens, magnum aliquē mor-  
 bum nunciat, vt apoplexiam, insaniam, & morbum comitia-  
 lem, cū in caput huius vitij causa ferri cœperit. Quæ enim  
 comitiales interdum, eadem ephialtici dormientes noctu pa-  
 tiuntur. Itaque commodum est sanguinis detractione &  
 purgationibus vniuersum agri corpus vacuare. Maxime his  
 opitulatur, nigri veratri drachma, cui scammonij oboli tres  
 sint adiecti. & nonnulla ex odoratis, anisum, daucum, petro-  
 selinum. Iam hiera diacolocynthidos, strenue auxiliatur:  
 est autem ea quæ ad Rufum authorem refertur. Victus por-  
 ro sit tenuis, nō qui inflationes pariat. Succurrit ipsis & pæ-  
 onix semen. Dandaque continue sunt potui ex aqua grana  
 eius nigra quindecim contrita.

De lycæone, vel lycanthropia.

C A P. X V I.

**Q**ui lycanthropia detinentur, noctu domo aggressi, lu-  
 pos in omnibus imitantur, & donec dies illucescat,  
 circa defunctorū monumēta plerunq; vagantur. Hæ con-  
 ites ipsoꝝ notæ sunt, facies pallida, oculi ad vidēdū imbecil-  
 les & sicci, lingua aridissima, nulla in ore salua, sitis immo-  
 dica, tibia quòd frequēter impingāt exulcerata, adeo vt sa-  
 nari nequeant. Tales quidā sunt notæ: speciē verò melācho-  
 liæ lycanthropiā esse existimare cōuenit, curandūq; in ac-  
 cessionis tempore, sanguinis ex vena ad animi vsq; defectū  
 det



detractione: item, cibus, probi succi, æger, & balneis dulcis aquæ sustinendus est. Deinde lactis sero per triduum vsus, etiam hiera diacolocynthidos, bis terve purgabitur. à purgationibus, Theriacem quoque ex viperis assumet, ac alia reliqua in melancholico affectu commemorata. Inuadent iam morbo, asperginibus somnum accersere conuenit, in id efficacibus. vbi somnus accesserit, nares opio illinantur.

*De amantibus.*

CAP. XVII.

**A**Mores cerebri affectibus annumerare cum sint quædam curæ, haud fuerit absurdum. Cura vero affectus est animi, ratiocinatione in motu laborioso occupata. Hæ sequaces amantium sunt notæ. Oculi concaui non illachrymant, sed tanquam, voluptate pleni apparent, continens palpebrarum motus, & cum reliquæ corporis partes non collabuntur soli hi amantibus concidunt. Pulsus ipsorum proprie nullus est, vt quidam opinati sunt verum, qualis eorum deprehenditur, qui crura conficiuntur. Cum vero id quod amatur in mentem ipsis vel auditu, vel visu, & præsertim repente venerit, tunc pulsuum animo turbato contingit immutari neque naturalem æqualitatem, neque ordinem retinere. Hos igitur & tristet, & vigiliis torfos nonnulli quæ dispositionem ignorarent, balnei abstinencia, solitudine & tenui victu consumpserunt, in quibus sapientiores cum amantem deprehendunt, ad balnea, comotationem, gestationem, ludos, fabulâsq; animum abducunt. nonnullis metum incutere conuenit. Nam qui amorî semper indulgent, iis difficulter abigi potest affectio. Quidam igitur obiurgandi sunt, pro ratione vitæ quam singuli delegerint. In vniuersum mens ad alias curas abducenda est.

*De apoplexia & hemiplagia, vel paralyfi.* CAP. XVIII.

**Q**Vando commune quidem neruorum principium affectum est, eoque omnes corporis particulæ motum simul & sensum amiserunt, apoplexia morbus appellatur ita vt pariter principis animæ functiones sint oblesæ. Sin autem in altera capitis parte obstructio fuerit oborta, hemiplagia & paralyfis nominatur. Si vero vnâ quandam particulam talis noxa occupauerit, illius affectio particulæ dicetur. Quippe Hippocrates memoriæ prodit, apoplecton hoc est resolutum ipsi crus euaserat. Seruatur itaq; in apoplectis modica quædam respiratio, quæ si permultum æ



naturali functione recesserit, maximam esse affectionem putabis. si paululum, exiguam. Deterrima verò est respiratio, cum intermittitur, vel etiam ubi magna cum violentia trahitur. Origo vitij est ex frigidiore pituita, quæ principalissimos cerebri ventriculos vniuersæ & subito repleat. Sin autem spinalis medullæ principium quandoque totum huic cõstitatur malo, omnes faciei subiectæ partes resoluuntur, ipsa manente incolumi, eo quod sensum motumque partes quæ ibidem habentur à cerebro excipiant. Si dimidia ipsius regio infestatur illarum partium resolutio quæ dicitur paraplagia cõstituitur. Si odoratus vitiatu fuerit, vel ad priores cerebri ventriculos intemperie expertos, vel ad meatu osiũ quæ à percolando ethmoide dicuntur, obstructos, talis referetur affectio. Itaque iacet apoplecti, voce intermorta, sensus motusque expertes, citra febrẽ. Præcedit hoc mali, capitis subitus, acutusque dolor, venarum circa guttur extantiũ, sphagitidas Græci vocant, toruli eleuantur, tenebræ oculis offunduntur: itemque splendores eisdem oboriuntur, & extremarum partium sine ratione algores, totius corporis palpitatio, difficilis motus, & dentium inter dormiendũ stridores, vrina veluti æruginea, atra, modica, & farinæ crassiori similia subsidencia quædam refert. Accidit autem hic affectus circa ætatẽ senilem temperaturis pituitosioribus, victuque tali vñs. At si iuuenes, & per æstatem infestet, magnam necessitatem fatetur.

*Curatio.*

APOPLEXIAE morbus, nequaquam, aut raro curatur, ut qui mortem minetur præcipitẽ. Si vero etiã discussa fuerit, plurimũ cum partis cuiusdam corporis resolutione discedit. Qui igitur quoquo modo curationem recipiunt, iis statim sanguis ex vena detrahendus est, & sicubi remissionẽ quandam habuerint, detrahẽre conuenit eadem die, aut sequenti, aluum autem acri clystere ex muria & melle cõtemperatis ducere. Dein oleo copiosiore sulfurato totũ corpus perungere, caputque chamæmelino, vel anethino oleo, in quo spõdiliũ decoctum sit vel calamintha: mulsaque instillatur, & ea quæ odore mouent, naribus admouentur, uti opopanax, vel sagapenum, & galbanum, vel castoreũ. Oportet autem & ori per vim aperto digitũ, vel pinnam oleo madefactã inserere, ut ea quæ ipsi inhærescunt, eiiciantur. Cæterum sedes etiam illis quæ flatus educunt, perungenda est: mulsa vel oxymel

po



potioni dabitur. Quinetiam apophlegmatismis ex thymo, vel origano cum aceto decoctis vtemur. Vbi morbus se remiserit, cibis mollis, distribui facilis & succulentus assumetur. Si vox nondum redit, & vires permittunt, cucurbitulæ occipitio cum scarificatione defiguntur. si fieri possit etiam præcordiis. deinde gestabuntur ægri curru, aut lectica, aut lecto pensili. assumi etiam debent crebrius quæ sternutamenta excitant, & apophlegmatismi. Vbi quatuordecim dies morbus excessit, ad reliquas gestationes ducetur. Cæterum sermonis etiam sollicitudo habenda est. vetus apomeli cum micis panis, vel alica dabitur: mox pauxillum ex hiera. Post vigesimum primum diem balneo ægroti credentur. † Vinum tenerum calente aqua temperatum potui exhibebitur: ac reliquo tempore vires balneis & vñctionibus reficiendæ sunt: degent autem ægri in locis si fieri potest, mari vicinis.

† Melius hic locus descriptus est in veteri *νεῖ δινον παλαιον δόσο υδρ πιαν*, id est vinum vetus &c. quāquam hæc admodū leuia sunt cū nemo tam stupidus sit qui *δινον* & *παλιν* nunquam dici non sentiat.

Curatio resolutionis, quæ paresis dicitur.

A T si principis animæ functionibus liberis, omnium particularum aut quarundam remissio acciderit, etiam hic qui molestat humor, qualiscunque ille fuerit, euacuari debet. Mox hiera, cui castorei quoq; pars sit adiecta, dabitur: per initia drachma semissis, cum tantillo mellis, & aqua calente soluta, vel per se, piperis quoque dimidio scrupuli addito. Quatuor deinde diebus interpositis integra drachma assumetur, dehinc vna & semissis, postea duæ, atq; tres. Rursus totidē diebus interpositis quatuor drachmæ, si ægri vires sustinent, offerentur, mellis adiecto cochleario. Particulis autem, medicamenta quædā discutientia, & ea quæ cutem possunt cruentare, imponuntur: addendo simul castoreum, aut piper, aut pyrethrū, aut cachry, aut euphorbiū. Prodest etiam eis oleum rutaceum, vel sycionium, vel vetus superfundere. Cibi conueniunt frumentacei, forbiles, vel alioqui ad concoctionem expediti: nec recrementicei. Cucurbitulæ remissis partibus agglutinantur, si multæ fuerint, distinctim, si pauca, vni: post cucurbitulas delinuntur medicamenta ex pice, vel rasina, vel manna. optime autem facit cum artemisia simul incocta calamintha, & cunyla, & ni-



trum ex aqua modica, quæ inter coquendum absumatur. Alius iterum subducatur ex aloe, vel polypodio, vel scammonia, vel ex pulve diacolocynthidos. vnctioni vero accommodata λιπάσματα græci à pinguitudine appellât; huiusmodi habentur vetus oleum, in quo scilla quadraginta diebus sub sole intabuierit. Si huius copia nō est, duas scillæ vncias in oleo coquito, illinitoq; vel cachry similiter præparatum, miscēdauero & ceræ vncia, ne illita diffluant. At si galbani, castorij, euphorbij, adarce, & nitri singulorum vnciâ semissem acceperit, multo erit medicacius. appositu etiam conuenit ranunculus herba incocta oleo, in quo per insolatum intabescat. Portiones erūt castorei circiter drachma: opopanax succus fabæ instar deglutitus. Mirifice facit etiâ sagapenon ad erui magnitudinē, ex mulla, & castoreū cum opopanace. item liquoris cyrenaici milij instar: Auxiliatur & antidotū ex triplici pipere, quod dyatriō pipereō dicitur græcis. Vtemur etiam acopis calefacientibus, & apophlegmatismis. Post diem quartūdecimū solidioribus vtī cibis expedit, & auxilio multum proficiente, in balneū deducere. A trigésimo dropacem adferre conuenit, & balineis committere: reliquo tempore sinapi cataplasmatibus modo obducere, in quibus & motus & sensus perit: attendentes ne ideo quod non sentiūt magis quā par est vrantur. In iis autē qui sensus compotes sunt, cutis ruborem dūtaxat oportet excitare post tumorem factum ad lauacrū mittere, & mollibus ceratis medicari. Vomitus à cœna conueniet, & is qui radiculis assumptis cietur: item gestationes, sella, aut lectica, aut vehiculo: postea ducentur ad balnea naturalia. Victus ficcior vtilis est, potio modica, & frictio. cibos igitur ficosos esse debent, sitim quantam possunt sustinentes.

*De ijs qui laxatione, aut distentione resoluti sunt.*

Q U O N I A M resolutæ partes vel cōuelluntur, vel laxantur: idque vel à repletionē, vel inanitionē, attendendum rursus est, partim etiam sanguinem detrahi debere, partim nō. Deinde in relaxatis quidem mēbris adstringentia, iis quæ laxant miscere, & frictiōē intensam moliri cōuenit. In contrariis, laxatibus dūtaxat vtendū, frictiōē simul molli adhibita: oleo in relaxatis nitri paulū & fæculę contritum adiciatur. fœtus erunt ex aqua vehemēter calida, & potissimū marina, in qua decoctæ sint lauri, vel viticis germina, vel  
fam



samsucus, vel aliquid huiusmodi. Si autem æstas fuerit etiã natationes in mari: rubores autem in cute excitati his maxime conferunt. Itaq; cedantur etiã particulæ ferulis, vel vrticæ ramis: Quod si perseveret resolutio, carnem, quæ intra articulos resoluta est, attractam ferris oportet candentibus exiguis tenuibusq; transmissis adurere. Contractis autem membris dropacem continue superiicere commodum est.

*De resolutione quæ unamquamque particulam obsedit.*

Quæ à nervi diuisione oritur particularum resolutio, insanabilis est: quæ vero ab intemperie, vel humore quodam contrahitur, cõmune quidem ex remediis commemoratis præsidium recipit. sunt autẽ peculiaria quædã singulis ipsorum dicata, quæ subiungemus. In iis igitur qui canũ more conuelluntur, æqualiter in oppositũ capistro appellato deduces. Profuerit etiam sanguinis detractio, ex vasis linguæ subiectis: item cucurbitulæ priori vertebræ defixæ, tum apophlegmatismi & per nariũ clysterem facta purgatio. Sciendum itaque est non eam maxillã quæ perversa esse apparet sed oppositã resolutione infestari. Gutturæ autem resolutæ, cucurbitulas mēto agglutinabis, perũgēsque medicamētis ex castoreo, sagapeno, & liquore partico. auxiliatur etiã gargarizatio ex acribus. Vbi lingua resoluta fuerit, venæ ipsius incidendæ sunt, cucurbitulæ mēto admouendæ & apophlegmatismis ex sinapi vtendum est, & linguæ exercitiis. Si vocis instrumenta resoluta sunt, thoraci præsidia adhibenda sunt, spiritus retentione, & vociferatu vtendum. In superciliis autem palpebrarum inũctiones similiter profunt, iana & futura proficit. Vesica vero resoluta siue vrina impediatur, siue præter voluntatem ex cernatur, inferiori ventris ab umbelico regioni, & ei quæ scrotũ & anũ intercedit medicamēta applicanda sunt: sedi autẽ immitēdum est oleum rutaceum, vel sycionium cum butyro, castoreo, galbano, vel opopanace, vel liquore silphii: vesicæ porrò hæc per colem transmissa valde profecerunt, vel sola etiam suffecerunt: ex centaureo autem, & colocynthide cū sycionio clysteres etiã intestinis vtilis sunt. Benefaciunt & medicamina vrina ciētia potui data, & castoreum consimiliter. In primis iis, quĩ nihil vrinæ reddũt, per rectos siphones, quos catheteras dicunt, in vesicam medicamina infundentur. Præterea laxantibus infidebunt, & eisdem cataplasmatibus forma oblinētur.

Qui



Qui præter voluntatem urinam excernunt, corroborantibus auxiliis astringendi sunt, cibis siccis, potione frigida ventur: ubi se recolligunt, summæ cutis ad ruborem usque exasperatione, & lauacris sponte prouenientibus frigidis ventur. Eos autem qui resolutionem experti sunt ob spinæ vulnus, aut casum, aut vertebræ luxationem, superuenientibus, quæ mortem fatentur, symptomatis, nulla medicina periculo subtrahit. Quod si coles resolutus fuerit, iis quæ in vesica dixi, utendum: in eisdem partibus & lumbis: item quæ intendendi vim habent, usurpabimus. non conuenit autem lac, caseus, & reliqua bellaria, lactucæ, aliæq; olera. Longanone vero soluto, in quo nonnunquam citra voluntatem stercus erumpit, nonnunquam cohibetur iisdem uti par est: interim hæc ab inferioribus partibus clystere demitti: aliàs astringentia, ut cupressi decoctum, lentisci, rubi: aliàs laxantia, ut adipem suillum, & anserinum, vitulinumque, & oleum: interdum rodentia, qualis est muria, vel cucurbitæ sylvestris, vel similium decoctum. Neque enim quicquam sic motum promouet, veluti varia agitatio. At si frigus prehenderit, etiam ex euphorbio acopon oleo dilutum per inferiora inditur. Artus autem resolutionem experti, cum communi curatione flectantur, perfricentur, extendanturque, in modum prædictum. Nam in frictione spei plurimum consistit.

*De resolutione ob colicum dolorem contracta.*

NOSTRA ætate colicus quidam dolor incruduit: ex quo præsertim superstites futuros consummata artuum motus priuatio comitabatur: tactus sensu, ut videbatur, incolumi seruato, ceu Critica quadam ex alto oborta transmutatione, unde motus plerisque spatio temporis sponte rediit. Qui vero difficiliore curatu exitere, etiam simplicioribus ex prædictis inunctionibus leuati sunt. præcipue autem efficacia sunt experti, acopon ex populo nigra confectum: item quod abiete constat. Sed quæ roborandi vim obtinent, ac modice refrigerant, multis præclare opitulata sunt.

*De conuulsionibus.*

CAP. XIX.

Postquam de resolutione tractauerimus, proximum est, ut de conuulsionibus agamus quoniam neruorum uterque affectus est: quare etiam de tremoribus dehinc dicetur. Cum igitur statim ab initio, vel non multo post morbi principia



incipia exorientes conuulsiones longius prorogantur, ex repletionem ducunt originem. Vbi verò sudores largos, aut vomitum, aut deiectione, aut sanguinis profluuium, aut vigilias, aut famem, aut motus, tum multos, tum vehementes subsequuntur, inanitioni feruntur acceptæ. Et cum ex sanis alicui repentina superuenit conuulsio, ob repletionem eam fieri necesse est. At si vniuersum corpus, neruūq; ex febribus perardentibus inaruerint, ac deinde ob siccitatem conuellantur, maximum sanè hoc malum est, & propemodum insanabile. Primum itaque partes quæ contrahuntur, valenter vinciendæ sunt, & inordinatis resistendum motibus, oleo perfricare oportet rutaceo, aut sycionio, aut veteri, aut quodam ex hoc genere: tum aquam mulsam potui præbere. Eos autem qui ex inanitione conuelluntur, oleo, vel hydrelæo calido fouere competit, si nihil prohibet etiam ad lauarum deducere, temperatōq; solio vti, cum oleo & frictione lenissima. Nutriendi sunt sorbitionibus ex chondro & alica, vinoq; tenui & quod facillè distribui possit, aquoso, nisi febris adfuerit: tunc enim ptisanæ cremor utilis erit, somnumq; accersemus. Iam verò ex plenitudine, aut inflammatione, contractas conuulsiones curabis, si copiam euacues, inflammationem verò propriis ipsi præfidiis discutias. fit etiam conuulsio, cum vomentes vehementius turbantur. Succurrit autem conuulsis acanthij radix, spinæ albæ, & ægyptiæ semen epotum, nonnulli centaurei tenuis succum potui exhibent, cum repletio conuulsionem parit. Atqui nō modo potui dato castoreum, sed etiam à foris cuti vnā cum sycionio illinito. Si vero malum hoc modo non finiatur, cucurbitulas cum scarificatione ad mouere prodest: si crura contrahantur, coxis, & postremæ vertebræ: si manus conuellantur, etiam dorso, & primæ ipsius vertebræ, tum ei quæ humeros superiacet. In vniuersum corpore ab affectu immuni, si labrum, aut palpebra, aut lingua contrahatur, graue symptoma existimandum est, quod maxima inuehat pericula, licet exiguæ partes affectæ videantur. In his itaque sanguinis ex occipitio, & primis vertebris detractio rectè adhibebitur.

*De tetano eiusq; differentijs.*

C A P. X X.

**T**Etanus, cum & ipse conuulsio quædam sit, procreatur musculis corporis, & præsertim spinæ, à frigido humo-

re



re intus & foris infixo ceu congelatis : ideoq; hoc malo occupati, flectere sese nequeunt. Verū cum particulæ corporis in anteriora tenduntur, affectus nominatur emprosthotonos: cum in posteriora, opisthotonos: cum in alterutram partem aequali robore intenduntur, tetanus appellatur. Pelops hæc vitia tensionem vocat, & contensionem musculorum cervicis, neruorumq; per quos caput inclinat, renuit & circumuoluitur. At si circa posteriores cervicis musculos malum consistat, opisthotonos ex accidente: si circa priores, emprosthotonos: si vtrunque, tetanus nuncupatur. Causam tribuit musculis repletis spiritu, & aëre crasso, nebulofoq;: quem impensè frigidum, & concretum, eoq; ad motum contumacem affirmat, vnde etiam sicca potius quàm humida fomenta malo prehensis conuenire. Hæ quidem tetani differentia sunt. Curatio autem in his cum communis quædam sit, non euariat. Optimum itaque præsidium ipsis est febris, quæ per initia non fuerit, superueniens. Notæ horum sunt, angusta respiratio, pulsus rarus & exiguus, nonnunquam & risus ipsis sardonius oboritur, rubet facies, oculi magis intumescunt, adhæc aut non urinam reddunt, aut aquæ similem, aut cruentam, cum bullis quibusdam: item aluius siccescit, vigiliæ magis vrgent, crebroq; à conuulsionibus periculum est, ne lecto agri excidant, qui etiam singultire incipiunt: indolentq; alij capite, alij clauiculis, & lumbis, quidam ipsorum subtremit quoque euadunt. Porro facit affectum (quamuis raro) lassitudo, humi dormitio, ponderis eleuatio, casus, vulnus, ardor, ictus, & alia quæ eandem neruis offensam inferre possunt. Curatur, quo modo conuulsionibus ob inanitionem generatæ, solent.

*Curatio tetanorum.*

QUI BVs ceruix recta intenditur, initio sanguis detrahendus est, partes lanis oleo madidis sycionio, castoreoque, cum veteri contegendæ, aut vesicam quoque latam calido oleo repletam, tendinibus superimponere oportet, & cucurbitulas admouere, cum lancinatu. leues enim noxam quoque inferant, item ceruicibus nonnunquam cucurbitulæ defiguntur, & vtrique spinæ parti, adhæc pectori, quæ est musculosius, & præcordiis: interim vesicæ regioni, & renū. Porro liberaliter sanguinem auferre conuenit, modo non vniuersim id fiat, sed particulatim & per vices. Sudores lanis  
oleo



oleo madentibus abstergere, ne imprudentes refrigescant. Quod si tetanus in vetustatem inciderit, in oleum bis quotidie descendere confert, nō tamen diutius immorari: quippe in oleum descensus, maximē vires conuellit. Potus erit hydromeli spissius ad dimidias decoctum. Qui robusti sunt, panacis liquoris drachmam bibent: sin minus, tres obolos, vel minimum, obolum. At si quis ipsum ceu stomacho inimicum habeat suspectum, ammoniacum quoque exhibeatur, vel liquoris cyrenaici instar erui discocto melli circumlitum deuoretur, & laserpicij radices duo cochlearia, tribus mulsæ cyathis inspersa, vel ipsius decoctum exhibentur, vel myrrhæ drachma ex mulsâ, hyssopiq; decocto: sed omnium securissimum expeditissimūque est duo, triū castorei cochlearia, partita ipsius quantitate, & per vices data. Non enim offendet etiam si secundum cibum ex eo quid exhibeas. Potus vero ipse præter alia tum paulatim, tum modicē assumetur. Nam dum ægre potionem transmittunt, in nares ipsam propellunt, vnde vehementer turbati, ad conuulsionem prouocantur. Sedes oleo rutaceo cum opopanace perungi debet, quod ab inferioribus quoque partibus iniicietur. frigida superfusionem, cum sit (quemadmodum ait Hippocrates) maximē temeraria, † eoq; posteris, credo, vituperata, & nos damnamus, deuitamūsq;e. Vnguentum hoc conuenit, nardi sextarius, ceræ vnciæ duæ, folij, amomi, styracis, mastiches singulorum vncia: castorei, adarcæ, euphorbij, piperis singulorum vncia: spicæ nardi, opobalsami, singulorum tantundem.

† Hæc ita scripta sunt in veteri codi. πλω ἢ το ψυχρὸ κατὰ χυσι, ὡς ἰπποκράτης φησὶν το μνηστὰ πλω ὄσων καὶ διὰ τοτο τοῖς μεταγενέστεροις οἶμαι, παραλεφθεῖσαν, frigida autem affusionem (quemadmodum Hippocrates ait) quum maximē temeraria sit, & ob id à posteris prætermissa vitamus.

*Potio opisthotonicis accommoda.*

PANACIS radices, piperis albi, costi, myrrhæ, papaueris lachrymæ, singulorum pares portiones, exhibentur cicerulæ modo somnum capturis: benefacit etiam orthopnœicis. Porro victus erit tenuis, qui expedite distribuatur, & recrementis omnino vacet.

De



## De tremoribus.

**T**remoris origo in vniuersum quidem ex neruorum imbecillitate est, quod ætas senilis palam testatur: priuatim vero plures causæ ipsum efficiunt: nempe frigida intemperies, frigida potio, & præsertim in febribus intempestiue assumpta: frigidi, glutinosi; humoris redundantia, & vini vsus liberalior. Qui igitur ex erroribus commissis manifesto tremunt, à noxiis abstineant. At si perseverat etiam diu in febribus tremor, primum corpus totum oleo sabino perfundatur: vbi autem accessiones remittunt, veteri, aut fycionio: summa vero corporis membra lanis mollibus prius tamen præuncta contegantur. Deinde cucurbitulæ à priori vertebra vsque ad spinam, lumbosque agglutinentur, sic ut particulæ prius cum præcordiis cruda hordei farina *ωμηνύσιον* Græci vocant, delinantur. Iam hæ quoque partes lanis ex veteri, aut fycionio oleo respersis operiatur. Quod si febres inueterauerint, die vno interposito in oleum, aut hydrelæum tremuli descendant, vtanturque frictionibus mollibus. Si longius prorogatur dispositio frigoris suspicionem, mulsa, castoreum; potui dabitur, & calidis locis gestari debent. Cibus diductu facilis offeretur, primum sorbilis, mox volatiliū, & piscium, qui molli carne sunt præditi: febribus solutis lauandum est, sed vitari debet frigidum solium, vini; potio. Porro si crassorum, viscosorum; succorum copia fuerit, vti conuenit iis quæ incidunt, extenuant; verbi gratia, rutæ ramusculo, spondylii, quantum tribus digitis comprehendi possit, castorei, & nitri singulorum obolis duobus: Datur quotidie cochleare vnum cum oxymelite ad tres vsque dies ieiuno, vel panacis, & piperis grana quinque ex mulsa cyatho. Simplicia præsumpta tremantes adiuuant, castoreum, leporis cerebrum comestum, althææ radicis decoctum, damassoni foliorum drachmæ quatuor in mulsa, eupatorium ex aqua. Superante autem frigore etiam zosymi vngue, item acopis ad resolutionem conscriptis, vnctionibus; & cutis ad ruborem vsque exasperatione, phænigmon Græci vocant, vtemur: præterea exercitiis, perfractionibus; iis vero qui ex vini potu tremunt, vinum circuncidendum est, quoad in totum morbo fuerint liberati.

Ocula



**C**VM in oculis vehementiores oboriuntur dolores, considerato, quam ex affectione corporis dolere ipsis in inflammationibus accidat. Vel enim, dum ab influentium acrimonia vehementius eroduntur, vel quia tunicae succis repletæ tenduntur, vel quod crassis succis, aut spiritibus flatulentis quodammodo intenduntur, graues in ipsis dolores oboriuntur. Rosiones igitur purgantibus curare præfidiis, noxium humorem vacuando par est. item candido oui liquore in oculos infuso. Vbi vero cõcocta iam fuerit inflammatio, corpusque superfluis vacuũ balnea ipsis aptissima sunt.

Ex repletionem autem contractas inflammationes sanguinis detractio, alui ductione, & partium inferiorum frictione persanare conuenit. Intensiones autem, toto prius corpore vacuato: item humoribus qui sursum tendunt, ad inferiora reuulsis, deinde loco iniectis remediis, quæ discutiendi facultatem habeant, fomenta itaque adhibenda ipsis sunt, & fœnugræci decoctum infundendum. In quibus autem sanguis crassus oculorum venulas intendit, sic tamẽ vt corpus totum plethoricam affectionem non præ se ferat, vini vsus est, quod possit excalfacere, vacuare, & meatus aperire.

*De perturbatione, & lippitudine quam proprie ophthalmiam graeci vocant.*

**P**ERTVRBATIO humiditas oculi est, & calor cum rubore naturæ alieno, nõ ex corpore, sed ab externa causa aliqua proueniens, vt à sole, fumo, puluere, oleo: quare etiam occasione ipsius separata, promptissime soluitur. In genere huius perturbationis, lippitudo est: verum non extrinsecus tantum, sed ex interiore etiam causa cæca ingruit, perque tres quatuorve, aut quinque dies plerumque durat. facillime discutitur, si obseruentur omnia quæ foris accedentia turbare lumen possint, item parciore cibo, aquæ potu, aut inambulatione, & aluo ex facili respondente.

*De inflammatione.*

**C**VM inflammatio ipsos oculos occupauerit, post totius corporis vacationem, perungendi sunt iisque imperus humorum possunt repellere, & irritationem lenire, quale est, quod ad Neilum authorem refertur, diarodon, vel etiã Me-



diacum, Nardinumq; Vbi membrana adnata inflammatio-  
ne tentatur, medicamentis utemur, quæ græci ab vno die mo-  
nemera vocant, cum oui candido infusis. Die insecuto nisi  
inflammatio crescat, nardino delinentur: fotu ex meliloti de-  
cocto vti cōuenit. vbi verò crassus humor est, qui lippitudi-  
nē facit, medicamenta accommodantur, quæ neq; infarciendi  
vim habent, emplastica græci vocant, neq; humores increas-  
cent, sed quæ diffundere, humectare, & excernere idonea  
sunt, quale est Chiacū. At si humores in capite fuerint impa-  
cti, cucurbitulā occipiti admoovere oportet, vel scarificare,  
vel hyruidines fronti qua oculus dolet, adhibere, panēque  
purum aqua maceratum cum modico rosaceo, aut polentis  
incoctis capitum papaueris decocto, similiter cum rosaceo,  
superdare. efficacior autem utendum est cataplasmate, ex  
croco, melilotis, palmularū carnibus, teneris coriandri fo-  
liis ouorū luteis tostis micis panis in sapam intinctis, rosa-  
cei momento, & papaueris capitum contritorū decocto. In-  
terdū semen quoq; ipsius ad leniendum dolorē miscetur. Si  
magna doloris necessitas est, etiā opij paxillum adiicitur:  
vbi dolor abest, stupefacientia græci *καρποτμή* appellant vi-  
tari debent. Quod si mediocris inflammatio infestet, aloen per  
se, vel aqua vel oui albo dissolutā illinito. vt autē expeditius  
sit auxilium, croci drachmas sex, aloē drachmas sedecim,  
gummi drachmas nouē coniecta in vnā aqua pluuiali exci-  
pito, fingitoq; collyria. † Iam quæ vocantur diacrocū lippi-  
tudinum initiis sunt idonea: in quibus verò tumor œdema-  
todes hoc est mollis cedensq; & exalbidus habetur: tum cir-  
ca palpebras, tum membranā adnatā sine tunicarum  
offensa, benefaciunt etiā liquida collyria (Græci hygrocōl-  
lyria vocant) & ex croco, & atramento sutorio & melle  
preparata. hoc autem est laudatissimum.

† Aliter hæc leguntur in antiquo exemplari, *ὅτι τὰ διακροκὰ ἢ προ-  
σαγορεύονται πρὸς τὰ κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν εἶναι ἐπιτίμια*, id est, quæ dia-  
croca appellantur oculorum conturbationibus sunt accommodata.

Liquidum collyrium quod dolorem leuet ano-  
dynon appellatum.

CRETAE sutoriæ, mellis attici, succi fœni græci singulo-  
rum pares portiones incoquito, donec mellis spissitudinem  
habeant. deinde specillo duos angulos attingito.

Ad



*Ad defluxionis impetum, qui epiphora græcis dicitur.*

Ad fluxionum impetus, per initia quidē conuenit inedia, aquæ potus, & multo magis veneris abſtinentia: Aluus ſub-  
duci, facies poſca aquoſa collui debet. præſertim ſi feruens  
fuerit fluxio. ſin minus, atramento ſutorio cum melle frons  
& palpebræ delinantur. Nonnulli atramentum ſutoriū aqua  
diſſolutum ad collutionem exhibent. Porro qui defluxu ci-  
tra inflammationē vexantur, vel etiam cum inflammatione  
quidē, ſed ita vt ſupra os caluariæ affectus conſiſtat, agglu-  
tinamentis vtendū eſt in fronte: ſimplicibus ſanē, viridibus  
vitis ſoliis, vel rubi ſucco, vel portulacæ, vel cotoniorū cum  
polenta tenui, vel galla leui cum vino, & polentæ polline,  
vel cicuta, vel pſyllio cū aqua, vel ſolano, vel cochleis cū te-  
ſtis ſuis in puluerem redactis, à tempore ad alterum tempus  
illitis: In vniuerſum iis quæ aſtringunt, refrigerantq; . Cōpo-  
ſitis autem his: pollen frumentaceus, & myrrha, vel thus cū  
oui aquato illinatur, vel ſamia terra cum myrrha, & manna  
ſimiliter vt oui albor inungetur. In frigidioribus autē hu-  
morū curſibus ſulphuris viui, bituminis, picis, colophonie ſin-  
gulorum drachmæ duæ: item Muſæ paſtillus, & Aſter, ſimi-  
liaq; probe repellunt. Iam verò Theriace vino aſtringente  
diſſoluta, fronti quæ illita frigidos humorum influxus ſiſtit.  
quinetiam eadem pota vehementer his ſuccurrit. Ipſi verò  
oculo, lana, aut panniculus tenuis, oui albo madens imponi-  
tur, item caſeus recens ſimiliter oculo applicatus, acres ma-  
xime influxus cohibet. tum collyria à reprimēdo diſta ſtal-  
tica, ſi illinantur, inſtillanturq; ex oui aquato idē efficiunt.  
At ſi in imo, & ſub oſſe hæreſcens humor longiore ſpatio  
duret poſt generales corporis vacuationes, medicamentorū  
uſus eſt quæ per nares atque os pituitam eliciunt, errhina &  
apophlegmatifmos appellant: caput radetur, & rubor in cu-  
tæ excitabitur. Porro in his etiam curandi rationes, quas in  
capite manu adminiſtramus aſſumunt, nempe Angiologiā,  
arteriotomiam, hypopſatiſmum, & periclyſiſmū, vti græci  
appellant: & in vertice uſq; ad os aduſionem. Iam cucurbi-  
tulæ occipitio incifa cure admotæ, impetum ſuoris poſſunt  
reuellere. Fluxiones extra caluariā notant, vaſa in fronte &  
tēporibus diſtēta, & capitis veluti vinculū, tum quod ex ag-  
glutimentis ſicca præſidio ſunt. Si hæc deſint, & ſuoris im-  
petus prorogetur, & ſternutamenta nonnunquam moleſte



elidantur, humorem sub caluaria teneri, censendum est,

*De chemosi.*

CHEMOSIN appellant, cum utræq; palpebræ ex vehemēti inflammatione inuersæ fuerint, ut vix oculi ab ipsis cōtegantur, & albū oculi nigro sublimius euaserit, rubrūque etiā magna ex parte nigrum occupet. Curatur venæ sectione, medicamine purgāte, collyrio diarodō albo, & quod à cinereo colore vocatur *σποδιανόν*, cum lacte, vel oui aquato. Eodem verò palpebras, tempora & frontē illinere oportet, tum fomentis & cataplasmatibus lenibus uti. cū autem remittit inflammatio, acrioribus, quale est etiā viride diarodon.

*De hyposphagmatis, & emphysematis.*

HYPOSPHAGMA venarum adnatæ membranæ rupturā dicitur, ex ictu potissimum eueniens. Instillatur itaq; ipsis sanguis palumbi, vel colūbæ, vel calido lacte muliebri thuris paululum conterens, vel muria, & præsertim ex sale capadocico: foris utitur ex hyssopi decocto. Porro tumor mollis, œdema vocant, oculis ex ictu obortus, fomentis ex posca continuis, & spongia ex eadem superdata discutitur. Recte huic specularium combustum, & sterqus colūbæ æquis portionibus, vino aut aceto contrita illinunt. Iam caseus recens vel raphani cortex, vel vua passa sine acinis, singulatim ex posca, vel mulla applicantur. Eadē faciūt ad Emphysemata.

*Ad emphysemata pruriginosa, & psorophthalmias.*

EMPHYSEMA palpebræ tumor est, œdemati similis: psorophthalmia autem pruriginosa eiusdē scabies, ex salso & nitroso humore contracta. Conuenit ipsos fouere, posca, lenticulæ decocto & rosarum. Hygrocollyrium autem hoc, aris drachmæ sex, misyos tostī, myrrhæ singulorū drachmæ tres crocci drachma vna semis piperis drachma vini Chij & passi cretici singulorū cyathus vnus, & dimidiū: incoquantur quoad mellis spissitudinem habuerint. Hec est Erasistrati compositio, quæ panchrysos vocatur: facit etiam ad anginam, vlcera oris, pudendorūque, & aurium dolores. Inungant & oleo palpebras, somnum inituri. Ab acidis, salis, & acribus abstineant.

*De sclerophthalmia, & xerophthalmia.*

SCLEROPHTHALMIA, durities oculi, & difficilis motus est cum labore, ruboreque citra humiditatem. fouere igitur ipsos crebro, spongiis aqua calida imbutis ex usu est,



est. Item ouum palpebris in lecto imponitur, cum rosaceo: vel adeps anserinus. Frigida & quæ indurant vitanda: caput velandum, vngendūque, aluus ducenda. Xerophthalmia, quasi dicas arida lippitudo, pruriginosa oculorum est sine fluore dispositio. Curatur balneis, inunctionibus, & victu probi succi: vtrisque verò communiter conueniunt medicamenta acria, vt vel lachrymas prouocent, per quæ & durities emollietur, & siccitas humectabitur. Talis est Erasistra ti quoque panchryfos, & quod dicitur Dicenteton. item cui nomen est Stratiotico.

*De ectropijs.*

HI C affectus palpebræ inuersio est, aut propter cicatricem, aut excrescentiam carnis nascens. In quibus igitur excrescentia inueterauerit, æruginem rasam torrefactam cōterito & admoueto, † vel plumbo vsto cum sulfure viuo, & loto vtitor, vel vtrisque paribus & ærugine & plumbo. Nam ex cicatrice proficiscens Ectropion, si in totum curare studueris, id manu faciendum est.

† Verior lectio est in antiq. ἢ μολύβδω νεκρῷ μέλιτι χρω μετὰ θύρις ἀπὸ πύρις ἡγεῖ πικρῶς, id est, plumbo vsto vtere, cum sulphure ignem non experto & pipere.

*De ægilope, & anchilopē.*

ÆG I L O P S abscessus est, qui inter maiore oculi angulum, & nares fit: qui ruptus, si negligatur, vsq; ad os in fistulam dehiscit. priusquàm verò abscessus in vlcus erūpat, Anchilops vocatur. probe igitur faciunt glaucium & crocus vna cum perditij herbæ succo imposita. crebro autem variare oportet, & neque in vomicæ eruptionem degenerabit. A L I V D. Halica cocta in aceto & probe trita, non solum incipientes, sed etiam in vomicam mutatos persanat, rumpitq; & vsque ad os penetrat. Hoc vsus non solum ægilopas, sed etiam anchilopas curabit. A L I V D. Ruta satiuā vna cum lixiuio, quod ex cinere & calce confectum est, contrita, cocta q; & imposita pulchre admodum ægilopas emendat, & adusque os permeat, initio erodens, postea non ita: ac mirum est, quòd ne cicatricem quidē indecoram hoc præsidium relinquat. A L I V D. Cochleas cum testis suis tritas imponito. interdum aloë, vel myrrha admista. Præsidium hoc antequā ægilops in pus degenerauerit, & postea cum ruptus fuerit abscessus, eum desiccet. A L I V D. Cum manus opera ægilo-



pa & anchilopa aduris, hoc vtere cataplasmate, lēticulas decoquito, & cum melle vtitor, vbi crusta exciderit, vnam passam excipiēs liquida terebinthina, vtitor in modum emplastri. Hoc enim & purgat, & carne replet, & cicatricē inducit

*De trachomate.*

TRACHOMA internæ palpebrarum regionis asperitudo est: harum intēsiō, vt veluti incisuras habeat, *σύνωρις* à fici similitudine græcis appellatur. Cum inueterauerit vitiū, callosque contraxerit, tylosis vocatur. Collyriis igitur vten dum est tum eo quod ex vino, tum quod ex duobus constat lapidibus, ipsoque hæmatite lapide, ex aqua loto subiectis palpebræ abstergentur: Hermatioque cum Cygnarij modico. Adhæc diacroci collyrium pariter pforophthalmiis citra exulcerationem efficax est palpebræ inuersæ illicum. At si durior callus, his non cesserit remediis, palpebra inuersa pumice raditur, aut sepiæ testa, aut foliis fici, aut etiam instrumento, quod à palpebrarum rasura blepharoxiston græci appellant.

*De chalazys.*

CHALAZION, otiosi humoris in palpebra colluies est in qua ammoniacum aceto detritum simul cū galbano inungitur. facit etiam terebinthina pariter cum cerato excepta.

*De crithæ tuberculo.*

CRITHÆ, paruulum abscessus tuberculum, oblongum, palpebræ cilio obueniens. Id cera alba foueri oportet: muscæ capite abiecto reliquo corpore infricari, vel hordei diluto perfundi.

*Ad palpebrarum pediculos.*

EXPURGATIS prius pediculis, marina tepida palpebras colluere oportet. Deinde medicamento subscripto cilium attingere: aluminis scissi partibus duabus, herbæ pediculariæ parte vna, tritis vtitor.

*De madarosi, vel milphosi.*

HIC affectus palpebræ pilorum defluuium est. Ad quod cura prius vniuersi corporis habita, smegmatis vtere, quibus ab honestandis palpebris nomē est calliblephara. Terræ amplitidis, croci gallicæ, ladani, singulorum pari portione contrita vtitor. ALI V D. Stimeos tosti lotique drachma, plumbi combusti & eloti drachmis quatuor, croci totidem nardi indicæ drachmis tribus, in puluerem redactis vtitor.

ALI



**ALIVD.** Palmarum ossium combustorum tribus drachmis, nardi gallicæ drachmis duabus: leuigatis vttere. hoc etiam scabiosis oculis medetur. **ALIVD.** Neapolitæ ad palpebrarum defluuia, *μυλφώσος* appellant, longosque palpebrarum affectus. Stimmeos, cadmiæ, chalcitidis, misyos xenici singulorum pares portiones. crassiuscule contundito, & melle respersa torreto: leuigatis vtitor.

*De pilloso.*

**PILLOSI**, palpebrarum crassities est, callosa, rubicunda quibus accidit sæpe pilorum etiam defluuium. Præter prædicta igitur etiam hoc summe facit, Muscerdæ combustæ, & melle contritæ, inunguntur.

*Ad superciliorum defluuia quæ madarosis dicitur.*

**PLVMBVM** digitis oleo, vel adipe anserino vnctis detritum illinitur. **ALIVD.** Hoc etiam subnigros reddit: nuces auellanæ exustæ simul cum adipe caprillo, vel vrsino infriantur. **ALIVD.** Hoc efficax est etiam barbæ alopecii. Alterci drachmæ duæ, muscerdæ drachma, polytrichi drachma irini vnguenti cochlearia quatuor. Tritis perbelle vnguentum admiscetur. fotuque prius adhibito illinitur. quod, si rasa pars ante fuerit, magis proficit.

*De palpebrarum pilis oculum irritantibus τριχίασι appellant.*

**PILIS** qui oculum pungunt prius euulsis, locus statim sanguine ranæ per se inungitur, vel cum cinere chamæleonis albi, vel sanguis cimum, vel fumariæ quæ in hordeo nascitur succus, cum gummi, vel tellinarum falsarum cinis cum cedria, vel loti cinis, vel alumen liquidum quod phorimon appellant, vel muscæ caninæ sanguis admodum in id efficax est.

*Pilorum glutinans medicamentum.*

**CONGLUTINANT** pilos infractos bitumen, massiche, colophonia, gummi, cochleæ par glutinosa.

*De encanthide & rhyade.*

**ENCANTHIS** naturalis in maiore angulo carūculæ ex-crescentia est. Rhyas autē huius imminutio. Enanthidas igitur iis quæ aduersus ectropia dicta sunt, similibusque vrēdi vel exedendi facultate præditis, hæc *ονκισιν* illa *νωσιν* græci nominant, absumes. sed non totas, ne eius loco Rhyas subnascatur, verū ad naturalē vsque magnitudinē. Rhyadas, cariosa parte in totū, vel rudi manus opera, vel medicamentis



absumpta, insanabiles existimato. Quòd si pars ipsarū imminuta fuerit, iis quæ mediocriter astringūt, carnemq; creantibus reficitur: qualia sunt medicamēta ex croco, glaucio & aloe confecta. item collyria diacrocu inscripta, necnō altercum prodest in vino coctum, impositumque, & aluminis ex vino pauxillon.

*De vlceribus.*

VLCERVUM in oculis genus quidem vnum est, differentia vero speciales diuersæ. etenim in cornea mēbrana quæ græcis ceratoides appellatur, vlcus cauum, angustum, & purum, à fossula botryon græcis dicitur. quod autem latius botryo est, sed minus altum, caloma nūcupatur. Argemoni in pupillæ circulo nascens, ambientia cōprehendit, vt etiam in exteriorē pupillæ parte rubicundum, in interiorē candidum appareat. Epicauma vlcus est sordidum, & crusta obductum, quo repurgato humores oculi sæpe effluunt. Iam vero aliæ plures vlcum sunt differentia, de quibus dicemus communius. Si igitur vlcus simul cum inflammatione obortum fuerit, curationem ex iis quæ inflammationē lenire possunt, & cōcoquere, moliemur, nō neglectis iis quæ ad vlcus proprie pertinent. Talia verò sunt collyria, libanium. cygnus, & pelaria vocata, item aster & similia: insuper quæ ex amylo, terra samia quæ ἀστυγ dicitur & cerusa constant: omnibus autem magis leniendo dolori esse ilamonem nouimus, verum diu ei insistendum nō est, eo quod admodum stupefaciat. Laudatissimum verò & quod diazematōn à decoctione dicitur, vt quod stupefaciendi vim non habeat. At si cum fluxione vlcus infestari, collyriom aliquod illi admiscebimus, quale est diahydraz, & Chiacum, præterea Cygnus fuluus & quæ repellendi sine rosione facultatem obtinent. Sin autem vlcera sordida fuerint, mulsæ mediocriter aquata, & fœnugræci decocto vtemur per se, & cum aliis ad id dicatis collyriis. † Si acriora sint albis, feberiano & fœnugræci diluto: si nō acria, diasmirnes, & nardinis. Purgata verò vlcera medicamentum Cleo probe potest cicatrice obducere, eamque præterea concolorem reddere.

† Exemplar græcum typis expressum ita habet *ἀστυγίον τὸ ἰσχυρόν, ἰδὲ ἐστὶν, ἰφ' ἀκρίοις τὰ ἔλκεα &c.*

*De oculi procidentia quæ πρὸς τὸν οὐρανόν dicitur.*

PROPOSITIS tuniculæ quæ græcis ab vix acino πᾶσι δὲ λέγεται dicit



dicitur, procidentia est, quæ erosa ruptæve cornea tunica accidit. Ea cum nondum creuit quod muscæ capiti similis sit, myocephalon nominatur. Cum vero amplius & eo usque succreuerit, ut acinum vix repræsentet, staphiloma, quasi vuatio dicitur: ubi plurima facta est accessio, ut palpebras transfiliat, melon, hoc est malum. Si vero obcalluerit, elos, id est clauus tunc dicitur. Si igitur ad myocephalon fere oculi procidentia degenerauerit, repellentibus constringentibusque ipsum medicinis utendum est: Chio nimirum, Phæo, Nardino, & Theodorio. item eo quod dia thallias, & quod diaceratos vocatur. iam vero spongiam leniter ipsis posca, aut vino adstringente, aut rosarum decocto imbutam, super dare commodum est, aut splenium. Principatum vero obtinet ad procidentias omniaque vlcera, medicamentum cui nomen est Olympiacum, vel Olympus, cum succo oliuæ, vel polygonij, vel polij. Eadem hæc etiam clavis conueniunt & staphilomatis, priusquam inalbescant. Vbi vero alborem aut callum contraxerint, nullus remediis locus est.

*De oculis pululentis.*

ALIQUANDO membrana à cornu dicta ceratoides, purulenta efficitur, nunc altius nunc in superficie, ita ut pus habeat unguis figuram, quæ causa est ut hoc etiam malum unguis oculi nominetur. Huc ergo spectat curationis ratio ut vel pus discutiatur, medicamentis mediocriter in id efficacibus quale est aqua mulsa, & fœnugræci succus, ex eoque collyria, similiter libani, & quæ ex thure cōfiunt, dia libanu inscripta: vel rûpatur vomica, & vehemētioribus repurgetur, quod genus sunt diasmirnes, & hygidion. At si pus in oculis citra exulcerationem coierit, etiam hoc liquido collyrio utendum est. Atramenti sutorij, croci singulorum drachmis octo, myrrhæ drachmis quatuor, mellis libra. Cæterum phlyctæna cum sit ceratoidis membranæ excrescentia, ex humore quodam tunicas ipsius excoriante, purulentorum curationi subiicitur. Hygra, hoc est liquidum medicamentum ad suppurantes oculos quos hypopios vocant: Bassi croci, aloes, myrrhæ singulæ uncia, vini quadrans, mellis optimi selibra. Crocus ex vino modico teritur, deinde alo & myrrha. Vbi crassitudinem acceperint, mel additur. Vnita in vitreo vase reponuntur: uti licet bis quotidie, aut



si necessitas urgeat, ter. Quando quidem oculum simul purgat, & carnem, cicatricemque inducit.

*De cicatricibus & albuginibus.*

QVAE per summa oculorum cicatrices fiunt, aliqui hoc nomine solo cicatrices dicunt, alij verò nubeculas. Altius autem delitescentes, albugines, medicamentis absterforiis, extergentibusque discutiuntur. Nebulas igitur anemonæ succus abstergit, & minoris centaurij succus cum melle. Verustiores autem cedria extenuat: & æs solum aqua tritum modo collyrij, ad hæc quæ detergent collyria: quale est quod cornu ceruino cõstat, dia ceratos elaphiu dictum: item Rhinarium, Hecatombæ similiaq;. Albugines vero nitrum cum oleo veteri detritum diligenter, & inunctum probe, extergit. Item sepia testa combusta, cum melle leuigata. Inter collyria hoc bene, & leniter abstergit. Collyrium. Mamiaræ, guttæ ammoniaci, myrrhæ troglodytidis, crocodilorum fimi, singulorum æqualia pondera. in collyrium coactis vtitor, vel crocodili terrestris fimum ex aqua leuigatum illinito, in collyria redigens. Recte autem sal cappadocum aqua soluitur, quo collyria albuginibus exterendis dicata dissoluens instillabis.

*Quomodo cicatrices tingantur.*

GALLAE, acaciæ, singulorū drachmæ quatuor, atramentū sutorij drachmæ duæ illinentur. Collyriū autē hoc proficit, floris mali punici, cytinorū, atramentū sutorij, acaciæ, gummi, singulorū drachmæ quatuor, stimmos, gallæ, singulorū drachmæ duæ. Aqua teruntur: si flos mali granati delidetur, interius mēbranofum quod grana intercedit, misceto.

*De vngui oculorum, quod pterygion græcis vocatur.*

VNGUIS quod pterygion græci vocant, neruosa membrana adnatæ excrescētia est, quæ ab angulo quidē oritur, sed adusq; oculi coronā peruenit, vbi verò supramodū fuerit adaucta, pupillā obtegit. Magni igitur & inueterati vngues solam manum expostulant. Recentiores vero & magnitudine mediocres, præsiidiis eliduntur abstergentibus, qualia aspretudini idonea sunt, & albuginibus. inter simplicia igitur æs combustū, vel atramentum sutoriū simul cum porcino felle pulchre faciūt. Efficacius autem hoc est quod sequitur: atramenti sutorij pars vna, gummi pars se mis-

tis



sis: vino leuigata illinuntur. vel etiam collyria formantur, nonnulli vero caprinum fel melle mistum inungunt.

*Ad vngues oculorum, suppurationem, & hebetudinem. Oribasij.*

LAPIDIS magnetis, æruginis rasæ, minij sinopici, suffiminis ammoniaci singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, mellis atticici cochlearij dimidium. Idem valet aduersus albugines.

*De carbunculo & carcinomate.*

CARCINOMA tunicæ ceratoidis affectus est: cui dolor adiit, distentio, rubor tunicarum, cruciatus punctorius ad vsque tempora magisq; si moueantur, cibi torquet fastidiū, acribus irritantur, & excandescunt. Hoc malo nulla medicina subtrahit. Nihilominus dolor leniri lactis potione debet, item cibis frumentatiis & alioquin probi succi, omnī acrimonia liberis. Collyria lenia infundantur, vt spodiæcum, seberianum & consimilia. † Cæterum bonæ totius, corporis temperaturæ prospiciendum est. Carbunculus autem, & ipse malignum ac contumax vlcus est, crustatium aliàs bulbo, aliàs palpebræ, quemadmodum reliquis pariter corporis particulis accidit. Itaque in bulbi carbunculis per initia quidem clystere primum, mox lacte discocto, mediocriter purgare conuenit. deinde spongia foto erui farinam, vel triticeam ex aquæ mulsæ decocto obducere instar cataplasmatidis, nonnunquam & iridem detritam applicare, & lacte oculum eluere. Si vlcera serpēdo depascant, lenticula cum melle, vel malis cydoniis incoctis forma cataplasmatidis obducuntur. Si latius depascendo penetrent, foliis oleæ decoctis, vel malicorio in vino cocto leuigatq; ex melle. At si cessent proserpere, crustaq; medicamento quod subiungetur, imposito, exciderit, & vlcera sint pura, lutea ouorum tosta, leuigatq; cum croco & melle cataplasmatidis modo inducentur, quousque ad cicatricem perueniant. Medicamentum autem est hoc, spodij drachmæ quatuor, myrrhæ non nimis torrefactæ drachmæ treis, totidémq; oboli. Detritis in vino amineo quousque inaruerint, passum creticum verus miscetur. Vbi leuigata sunt inuicem, liquida, pixide fœtili excipiuntur, subiunguntúrq;. Ad palpebrarum vero carbunculos malum granatum acidum, totum frustatim concisum aceto incoquito. Vbi intabuerit probe, in læuoremq;



uoremq; detritum, illinito in lintheolum ac vtitor, bis tēve quotidie immutans, noctu semel.

† Hic locus integrior est in nostris exemplaribus, in quibus ita descriptus est. προνοείσθαι ἢ ἢ ἢ τοῦ ὅλου σώματος εὐπρεπείας πρᾶνς ἢ τὰς ὀδύνας ἢ κινήσας ἀφελήσας φανὲς ἐγκυματισμῶν ἢ χυλὸς πολυγώνος ἢ ἀρρογλώσας, ἢ ἀνδράχυνος, ἢ ἀνδράκνωσις, id est, bonae totius corporis temperatura perspiciendum est. Carcinomatis autem dolores lenit decoctum lentis impositum, vel succus polygoni, vel plantaginis, vel portulacae. Quam veram esse scripturam ex Aëtio facile intelligi potest.

De mydriasi.

C V M pupilla colore quidem nihil magis euariet, sed multo est quam naturalis status exigit latior. interim ex toto visum impedit, interim permultum, & omnia quae conspiciuntur ab ipsis minora quam sint videntur esse, Mydriasis quidem affectus est, causa autem ipsius humor quidam excrementitius, itaq; curationem ipsius sanguinis emissionem à cubito, vel purgatione tentabimus: sin minus, venas in angulis oculorum diuidere oportet, deinde cucurbitulam occipitio admoovere, & marina frontem, & oculos perfundere. si marina desideretur, muria, vel posca. Medicamentis autem iis vtendum est, quae etiam ad pustulas conducunt.

De phthisi & atrophia.

P H T H I S I S affectus est, quo pupilla fit angustior, obscurior, rigosiorq;. Res lumini obiecta, in his maiores apparent. causa vero est densatio, quae siccitati potius fertur accepta. Sed phthisis ab atrophia hoc dignoscitur discrimine, quod illa angustio rem pupillam, haec totum oculum minorem, humilioremq; reddat. Mederi his conuenit exercitio, & studiosa capitis, faciei, & oculorum fricatione: Adhuc aquae in faciem superfusione & vnguae quodam calfaciente in caput dato, oculos autem medicamento, quod rarefaciat, & acriore oblinito, quale est infra scriptum. Ammoniacy drachma, crocomagmatis drachmae quatuor, croci drachmae duae, eruginis drachma. Tritis in aqua, formatisque vtitor.

De nocturna cecitudine quae nyctalops dicitur.

N O C T V R N A caecitudo, qui Graecis Nyctalops dicitur, vitium est quo per diem homo cernit, Sole dein occiduo obscurius, noctu omnino nihil. Curari debet sanguine ex cubito,



bito, & oculorum angulis vacuato, mox purgatione, vel per clysterem inanitione adhibita. Deinde apophlegmatismi indicentur, aut sternutamenta prouocare oportet. Ante cibum hyssopus potui, vel ruta dabitur. Si his remediis morbus non cedit, iterum purgationem moliemur ex scammonia, & castoreo: oculi vero melle despumato illinentur, claudunturq; , premendo liquamenta, continendq;. Aluminis combusti partes duæ, salis fossitij pars vna. Trita cum melle sublinuntur. A L I V D. Iecur hircinum assatur, aquosa inter assandum sanies inde emanans collectaq; inungitur. Quin & ipsum iecur comedendum exhibetur, coctiq; vapor oculis excipi a pertis præcipitur.

*De glaucomate, & suffusione quod hypochyma dicitur ex  
commentarijs Ruffi.*

GLAUCOMA, & hypochyma veteres vnum quoddam mali genus esse existimarunt. Posteriores autem glaucomata quidem humoris, qui ob similitudinem crysalli *νεφθαλμοειδης* appellatur, vitia, præ humiditate in glaucum colorem transeuntis iudicarunt. Hypochymata humorum affusionem, qui inter tunicam ceratoidem, & crystalloidem concresecunt. Verum omnia glaucomata curationem non recipiunt: hypochymata autem curantur, sed non omnia. proinde suffusione tentatis succurremus, antequam malum radices egerit, consistatq; sanguinis ex cubito detractio, & purgatione. item iniectionibus acrioribus, veluti ex centaury, aut cucumeris amaræ decocto petitis, & alui solutione crebriore, cucurbitulisq; occipitio cure incisa admotis. Cæterum aquæ potus toto victus curriculo competit, cibisq; vti qui extenuant. Proderit autem temporis spatium, & apophlegmatismis diebus aliquot vti. Quibus verò ceu culices, oculis obuersari perperam videntur, ex quadam humorum prauitate, vel biliosioribus vaporibus sursum distributis, medicamentum dialoes amarum exhibetur subinde, vel etiam inde sumetur purgatio. In oculis autem medicaminibus vtendum est, primum simplicibus, puta melle, cum oleo, & feniculi succo. postea etiam compositis, quale est hoc. Sagapeni drachmæ duæ, liquoris cyrenaici, veratri albi singulorum drachmæ sex. Alij addunt in mellis heminis octo. Nos autem tradit Oribasius, subscripto vtetur, calidis succi, chamedryos, sanguinariæ singulorum æquis portio



portionibus contritis. Benefaciunt item collyria, & quod succo feniculi constat, & Protheus, & Thalassius, & diopobalsamu, & quæ ex his præparantur, præsidio esse solent. Insuper feniculi decoctum per initia superfusum adiuuat. item ex succis confectum, opobalsamo, melle, oleo veteri, & similibus.

*De glaucomate & suffusione, ex commentarijs  
Demosthenis.*

FLORIS æris oboli quinque, myrrhæ drachmæ tres, nardi indicæ drachma, lapidis hæmatididis drachma: aphronitri drachma, salis floris drachmæ duæ, opobalsami drachmæ nouem. melle attico excepta offeruntur.

*De obscuritate, & hebetudine.*

OBSCURITAS, quam amaurosim Græci vocant, est totius cernendi visus plerunque absque manifesto oculi affectu impedimentum. Hebetudo (quæ amblyopia Græcorum lingua vocatur) obscuritas visus est, ab occulta quadam causa proueniens. Curatio communis sanè est ei quam in suffusis diximus: Priuata vero est, ab angulis sanguinem mittere, hirudines ad mouere temporibus, inferiores partes perfricare. Procedente tempore etiam iis quæ sternutamenta prouocant, vtendum est, tum vomitu ante cibum, & inunctionibus, primum ex mellis, & olei aqua portione, deinde composito quod subiungitur. Croci obolis duobus, felis hyenæ drachma, piperis communis granis octogintaquinque feniculi succi drachmis sexdecim, guttæ ammoniaci drachma. Contritis ad læuorem aridis ex succo, mellis cochlearia quatuor adiciuntur. Præparata excipito area pyxide & vitior. priusquam verò illinantur oculi, in marinam calidam demersi fouebuntur.

*De strabismo.*

INFANTES ab origine strabones curantur larua faciei circumposita, vt in rectum videant. Nam strabismus conuulsiora musculorum qui bulbum mouent, dispositio est. & lucerna è regione posita, & non à latere elucente. Præterea cum ad nares conuiuent oculis floccos rulos agglutinare vincit angulis qui circa tempora habentur: vt visu ad hos inconniuer directo, oculos emendent.

*De oculorum expressione qui ενπιρσις appellatur.*

EXPRIMUNTUR oculi nonnunquam, vt exerti perseverent.



uerent. quibus sanè strangulatus, mali causa est, ex cubito venam incidere oportet: sin alio modo id acciderit, medicamento purgare, veratro nigro, vel scammonia. Ex doloribus autem contractas oculorum expressiones, quæ frequenter sane etiam ex partu accidunt, vteri purgationes solvunt: unde has promouere conuenit. in viris autem post sanguinis detractionem. si non remiserit vitium, cucurbitulam occipitio defigere commodum est. Lanam melle imbutam imponere, aut panni floccos cum aqua, superq; duplicatum lintum illigare leniter. His prodest & marina frigida fronti superfusa, item sereos, & polygoni succus cum meconio illitus, tum alia quæ reprimere possunt, & contrahere.

*De confusione.*

CONFUSIONES ex ictu, curamus sanguinis detractione à cubito, totum oculum sanguine, potissimum quidem palumbi recens occisi, sin minus, etiam columbæ replemus: deinde lanam mollem in ouum cum vino, rosaceoq; contusum demersam imponimus, illigamusq;: sequenti die idem facimus, & tertio fomenta exhibemus, lac instillamus, applicamusq; idonea, deinde sublinimus medicamentis quæ ad veteres affectiones inscribuntur: quale est Chiacum.

*De myopiâ.*

MYOPIÆ dicuntur Græce, lusciosi nostris, qui prima natali die propinqua sanè vident, remota vero non item. Insanabilis est huiusmodi dispositio vt quæ ab imbecillitate spiritus visorij proueniat. Contrario his modo senes afficiuntur. Cum enim propinqua non videant, procul disita assequuntur.

*Auricularia & primum de aurium dolore. CAP. XXIII.*

**A**Vrium dolorem ex frigiditate contractum, vbi ex anni tempore, præcedente victu, vel agrotantis quoq; per-cunctatione: an ob exteriorem causam acciderit, didicerimus, inde quòd dolor alte citra grauitatem, vel distentionem, vel ardorem fixus sit, calfacientibus curabitur præsi-diis, nempe oleo rutaceo, calido vel nardino, vel laurino calido, vel amaracino, vel phuliato, vel spicato, vel communi, cum euphorbio, vel piperi, vel castoreo, vel commageno, dicto vngvine, vel liquore balsami in meatum auditorium instillato. Iam vero oleum in quo allium decoctum sit, vel cepa, instillatum auxiliatur. At ex calida conceptum intempe-  
rie



rie dolorem, in quo feruoris cuiusdam sine grauitate seu  
tensione sensus est, contraria medicantur oui albumen sub-  
actum in aurem demissum, quemadmodum oculis adhibe-  
mus, lac muliebre cum quodam collyrio, quod dolorem le-  
nit, vel succo perditij herbae, cum modico rosaceo: ipsumq;  
rosaceum, vel oxyrhodinum, vel succus solani, vel corian-  
dri, vel hastulae regiae, vel oleum in quo lumbrici, vel aselli  
qui sub aquariis stabulantur, incocti, vel oleum amygdali-  
num per se, vel buccina viua numero tria, in eo decocta na-  
turaliter proficiunt. Quod si glutinosi, crassiq; succi dolo-  
res fecerint, capitis, ipsiusque auris grauitas, & praecedentis  
victus ratio testatur, sola vero citra grauitatem distentio  
ipsius auris spiritum flatulentum, cui exitus non patefcit, in-  
dicat. Itaq; in ambobus vitiis vtere medicamentis, quae ape-  
riunt, inciduntq;, cuiusmodi est aphronitrum cum aceto, &  
melle. Item fel ouillum cum oleo communi, vel amygdali-  
no: praeterea porri & cepae succus tepidus cum melle, aut  
origanum tritum, cum melle & lacte muliebri instillatur.  
Ad vehementiores aurium perfrictiones fel caprillum cum  
succo porri inditur. Verum in iis quos multus dolor, longus  
que vrget: & grauis simul auditus existit, haec quoque vsur-  
pari debent, cuiusmodi dracunculi succus est, ari, brioniae, &  
similia. priuatim vero qui ob flatuosum indolescent spiri-  
tum, cucurbita ex aqua calida fotu prius facto, circa aurem  
fixa strenue auxiliatur. At si grauitas, distensio, simulq; ca-  
lor, & dolor pulsatilis, aut etiam febricula oboritur, inflam-  
matione aurem laborare censeto. Atque ante omnia hic san-  
guis emittendus est, † deinde fotu frequenti vtendum ex  
oleo dulci calente per specillum lana inuolutum, meatui ve-  
ro adeps anserinus, vulpinusve, aut medicamen basilicum  
cum rosaceo, vel cyprino, vel irino debet instillari: extrin-  
secus ea quae dolorem lenire, & concoquere possunt, cata-  
plasmatis modo superaccommodare. Si dolor violentus est,  
iis vtere, quae leuiter sensum stupefaciunt: non enim medio-  
cre periculum est, quod cerebrum neruo per quem facultas  
audiendi erogatur inflammato, vicinum sit. Probe igitur  
hoc dolorem lenit, opij pars vna, castorei partes duae, cum  
lacte muliebri, vel oui albumine, aut vino dulci tepido in-  
stillantur. Iam pastillus Crocodes, Aster, Philonis antidotu  
frequenter his pro fuerunt. verum conuenit crebro foun-  
tem



tem aut oleo communi, aut ex quodam calido fomento lanam, hoc ipso imbutam in aurem conicere, sed ita ut partes inflammatione tentatae quam fieri potest minime attingantur. At si dolor in vetustatem incidit, ac in pus degeneraturus est, medicamento utitur, quod ex lini seminis succo conficitur, una cum rosaceo, aut chamæmelino solutum, instillatur. Cum autem aqua medicata, meatu recepta auditorio dolorem parit, si quidem copiosa fuerit, ore, vel etiam arundine ipsam exugere ratio est. Sin autem pauca specillo auricularia lana inuoluto extergens, oleum quoddam instillabis quod sit partium tenuium, aut rosaceum, aut oui album, aut lac muliebre. Calida verò omnia mediocriter esse conuenit, quæ auribus adhibentur.

† Hic locus magis expressus in veteri exemplari, in quo ita est descriptus. *ἡ δὲ δὲ οὐχ ὡς πυρὶ ὡς ἴα. ἢ τῷ κοίνῳ ἰλαίῳ, ἢ τινὶ τῶν δευτέρῳ μύρων χηναίων, ἢ ἡγεὶ ἐργον ἐν αὐτοῖς τοῖς βιβραγμείοις ἐν τῇ δυνάμει τῇ ἀνοῇ, id est, oportet autem assidue fouere & oleo communi, vel aliquo medicamento uti, atque eo madefactam lanam auri imponere.*

Ad vlcera quæ simul cum inflammatione affligunt.

LICIVM & meconium æquali portione trita cum melle iniiciuntur.

Ad dolores maximos, pus & grauem auditum.

AMYGDALARVM quibus corticem detraxeris & aphronitri singulorum drachmæ tres, opij drachmæ tres, thuris drachmæ tres, croci drachmæ quatuor, galbani drachmæ duæ, myrrhæ drachma. Aceto læuigata instillantur. si dolor quidem exercet, rosaceo diluta: sin autem pus profluit, mulso, vel oxymelite: si grauius audiunt, aceto recentia vlcera glaucium solutum aceto, per sanat: item ex eo collyria, tum quæ appellantur diarodō, diacrocū, & diasmirnes. quemadmodum rursus suppurantes citra dolorem ferri recrementum cum aceto diutius læuigatum.

Ad sordium duritiem.

NITRO aceto diluto cum aqua auris illuitur, cumque fordes deterfæ sunt nitrum aceto solutum cum rosaceo instillatur.

Aliud ad fordes.

CARDAMOMI & nitri exiguum, cum ficis pinguibus sine granis exceptum, & in collyrij formam redactum, auriculæ committitur. Terrio quoque die educitur. Copiosas



enim sordes extrahit, & abunde leuat. Proficit hoc etiā aduersus carnis excrescentias, longos dolores, exulcerationes, recipit aloës, thuris, myrrhæ, singulorū drachmam, myseos drachmas quatuor ex aceto in pastillos digeruntur, cū vsus requirit, aceto & rosaceo soluta instillantur, Item Andronis pastillus & Heræ, & Musæ.

*Ad diuturna vlcera.*

CEDRIA melli admista illinitur. ALI V D. Myſi vſtum & in puluerem redactum inspiratur. Per clysterem verò auricularium eluuntur aures posca, vel oxymelite, vel mulſo, vel decocto quorundam repellentium (verbi causa) lenticula, vel rosarum.

*Ad aures cruorem fundentes.*

LENTISCI decocto auris illuitur, polygonij verò succus cum paucissimo aceto instillatur, vel lycium, vel amurca, vel acacia, vel porri succus.

*Si caro excreuerit.*

NITRO ex aqua calida, simul cum squama æris, & fandaracha parimodo auriculam illinito. Vbi crustam acceperint, melle repurgato.

*Aduersus aurium vermes.*

ABSYNTHII decocto, vel centaurij, vel porri eluuntur: capparis autem foliorū viridium, aut fructus succus instillatur, vel cedrinus liquor, vel vrina humana verus, vel albū veratrum cum melle, vel calaminthæ succus, vel scammonia cum aceto, vel succus absynthij: oleum verò meatui inditū vsque ad superiora, exire ipsos compellit: potius autem est oxelæum. Eodem ad ea quæ auribus incidunt animalcula vtitor.

*Ad calculos & similia quæ in aurem inciderunt extrahenda.*

SPECILLVM auricularium lana inuolutum in resinam, aut gummi, aut aliud quoddam glutinans medicamentum intingendum, idque in aurem iniiciendum, ac quod in ea est protrahendum. Si hoc modo nihil efficitur, oleum calidum continue instillato. At si ne sic quidem exciderit, aut comprehensum fuerit: aliis quoque vtitor modis: vt in parte chirurgica docebimus.

*Ad sonitum aurium intra seipsas.*

SI in febribus, aut harum crisiſibus sonitus aurium euenerit: nullum ei negotiū faceſſere oportet, quippe statim magna



gna ex parte finiuntur. Sin autem post morbum perseuerauerit, absynthij decocto vbi aures foueris acetum, rosaceūque infundi debet, vel raphani succus cum rosaceo, aut veratri nigri cū aceto. Ad veteres autem sonitus, qui ex crassis glutinosisque humoribus creantur, inde verò illos cognosces quod non subito, sed paulatim crescunt, nascunturque; aceto, nitro, & melle aurē illinito. A L I V D. Veratri albi drachmæ duæ, castorei totidem, croci drachmæ tres, nitri drachmæ sedecim. ex aceto cōtrita, in pastillos digerito ac vtitor.

*Ad veteres sonitus, & tinnitus.*

EUPHORBIVM cum cyprino oleo leuigatum, calefactumque; vsurpato, in quibus autem ob multam sentiendi facultatem vapores, & flatus sursum distribui percipiuntur, castoreum, & cicutæ semen tritum cū aceto instillatur.

*Ad grauem auditum, & surditatem.*

QVÆ ab origine quidem, vel etiam post natalem diem, sed longissimæ, & absolutæ surditates constituuntur, nullo remedio illidi possunt. Quæ verò non absolutæ quidem, sed diuturnæ tamen, & ipsæ curationem non recipiunt, aut certe difficillimam. Quæ ob biliosum humorem sursum vergentem nascuntur, vacuationibus per medicamenta bilem ducentia ex facili abolentur. quidam etiam sua sponte affectu liberantur, bile inferius descendente. At ex crudis crassisque humoribus prognatas surditates, vel grauem auditum, venę incisione curato, aut omnino purgatione, ex Hieratū apophlegmatismis & errhinis. item balneis sua sponte scaturientibus, vel ex aqua marina. Porro in meatum vbi facultas audiendi est, conuenit instillare, quæ ad sonitus tradita sunt. Priuatim verò hæc: vrinam & fel caprillum, aut seorsim fel, aut rutę succum cum melle, aut castoreum, cum oleo anethino: & hyssopum medicamentum cum nardino vngvine, vel caprillum fel cum galbano: vel quod recipit castorei drachmas duas, nitri, veratri albi singulorum drachmam.

*Ad contusionem aurium quæ θλάσις dicitur.*

HIPPOCRATES quidem nihil ipsis adhibendum præcipit. Cum verò sæpe ab ægrotis cogamur, vtendum est his. Myrrhæ, aloës, thuris, acaciæ, pari singulorum modo: ex aceto inunguntur aut panis calidi pars interior cū melle in



pila contusa obducitur: aut hoc: bituminis, thuris, aloës, cochlearum carnis, bulborum polentę par modus, ex aceto leuigata imponuntur. Quod si inflammatio oborta est, sesamum leue factum applicatur, vel chondrus, cum aceto coctus, laxiora autem esto cataplasmata, & citra deligaturam aut leuiter deligentur. & lana oleo imbuta auris anfractu demittatur.

*De parotidibus.*

PAROTIS glandularum iuxta ipsas aures affectus est, materia morbi illic eructante, alias à capite humoribus videlicet in eo impactis: aliàs à reliquo corpore in febribus critico modo proueniens. Si igitur, alte adhuc delitescens parotis in tumorem non attollitur, natura debet adiutari praesidiis, quæ coactas sordes extrahant, vel etiam cucurbitula agglutinata, vel crebro fotuum vsu. Nam si in altum recurrat colluies, periculum haud mediocre subsequiturum est. Sin autem inflammatione tentata in tumorem fastigietur, è contrario iis quæ leniunt, & concoquunt, utemur cataplasmatibus, quale est ex farina hordeacea, aut triticea, aut semine lini cū mulsā, aut fœnugræci, aut althææ, aut chamæmelorū coctionem expertorum iure incoctum. item quod ex rumice, & axungia insulsa constat. at si exuperare sanguis tibi videatur, prius ipsum venę sectione vacuabis: modo vires permittant. Tumore autem non discusso, medicamentis utere quæ puri mouendo sunt, nempe farina triticea cū pinguium ficorum decocto, vel oleo, tum medicamento quod ex polline, & quod ex fermento confectum est. Vbi iam abscessus, ad suppurationem spectarit, vel cute ferro discissa pus excernetur, vel acri medicamento rumpeatur, cuiusmodi existit smidion appellatum, & diascorodon, hoc est ex aliis preparatum. Cæterum mitiores parotidas etiam fots ex muria discutit, item medicamentum diaperanu. Hoc sanę etiā pus iam maturatum discutit, præter quod dolori leniendo sit efficacissimum. Ad inueteratas parotidas buccinorū, aut purpurarum combustarum cinerem cum melle, vel axungia imponemus, aut ficus marina incoctas, vel marrubium cū sale. Induratas autem iam emollit & medicamē Mnasei, & Ariobarhanos. optimū etiam quod ex succo lini seminis preparatur. ante hæc autem obducere ammoniacum conuenit, mista cum cataplasmatibus pice liquida, vel seuo taurino,



no, vel bdellio, vel styrace, vel medulla ceruina.

*Denarium & olfactus vitij.* CAP. XXIII.

**O**lfaciendi facultate oblata, si vox seruetur incolumis, ad priores cerebri vetriculos morbus refertur: qui aut ex intemperie sola noxam conceperunt, aut etiam ex humorum copia. Sin autem vox quoque mali contagiū senserit laboriosior quodammodo reddita propter ossa quæ à colatu ethmoide græcè vocantur, obstructa, affectum rursus malis quibusdam succis contractum esse censeto. Itaque cerebri intemperies, vbi ex notis sæpius à me dictis deprehensa fuerit, contrariis curatur remediis. humores autem apophlegmatismis euacuare oportet: maximè verò vitior medicamentis quæ per nares valide educunt. & quæ odore mouent tenuis substantiæ, quemadmodum in defluxionibus quas *ναβάρρως* græci vocant, adhibeto. Cum autem totius corporis humorum copiam suspicio subest, hæc prius, aut sanguinis dimissione, aut purgatione ex Hiera vacuatur. Ita quoque in polypode, & ozæna faciundum est, deinde loco etiā affecto inducuntur remedia. quin & Theriace pota sæpe magno fuit præsidio. Caterum polypus, tumor præter naturam in naribus oritur, substantia respondens polypodis caruncule: eiusdem verò naturæ est & sarcoma. Ozæna verò vlcus est, putridum ex humorum acrium illuue creatum.

*Ad polypodas & Sarcomata.*

**S Q V A M** AE ætis drachmæ octo, atramenti sutorij drachmæ duæ, sandarachæ drachmæ quatuor, veratri nigri drachmæ duæ: naribus inspirantur. In vsu hoc est laudatissimum, nam tredecim diebus, insigne affert præsidium. benefacit & atramentum sutorium cum aceto. **ALI V D.** Malicorij drachmæ duodecim, atramenti sutorij drachmæ decem, chalcitidis drachmæ octo, fellis taurini, amomi, myrrhæ, calaminthæ, marrubij, singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, veratri albi drachmæ quatuor. sicco vitior. **ALI V D.** Diphrygi trito nares, linamentoque ex ellychniis contorto attinguntur, dilatanturque.

*Ad ozænas.*

**M I S Y O S,** chalcitidis, myrrhæ, singulorum drachmæ septem, atramenti sutorij drachmæ sex, aluminis scissilis, gallæ, squamæ æris, singulorum drachmæ quatuor, aluminis rotundi drachmæ duæ, thuris drachma vna, aceti sextarius. to-



rum in vase æreo coquitur. Vbi ad mellis spissitudinem venerit, ex carptis linamētis vtitor. **ALIUD.** Aeruginē & aris squamam pari portione aridum medicamentum facito.

*Ad fædum narium odorem.*

**MYRRHAE**, acaciæ, amomi singulorum drachma. melle cocto excepta summo nariū intersepto iubeto agglutinari. **ALIUD.** Amomi, myrrhæ, rosarum siccarum partes æquales, nardino vnguento exceptas illinito. Item benefacit aduersus fœditatem odoris, & malagma hedychoë cum vino admotum.

*Ad narium vlcera.*

**CERVSÆ** libra, argenti spumæ quadrans, recrementi plumbi tantundem, vel plumbi combusti. omnia verò lota esto, excipianturque vino, myrtæoque oleo.

*Ad vlcera quæ vocantur glycea.*

**ARGENTI** spumæ drachmæ quatuor, rutæ nouellæ totidem, aluminis scissilis drachmæ duæ. Myrteo oleo acetoque excipiuntur.

*Quæ sternutamenta citent.*

**VERATRVM** album, vel castoreum, vel piper, vel struthium, vel simul omnia: nō autem oportet inspirare, sed pinna, vel digito penitissime, in nasum demittere. vbi sternutamentum frequentius est, medicamento sedari debet. Infunditur nardinū, vel rosaceū, vel glycelæum. Iam quæ odore mouent, sternutamenta sedant, anisum, ocimi stipulæ contusæ: sed ante hæc omnia caput desiccandum est. smegmatis ex nitro & pumice factis, vel etiam asclepio vocato vtendū, & Constantini sapone, & sale cappadocico, similibusque.

*Ad sanguinis eruptionem, è naribus.*

**SANGVINIS** è naribus profluuiū, quod febribus superuenit, secūdo volumine inter illas sum executas. De eo autē quod alia quacunq; de causa accidit nulloq; sisti potest remedio, in præsentia tractabimus. Chalcitidē cōtritā linamento ex ellychniis cōtorto, aqua imbuto, vel eo quod à genitalis humani forma priapiskon appellant exceptam, narium foraminibus demittes. Vel testam oui exustam admiscebis, & dimidiatam gallæ partem, vel lycio indico attinges. Vel fimi asinini cinerē inspirabis. Vel eius expressi succū instillato, vel molaris lapidis aceto extincti, vapor naribus attrahatur. Vel hoc quoq; medicamento obstruenti vtitor,

Man



Mannæ, thuris, partem vnam, aloës partem dimidiam. Candido oui liquore excipito: ac vtitor, per linamentum ex el-lychniis contortum, extrinsecus leporis pilis vnctioni impositis. Vel funiculum lucernarum in nares conicito. Vel cucurbitulam leuem directe, quâ sanguis profluit præcordiis magnâ affigito. præcordiis autē magnam, & perseveranter admoueto. Vel aures valide obstruatur, frōs spōgis ex aqua frigida foueatur. Vel cucurbitula occipitio agglutinetur: cū sanguinis detractione: interim etiā venam incidere, si nihil prohibet, & summas partes vinculis excipere, præsertim brachia, & femora, sicut in venæ sectione fieri solet. Eadem motu cōcuti iubeto, manus verò fricatione, pedes autē obambulatione. Nam venis indidē sanguine repletis, nariū vasa deplentur. Item spongia in poscam frigidam demersa, naribusq; profluentibus à foris strictim admota: id quod requiritur, subinde perfecit: melius autem proficit longo ex linamentis intortis penicillo naribus prius subiecto.

*Ad faciei vitia.*

*Quomodo facies à rugis asseratur.* CAP. XXXV.

**T**Huris drachmæ quatuor, fuci quod φῦχ<sup>o</sup> dicitur græcis, drachmæ tres, argenti spumæ, piperis, singulorum drachmæ octo, omnia ex ichthyocollæ contusæ diluto solvuntur, in pastillos redactis vtitor. A L I V D. Eburnei scobis drachmæ octo, thuris masculi, ichthyocollæ pares portiones. Vtitor, quemadmodum est prædictum.

*Ad faciei nigritias.*

**I R I D I S**, vel ptisanæ fresæ singulorum sesquiseptarius, salis ammoniaci, cornus ceruini combusti, thymiamatis ammoniaci, singulorum vnciæ duæ. Aqua dissoluta in pastillos coguntur, ac iterum aqua trita ante balneum illinuntur. A L I V D. Ptisanæ, erui, thuris, iridis illyricæ, aphronitri, singulorum chœnices duo, costi, amygdalorum amarorum singulorum drachmæ viginti. Quorum albumine, lacteque asinino subigito, ac vtitor veluti prædiximus. Benefacit etiam pastillus Peponatos.

*Ad ephelidem & lenticulas.*

**T E R R A E** cimoliæ torrefactæ, semicongius, aphronitri totius drachmæ octo, erui farinæ elixatæ drachmæ quatuor, felis taurini, eburnei scobis singulorum drachmæ octo. Leuitatis facies defricatur. A L I V D. Fecis drachmæ decē, erui farinæ



drachmæ decem, lomenti drachmæ decem, veratri albi drachmæ quinque, aphronitri drachmæ decem, alcyonij drachmæ decem, tritis abstergito.

*Ad suggillata.*

PER initia decocto fœnugræci postea & meliloti oculi fouens, Nilei collyrium diarodō aqua solutum illinito: deinde diasmirnes. Et si nihil profecerit, id quod diasandicos inscribitur, combustum, perungito, vel hyssopū cum aqua applicato. Vel hyssopo in panniculum illigato & calida aqua respersa foueto: vel acri muria. item raphani corticem cum melle detritum impones. hoc etiam veteribus efficax est. Porro ad vetusta faciei suggillata, & liuores tordili partes duas, terræ samix partem vnā cum melle admoueto, cura adhibita ne exulceretur.

*Aliud deterforium.*

HYSSOPi, thapsiæ, casix singulorum drachmas duas, ceræ tantundem, terebinthinæ drachmam iniicito, cauens ne exulcerationem excites, eoque frequenter tolles.

*De varis.*

EXIGVI sunt & duri in facie tumores. Oxymelite illinito, vel argenti spumam cum terebinthina, aut olei candidi momento tritam infricando perunges: vel alumen fissile cū terebinthina, vel amygdala amara aceto macerata infricantur. In callum vero cōcretos varos, saponis gallici drachmis quatuor, thuris, thymiamatis ammoniaci singulis drachmis, aqua dissolutis perungito, & post horam eluito.

*Ad varos, pilos, & aspredinem faciei.*

CERAE drachmæ decem, terebinthinæ, drachma, visci drachmæ duæ. Liquato vnā oleum superinfundens atq; hoc medicamēto faciē abstergito, tollit enim radicitus. ALIUD Papauer detritum, vel pulegiū cum sale. acetōq; applicato.

*Ceratum thaidis quo facies rubescat.*

CROCI, erythrodani radices, fuci, thuris, myrrhæ singulorum drachmæ duæ. Adipe vitulino, oleoq; mastichino excipiuntur: deinde illinuntur. Interposito tempore, spongia ex calente aqua facies abstergitur. Cæterum faciei remedia, etiam reliquo corpori conuenient.

*De oris affectibus, & primum de dentiū dolore. CAP. XXVI.*

**D**Entium dolorem siue gingiuarum inflammatione, interim in proprio ipsorum corpore, interim in neruo, qui



qui ad ipsos pertinet, oriri contingit. quapropter valentissimorum in hoc medicaminum vsus est. Atque inde plurima ipsorum quàm acerrimo aceto præparantur. At gingiuis propter inflammationem dolentibus, præsentissimum est remedium, oleum lentiscinum, calore temperatum, si in ore retineatur, esto autem id recens. nam vetus tanto recenti deterius, quanto calidius. Communis autem ratio etiam hic seruetur, vt humor qui in toto corpore superat, prius euacuetur.

*Ad dentium inflammationem.*

Os colluatur aceto, in quo decocta sit galla, vel halicacabi radix, alterci semen, foliæve, vel pulegiū, vel solani succus, vel capparis radix, vel myrti folia, vel polium, vel cucumis sylvestris radix, vel rutæ folia cum oxymelite, vel cornu ceruinum, vel acetum scillites, vel pyrethrū, cum hyssopo. At erosionem experto denti, styracem cum opio imposito: vel sulfur viuum cum lycio: vel alterci feminis vaporem excipiat per infundibulum. Item Philonis antidotum denti circumlitum, dolorem sedat. Quod si defluxione laborent dentes, myrti, lentisci, & gallæ decocto colluentur, vel rhus syriaci, balaustij, vel malicorij. applicantur autem salis partes duæ, aluminis vsti, & aceto extincti tritiquæ pars vna: deinde vino perluuntur. porro gingiuis cruentis alumen tenue inspergitur, vel aloë cum vino eluuntur: vel rubi radice vino decocta: vel rhu syriaco. cruentis autem & defluxione tentatis gingiuis crudum salsamentum in olla comburito, quoad in carbones redigatur, puluere attingito. At mobiles stabilit aloë inspersa, vel rhus syriacus, vel alumen scissile, vel galla, vel rubi radix per se, aut cum vino incocta.

*Aliud ad dentes.*

N V C I S viridis corticem terito, eiusque ius, cum habes, in id coniicito myrrham veram, & alumen scissile, vbi omnia in vnitatē coegeris, in vsu infundito, ac in gingiuas qua parte dens indolet, demittito & persanabis. A L I V D. Allium, piper, herbam pediculariam quæ staphis agria dicitur, detrita, in linamento in globulos coges quos circa dentes versans humorem in capite contentum elicies, dentemque sanabis. A L I V D. Ad dentes mobiles, & gingiuas fluxione pressas omniāq; oris vlcera depascentia Chalcitidis tostæ drachmæ duodecim, cadmiæ drachmæ octo. vtitor sicco, aut



cum aceto, sine dolore dentes tollit, farina cum liquore tris  
 thymalli imponitur, & super hederæ folium accommoda-  
 tur, ac per horam finitur, sua enim sponte dens conteretur.  
 Dentium smegma, quod & parulidibus benefacit. Aluminis  
 latercularij triēs, salis ammoniaci tantundem, myrrhæ, co-  
 sti, pyrethri, singulorum drachmæ quatuor, piperis grana  
 octoginta.

*Ad parulidas.*

S V L F V R I S viui, piperis, aluminis scissi, æquales portio-  
 nes. Ac parulis inflammatio quædam est in aliqua gingiua  
 rum parte suscitata, quæ nisi discussa fuerit, in suppurationem  
 cōuertitur, & cum suppurauerit, scapello incisa, linamentis  
 insertis distenditur. Epulis autem carnis excrescentia est  
 quæ ab inflammatione contracta ad intimos molares den-  
 tes pertinet: nonnunquam cum febris & dolore. Quoniam  
 igitur reprimi debet, vtendum est, æruginè rafa priuatim  
 vel cum pari galla, vel fori combusto, vel alumine quolibet  
 cremato, vel galla per se vel squama æris cum aceto diebus  
 fat multis leuigata desiccataque.

*Smegma dentium.*

A R I S T O L O C H I A E radix combusta, cerui cornu com-  
 bustum cum mastiches momento, sal candidus melle resper-  
 sus & fici foliis inuolutus exustusque donec in carbones mu-  
 rentur. A L I V D. Buccina sale respersa, vltaq; cochleæ terre-  
 stres cum melle combustæ, lanæ succidæ crematæ cum mo-  
 dico sale. Singulis ipsorum grati odoris gratia misceatur  
 iunci rotundi flos, vel nardi spicæ, vel folium malabatri, vel  
 iuncus odoratus angulosus, vel iris.

*Dentium candorem concilians, & oris suauitatem faciens  
 gingiuasque reprimens.*

P V M I C I S, salis tosti, iridis singulorū drachmæ quatuor,  
 iunci odorati angulosi drachmæ quinque, spicæ nardi drach-  
 ma, piperis drachmæ sex. Tritis vtitor.

*Ad stuporem dentium.*

S T V P O R I benefacit portulaca commanducata, vel oleū  
 quod immaturæ oliuæ fuderunt infricatum, vel amurca in  
 æreo vase cum oleo cocta, donec mellis spissitudinem ha-  
 beat. atq; vetusta si perungatur, magnū affert momentum.

*Ad dentes attritos.*

D E N T I B V S attritis, baccarum lauri, aluminis scissi, ari-  
 stolo-



stolochiæ sarmentorum quæ clematidis dicitur, singulorum pares portiones iniiciuntur.

*Ad gingiuas corrosas.*

ROSARVM floris drachmis octo, gallarum drachmis quatuor, myrrhæ drachmis duabus, si gingiux erosæ, & humiditatis vitio flaccidæ, colluantur, sanescunt. Idem præstat lac asininum, oliux foliorum decoctum, acerum scillites: arida verò admota, ærugo ferri, cytini. Tumidas excrecentesq; gingiuas portulacæ succus in ore retentus, muria ex colymbadibus oliuis, calidum. calidum, vel lentiscinum, vel melinum amurcæq; discutit: sicca autem, ærugo ferri, vel æris, aristolochiæ radix, arnoglossi semen, dyphryges, atramentum futorium tostum, cytini.

*Ad disrupta labra.*

AMVRCA cocta illinantur: vel hoc prodest adeps anserinus cum melle, terebinthina æquali portione, rosarum floris, hyssopi, rosacei, singulorum momentum.

*Aduersus linguæ morbum qui batrachus appellatur.*

BATRACHVS tumor est, ad inflammationis similitudinem, sub lingua erumpens, maxime in pueris: itaque locus misyos, æruginis rasæ, pari pondere sicco perfricatur. Mentio autem adhiberi debet medicamentum. Anthera, vel sphærion, vel ex ouis parygrum. In adultis remedium est venas sub lingua diuidere. ALIVD. Valet etiam ad oris vlcera, quas Græci aphthas vocant, æruginis rasæ, gallæ, chalcitidis singulorum æquale pondus cum passo. os etiam his colluitur. ALIVD. Erui farina cum melle prius absterfis, delinitur, galla læuis cum melle, vel rosarum flores similiter. Vel oliux foliorum decocto colluant.

*Ad tonsillarum inflammationem.*

SI in febris tonsillæ, & columella inflammationē senserint, gargarizare conuenit decocto furfurum, aut rosarum, aut palmarum, aut myxæ, aut lenticulæ. Cum verò inflammatio remittit, consistitve, mel ipsis adiiciendum est, quod per initia facere non oportet, nec in augmento, ne acrimonia fluxionem quandam concitent. Vbi in suppurationem conuersa eruperit, gargarizandum est, ex mulsa vel lenticulæ decocto, vel rosarum: idq; faciundum est, donec in totum soluatur: aut stomatica collutio ad gargarizandum etiam exhibebitur. At si pestifera tonsillis vlcera oboriatur, vtendum



dum quidem & præscriptis, sed priuatim exhiberi debet medicamen diamoron, ex aqua calida, vel aqua mulsa, quæ rosarū inspersum florē obtineat, vel costum, vel rhus sicca, vel decocta, vel glauci foliorum aridorum decoctum quod amarum est. optime autem facit, si succum, vt ad collyria vtimur, in mulsa dissoluis. ipsius autem fruticis ficci, si inspiretur, vsus est laudatissimus, aut si digito admoueatur. cura vero habenda est ne prorsus attingatur, aut certe leniter admodum. Profuit & pastillus Andronius. Post hæc acria irritantiæve gargarizatur ex medicamento, quod ex dulci radícula quæ glycyripe dicitur, constat: aut eo quod croco, vino scybelite, terra chia, & myrra componitur. deinde amylo, & tragacanto. Vbi iam constiterit vlcerum de pastio, gargarizandum medicamento ex lacte & samia terra confecto. A L I V D. Ad tonsillas quæ post inflammationem induruerunt, *ἀντίσπασ* græci nominant. Ex malo punico dulci cum cortice tuso succus exprimitur, & eius partes sex, mellis vni mistæ coquuntur, donec eis mellis spissitudo sit & perunguntur. A L I V D. Gallæ omphacitidis vnciæ duæ, aluminis scissilis vncia, salis ammoniaci tosti tantundem. Puluere attingito. A L I V D. Gallæ drachmæ octo, mysos drachmæ duæ, salis tosti drachmæ quinque vitior puluere. est autem Antias, tonsillarum tumor, schirruræ præferens.

De vua.

V V A si inflammationē experitur, gargarizandum ex iisdem, quæ tonsillæ inflammatae postulant, & mediocriter astringentibus, qualis est mali punici succus per cochlear, vel instrumentum, quod ab vua attollenda staphileparton appellant, subiectus, tum per se, tum cum melle affatim cocto: vel dulcis radix, mali punici succo mista. proficit etiam succus dulcis radice cum melle illitus. iam hæmatites lapis vnam reprimat, & phrygius combustus, & ageratus, item ex lapide phrygio medicamen ad pudenda inscriptum. His adduntur terra samia, erethrias, sinopis, lemnia, & omphacium, per se & cum horum aliquo. Item spinæ ægyptiæ succus & alumen scissile. rosæ vero, & semen, & folia lenius operantur, adhuc lenius gummi, tragacantha, sarcocolla, amyllum: quibus vtendum dum magis vua prematur ab astringentibus cōstricta. vbi æqualiter crassa fuerit ipsa, quod vitium



vitium iam vnam Latini, *leiova* Græci propriè dicunt, gargarizationibus fidendum etiam iis quæ ex myrrha, & croco, & iunco anguloso fiunt. Contusiones autem cauendæ sunt. ob quod pinna potius perungere conuenit. compositum vero hoc vtile est, rhus syriaci drachmæ octo, croci drachmæ quatuor, costi drachmæ octo, rosarum seminis drachmæ quatuor. Præterea gingiuis benefacit, linum ex purpura marina, quod viperæ collo circumdatū ipsam strangulauerit, deinde circumadigatur tonsillis, & collī vitiis, mirabili quodam modo opitulatur, vt Galenus author est.

*Ad sanguinis ex ore profluvium.*

PORRI folia contusa imponuntur, vel sponsia recens in picem crudam mersa comburitur, in puluerem coacta vitior, ac valde vtile est remedium, & collutiones oris ex rosis siccis, aut viridibus. Ad hæc decoctum frigidum, vel pampinorum vitis, vel lentisci foliorum, vel rutæ, vel maiorum cotoniorum, vel rosarum, vel vuæ acinorum, vel lenticularum.

*De angina, eiusq; speciebus: vbi etiam de strangulatis: vel alio modo suffocatis agitur.*

CAP. XXVII.

Interioribus faucium, pharynga Græci vocant, musculis inflammatis angina accidit, quæ synanche Græcis dicitur: exterioribus, parasyranche. Eodem modo & in superiore gutturis parte, *ἀσπύγχα* Græci nominant, habet: cuius si interiores musculi inflammatione confluentur, cynanchem: si exteriores, paracynanchem efficiunt. Hæc autem comitantur omnes. recta ceruice spiratio, dolor cum difficultate spirandi, nonnullis etiam febricula oritur, faciei rubor, ceruicisq; & tumor in quibusdam os ægri apertum habent, & deuorare nequeunt. Cynanchicos vero strangulatus quoque interdum secutus est. Pueris raro talis affectus oboritur, cum scilicet ceruicis vertebræ affectæ loco suo excidunt. Verum illis ceu curationem non recipientibus, ac deploratis, manum admoliri non oportet. Reliquis autem sanguis protinus è cubito mittendus est, sed non subito ac semel, verum pluribus interpositis vicibus euacuabitur, quippe cumulatâ, semelq; facta vacuatione, anima ipsis deficiente, suffocationis periculum superuenit, dum materia in affectam partem collectim prorumpit. Si per hæc non leuantur, eas quoque venas incidere conuenit, quæ sub lingua



gua sunt, vel ipsa quoque lingua scarificanda, si propensior foras cum tumore appareat. Alius acriore clystere subduci debet, pedes aqua calida foueri, extremæ partes valide deligari, collum lanis succidis, vel etiam oleo imbutis contegi, crudaq; farina ordeacea, quæ Græcis *ὄραν λόρος* dicitur modo cataplasmatibus obduci. gargarizandum verò per initia ex eis quæ in tonsillarum inflammatione dicta sunt, vel simplici diamoron, † cum rhus decocto. Potius autem est diamoron, quod sylvestribus moris conficitur. Deinde & composito diamoron, vel eo quod diacaryen à nucibus vocatur perungantur. Cum autem morbus viget, consistitq;, & nitri momentum admiscendum est, aut etiam sulfuris viui, nisi acrimonia quædam prohibeat. item stercus caninum aridum contusum, & cum melle perunctum, præstantissimum est remedium: idque album maxime, item sylvestrium hirundinum cinis similiter efficax est. Si malum longius prorogatur, etiam perunctione diabesasa, utemur, nunc vires ipsius remittentes, aliorum mistura, nunc iterum intendentes. Cucurbitula quoque, vel hirudo sub mento, & circa ceruicem admoueri debet. utendumq; gargarismatis ex iride, hyssopo, melanthio, abrotano, dulci radice, ficis pinguibus in mulsa decoctis, vel rutæ succo cum lacte, vel sinapi cum oxymelisse. Sin autem ex his quædam acrimonia percipiat, oleum ipsis quàm optimum calens exhibetur, aut rosaceum per se, aut cum cremore ptisanæ, aut fœnugræci gargarizandum. Cibus sit triduo aqua mulsa, inde ptisanæ cremor cum dulci quadam portione, deinde & ouorum lutea perliquida, ac sorbitionibus utendum ex chondro, ubi deo rare melius cœperint, & cibus qui ægri viribus respondeat. Cum morbus cœperit inclinare, ægri deambulationibus & balneo credentur: pars affecta cerato ex oleo rutaceo operietur, reliquaq; virium recolligendarum ratio, ut par est, adhibebitur. Porro ex strangulatis, quibus spuma iam circa os emanat, manus admoueri non debet: si Hippocratis consilio acquiescimus. Alij verò vitæ restituuntur, aceti infusione & piperis, vel vrticæ seminis in aceto triti acerrimi. Verum quia ægre magnoq; negotio assumunt, compellere eos ratio est. Discussis autē colli ruboribus, statim sursum respiciunt, & ad se redeunt. simili modo in his qui naufragium passi sunt. Summatim in omnibus qui suffocantur.

Nam



Nam ita horum calor recreatur, refocillaturq̃.

† In nostro codice est οὐκ ἀπεψύχθη ποῖας, id est, cum decocto mali punici.

De grauedine, destillatione, raucitate, & tussi.

CAP. XXVIII.

Communis est hisce vitiis, excrementitij humoris ex capite in subiectas partes descensus: si in nares decumbit *λόρυξ* Græcis, grauedo Latinis appellatur: si in fauces, & palatum, simplici vocabulo *λαδάρρος*, nobis destillatio. si in guttur, & asperam arteriam defluerit, vt etiam membranam internam quæ hanc integit, exasperauerit, rauca vox efficitur, vocaturq̃; malum Græce *βρόγχος* & *ἀσθμα* Latinis raucitas: In quibus non solum ex capite, sed etiam vehementi clamoris conatu, & spiritus inspiratu frigidi asperitas contrahitur inflammatoria. Si morbus perseveret, fluxioq̃; in pectus, pulmonesq̃; defertur, tussis oboritur ipsis maligna, ac contumax. Iam & propter intemperiem subinde tussis accidit, interim ob calidam, vt in febribus: interim ob frigidam, vt aquiloniis diebus, eaq̃; magis sicca est. Iam vero aliis quoque morbis tussis nonnunquam symptoma efficitur: verbi gratia, pleuriticis, iecorariis, phthisicis, pulmonariis: Galenus itaque in diuturna tussi grandines quasdam ex pectore educi memoriam mandauit. Alexander autem calculum quendam grauem, qualis in meatibus vrinariis nascitur, post longam tussim expulsam: ac inde illam quoque cessasse prodidit. Porro nos in sanguinis reiectione calculos excerni vidimus, quemadmodum cum illuc peruentum erit, exactius commemorabimus. Qui igitur ex æstu grauedinem, vel destillationem concipiunt, his calor sensus oboritur circa partes affectas, acris, tenuisq̃; humor destillat, tum per nares, tum per os, faciesq̃; rubescit, & nasus. Qui ex frigore, iis caput vndique & frons distenditur: meatusq̃; ossium quæ à colo ethmoide vocant, clauduntur, ne vox deorsum per nares transmeet: si verò longius malum trahatur, tussis quoque affligit, pituita educitur, nunc cruda & liquida, nunc viridis. Quibusdam & febris superuenit: quæ ob æstum laborantes nihil iuuat: frigore pressis, etiam concoctionem efficit.

Curatio destillationis, & grauedinis.

¶ I calida præpoller intemperies: iis pugnadum est præiudiciis



fidiis, quæ dolori capitis ex tali causa contracto cōueniunt. balneo vtendum est, caput aqua copiosiore calida perfundendum. Cibi vero his proderūt ad sorbitionem aptati, ouarum forbilia, amyllum, liba dulciaria, quæ itria dicuntur, sesamum, ma, necnon amygdala. item nux pinea, & quæ ex lacte fiunt bellaria: vina dulcia, non vetera. medicamentum diacodion linctu assumptum, & quæ his congruunt composita auxilia. Quod si frigida intemperies afficiat, & morbus contumax sit, modico vtendum cibo est, caput calefacientibus, tenuiq; substantia præditis nardino, rutaceoq; debet perungi. Irinum verò non solum illinitur, sed etiam naribus instillatur: intus nares thure, & myrrha cum oleo perunguntur, præsertim si perfrictio grauedinem crearit. Alios naribus odoranda adhibita iuuarunt, vt lacineæ panniculorum combustæ, vel melanthium, vel cuminum vstum, illigatumque in panniculo. Iam cyphi silenaicum, id est lunare olfaciant, frontique illinatur, cui simul vnum ex emplastris, quæ inflammationem arcent, agglutinabitur. Exempli gratia, Icecium, vel Oxera, vel Barbarus, vel Athena. Ad distillationem vero ex frigore ortam, & cyphi potus utilis est. Thorax autem balsami liquore illinetur idemq; per lanas succidas cum styrace, & irino, vel anethino circumfouebitur. Cibus calidioribus, & ad concoctionem promptis vti commodum est, vbi iam materia concoquitur medicamen quod pituita per os educat, idoneum erit, tum capitis smegmata, nempe Constantini sapa, atque eius generis consimilia.

*Rauicitatis curatio.*

RAVCITATI quam arteriacum & branchum appellauimus, competent quidem superius comprehensa, verum priuatim vbi arteria, & caput eius quod larinx dicitur inflammatoriam quandam affectionem experiuntur, emplasticis, id est, obstruendi meatus facultate præditis per initia vtentur, donec inflammatio remissior euaserit: talia vero sunt quæ ex passo cretensi, tragacantha, gummi & amylo constant. Item pinguium palmularum decoctum. & dulcis radice cum sapa, donec mellis spissitudinem conquirit. Item compositionum quas quod sub lingua teneantur, ὑπογλωττῖδης appellant vsus est. Ante omnia vinum hoc tempore circuncidendum: postquam inflammatio moderatior fuerit reddita, vinum dulce assumetur, tum confecta ex melle, lacte,



laſte, cum amylo, vel pane ſiligineo. Adhæc ſorbtiones ex amygdalis, butyrūmq; vtile. At ſi humor in particulas ſe receperit: tranſeundum eſt ad ea quæ valentius abſtergunt, cuiusmodi eſt ferculū ex faba freſa paratum, & quæ ex melle præparantur. His adde braſſicam & porra probe cocta. medicamenta vero calidiora & ad tuſſim accōmodata proſunt, quæ conſtant ſapa ex ficis pinguibus confeſta, thure, iride, terebinthina, ſtyrace, galbano, pipere, cinamomo, caſſia & his ſimilibus.

*De tuſſi.*

TUſſiſ quoq; eadem ratione curanda. hoc ſolum inſpicitur num aliarum particularum conſenſu fiat vt gurgulionis diſtillantis, vel capitis, an aliis morbis coincidat. His ubi quàm fieri poteſt optime erit proſpectum, quemadmodum à me comprehenſum eſt, dicetūrq; in poſterum, tuſſis curationem molire. Compoſitorum vero præſidiorum enumeratione hic ſubieſta eſt.

*Catapotia ad diſtillationem in fauces & tuſſim.*

STYRACIS, myrrhæ, opij, galbani ſingulorum pares portiones. paſſo excipiuntur, vel priuatim in pila contunduntur, & ad magnitudinem erui terna, quaternave aut quina, noctu dormituro dantur: paſſumque ſuperbibitur. Hæc ad acrem tenuemque fluxionem valent.

ALIUD. Alterci ſeminis drachmæ duodecim, nucleorum pineorum drachmæ ſex, croci drachmæ duæ. ſapa, vel paſſo in uſu excipiuntur.

*Eclegma.*

MELLIS vncia, butyri ſemuntia, ſimul incocta exhibentur: item ex hyſſopo, ficibus, nucleis pineis, & iride decoctū ſorbetur.

*Catapotia ad veterem tuſſim accommodata.*

STYRACIS drachmæ ſex, myrrhæ drachmæ duæ ſemis, terebinthinæ, galbani, opopanacis, iridis ſingulorū drachmæ duæ, piperis albi, nitri, ſeminis alterci, lachrymæ papaueris, ſingulorum drachma, ſine vlllo liquore in pila tuſa in catapotia rediguntur: vtitor vt prædictum eſt.

*Ad aſpredinem gutturis, tuſſim & ſputum cruentum.*

AMYGDALA amara, quibus cortex ſit detractus vigin-  
tiquinque, ſeminis lini torrefacti drachmæ quatuor, traga-  
canthæ drachmæ duæ, pini nuclei triginta, oui in adipe cocti,



luteum. Tragacanthum, aqua maceratur. Totum vero passio excipitur: si verò & sonus vocis fuerit oblatus, mel miscetur in passu vicem, & praesertim in quibus educi ex gutture aliquid oportet.

*Arteriacae quae quod sub lingua teneatur hypoglossis appellata, facit ad abscissionem vocis, raucitatem. item ad eos qui egre reijciunt, anaphoricos graeci nominant.*

TRAGACANTHAE drachmae sex, gummi tantundem, myrrhae drachma, thuris drachma una semis, piperis albi grana viginti, croci drachma una, dulcis radicis succi drachmae sex, palmularum trium caro, passu cretici, quantum sufficit. Atque succus tragacanthae solus ipse sub lingua loco dulcis radicis succi retentus. Eiusdem decoctum dum spissitudinem habeat quadruplum inditur.

*Arteriacae, ad abscissum vocis sonum conuenit, & eos qui vocis exercitio vtuntur.*

PORRA sex coquito, usque ad tertias, atque ipsa proiicito, iuri ipsorum succum alicui admisceto, mel & ouorum prius decoctorum lutea tria simul incoquito, circumagitans anethi ramusculo.

*Compositio ad tussim, graece bechicon appellatur.*

PVLEGIJ sextans, nucleorum pineorum, cnici seminis, lini seminis singulorum uncia, piperis cocti triens, melle cocto excipiuntur. ALIVD. Hyssopi, pulegij, piperis singulorum uncia, petroselini semuncia.

*Medicamentum tussim veterem concoquens.*

MELLIS drachmae sedecim, terebinthinae drachmae duae, galbani drachmae quatuordecim. Vbi simul fuerint incocta, orbiculi finguntur, circa fabae magnitudinis, nucisve auelanae, atque ex his delingitur. ALIVD. Aridam tussim curant tum arteriaca medicamenta, tum aquae nonnunquam feruentis sorbitio. nam dum propter pituitae crassitiam non creant, reijciuntque, humectantibus aliquantulum iuuantur. ceterum conuenit ipsis etiam hyssopi, iridis, & pinei nuclei decoctum.

*Pastillus à fumo dictus capnistos ad tussim continuam.*

STYRACIS, piperis, mastiches, petroselini, singulorum unciam, sandarachae scrupulos sex, baccas lauri duas. Melle excepta in carbones proiicito fumumque excitato, ut tussiens hunc



hunc per infundibulum aspiret. conuenit & qualemunque perfrictionem expertis.

*De orthopnæa, suspirio, & spirandi difficultate.*

CAP. XXIIX.

**Q**ui febris expertes, crebro veluti à citatiore cursu respirant, ab accidenti quod superuenit nostris suspirio si, Græcis ἀσθματινοὶ appellantur, iudemq; hinc quod omnē figuram totius thoracis rectam seruent, strangulari metuētes, orthopnæici dicuntur. creatur hoc mali cū fistulosæ pulmonum cartilagine crassis, glutinosisq; humoribus fuerint infarctæ. spirandi autem difficultas cōmune est symptoma, quod & his, & aliis cōpluribus affectibus superuenit. In curandis suspiriosis huc omnis cura dirigenda est, vt per extenuantia, abstergentiaq; medicamina, glutinosus humor, & crassus absumatur. Acetum igitur ipsis conueniet scillites, & oxymelitis ex ipso præparati potio, ipsaq; scilla tosta læuigataq; cum melle. Ex antidotis hiera, & purgatio cōtinua ex validissimis medicamētis petita, à radícula vomitus, aristolochia rotūda pota, cētaurij magni radix, spondylii semē, radixq; calaminthæ semē hyssopus, iris, melanthiū: asellorū qui sub aquariis vasis agunt sextarius in vas fictile cōiectus, carbonibus subditis frigitur. Vbi candorē acquisierint, teruntur, & melle cocto excepta mystri mensura ante cibū secundūq; ipsum datur. Quod si necessitas vrgeat, etiā vena ante hæc omnia incidetur, & quantū vires patiūtur sanguinis detrahetur: aluus clysteriis sollicitatur, Thorax aforis, ficubus & lolij farina obducendus est, cui adiecta sit resina, cera & mel. Inspargatur autem ipsi iris & manna. Non inutilis est & farina ordeï cruda, cum resina, cera, iride, & manna. vnguentis autem vtendum calidioribus, irino, anethino, rutaeco. Sed quod subscribitur medicamentum, huic vitio proprie dicatum est. pumicis pars vna, fæculæ, quæ est vini fæx combusta, partes quatuor, auripigmenti pars vna, iunci rotundi floris partes duæ, alcyonij pars vna, aphronitri partes duæ. Contusa incernuntur, vnguentisq; excepta, thoraci infricantur. Malagmatis vtendū est quæ serosas superfluasque sanguinis humiditates, græci ἰχθῆρες nominant, possunt extrahere.

*Potio suspiriosis apta.*

POLII, abrotani, castorei, chamæpyteos, guttæ ammo-

m 2



niaci, singulorum par modus. Melle subacta exhibentur.  
**ALITER.** Nonnulli dederunt, aphronitri cochlearium cum  
 tribus mulsæ cyathis. **ALIUD.** Aphronitri drachmæ nouē,  
 piperis drachma, silphij drachma semis. Cochleariū ex aqua  
 datur. **ALIUD.** Castorei, suffiminis ammoniaci, singulorū  
 drachmæ sex, piperis grana viginti, passo excipiuntur. Instar  
 fabæ cum mulsæ exhibetur. **ALIUD.** Sinapi drachma, nitri  
 spumæ tres oboli, elaterij semiobolus. Totum in pastillos  
 octo digeritur. Bini duobus diebus offeruntur, nam sine mo-  
 lestia supra purgant. His qui prefocantur, aphronitri drach-  
 mæ tres, cum tribus hydromelitis cyathis assumentur, ac-  
 cum cardamomo nonnunquam, subito auxiliatur. benefa-  
 cit etiam coxendicibus.

## De peripneumonia.

## CAP. XXX.

**P**eripneumonia pulmonis est inflammatio, quæ plurimū  
 ex valentibus in eam partem distillationibus, aut angina,  
 aut suspirio, aut pleuritide aliūve morbis contrahitur:  
 Aliquando etiam ipsa inflammatio affectus origo est. Hæc  
 subsequitur spiritus difficultas, febris acuta & ardens, graui-  
 tas distensioq; pectoris tumor & magna repletio faciem oc-  
 cupat, materia sursum ignis instar impetum faciente. Malæ  
 itaque in his rubent, oculi intumescunt, supercilia deorsum  
 nutant, tunica oculi ceratoides, ob cornus imaginem dicta,  
 in pinguedinem languescit. Cum vera signa ad æstum fla-  
 grantiorem declinare videntur, pulmonis inflammatio Erysip-  
 elatis naturā resipiens, subesse existimabitur. In iis igitur  
 qui ex aliis morbis huc decidunt, sanguinis detractio vitan-  
 da est, maxime si diu hoc in statu fuerint, vel si per initia san-  
 guinem dimiserint. Verū alius in morbi remissione clyste-  
 re ducenda est, si ægre respondet, aut cucurbitulæ, vbi nihil  
 obstat, pectori, & lateribus admouendæ sunt, eaq; prægrā-  
 des, & multæ, cute incisa. Sin autē peripneumonix affectus  
 statim ab initio inuaserit, sanguinē mittere, suffragantibus  
 qui huc requiruntur, numeris, ex vsu est: sin minus, cucurbi-  
 tulas certè defigere: quibus tantū elicietur sanguinis, quan-  
 tum vires patiuntur. Quod ad cibū vero attinet, danda est  
 sorbitio ex ptisanæ cremore & chondri cum melle, vel ex  
 amaris amygdalis cū similagine, aut chondro, dulci quadā  
 portione admista, hydromalo, vel apomelite, vel hydrosafa-  
 to. Rectè sumitur & recens butyrū, cochlearibus circa tri-  
 bus.



bus. Propinatur autem ipsis ficuum cum hyssopo decoctum, vel iridis in mulla coctæ, vel leuigatæ instar duum cochlearium mulsæ insperforum. Hoc itidem, ab inferioribus partibus expurgat. At virtutis tuædæ gratia, crebrius potui assumetur, mulla per se & cum nucleis pineis, ac cucurbitulæ vniuerso thoraci lateribusque agglutinabuntur. Ceratum verò cyprinum quod contineat iridem insparsam, imponetur, vel ceratum ex rutaceo oleo, & iride sicca, vel epithema ex cera, resina medulla ceruina, butyro, æsypo medicamento, iride sicca, & nardina vnguento.

## De cruentis sputis.

## CAP. XXXI.

**C**Ruentum sputum si disrupta vasorum commercia excitant, multum sanguinis euacuabitur. Et quidē modo manifesta ex causa, vt alto delapsu, clamore, & consimilibus, modo ex occulta, veluti plenitudine, aut frigore immodico, nam id venis rumpendis esse habile scribit Hippo. Si verò exesa parte aliqua sputum cruentum æditur, nō cōfertim sed paulatim sanguis reieicitur, sic vt acres quidā prauiq; cibi, vel inedia, vel acris ex capite destillatio præcesserit. At si ex adaperitione, ἀνασφύμιον appellant, nullum quidē ex prædictis, præterquam plenitudo interdum præcedit, sed victus humidior, calidiorq; balnei immoderati vsus, calidū nimis loci inhabitatio morbum facere videbitur, & neque inflammationes, neq; febres, neq; dolores experientur: sicut in iis euenit qui exeso vasorum corpore, ἀνασφύμιον appellant, sanguinem reiciunt: Imo contra leuius faciliusq; agent (vt verisimile est) euacuati. Quod si hæmorrhoides, aut mulierum menstrua, nō respōderint, etiā periculis, erumpens sanguis subtrahet. Idem verò hic pariter iis qui ex vase plenitudinis causa rupto vacuantur, satis ad valetudinē proderit, nisi ex vlcere, aut immodica vacuatione noxam senserint. Quæ verò exesis vasorum tunicis sanguinis sit euacuatio nunquam cōmode cadit, facitq; valetudini. Quod si per vomitum excreetur, clarū est eum ex stomachi, aut ventriculi regionibus procedere. In quibus & per annū infra descendens nonnunquam vacuatur. Si cum tussi, ab instrumentis respiratori dicatis prodir. Iam verò si spumans & subalbidus sit ex interualloq; reieicitur, vt dolor absit, & pressio, ex pulmone ferri notum est: In quibus temporis spatium, febris sequetur cōtinens, præsertim iis quibus ex erosione profuit,



& non nihil ex pulmonis substantia, aut arteriae asperae circulus qui *βρόχιον* dicitur, aut vena egeratur. Notus certe quidam mihi est ex iis qui sanguinem è pulmone reiciunt temporis processu maxima cum tussi, & sanguinis copia, calculos quatuor, aut quinque; expuisse asperos tribulorum modo, ad magnitudinem siliquarum trium, aut quatuor, ac deinde dolore leuatus est. paulo post tabe consumptus interiit. Porro si pituitosa cum tussi leuiore, vel scretu quoque adantur, eaque spumosa leuiaque, ex aspera arteria prodire scito. Si vero ater sanguis & in grumum coaceratus fuerit dolorumque in loco testetur, ex thorace educi significatur, per pulmonem arteriamve translatus: Qui vero scretu, ex faucibus per palatum educitur. Ceterum si quando a capite destillet, cum irritatione quadam, & tussi editur, ut qui ad asperam arteriam caput defluat: iterumque sursum feratur. haec acris plurima ex parte distillatio, vel capitis dolor, vel grauitas praecedat. Accidit autem nonnumquam per palatum sanguinem vacuari, & propter hircinam deuoratam, & alicui indidem particulam adhaerentem. Verum de hac in libro de venenis pertractabitur.

*Curatio.*

Quibus distillatio cruentum sputum concitauit, vena protinus debet incidi, nisi vehementer acris humor destillauerit, ac pro virium modo sanguis detrahi. Extrema deligari, oleoque veteri calido. vel sycionio praeter caput perfricari. cibis adhiberi. frumetaceus cui succus alicuius austeri adiectus sit, ut mali granati, pirorum, malorum, vel illa eadem simul incoquatur. dormituro ex pastillo diaelectru datur tertio die mellis cocti momentum delingitur. Quod si morbus longior haec vicerit, capiti raso medicamentum, quod ex fimo syluestrium columbarum constat, imponis, & post tres horas medicamento deposito, balneo egrum committis, sic ut caput nequaquam inungatur. Deinde ubi sorbitionibus alueris, somnum capitulo, Theriace antidotum datur, iterumque die insequenti, ubi dederis, similiter totum corpus, praeter caput perfricato. huic autem ceratum ex thapsia, aut aliud quoddam iniicietur. & rursus utendum sorbitionibus. Quod si malum in vetustate incidit, cucurbitula occipitio defigenda est. At si acris admodum fuerit distillatio, sanguinis detractio cauere debet: alimentis autem & praesidiis iis tum quae supra, ubi de distillatione egimus comprehensa sunt, tum,



tum quæ mox dicentur, vtendum. Qui ob frigoris iniurias sanguinem spuunt, thorax illis fouendus est remediis, quæ calfaciunt ipsum simul & desiccāt, quod præstat medicamentū diadyopeperion, id est, quod duplici pipere constat, vna cū pastillo diaelectru, hoc est ex succino exhibitū. Atqui ex respiratoriis sanguinē reiciūt disruptis oris venarū aut pate factis, venā iis secare cōuenit, nisi sanguinis copia prorūpat. omnes autē quos hoc vitij premit locis aëri expositis decū bēt, lecto immobili, figura sublimi, cauentes ne vehemēter respirent loquanturq;, imponenda autē extrinsecus supra partes affectas, spongia ex repente posca. A septimo die lana succida cū rosaceo, vel myrteo, vel lentiscino, cui interim acetū interim vinū austerū sit additū: si copiose effertur, farī næ pollinem, & mannā thuris cū aceto superaccōmodamus, vel alumen, vel acaciam, vel malicorium, vel gallam cum aceto, vel palmulas cum polentis, & malis cydoniis in vino austero decoctas. post hæc autem & emplastrum diaiteon hoc est ex salicibus iniiciendum, præsertim vbi moderatior sanguis fertur. Per os autem hæc sumpta proficiunt. portulaca commanducata benefacit. efficacior autē succus ipsius epotus, balaustiū, rubi fructus & flos, quercus mēbra na cortici subiecta, & quæ glandis putamini subest tunica, maxime vero cocta ipsa vtuntur: fagi autem & ilicis membranæ præstantiores sunt, terra samia quæ aster dicitur, ad omnem sanguinis reiectionem. Item lemnia sphragis, lapis hæmatites in tenuissimū pollinem detritus cum succo mali punici, vel polygonij. pondus autem lapidis erit scrupulus vnus. Composita medicamenta hæc prosunt, pastillus diaelectru, diacoralliu, & qui ex spina ægyptia conficitur. item puluis confectus ex terra samia quæ ἀστὴρ dicitur, lemnia sphragide, corallio, simphyto, amylo, omnibus pari modo. In his autē qui corrosis partibus expuunt sanguinē, idq; potissimum, vt desillatio præcesserit & opij partem semissem adiicimus. Insuper medicamentum his facit, quod samij asteris, agerati lapidis, lemnia sphragidis, æquas portiones capit: duobus cochleariis potum ex duobus plātaginis succi cyathis. A L I V D. Lemnia sphragidis drachmas sedecim, samia terræ, quæ aster dicitur drachmas octodecim, amyli drachmas octo. sarcocollæ drachmas quatuor gummi drachmas duas, pulueris cochleare vnum cum decocti palnu-



larum cyathis duobus. Superbibant autem etiam poscam frigidā, vel palmularū, vel malorum, vel pirorum, vel pampinorū vitis, vel eiusmodi cuiusdam decoctum. nutriuntur vero, si vires quidē requirant, ad secundā tertiāve horam, sin minus circiter quartā. Panis sit lotus ex aqua frigida, vel alica, vel chondrustcū quodā succo refrigerante, puta mali granati, vel myrti, vel omphacomelitis, vel oua sorbilia, vel aliquod ex lacte bellarium, cum quodam astringente. Inter olera, feris, cichorium, plantago, cum oleo immaturo, acetōq; incocta. Ex fructibus mala, pira, mespila, malum granatū, corni fructus potus erit si febris careāt, vinum aquosum, modicū: si febris adest, ex prādictis quādā potio, vel hydromalum cibariticū. Porro qui vomunt sanguinē, iisdem sustē tandi sunt, sola hac cura adhibita, ne crebro cibum sumāt: quippe ex facili curantur: quandoquidē auxilia etiam quæ bibuntur particulis ipsis sanguinem fundentibus palam appropinquant. At sanguine in ventriculo grumi instar concreto, coagulum potandum est maxime leporinum, aut lixiuium ex fici cinere, cū aqua, vel thymū, vel sarureia cū aceto, vel etiā ex lacte scissili vacuari debēt, aut ex aloe. Rursus qui per palatum sreatu sanguinem reiiciunt, gargarizabunt ex astringentibus, frontique & capiti admouenda sunt quæ ex naribus sanguinem fundentibus accommodantur. Hęc eorum qui sanguinem expuunt curatio est, quam summa obire cura conuenit propter imminens ex immodica vacuatione periculum: siquidem copiose vacuatus sanguis quemadmodum in his qui iugulantur, mortem infert præsenteam, si affectus remanet, in tabem transire minatur. postquam igitur omnia, vt postulat ratio, peracta fuerint, & sanguinis fluor substituerit, vires ipsis recolligendæ sunt, roburque adhibendum, ac recentium porculorum petunculi ac cerebella huc faciūt: corpus perfricari debet. vitari autem, balnei frequens vsus, & vini potio, ira & venus.

† Scriptura quæ est in veteri codice est multo verior, μετὰ τινος τῆς φόντων χυλῶν οἷον ροιᾶς ἢ μύζων &c. id est, cum aliquo succo adstringente.

*Depurulentis & tabe quæ phthisis dicitur.*

CAP. XXXII.

**P**ris illuies quod ἐμπύημα græcis dicitur, in va cuius thoracis regionibus, vel membrana quæ costas succingit, colli



colligitur. interim propter sanguinis educationem, vlcere ad cicatricem non perducto, quod etiā tabes statim comitatur si ex pulmōe fiat reiectio: Interim ex inflāmatione suborta: quæ deinde in abscessum conuersa, rupta quæ fuerit, quæ admodum & in laterum doloribus, quam pleuritidem vocant, nonnunquam accidit: vel propter confluxum ex capite manantem. notæ igitur empyematis adhuc consistentis erūt, grauitas thoracis, tussis valida, sicca quæ cum dolore, aliquando etiā cum humiditate, ob quā releuari quoque videntur, febriculæ per initia affligunt, languidæ, inordinatæ, & ad iudicandum difficiles. postquam vero abscessus ad vomitum inclinauerit, vehementius cum quodam horrore febricitant, ac in sermonis proprietate conturbantur, spiritu molestati. Rupto abscessu, pus educitur, nunc purum, nunc faculentum. & nonnunquam sursum abscessus erumpit: quando etiam periculosior est: nonnunquam infra. Ac ea quæ inferius tendunt, partim in ventrem & intestinum transsumuntur, partim in vesicam traductione per vasa quædam administrata. semper autem febri hectica laborant, quoad sursum omnia fuerint educta. In quibus, nisi summa adhibeatur diligentia, protinus purulenta illa collectio in tabem quam phthisin græci vocant transit, pulmōe exulcerationem sustinente. In qua iam phthisi confirmata, genæ liuescunt, desudationes in fronte, ac ceruice fiunt, carnes colliquantur, vngues curuantur, pinguesque & exalbidi vel pallidi apparent. Malo iam vincente, venter turbatur, præcordia sursum conuelluntur, sitis ipsos magis conficit, cibi quæ fastidium vrget, & id quod sursum vergit, vehementer fædi odoris est.

*Curatio.*

PRIMUM igitur puris collecti concoctio adiuuanda est fomentis per spongiarum, & cataplasmatum, ex hordei farinis cum ficis pinguibus incoctis, resina modica, columbarum simo, nitro, & hibisco. Rupturam vomitæ promouet etiam sani lateris incubitus. mulsæ autem sorbitio interposito tempore, & prisanæ cremoris cum melle. Valentiores, bibant decoctum quoque hyssopi, & thimi cum melle. opitulatur etiam rupturæ, & salsamentorum esus, & catapotia hieræ diacolocynthidos dormituro data. At ubi pus excerni cœperit, iterum dabitur hyssopi, iridis, & dulcis radicis decoctorum



in mulsa potio, vel dulcis radícula cum sisamo detrita. Item pollen, mulsa & oleo incoctus superaccommodatur. Quod si vlcus agre possit sursum repurgari, compositis vtendum est, puta medicamento dia prassiu, hoc est ex marrubio, simplici & composito. item, dia orobon, id est, eo quod eruis constat, necnon dodecatheo & phyloxeno appellatis. Verū in tabem quæ phthisis dicitur prolapsis, porra capitata, quæ in chondri & ptisanæ sorbitionibus contabuerint, exhibentur: quæ simul per se bis cocta offeruntur. Potus autem aqua cœlestis erit, atq; mulsa inde confecta. Extrinsecus applicantur per initia quidem remissionum, cataplasma ex semine lini & polline ex decocto fœnugreci, vel maluæ, olei, mellis & foliorum altheæ. temporis autē processu, ad cerata ex butyro, cyprino, laurino, & iride trāsitus est. quin & emplastri Mnasei vsus conducit. Verum si thorax fluxione infestetur, medicamentum diaiteon, hoc est, ex salicibus confectum recte imponitur. atq; superius in purulentis simplicia dicta, nonnullaque composita ipsis propinātur. Tussi vero grauitè affligente, thymum, hyssopum cum succo radiculæ dulcis melle decocto excepta, formataque, sub lingua tenenda dantur. Caterum conueniet ipsis & antidotum Mythridatis, diebus intercedentibus: sic quod viperis constat. Optimum vero auxilium est, & boli armeni potio. item Efdra Antidotum, nihilo prædictis minus proficit.

*De laterali dolore, quæ pleuritis dicitur.* CAP. XXXIII.

**P**leuritis, qui nobis lateralis dolor appellatur, proprie inflammatio est membranæ, quæ costas succingit. Huic si mul accedit spirandi difficultas, tussis, febris continua, dolor vsq; ad iugulum & præcordia pertinens. Sed pleuriticus morbus à iocinoris inflammatione, in qua etiā omnia modo comprehensa apparent, his notis discernetur, quod pleuriticis dolor punctorius adsit, tussis aliàs sicca, cum & crudus morbus significatur, aliàs cū spūto, quod humoris qui morbum facit index est. Rubrum siquidem & subcruentū æditur, cum sanguis superat. Flauum vero & subpallidum, cum flaua bilis: quemadmodū rursus album, & leuiter spumofum, cum pituita. Ob melancholicum vero succū: nigrius pulsumque durum & ferræ modo inæqualem obtinēt. Iocinoris autem inflammationi, neque punctorius dolor, neque pulsus adeo durus superuenit, verum tussis perpetuo

sic



secca & quæ nihil emolitur, male habet : facies pallidior apparet. At quibus pleuritides ex musculorum exteriorum inflammatione creantur, quæ proprie pleuritides non sunt, iis cum eò quòd sint sine tussi, sine sputo, ac sine pulsus duritie, ad manus tactum locus affectus indolescit : atque si tumor purulentus non fuerit discussus, extrinsecus incidi postulat, cum pleuritis quæ inflammationi membranæ costas integrentis fertur accepta, eò non feratur. Illa nanque, nisi vel extra, vel intus, expurgetur, purulenta colluuiis empyema Græci vocant, multo citius in peripneumoniam degenerat.

*Curatio.*

**I T A Q U E** si dolor ad iugulum vsque peruenit, remediũ est sanguis dimissus. sin autem ad præcordia descendat, purgatio. Recetiores autem omnibus venã incidunt, veriti, vt opinor, turbationem, quã purgatio solet accersire. Quod si vires non patiantur, neutrũ facere oportet: clysteribus acris vtendum: & si quidem dolor fuerit mediocris, aqua mulsa, & ptisanæ, vel chòdri cremor propinari post illos debet. Vbi morbus inclinauerit, porrum cremoribus recte iniicitur, vel calamintha, vel pulegium, & vrticæ semen, cum melle delingitur. Porro vehementes dolores à corporis vacuatione leniendi sunt lana calente, aut sulfurata imposita, aut etiam fomentis ex milio, aut furfure per sacculos adhibitis, aut ex aqua calida, aut oleo in vesicula. Lana sçq; succidas imponere vtile est cum oleo & vino ex marina præparato. Vel sal iniicere, vel cataplasma diaspermon id est quod seminibus constat ex decocto chamæmeli, althææ, vel ficorum pinguium, iridis, absynthij, mellis modico cum oleo nardino. Quarto die cibi erunt sorbitiones cum mellis momento à septimo autem linctus ex amygdalis, & vrticæ semine, ex melle simul contritis dabitur, vel eclegma quod ex butyro, & melle coctũ est, vtẽdumq; medicamento ex melle cocto, quod quia sub lingua tenetur, Græci vocant hypoglottida. Epithemata cõuenient cũ quod à graui odore dysodes nũcupat, tũ diasampsuchu, id est quod cõstat amaraco. Itẽ emplastrũ peganera dictũ, locis dolentibus vtiliter accõmodatur. Præterea ad curationem bulbi cum axungia cocti frequẽter fuerunt abunde. Aluo iniici debet ab inferioribus partibus butyrũ & terebinthina. At efficacius eclegma est ex fructu piceo.



piceæ, amygdalis amaris, lini semine, nucleo pineo, & amylo æquali portione cum melle. Quos torquent vigiliæ medicamen diacodyon delingere conueniet. Ex antidotis, & Athanasia, & aliis ad hoc compositis vtemur. Post quartūdecimum diem, si malum remanet, cucurbitulæ ipsis admo- ueri, tenuiorq; seruari victus debet. Deinde morbo inclinante balneo æger credetur, frigus vitabit, solidiore vtetur cibo. At si inflammatio membranæ costas integrentis non discussa, in pus transire videatur, supra commemoratis vtendum.

*Ad laterum dolores sine feбри.*

L A T E R V M doloribus sine feбри, bdellium medetur, & costus, brassicæ caulium combustarū cineri adipiq; mixta. Nam id medicamenti affatim discutit.

*De cordis affectibus.*

C A P. XXXIIII.

C O R D I S affectus si quidem primario accidit, omni destitutus medicorum auxilio, in præsentaneam mortē præcipitat: nempe cum inflammationem, erysipelata, & interperies validas in acutissimis febribus ipsum experitur, vel sanguinis profluuium ex sinistri potissimum ventriculi vulnere. At si consortij lege afficiatur, cerebro, iocinore, ore ventriculi laborante, tum si ob tristitiam, metumq; & alias plerasq; causas, syncopen appellatam, quæ subitus est viriū collapsus sustinebit, quæque indicatur, animæ defectu, pulsuum paruitate, extremorum perfrictionibus, & sudore circunfluo. Quæ inquam syncope, si valida est, medicinæ locus non est. Si vires adhuc tantillum constant, aliquando ad sanitatem recursus est. Itidem valentes cordis palpitaciones sæpe ex sanguinis in eo concepti copia, aut feruore contrahuntur. Idem vero cor si incaluerit, magnam crebramq; ædit respirationem. si perfrixerit, paruum & raram, quomodo autem cardiacæ syncopæ possint emendari, secundo volumine, inter ea quæ febribus superueniunt, sumus executi. Tantum vero hic adiciendum est, si symptoma euincit, postquam extrema perfricata fuerint, inunctaq; & post puluerem ex pauimento iniectum aliaq; viriū recreationi apta, particulis sudore diffatis inicere emplastri modo conuenit myrtum detritam, vel cimoliam cretam, vel succinum, vel malicorium cum manna, vel terram samiam cum gummi. Extremis autem frigentibus adusque inguina & alas si-

pi,



pi, vel pyrethrum, vel adarce imponitur. Cibus erit panis ex aqua, aut vino frigido temperato, suum petunculi, articuli, rostra, alæ, omniaq; frigida. Capiti fronti; omphacinū, aut astringens aliquod cum gummi, vel rosarum decocto imponetur. Præcordiis & stomacho cataplasma admouebitur ex palmulis, rosis, cœnanthe, acacia, hypocyfide & alumine.

*De palpitacione cordis.*

NOVI (Galenus inquit) qui annis singulis verno tempore, cordis palpitacione affligeretur. Aduersus quam venæ sectionem triennium expertus commodam, quarto anno sanguinem prius misit quàm symptomate corripere, atque ita securus fuit, eoq; modo multis subsequētib; annis factitauit, & cōuenienti victus ratione vsus est. attamen & hic ante senectutem, fato functus est, quemadmodum alij quoque omnes, nonnulli in febribus acutis subita syncope oppressi similiter interierunt. alij ipsorū etiam citra synopen, veluti apoplexia tentati repente diem obierūt. Complures ita affectorum ætatem egerunt, minorem annis quinquaginta, maiorem vero quadraginta.

*De mammillarum affectibus.*

CAP. XXXV.

Ac à partu sæpe casei modo coactum mammillis inflammationes parit. Utendum igitur per initia est hisce rebus. spongia mollis posca tepente imbuta, expressaq; loco appositè superaccommodatur illigaturq;: vel palmulæ cum pane ex posca in læuorem contrita, vel ouo toto vtendum est cum rosaceo, & cerati momento, vel alumen, psylliumque cum coriandro, vel portulaca applicato. Vel lapis pyrites tritus cum cerato impositus illigetur. At distentione oborta, vel lacte in grumos concreto, panis ex hydrelæo, aut mulso instar cataplasmati inicitur. Aut panis cum perdicij herba viridi simul cum cerato, bis quotidie, aut lomentum cum hydromelite, vel sapa applicatur. Quòd si vero pòdus ferre non poterint, superfusione vtendum est ex dulci oleo calente, per lanas delicates. Fotus autem adhibendi ex vapore calidæ aquæ, vel decocto fœnugræci, vel althææ, vel apij seminis. Delinere vero māmillas conuenit polline farinaceo cum semine lini, aut fœnugræco cum hydromelite, aut sesamo quod cum melle aut butyro sit leuigatum. Cæterum ne lac exugatur cauendum est, nam maior per lactationem materies illuc citabitur. Inclinante autem inflammatione,

*ad sac  
bifm videri  
fid m ples  
optimi parat  
parba m  
plure acito  
ra lide impo  
nito p p f*



matione, cerata hæc recte induces, betam oleo incoctam quoad intabuerit, ipsam quidem proiicito, oleo autem ceræ modicum iungito, ac vtitor. *ALIUD.* Quorum crudorum lutea decem, cerato miscentur, cui vnciæ duæ & semis ceræ, rosacei vnciæ quatuor sint adiectæ. Postquam radícula agitataueris, muria quantum recipere potest indito, & rursus ubi permoueris, vtitor. Porro ad mamillarum duritias, facit & medicamentum ex melle: tum omnia medicamenta molliendi facultate donata. Cum vero in abscessum vertitur, iis vtendum est, quæ in parotidibus comprehensa sunt, item illis, quæ, ubi de ascessibus tractandum erit, enumerabimus.

*Archigenis de erosione mamillarum cum malignitate.*

*VINI* Adriani boni sextarij viginti, rhus quo coriarij, vtuntur libra, cupressi pilularum tantundem, gallæ omphacina nigrae selibra, casia tantundem. Contusa vino diebus decem commadescant, deinde coquuntur agitata cupressi rudicula, donec dimidia ferè pars fuerit absumpta. atque tunc herbæ proiiciuntur, succus coquitur dum mellis spissitudo fiat, deinde vitreo vase reconditur. In vlceribus depascentibus mero vtitor. Sin autem crassius fuerit medicamē, vino liquari debet: vt applicetur mamillis depastis, auribus suppuratis, gingiuis ex humiditate putridis, intestinorum torminibus. Idem vero dolores etiam lenit, lacte dilutum. Aliæ mammaram exulcerationes communem reliquis vlceribus curationem recipient.

*Quomodo mamille conseruentur.*

*CVMINVM* cum aqua tritum mamillis obducitur, deinde spongia extrinsecus imposita, ex posca pectus cinctura stringito, à tribus diebus cumino deposito, mamillis florem bulborum cum melle superaccommodato. Et deligatum rursus triduum finito, idq; ter mense facito. *ALIUD.* Cicuta in pollinem detrita, ad nouem dies imponitur: spongiaq; extrinsecus, sicut comprehensum est: pauculis diebus interpositis idem facito: *Quin & Naxia* cotis detrimentū, virginum mamillas conseruat tueturq;.

*Ad sedum axillarum odorem, sudationesq;.*

*ALVMINIS* liquidi partes duæ, myrrha pars vna. Vino dissolutis vtitor. *ALIUD.* Plumbaginē combustam, vinoq; odorato extinctam, ex vino terito, myrrha momētum iniiciens quoad sordium fiat spissitudo, ac vtitor. *ALIUD.*

Argen



Argenti spumæ drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ duæ, amomi drachma. vino excipiantur. ALIVD. Aluminis liquidi drachmæ octo, amomi, myrrhæ, spicæ nardi, singulorum drachmæ quatuor. vino leuigatis vtitor.

*De stomachi, præcordiorum & ventriculi affectibus.*

CAP. XXXVII.

**D**E cibi fastidio quod febribus superuenit, grandi fame, quam Græci bulimon vocant, canino appetitu, stomachi imbecillitate, animi defectu, insuper siti, singultu, nausea, & syncope, libro superiore, vbi de febribus tractatū est, abunde differuimus. quare de eisdem rursum dicere opportunum non est. At inflammationes oris ventriculi, & iocinoris, astringentia misceri desiderant. Nam si sola relaxatoria medendi ratione curationem tentes, vitæ periculum intuleris. Ob quam causam, siue oleum fuerit quod superfunditur, siue cataplasma, recte adiicitur astringēs aliquod, verbi causa, absynthium, vel nardinum vnguentum, vel melinum, vel & malum cotoneum incoctum. Ceratum vero eius notæ est quo subinde vtimur, ceræ candidæ vncia, per æstatem drachmis septem, aloes, mastichæ, singulis drachmis, olei omphacini, vel melini, & nardini quantum ad spissitudinem in vsu satis est. Sin maiorem requirat astrictiōnem, vbi tam fuerit imbecillus, vt ne cibus quidem sit retinendis, admisceatur etiam omphacij drachma, aut absynthij succi æqualis mensura, & tertio ad hæc hypocistidis, cennanthæ, & rhus succi. Augendus autem cerati modus, qui aliorum medicaminum numero proportionē respondeat. Quod si inueterascit inflammatio, indurescitq; , varia iam magis applicare oportet. tum ea quæ ex aromatis nonnihil, & emollientibus, discutientibusque continent, cuiusmodi est quod ex meliloto præparatur. philagrianum, & quod ab odore grato *ivvñlis* dicitur, & viridis iaspidis torques à collo suspensus, vt stomachum contingat magno est præsidio. In calida autē stomachi intemperie & ardore cum eius resolutione, vel animæ defectu, vel quodam cibi fastidio, ex quacunq; tandē occasione, præterquam febri, aqua frigida cum vix acerbæ succo propinatur, vel malorum cotoniorū decoctum, vel pampini vitis, vel semen cucumis leuigatū cū frigida. Verum stomacho vesicā aqua frigida repletam, vel  
cucu



cucumeris ramēta imposito. Catapotia quæ siti restinguenda sunt, danda, vt supra de siti à nobis dictum est. Porro medicamen quod stomachum ex humiditate superflua imbecillem, refrigeret confirmetq; , istud est. Rosarum viridum foliorum drachmæ sex, dulcis radiculae succi drachmæ quinque. vino dulci excipiuntur, & vt sub lingua teneri possint, formantur. Cæterum in quibus crassior pituita calefieri incidiq; desiderat, hoc medicamentum proficit, fœniculi radicis corticis vnciæ duæ, aceti sextarius vnus & dimidius, aloes quadrans, mellis libræ quatuor. Radices cum aceto coctæ exprimuntur, abiiciunturq;. Mel autem inditum ad spissitudinem vsq; coquitur, & tunc aloë trita inspergitur. Triahuius cochlearia cum aqua sumuntur. quidam vero sine aloë ipsum præparant. iam vero medicamentum diacalaminthes his idoneum est. Quibus autem cibus acescit, coriandri feminis drachma, polentæ modo inspersa commode bibitur, vel mastichæ cochlear, vel lactucæ albæ feminis cochlearia duo. Compositum autem hoc est, piperis drachma, anethi drachmæ tres, cumini drachmæ quatuor. trita cochleari vno noctu sub somnum ex vino temperato præbentur. Porro in quibus atra bile vitiosus est stomachus & inflammatione laborat spongiæ in accessionibus oleo acerrimo imbutæ applicentur. Deinde si malum remanserit, alumen cum are læui, melle exceptum admouetur, sereos succus bibitur, vel menta potui inspergitur. Si flatibus turgent stomachus, & distenditur, calaminthes decocto, mediocris mellis piperisq;, mensura mixta exhibetur. Ad stomachi peruersiones conueniunt mali granati acidi nucleorum succi partes tres mentæ succi pars vna. Vbi coxeris quoad in vnitatem coierint, ante cibum, mystrum vnum dato.

*Ad stomachi saluam.*

ACETO scillite, aut sale conditarum oliuarum iure, aut summitatis oleæ decocto os colluatur, aut etiam minimum ex ipso deuoratur. Inter omnia præsentissimum est, aloë aqua diluta. Ad eos autem qui cibum non continent, quos veteres proprie stomachicos nominant, fœnugræci farina melli mixta, & malux semen tritum aridum applicatur. celeratum vero ex cera, irini olei facce & castoreo.

*De cibi fastidio quod Greci ἀρεγξία vocant.*

FASTIDIUM, quod anorexia dicitur est, cum stomachus



chus aut intemperie viciosus, aut humorum redundantia pressus cibos auersatur. Calidam intemperiem testantur, sitis, nidorosi, oletosiq; ructus, si cibus quodammodo præter voluntatem sit assumptus. item si frigidiora potius & elaboratu peruicacia, hac detenti queant concoquere. Frigidam contraria indicant. neque enim in hac ægri sitiunt, neq; frigida sustinent, & acida nonnunquam eructant. Qui humorum vitio cibum respuunt, partim ob tenuitatem ac rosionem illorum ita laborantes, ventriculi demorsu torquentur. nauseaq; magis & siti conficiuntur. Quibus autem humores cõputruerint, interdum ij etiam febricitant. At quos crassi viscosiq; succi male habent, ij plane nec rosionem ventriculi, nec sitim experiuntur. communiter autem omnibus superuenit nausea. porrò si in ventriculi sinum humores se receperint, etiam hos ipsos euomunt. si vero, infarcti vel etiã imbibiti tunicis adhærescunt, nausea solũ, non vomitu premuntur, præterquam cum cibos assumpserint. Qui igitur ex calida intemperie fastidio laborant, refrigerante victu curantur, præcipue qui ex aceto assumitur. Panis ergo posca imbutus elui, ipsaq; posca potui datur. Item ozigala, & quã Romani melcam appellant, quod ex lacte quoddã est opsoniũ, intybi & portulaca, interim etiam aqua frigida, omniaq; mediocriter secundum eius quæ subest intemperiei contrarietatem. Nam immoderatus horum vsus, non modo nõ iuuat, sed etiam sæpe insanabilem morbum efficit. Frigida intemperie laborantes, contrariis medicari conuenit, vino veteri & condito, hydrogaro, item anisi, rutæ & petroselinĩ decocto: iam pipere ex aqua calida communi, vel etiã ipso medicamine, quod inscribitur diatrion pipereon, vel cui nomen est diacalaminthes. Dabis etiam nonnihil theriacæ ex viperis cõfectæ, quæ nec ipsa, fastidio ob humorum copiam laborantibus inidonea est. insuper allia his & alimēti & medicaminis nomine conueniunt. Sin autem humorum abundantia fastidium excitarit, tenues, mordacēsq;, aut vomitu, aut per aluum euacuabis. facilem itaque vomitum reddit aqua tēperata, vel mulsã dilutissima præbibita. Satiùs fuerit, si ante hæc humectantia exhibeas alimenta, veluti ptisanæ cremorem, vel ouorum lutea. Cæterum quomodo ex facili vomas, priori libro est expositum. At si difficilius ager vomat, præstat materiam ad aluum elicere copiosiore tem-



peratoq; alimento his prius humectatis. Purgans vero medicamentum esto, vel picra ex aloë, vel ex malis cotoniis præparatum, cui adiectum sit aliquid scammonia, vel quod constat rhodomelite. Si verò citra scammoniam aloës potius copia ipsos euacuare liceat, melius feceris, eò quòd illa stomachum offendat. Quibus crassi humores viscosiq; fastidij authores sunt medeberis extenuando ipsos incidendoq; tum oxymelite, tum iis quæ ex hoc & muria cõponuntur, vt capari, oliuis, sinapi & similibus. Non inepta sunt his, & quæ ex frigida intemperie fastidientibus consulimus, maximè post vacuationem, quæ nimirũ fiet oxymelite Iuliano. Extrinsecus vtendum quæ calfacere stomachum & corroborare queant, inunctionibus & malagmatis, qualia sunt potissimum quod dicitur diaomphacos, & Marciatum aliaq; consueta vnguina: insuper epithemata, Baiiũ & Euodes huiusq; notæ reliqua: his addentur exercitia & frictiones potissimũ. Adeos qui frigidi humidiq; humoris, vel talis intemperiei vitio difficulter concoquunt, cibũmq; respuunt, ea quæ ex malis cotoniis confiunt, pertinent. Dico autem quod vocant meloplacuntion, item quod ex malorum cotoneorum succo præparatur, tum quod ex carne eorum constat. præterea dia citriu, idest ex cytrio cõfectum. Malagmata vero, Marciatum & quod ex acerbæ vux succo componitur, item Baion, Polyarchion, atq; his finitima. Sin vlcus fuerit in stomacho, aut ventre, omnibus acribus & cibis & potionibus abstinere oportet, vti vero medicamentis quæ leniunt, puta sorbitionibus ex oleo, tum iis quæ ex amylo, terra samia, lemnia spargide & lacte, vel melle paucissimo conficiuntur, vt etiam purgent citra rosionẽ. Epithema facies ex palmulis cotoneis, & polenta. Ceratum ex melino, vel rosaceo cũ ammoniaco & thure. Ad hæc Nelei epithema conducit, & emplastra ex falicibus, & Icesion. Notæ vlcis sunt vomitus sanguinis, vel puris, vel etiam ramentorum.

Ad solutũ imbecillẽmq; stomachũ, & ob hoc cibũ nõ cõcoquentẽ, valet hoc; Aloës, masuche, mastyches, styracis singuli sextantes, absynthij triens, cœnanthe quadrans, gleucini selibra, melini quadrãs vini quod satis est. Nõnulli etiã cyphæos & rosarũ singulos sextãtes miscent. Hęc in leuorẽ reducta, purpura, vel lana, excipiuntur, ac stomacho imponũtur. Quidã cerę selibrã adiungẽtes, epithema ipsum faciunt.

Ad



*Ad ileosas stomachi affectiones, hoc est vehementes & conuulsorios dolores.*

OPTIME facit pastillus Amazonū: inuenies autē huius scripturā, tum aliorū ad stomachū compositorum materiā ad calcem libri de medicamentis compositis explicatam.

*De flatu ventriculi.*

CAP. XXXVIII.

**F**Latus in ventriculo generantur, humoribus, vel cibis, exigua caliditate in vapores dissolutis. nā frigiditas hoc nomine quod extenuare ac dissoluere non sit idonea, nullos flatus procreat. Vehemens caliditas cum nō tantū extenuet, sed etiā discutiat, flatus generationem impedit. minor verò caliditas diffundit quidem & transmutat alimentum, verū minus quā opus sit: vnde flatus excitantur: quare calidis eos medicamentis extenuare conuenit, cumini semine, & api, & spondyli, & dauci, in oleo decocto. Vbi verò adfectioni adest frigiditas, ruta, bacca lauri, nigella, & feniculū oleo incoquantur, misceturq; bitumen & oleum laurinum. At si inflammatio dolores comitetur, in vicem calefacientium laxantibus vteris, acetum decoquens, cui gallinæ anserisq; adipem adicias. iam verò polij fasciculus, vel calaminthæ decoctum cui mellis pauxillum cum piperis drachma sit iunctum, flatibus infestatis auxiliatur. Hæc itaque, dum vehemens dolor inciderit, adhibenda consulo. dum mediocris, etiā fomenta ex milio sufficiunt. Cæterum cucurbita bonæ magnitudinis umbilicum vndique comprehendens toto symptomate frequenter subito liberat, castoreūque ipsis prodest, tum ex posca potum, tum extrinsecus cū oleo ficyonio appositum, vel si cum tormine intestinorum flatus incidant, medetur. Item talus suis combustus, potusq; tormina & flatus tollit. Idem facit aristolochia rotunda. Iam verò aduersus dolores flatuosos ex ventris obstructione, vel crassitie, vel perfriktione obortos, vinum meracius, à cibo sumptum proficit. Vbi somnus accesserit, etiā ex toto leuat affectos.

*De cholera.*

CAP. XXXIX.

**C**Holera est immodica ventris perturbatio suprā infraq; ex continua ciborum cruditate proueniens. quæ inquā cruditas nonnunquā ex magna alimentorum prauitate, interim ex vitiosorum humorum superfluo contrahitur. Si igitur nauseabundus ager est, & turbatur, cibis etiamnum



crudis in ventriculo manentibus, aqua tepida propinari debet, deinde vomere oportet, digito, vel pinna ori indita: item alui ductione adiuuandus est. Vbi verò hæc exinanita est, conquiescere, & præcordia oleo dulci cum vini modico, vel mastichino, vel etiam nardino si hyenis fuerit fouere cōueniet, somnūq; permittere. Vbi iam exacta apparuerit concoctio, balneis & probi succi cibo vtendum est. At si inani- tio fiat immodica, sufficient quidem initio vel ea quæ secūdo libro de ventris perturbatione comprehensa sunt. Sin autem perseueret euacuationis impetus, venter concidat, pulsus minor crebérq; euadat, cataplasma adhibendum ex palmulis cū cēnanthe & acacia, item hypocistidis & malicorij succo. Adhæc offerendus est ad sorbendum aquæ medio- criter frigida cyathus. Præstiterit rosarum, vel cēnanthæ, vel rhus, vel vitis capreolorum decoctum, vel mali granati acidodulcis succus, cui mentæ paxillum sit inspersum. Por- rò si excrementa fuerint acriora, vexétq; ardor, & sitis, cu- curbitæ semen cum aquæ cyathis tribus, tum intybi, & por- tulacæ in posca coctæ alimenti nomine exhibeantur. Verū si fluxio sisti nequeat, vinū quoddam austerum, potui dandū est. si febris absit, palmatianum, vel aminæum, vel spathites, vel omphacomelites. Sin absit, rhoetes, vel myrtinum, vel cibyriticum hydromalum & potui, & cum mica, vel halica, vel chondro. At si respuant cibum frumentaceum horarios seu fugaces fructus mandent, mespila scilicet, vel pira, vel mala cydonia, vel punica: quod carnosum est & durum ex- puant. Si ne his quidem auxiliis cibum retinent, extrinsecus contra ventriculum ipsum, cucurbita leuis quam maxima admouenda est. Dum autē ipsa adhæret cibo aliquo ex præ- dictis ali debent. Ad conuulsorias autem contractiones cali- da linimenta, oleo, imbuta, musculis circumponere oportet, tum cerata liquida, quibus adiectum sit aliquid castorei & ficyonij. Ante hæc artus aqua calida superfundendi. At si vi- giliæ torquent, somnus, iis quæ aduersus illas prodidimus, conciliabitur. Si vires autē non prohibent, etiā medicamen- tum diacodion ipsis propinabitur: vbi morbus inclinauerit, ad balneū deducuntur, cibus ad refectionē, pulli gallinacei erunt, colūbe, vel suum petunculi, similiave. Alui profluuiū, *διὰ πύλου* græcis vocatur, quod ciborū corruptela est, plerūq; sua sponte cessat, ægris nō citius alimentū sentiētibus quàm abso



absoluta facta fuerit concoctio, & corruptorum euacuatio: sin autem remaneat, iis quæ in cholera dicta sunt, utendum.

*De leuitate intestinorum quæ lienteria dicitur & cœliaco*

*affectu.*

CAP. XL.

**C**Um lienteria duplex sit species, vna sane ex superficiali intestinorū exulceratione: secundū quosdam verò etiam ex cicatrice, quā dysenteria magna ex parte, vel alia fluxiones excitant: altera ex facultatis cibum in ventre continentis imbecillitate, secundā opinor differentiā cū cœliaca dicta affectione cōmisceri confundiq; Etenim in hac cū venter præ imbecillitate nequeat cibos & concoquere & distribuere, læuia, cruda & perliquida redduntur, & aluo in omnib<sup>9</sup> fluida. Verū in lientericis celeriter, quæ assumpta sunt, egeruntur, tamq; intensa est cruditas, ut alimenti assumpti genus aperte cognoscatur. atq; hac nota potissimum à cœliacis discernuntur. Itaq; semen lini cum palmulis ipsis obducitur. Summe autem facit lentiscus, rubus, oxymelite incoctus: cum adest inflatio cuminum miscebitur, anethūmq; & ruta: augescere verò profluuiο adiungemus mala cotonea, alumen liquidum, acaciam, hypocistidem, gallam, vel quædam, vel omnia. Cerata ex oleo myrteo cum vino quodā astringente. Epithemata calidiora quidem ex baccis lauri, & quod ex seminibus constat. Astringunt autem magis diacœnanthes, & diagigarton, id est ex acinis malorū puniceorū: Itē quod ad Antyllum authorē refertur, & Erythrij mirificū: si verò morbus in vetustate incidat, etiā vētri rectē applicatur & ceratum ex sinapi, ipsumq; sinapi. Portiones cōueniunt, simplices quidē, plantaginis, vel rumicis, vel mali granati cortices, vel sorba arida, vel immatura, vel omphacium ficcum, ex vua aminæa, tribus obolis potum. Qui febris carent cum vini austeri cyathis sex: febricitantes autem cum aqua pluuiali sumunt. Porrò aluus arida gallinarum potui inspersa, stomachum minus attingit, tum ea quæ vrinam ciunt, exempli gratia, apium, adianthum, similiaq; epota deriuationē moliantur. Cōposita verò sunt polyide sphragis, pastillus ex succino, item ex spina ægyptia confectus, insuper clidium appellatus, & diaspermaton. Item hoc est præstantissimum quod sequitur, rumicis syluestris seminis fescūcia, plantaginis seminis vncia, & hypocistidis succi drachmæ sex, gūmi vel acaciæ drachmæ tres. Excipiūtur cotoneo-



rum ad tertias decoctorum liquore. A L I V D. Cumini, pipē-  
ris, rhus syriaci, balauſtij ſingulorum ſeſcuncia, malicorij  
vncia, laſeris ſeſcuncia: aut eius pulueris drachma potui in-  
ſpergitur, aut oxymelite macerata dantur mane & veſperi.  
A L I V D. Myrti nigræ cochleare, eiúſq; dimidium, aniſi, ro-  
ſarum ſiccarum, cœnanthes ſingulorum cochlearis dimidiũ,  
palmulas viginti, in paſtillos cogiro, & drachmam vnã cū  
aqua aut diluta vini potione porrigito. iam Thēriace ex vi-  
peris optimum his eſt præſidium. Cibus autem, ſi acris & bi-  
lioſa ſit deiectione, ex chondro, oriza, halica, & ſimilibus erit:  
quibus cum aſtringens aliquod decoquetur, pirum, malum  
cotonium, meſpilum, & id genus alia, item lac decoctum  
probe his proderit. Potus erit, aut vinum aquoſum, tenue,  
aut, dulcis quẽdam potio. Sin autẽ pituitioſiora excernunt,  
contrarius iſtis cibus exhibetur, nonnulla ſtomacho grata  
admiſcentur, aniſum, cuminum, vel apij ſemen: Adhæc len-  
ticula bis cocta plerunque iſtis proſuit, cum aceto modi-  
co, vel oxymelite commanducata. Præterea braſſicæ &  
iſpæ bis coctionem expertæ: præſtat autem ſecundam iſo-  
rum coctionem in poſca fieri. Vinum aſſumetur vetuſtius  
calidiuſq;.

† Rectior eſt ſcriptura veteris colicis *περιμενόμενος ἐπίπαρ τῷ γασ-  
τρὶ*, id eſt, ventre omnino fluxionem abunde accipiente.

‡ Veteres libri hoc loco hanc ſcripturam habent. *ὕπνου ἰδὲ χυλῶ  
3.6. νόμου ὃν ἀνακίας ἰσορ*. id eſt, hypocyſtidis ſucci drachmæ ſex,  
gummi vel acaciæ par modus.

## De tenefmo.

## CAP. XLI.

**T**enefmus interdum dyſenteriam præcedit: ſæpe verò  
& ipſe ſolus paulatim generatus, deſinit. Eſt autẽ affe-  
ctus hic, implacabilis deſidendi cupiditas, quã nihil præter  
modica cruenta, vel mucoſa, egeritur, quẽ totius prope ma-  
li cauſa eſt: facta q; in loganone inflammatio œdematodes  
hoc eſt mollis & cedens hærentis illic ſtercoris opinionẽ, &  
deiiciendi ea deſiderium mouet. Galenus memoriæ prodi-  
etiam calculum quendã in tenefmi affectione per anũ fuiſſe  
excretum. Subinde verò obſtructionem ſtercoris in tenui  
intefſtino coacti, tenefmus ſecutus eſt, qui aſtringentibus  
quidem obturantibuſq; remediis magis increuerit: clyſteri-  
bus autẽ acrioribus, nempe muſſa cum ſale, vel medicamine  
quod



quod emolliat, per os assumpto, ut damasceno, vel pingui-  
bus ficis, rore marino sero lactis stercore excreto, confectum  
finitus est. Quod si igitur citra talē causam, tenesmus obor-  
tus sit, conuenit inflammationem, cruda ordeī farina calida  
& fotu ex vino, oleo myrteo, vel rosaceo, vel ompha cino lū-  
bis & inferiori ventris ab umbilico regioni adhibito lenire  
ad ea vero quæ longanoni mucosa impacta sunt, mulsā in-  
dita aluo abstergēdo muriāq; sæpe demissa auxiliū fuit abū-  
de. Sufficiunt autem salis drachmæ sex in aquæ calēntis he-  
mina. Porro dolores intentionēsq; leniuntur infessu scenu-  
græci, vel maluæ, vel seminis lini. Alij autem frequenter hūc  
quoq; infessum felicem sunt experti, rutæ, myrti, cytini, lau-  
ri, cupressi. æqua singulorum viridum portio in aqua co-  
quitur: est autem Marcellium. Vbi alte affligit inflamma-  
tio, irritationēsq; iniici debent ab inferioribus partibus cre-  
mores frumētacei cum quodam astringēte decocto. oleum  
vero dulce inditum retentumque dolorem soluit. Cum au-  
tem crebra desidendi est cupiditas, etiam Agatidem spif-  
samentis calidis sedi apponent, aut furfures calidas in fa-  
scia, aut spongiam, aut aliquid huiusmodi.

*De torminibus quæ dysenteria dicitur.*

CAP. XLII.

**C**um intestina intus exulcerantur, latini tormina, græ-  
ci dysenteriam appellant, quæ nunc ex tenesmi muta-  
tione, vel quadā ex prædictis alui turbatione prouenit, nūc  
per se incipit. in qua excernuntur primum biliosa, varia. de-  
inde leuiter subcruenta, postremo saniei similia cuiusmodi à  
mortuorū cadaueribus solēt profluere. At quæ à bile nigra  
oritur, exitialis est: ut quæ cancrum cum exulceratione te-  
stetur. Si igitur ab exulceratione, cruēta stercore commista  
deici cum dolore & torsionibus cernantur, vlcus tenuia in-  
testina obsidere nota est, quod per os potissimum remedia  
desideret. Sin autem syncerū stercus descendat: crassa, quod  
enematibus magis cedit. Porro cū multū sanguinis seorsim  
excernitur: affectū cruentā dysenteriā appellāt: quanquā  
interim sanguis etiā nigrior, quam naturaliter esse debet, &  
splendescens deiciatur, cum scilicet iecur alimentum distri-  
butum non probe conficit. Iam vero cum retentrix ipsius fa-  
cultas, vel alteratrix imbecillis est, sæpe eiusmodi descen-  
dūt ut recēs in eis caro lota esse videatur. Atq; hanc iecora-  
riam vocāt dysenteriā, de qua in iocinoris affectu agemus.



Itaque vtendum est communiter iis quæ in cœliacis & aliis præter naturam excretionibus comprehensa sunt. Priuatim conueniunt, lemnia sphragis, quæ etiam depascentem modo dysenteriam per sanat, & pota & in aluum data, si intestinum multa prius fuerit abstersum. Deinde muria & lactucæ succus potus conuenit dysentericis: ipsaq; lactuca inposca cocta esui idonea est, item plantago, rubi tum fructus, tum folia, & althææ radicis decoctum, hippuris ex aqua, vel vino bibita, eiusq; succus prodest. Mori succus immaturus exiccatus, atq; hoc magis batina mora similiter resiccata. siccant etiam vêttris fluorem oua ex acetô cocta comestâq;. Satiùs fuerit, si cômista quibusdã ex iis quæ ad dysenteriam faciunt, frixâq; esui exhibeas. Vtilissimum his est omphaciũ, rhus rubrum, eiusq; succus, malicorium, galla, acini vuæ, mespila, myrta, corni, cochlearum integro tostorum cinis. Compositum hoc bene facit, cochlearum cineris partes quatuor, gallæ partes duas, piperis partem vnã in puluerẽ redacta obsoniis inspergito, vel ex aqua, vel ex vino albo aquoso potui dato. Generose iuuat dysentericos quos nondũ vlcus putre occupauerit, & canum ossa vorantium stercus aridum, cum lacte caseato, ex lapillis marinis iniectis potatum. composita vero ex ægyptia spina pastillus, itẽ Philippi, tum qui ex cornu ceruino constat, adhuc qui ex seminibus conficitur, quiq; ad Trigonẽ refertur. Iã catapotia ex macere admiranda. maxime autem commendatur & hoc: opij, croci, lycij indicij, acaciæ, rhus, thuris, gallæ hypocistidis, malicorij, myrrhæ, aloës, æquales singulorũ portiones, nempe tres obuli ex aqua propinantur. A L I V D. Rhus drachmæ octo, gallæ, malicorij, singulorũ drachmæ quatuor cochleare vnũ ex vino datur. A L I V D. Rhus drachmæ octo, gallæ, acaciæ, gummi, singulorũ drachmæ duæ opij drachma. Exhibetur drachma ex vino temperato. Hoc autem elegma ipsis conueniet. Myrtorum nigrorum, rhus syriaci singuli sextarij, palmularum thebaicarum duæ libræ, malorum cotoneorũ carniũ libra, mala granata acida cum ipsis corticibus decem, vini astringentis sextarij duodecim, ad tertias decoquũtur. Percolatis libræ sex mellis iniiciũtur, & ad spissitudinem iam incocta linctu exhibeto. Notum vero est cataplasmata quoque ex astringentibus cõponenda, quorũ materiam explicatam habes. Porro aluo indita, dysentericis  
pro



propter tenesmos infestantes, ex usu fuerint, cremor orizæ, vel chōdri, vel huiusmodi alterius cū adipe caprillo, vel hircino, tū ea quæ capite de tenesmo diximus. Si autē sanguis profluit, ex inferioribus partibus infundere oportet succū polygoni, vel plātaginis cum acacia, vel hypocistide, vel id genus aliquo. Sin vrgeat fluxus, etiam quod sanguinē cohibeat quoddam iniciēdum est. vt cinis lanæ succidæ, vel spōgiæ inanis, pice liquida, vel sanguine bulbulo imbutæ vel alumine liquido, cōbustæ, vel asinini stercoreis succo. Huic & Andronis pastillus præstās est remedium. tum qui Musæ ascribitur, ac per similes. Insuper subiecta collyria multo sunt in id efficacissima, in quibus potissimum etiam dolores circa deiectionem fiunt. Vbi vero vlcera intestina depascan tur quæ tum fædo excrementorum odore, tum putredine, tum quod non statim per initia fiat, sed temporis interuallo, agnoscimus, enematis quæ crustam inducunt vtemur, cuiusmodi sunt pastilli nomine Faustiani, item diachartu id est ex chartha inscriptus, ac Bitynius, Theoniusque: Præterea qui ex suberibus constat, ex lenticulæ decocto, vel cuiusdam astringentis, iniecti. Atque hoc enema est ex iis quæ admodum expertus sum, glandis caliculi combusti (Est autem calyculus concavū illud vnde querna glans prodiit, quo coriarij vtuntur) Auripigmenti consolidæ, rhus syriaci, æquales partes. his contulis, duo cochlearia excipito cremore orizæ & succo anchusæ quæ folium habet spinale, amplum nigrumque, quod chærospileton appellant. Item ouorum candidi liquoris similiter ad uncias duas ternasve immittito. Epithemata vero in cœliacis enumerata sunt. Item ventris inunctiones quæ astringentia ac siccante constāt materia, glutinatorio quodā adhibito, gummi, thuræ, taurocolla, polline, in similibus cataplasmatibus locum habeant. † Alimento his erit per initia, pultrix ex ovo & lacte. deinde sorbitiones frumētaciæ per se, & cū lacte, item lac mediocriter coctū maxime cōmēdatur. holerū vsus non est necessarius quidem, attamen gustandas exhibebis serim coctā, intybū, plantaginē, brassicā bis coctam, poma quæ *ἰπώρα* dicuntur astringentia, carnibus ipsorum reiectis, vel aliis quæ asperare intestina possunt. Verū si multa sit caloris intēperies, etiā intybus cruda esui danda est, & aqua potioni frigida. Alia vero potabilis aqua cœlestis esto: si vero



laborauerit stomachus, vinum quoque propinandum est. Postea ex aucupio ficciora & concoctioni morigera sumantur: balineis dulcibus vrentur, à quibus si fluxionem experiantur, spongiam magnam, vel panis filiginei micas vino ascalonite, vel quodam astringente calido imbutas, totū ventri imponere oportet, contra quem cum deligaueris, sic lauare iubeto.

†Hoc loco vetus cod. habet, τροφή δὲ τούτοις ὡς πρὶν ἀρχὴν ἔστω, id est, alimentum per initia his sint ova. Sed vulgarem scripturam bonam esse ex Actio quinis intelligere potest, apud quem vox ὡγάλα est, quam interpres ova lacti mixta reddidit.

De morbo intestini plenioris, quem greci colicon appellant.

CAP. XLIII.

**C**olon, cum pars sit intestini crassi, à dextra ilium regio ne procedens, ad sinistriorem cincturæ modo pertinet. Huic dolores grauissimi plures ob causas suboriuntur. vel enim ex crasso pituitosoque humore intra tunicas ipsius recepto, vel ex spiritu crasso, & flatulento qui non habet exitum, vel propter inflammationem, intestini, vel ob acres mordacésq; humores. Qui ergo ex humore crasso, ac pituitoso dolorem concipiunt, hi per totum abdomen in alto ex cruciantur, præsertim sensu, qua parte colou situm est, ceu terebra pertūdatur. Hos torsiones quoq; affligunt, ructus, nausea, vomitio cuiuslibet humoris, potissimum pituitæ. Alius grauius impedita nihil reddit, ac ne spirituum quidem transmittit. Stercus autem quandoq; excretum, bouino simile videtur, leue & flatus plenum. Præcedens horum causa est magna ex parte, continuus ciborū frigidorū, crassiq; succi, vsus, repletio, cruditas, otium & his finitima. Qui autē ex spiritu flatulento indolescent, iis tensionis magis sensus obuenit: qui autē ex inflammatione, ij feruorem internum percipiunt. & febris non ignaua, vrinae retentio simul & stercoris: pulsus in vētre molestat, sitis, ardor, nausea, bilis potius vomitiones quæ nihil leuant malū, summam inter colicas affectiones. hæc est grauissima, quæ in Ileum transitionē minatur. at quibus acres rodentésq; succi dolorē mouent, sicut etiam qui ob inflammationem dolent, hos ardor sitis & vigilia torquet, †febricitant autē omnino vel minus quam illi, vrina redditur acris, & biliosa per aluū descēdunt. Sæpe



Sæpe alui deiectio maiorem excitat cruciatum, grauiusq; irritant calidiores cibi potusq; assumpti. Itaque doloribus quos frigidi & glutinosi ac crassi humores contraxerunt, medebimur sic vt non vehementer calfaciamus, quippe huiusmodi humores iis quæ nimis exalfaciunt, præfidiis funduntur, ac in spiritalem potius substantiam rediguntur. Quapropter & incidi, & concoqui medicamentis debent, quæ non inflent, sed extenuent desiccantq; , nec per morbi initia valde calefaciant. Prius itaque aluo stercore leuata, cõgrui clysteres ex oleo iniiciuntur in quo decoctum sit cuminum, vel ruta cum adipe anserino, vel gallinæ, aut cucumis syluestris radicum decocto, & myrrhæ drachma, melle & oleo, aut ex myrrha, melle, & oleo sicyoneo. Iam vero commune oleum iniectum, sæpe vitream simul pituitam expulit, ac dolorem subito finiuit. At si ob doloris vehementiam etiam enema retinuerint, glans aluo demittenda est, ex melle, cumino, nitro, rutæ semine sicco, brassicæ caule probe polito & muria madefacto, vel cinere brassicæ melle consperso, vel cucurbita syluestri trita cum melle, nitro & cumino. Glandes autem digitorum sex erunt, vt strictiorem ani musculum quem *σφιγκτηρία* vocat, exuperent, sedemq; vngere oportet, ciclamini succo cum melle & nitro, vel centaureo cum melle & nitro. Si dolor non remittitur, enema præter commemorata sit. Resinæ terebinthinæ vncia, vel opopanacis drachma, vel galbani drachmæ quatuor, bituminis tantūdem, cum nitri drachma, & aquæ vncia, olei rutacei vnciæ quinque, aut amplius. fots autem partibus indolentibus superaccommodandi sunt ex cumino, vel anethino, vel sicyonio oleo. Cataplasma admouendum, trispermum appellatum, cum cumino, baccis lauri, apij semine. Epithemata vero conuenient, diaspermaton, diadaphnidon, adde diamelilonton, & Poliarchion. Infessus autem vtilis ex decocto fœnugræci, althææ, chamæmeli, artemisiæ, anethi, lauri, & similia. Item in oleum calidum, aut hydrelaum descendere alienum non est. potui offertur absynthium, & cuminum aqua portione, vel panax cum aqua, vel castorei, anisi, piperis, singulæ drachmæ cum oxymelite. Quod si dolor non conquerit, propinatur ipsis medicamentum diatrion pipereon, vel theriaca. Iam sinapismo, & dropace in remissione doloris vtendum est, ac balneis naturalibus: † à balneis



neis autem aquæ potabilis abstineant, nisi doloris circumstantia compellat. Vbi iam prædictorum aliquo medicamento facta prius fuerit euacuatio, iubebis ut lauent, incallescantque laconico intra ignitos parietes inspergendo nitrosa quædā smegmata. Cum dolor est vehemens, mediocriter lenientibus uti cōuenit, qualis est pastillus ex castoreo, tum alio ab inferioribus partibus inditus, tū porus, similiq; his medicamina. Nam quæ valenter stuporē inducunt, vitare oportet. quippe paulisper quidem leniunt, sed longiorem affectionem reddunt, dum materiam incrassant, meatusq; intestini condensant. Porro vbi iā pituita fuerit extenuata, purgabitur hiera amarescente, vel his catapotis: Aloes, euphorbij, cocci gñidij, scammonia æquali singulorum modo. dantur duobus scrupulis. Victus utilis erit calidior sicciorq; per initia morbi, à cibo abstinebitur. deinde acria assumuntur. Porra igitur ipsis exhiberi cocta cum condyto debent, apiū, asparagus palustris, cruda allia, & maxime iis qui talibus nō offenduntur, ipsumq; vero condytū bibant panem vero cum ipso assumant. Insecutis diebus etiam reliqua boni succi alimenta concoctuq; facilia dabuntur, sic ut repletio cruditasq; vitetur. At si flatulentus spiritus doloris author fuerit, secundum clysteres qui flatus discutiant, potionesq;, etiam cucurbitæ quàm maximæ cum flamma ac leues toti abdomini defixæ, frequenter abunde auxilij præstiterunt. Porro cum inflammatio intestinum exercet, vena in cubito aperienda est. sin vrine difficultas distorqueat, etiam ex talo sanguis detrahi debet, & prædicta ad moueri præsidia, \* præterquam quæ acria sunt & valenter purgant: vtendum vero iis quæ magis leniunt, enematis, cataplasmatibus & superfusionibus, in oleūq; descendendū, ac cucurbitulas ipsis defigemus, ceratū abdomini applicabimus quod habeat ceræ quincuncem, olei chamæmelini vncias duas, rosacei tātūdē, lomenti semunciam, vitella ouorum quinq;. Hæc succo lini seminis soluantur. Victus tenuis ac febricitantiū proprius ipsis cōuenit, quousq; inflammatio discutatur. Atqui si propter acreis rodentesq; succos dolitant, oleū ipsis ab inferioribus partibus iniicietur, in quo fœnugræcum decoctum sit, vel althea cum tenera adipe recenti anseris, vel gallinæ vel etiam cremore ptisanæ cum rosaceo, vel succo quoque lini seminis. Propinandumq; ipsis Antidotum picra dia aloës, & balneis

vt en



utendum ex dulci aqua, cibo sobili ex chondro, vel prisa-  
na, piscibus saxatilibus. In summa vniuersus victus humi-  
dior erit, & frigidior. Abstinentum acribus omnibus, cum  
cibis, tum medicamentis, fotuq; ex asperginibus, & cata-  
plasmatis, vini potione & potissimum veteris. Cum autem  
dolor præpollet, etiam iis utendum est quæ sensum obstu-  
pesciunt, nam offendunt minus aliis huiusmodi affectio-  
nes medicamenta quæ tenues, mordacesq; humores incras-  
sant, & mediocriter refrigerant. Puto autem colicam affe-  
ctionem, quæ etiamnum regnat ex huiusmodi prouenisse  
humoribus, quæ ab Italia quidem regionibus incepit, in a-  
liis autem multis Romanorum Reipublicæ locis pestiferæ  
cuiusdam luis modo sit grassata: ex qua pleriq; in morbum  
comitiale, alij in artuum resolutionem sensu incolumi,  
nonnulli in vtraque sunt prolapsi: ac eorum qui in comitia-  
lem morbum inciderunt: plures interiire. Ex illis vero qui  
in resolutionem, plures euaserunt, tanquam in crisi, causa  
aliorum ex loco quem infestauerat, conuersa. Sic igitur la-  
borantes, medicus quidam in Italia curauit victus, quadam  
ratione infideli refrigerante & maxime temeraria. lactucas  
enim non coctas refrigeratasq; ipsis porrigebat, intybumq;  
similiter supra satietatem comedendum. Item vuas, mala,  
piscis dura carne præditos, omniaq; crustacea quæ vocant  
Græce ὀστρακόδερμα, pedes bubulos, bulbos & similia, non  
solum facultate, sed & tactu frigida. vinum raro præbebat,  
cum autem dabat frigida miscebat, ipsamque frigidam vel  
etiam poscam frigidam exhibebat, ab omni alio calido, &  
medio cibo abstinens. Atque plurimos sic præter omnium  
opinionem persanauit, imò nonnullos qui iam in morbum  
comitiale, vel resolutionem prolapsi erant, propemodum  
sanitati restituit.

† Veteris Cod. hæc est scriptura, πύρετοι δὲ οὐδὲν ἔλως ἢ ἐνέ-  
υον ἤτοι. Sed vulgare lectionē, vel eam quam habet codex Oroscij πύ-  
ρετοι ὁμῶς, meliorem esse ex Alexand. Tral. intelligere licet, qui  
scribit, eorum qui colico dolore laborant, οὐκ ἄνδρ' πύρετ' δὲ διαίτην  
τὴν πλείστην, id est plurimos non esse sine febre.

‡ Totus hic locus sic legitur in antiquis libris. τῶν δὲ δι' ὑδάτ' ὁ-  
πῶς τοῦτον ἀπεχιδνωσάν, πλὴν εἰ μὴ διὰ τὴν περιττασίαν ἢ  
δύνης ἀναγκάσειν, ἢ νύκτα δὴ πρῶτος ἐν νύκτι αὐτὸς τινὲ τῶν ἐρη-  
μένων φαρμάκων τοῦτον ἢ πυριᾶσαι λιγυρῶν τοῖς διαπύροις τό-  
ποις,



ποις, id est, à balneis aquæ potabilis abstineant nisi doloris intensio compellat, ubi iam prædictorum aliquo medicamento facta leuiter fuerit euacuatio, inbebis ut lauent, incalescantq; laconico in locis ignitis.

\* Hæc scriptura est in veteri codice *ωλὴν τὴν ἀριμύων καὶ τῶν δευτέρων* *ἰσχυρῶς*, id est, præterquam quæ acria sunt & multum calfaciunt. Quæ scriptura rectior est.

De tenuioris intestini morbo, qui ileos dicitur.

C A P. X L I I I I.

**I**leos cum affectus sit maxime acutus, & dolorificus, symptoma quoddam habet periculo grauius. Qui enim hoc malo sunt oppressi, miserabili morte pereunt, ad vitæ finē, stercus per os reddentes. Contrahitur id vitij cruditatibus, & obstructo recrementorum itinere, iis nimirum retentis, quæ iam corruptionem experta sunt: ex letalibus medicamentis, cunque in scrotum prolabantur intestina, & cum inflammationem sentiunt, colica affectione plerunque præcedente, causamq; adferente. Pueros itaque superfusionibus, cataplasmatibus, enematis, glandibus & fomentis, sicut in capite de colicis comprehensum est, curare oportet. Adolescentibus autem & ætate floridis indubitatò sanguinem detrahare: sin minus, vincit multas ac leues cucurbitulas toti abdomini admouere: Loco autem dolenti, etiam cute incisa: item perfricare & deligare artus, & tunc efficacioribus clysteriis & iniectionibus uti. Ad hæc in oleum calidum descendere, antidota purgationesq; assumere, breuiter omnia adhibere conuenit, quæ ad colicos scripta sunt, præter eos qui ex acribus, rodentibusq; succis indolescent. Mirifice autem ipsis facit etiam si vomuerint, anethum coctum, potumq; à potu panis in calidam demersi frustula statim esse, dum incalescent. Ad eos autem qui cibos non retinent, rhus & cuminum in eadem trita potui dato in senis oxymelitis cyathis. Qui ex medicamento in ileon inciderunt, ut vomant compellendi aquæ calidæ potu. Noxiorū autem medicamentorum notas, quinto libro habes expressas. Deinde oleum calens propinari debet, vel iura pingua ut denuo vomant. Diebus aliquot interpositis, theriace potui detur. At si obstructio perseueret, lacte scisso cum scammonia, vel aloës, vel cuiusdam purgantis momento, aluum inanire confert. Si ex intestini prolapsu in scrotum affectus processerit,

figur



figuratis statim ipsis sublimibus in inguina cōpelleretur de-  
lapsam intestinum, fasciaq; deligabitur.

*De renum & vesicæ affectibus, & primum de calculo.*

C A P. XLV.

**M**Orborum cognatio, ordinem disciplinæ transgredi  
nos compellit. nam communis est Colicis, & lapidem  
in rene habentibus aluus initio astricta, vehemens dolor, fa-  
stidium, cruditas, & tormina. Propria vero, colici habent om-  
nia hæc magis intensa, nephritici minus. At colicis qui-  
dem in dexteriore potius ileum parte dolor excruciat, &  
vsque ad stomachum, iecur, & lienem peruenit, aluus omni-  
no cohibetur, adeo vt ne spiritus quidem infra transmitta-  
tur. Cum verò necessitas stercus expellit, flatulentū bouilli  
modo est. Interim etiam vitrea pituita excernitur, vrina co-  
piofior pituitosaq; redditur. verum nephritici grauē in ipsis  
renibus infixū dolorem impacti pali instar sentiunt, eius-  
demq; lateris ac è directo subiectus testiculus indolet, fe-  
mur eiusdē partis directe obstupefcit, excernitq; etiā sponte  
quidem raro, omnino autem clysteriis aluus citata, flatus,  
stercusq; biliosius egerit. vrinæ paucæ, & arenosæ magis  
prodeūt: meatus per quē vrina distillat, astringitur. hæc in-  
dicia calculos in renibus esse fatētur, quæ adultis potius ob-  
oriuntur. in vesica autē pueris magis calculus solet concre-  
scere: notæ harū sunt cruda & subalbida vrina cui subsideat  
arenosum. Pruriunt laborantes crebro, & contrectāt puden-  
da, intenduntq; , & continue ad vrinam reddendam vrger-  
tur, ac stillicidio vexantur. Materiam igitur calculis crean-  
dis suppeditat crassus, terreusq; humor. Effectrix ipsorum  
causa est ignea renum, aut vesicæ caliditas. At in renibus  
quidem medicamentis vti conuenit, quæ calculos confrin-  
gunt dissecantq; , non autem manifesto calefaciunt. Talia  
habentur basilicorum asparagorum radices rubiq; , vitrum  
combustum, graminis radix, adianthum, bdellium, lauri ra-  
dicis cortex, altheæ semen, cicer nigrum arietinum spon-  
giarum calculi, acetum scillites, phu, meon, asaron, car-  
pesion, saxifraga. sion vero, & esu, & potu prodest, cardui  
radix, erysimon, & prionitis. balneis autem crebro vtan-  
tur, & post lauacrum statim quædam ex prædictis bibant.  
Cæterum superfusiones, cataplasmata, fots, infessus, rela-  
xantia & quæ leniunt, ex colicis huc transferre conuenit.

Com



Compositæ potiones sunt, rutæ sylvestris, maluæ sylvestris, apij radices. incoquantur vino, & liquor inde expressus temperatusq; aqua, duobus cochleariis porrigitur. Hoc inspergi potest. Balsami fructus, lapidis spongiarum, pulegij sicci, maluæ sylvestris seminis singulorum pares portiones. vbi contusa fuerint, † cochleare inde cum vini temperati cochleariis duobus exhibetur. Item sanguis hircinus inarefactus, cicadæ siccae sine pennis pedibusq; , lapis iudaicus, qui recolithos dicitur, ex mulso in calido balnei folio offertur. tum medicamenta composita, quæ ex ipsis præparantur. Insuper, Fusca nephritice, & ad hoc composita, condita. His accedit laudatissimum remedium troglodytes: est autem passerulus omnium auium minima, ea sola excepta, quæ Regulus appellatur. Hoc enim solo paulo maior est, eiq; similis colore inter cinerium & viride, tenui rostro, in muris maxime & sepibus degens. Hic inquam totus sale conditus crudusq; frequenter commanducatus, calculos iam creatos per urinam expellit, in posterumq; generari prohibet. Combusi integri cum pennis cinis vniuersus per se & cum pipere, phylliq; momento ex mero & melle potus, idem potest efficere. Ad dolorum vero acumen & vigilias bona sunt remedia Sotira, & Philonis medicamen. iam sanguinis missio adhibita dolorem sæpe leuauit, celeriter calculum emoluit. Tuetur à calculis, ne fiant, primum sane cibus boni succi, & moderatus, dein exercitia, rarusq; leguminum omnis generis, frumentaceorumq; vsus, item casei abstinentia, lactis, & quæ ex ipso præparantur, obsoniorum, vini nigri, carniū copiar, & omnium summatis crassi succi, ac nimis calidorum acriumq;, hydrogarorum dico, & conditorum & similia. Hæc enim si obseruentur, non solum lapides nondum creatos prohibent concrefcere, sed etiam iam factos, confringere, vel excernere idonea sunt. bibant autem oxymeli cum quodam simpliciore urinam citante, veluti adiantho, apio, graminis decocto. A balneo ieiunus ante vinum aqua temperatam potet. ac in medio prandij frigidam superbibat, si nihil prohibet. † Vbi prauū humoris copiam persentiscunt, sanguine detracto, aut purgatione vacuentur. Omnium vero præsentissimum est ad calculos arcendos secundum balneum, aquam temperatam prius bibere, quam vinum, aut aliud alimentum assumas: ac vesicæ calculos in pueris,



pueris, valentioribus emolire præfidiis, delectu ex supra cō-  
prehensibilibus habito. Quod si impendio excreuerint, aut cerui-  
ci vesicæ impeerint, iniectione recti syphonis, catheterismū  
vocant, per quassatum vtendum, aut etiam calculi incisio  
adhibenda, vt in parte chirurgica dicetur.

*De inflammatione.*

At si inflammatio renes, aut vesicam exerceat, quam hæ  
notæ testantur, loci affecti ardor, dolorq; cum grauitate, fe-  
bricula, mentis alienatio, vomitio bilis synceræ, vrinæ red-  
dendæ impotentia, & præsertim vbi vesica inflammationem  
experitur: sanguis statim detrahendus est, vtendumque su-  
perfusionibus, quibus leniendi potestas est, & cataplasmatibus  
ex ruta, anetho, scænuagræco, althææ radice, clysteriisq; mol-  
libus, & iniectionibus ex oleo, papauere, adipe anserino. In  
vesicæ affectu etiam, opij semibolum cum myrrha, croco,  
& oleo, in aluum demitti, mulsæque potui sumi debet, ab iis  
abstineri quæ valde vrinam citant, ac multa potio vitanda,  
nisi acris biliosusq; humor superet, tunc enim potui quoq;  
liberaliori indulgendum est, ac vna vice cumulatim, qui ex  
aliquo citra rofionem, vrinam mouente, sumetur. Seminis  
lini partes duæ, amyli pars vna, cochleare ex aqua datur, itē  
cucumeris & peponis semen. Cum ardorem igneum renes  
sentiunt, linamēta ex vino & oleo rosaceo, vel aqua & oleo  
rosaceo, vel melino super accommodantur, aut ceratum ex  
cera & rosaceo, chamæmelinoque vel melino & luteis ouo-  
rum confectum cum aceti paululo, vel polygoni succo im-  
ponatur. Postea etiam emplastrum quod à succis diachylon  
dicitur, cum chamæmelino adhibeatur. calida autem nimium  
vitanda, ne puris generationem suscitent, item quæ impen-  
dio refrigerant. quippe ab his renes facile in scirrum indu-  
rescunt. Ad hæc balneis. cum inflammatio instat, abstinendū  
victus qui in febribus dari solet, & ab inflammatione  
arcenda nomen aphlegmanton sortitur, utilis est.

† Hic locus sic descriptus est in veteribus codicib. διδς νοχλεάριον  
μετ' οὖν κικραμὲνς κινάδων. β. id est, cum vini temperati duobus cya-  
this.

† Locus hic integrior est in vetustis codicib. πλίδης ἡ καὶ κακοχ-  
μίας σωματὰ ἀνθρώπων διὰ φλεβοτομίας ἢ κατάρσεως κινούσων, id  
est, si sentiant plethoram & cacochymiam sanguine detracto aut purga-  
tione vacuentur.



De abscessu & exulceratione partium per quas vrina descendit, οὐρη-  
τινὰς, græci vocant.

DOLORES circa ilia oborti, horror inæqualis, & febris inordinata, abscessum in renibus fatentur. In vesica autem præter commemorata, loci cruciatus testatur. Cæterū affectus renum, hac nota deprehenditur. si homo in sanum recubens latus, in opposito percipiat dolorē ceu ē sublimi rene suspenso. In quibus utendū est incessu ex hydreleō, itē cataplasmatibus ex polline, oleo & resina, vel erui farina, cū melle, vel cardamomo, vel columbæ stercore, cum ficis pinguibus. Pus autem per vrinas confarctum excretum, abscessum esse ruptum, & vlcus in particula ostendit. Quoniam verò etiam sine abscessu, instrumenta per quæ vrina fertur exulcerationi patent, vase, aut rupto, aut exeso ex materia acri vel lapide perradente, distinguenda est renū exulceratio, ab ea quæ vesicā exercet, vel meatus quos οὐρητινὰς vocant, hoc pacto, Renibus quidem exulceratis in lumbis dolor exercet cum grauitate & sine impedimento vrina redditur, cui pus mixtū reperitur, carnosus particulis innatantibus. Vesica aut exulcerationem experta, tormentum vehemens in pectine imoq; ventre mouet, vrinæ difficultas vrget, pus vbi reddita vrina est, subfidet, squamulæ fædi odoris, vel laminis similes in sunt. furfuracea autem subfidentia vesicam scabie laborare notant, si verò meatus vrinarij sint exulcerati, etiam puris mixtura medio quodam modo habet, & pilis similia potius in lotio feruntur, dolorque mediam inter renem & vesicam, regionem occupat. Si autem pus aut sanguis excernatur, idque citra vrinam, nullius particulæ ex prædictis, sed pudendorum exulceratio significatur. Itaque cum vasa vrinæ dicta exulcerationem sentiunt, aqua mulsa bibitur, aut fœnugræci decoctum cū melle, aut cucumeris semen cū passo. Pus reddentibus per vrinam, bolus armenus datur, aut ferularum combustarum cinis, quantum tribus digitis comprehendi potest, ex passo, item lactis potio vehementer his auxiliatur. Composita autem hæc, seminis lini, seminis cucumeris, tragacanthæ, singulorum drachmæ duæ: pastilli finguntur. ALIUD. Noces pineæ numero viginti, cucumeris domestici seminis grana quadraginta, amyli drachma. Excipiuntur heminis duabus decocti nardi apij seminis. Archigenes in epistola ad Atticum iubet, cum vrinæ diffi-



difficultas vrget, papaueris albi torridi seminis detriti drachmam vnam capi, quæ decocto iunci rotundi, aut calami, aut dulcis radice inspergatur. Dolores autem ex vlcerebus contractos hoc lenit: cucumeris domestici purgati seminis grana numero triginta, nuces pineæ duodecim. amygdala amara corticibus exuta triginta quinque, croci quantum ad colorem satis est. Ieiunus quotidie assumet cum lacte, aut passo. Mirius erit si pro nucibus pineis maluæ seminis æqualem modum iniicias. Elidere autem potest (inquit) vesicæ exulcerationes etiam cyphi & antidota inde confecta. Ego vero in vetustioribus hoc vsus, nunquam aliud magis varium desideravi: chamædryos, chamæpyteos singulorum drachmæ viginti quatuor, asari, piperis albi singulorum drachmæ septem, cinnamomi drachma: optime detriti cochlearia duo ex passo, cretico, porrigo, si febris adsit, ex aque cyathis tribus, ubi verò mordax est exulceratio, etiam amyli duobus cochleariis & cucumeris seminis granis quindecim adiectis, voti compos euasi. Hæc quidem ex Archigenis scriptis sunt. Item medicamenta, diaphysalidon, id est ex halicacabo, & antidotum ex sylvestris maluæ semine, nec non ex tragematis confectum benefacit. Regioni inter scrotum, & anum, nec non inferiori ventri, cerata imponuntur ex æsypo lota, butyro, adipe anserino, styrace. In vesicam autem infunditur clysterio mulsæ aquosissima, vel lac cum paululo mellis, vel cum cucumeris semine, vel candidus oui liquor cum pompholyge, vel dictorum medicaminum aliquo. Si vlcus pascendo serpit, pastillus ex carta iniiciendus est, aut Bithinius: & cataplasma ex palmulis & vuis passis cum galla, acacia, hypocistide, & alumine debet imponi.

*De sanguinis renum profluvio.*

RENES infirmi lotiū subinde retinere nequeunt, sed patientiores redditi sanguinis nonnihil ex vena laxant, aliāsq; crassicies remittunt. Sæpe renes etiā iuxta circuitū quædam modū hæmorrhoides, sanguinis profluvio laborant. Inaniti verò subleuantur, in quibus nihil subito tentandū est, si sanguinis cursus sistatur. At si fluxus eius perseneret, vena in cubito aperitur, ac medicamētis quæ ad sanguinis spurū, aliāsq; sanguinis eruptiones inscribuntur, in renibus ac vesica sanguinē fundēti, vtēdū est. Maxime verò dari debet symphyti



radix, & tragacanthum vino maceratum. Ad hæc polygoni & plantaginis succus, cum posca, aut amygdala amara cum passo. Vel hoc, aluminis scissi drachma, tragacanthi drachme duæ, gummi oboli quinq; ex passo assumetur: item cataplasma ex ordeï farina cruda cū posca & rosaceo, aut ex palmulis & pane filigineo cum acacia, vel hypocistide, in vino astringenti, vel posca decoctis obducitur. Cū vesica sanguinem fundit, etiam cucurbitulas in iliis & coxendicibus defigemus. Cæterum particula quæ sanguinem fundit, hisce notis agnoscitur, loci dolore, & quod sanguis vrinæ miscetur, aut è contrario, veluti in pure comprehensum est. Concretus in vesica sanguis inde adeo deprehenditur, quod post illum vrina subito cohibeatur, & fibræ quædam sanguineæ (vt verisimile est) aut humiditates cruentæ emanent. Datur autem potui artemisiæ decoctum, heliochrysq; vel cunilæ, vel raphani semen, vel liquor laseris, vel cyrenaicus, vel apij succus, singula in aceto temperata: aut leporis coagulum, aut hinnuli, aut hœdi in oxymelite, aut lixiuium cum oleo: spongiaq; à foris ex muria, vel lixiuio calido accommodatur. Quod si vitium his non abigitur, secatur locus inter anum & penem, quemadmodum in calculosis: ablatiisq; grummis commode curantur.

*De renum duritia.*

QVÆ durities in renibus cōtrahuntur, nullum sane dolorem mouent, sed videntur renes ipsi tanquam ab iliis suspendi, coxæ stupent crura impotentia vacillant, vrina modica egeritur: Totus deniq; habitus duricie renum laborantium iis potissimum qui aqua subter cutem laborant, similis est. Hi ergo emollientur ceratis, malagmatis, frictionibus & fomentis. Ad hæc quæ vrinam cient, assumuntur, aluiisq; subduci clystere deber.

*De diabete.*

CVM poculenta, statim qualia assumpta sunt per vrinam transmittuntur, diabetes vitiū appellatur. Qui igitur eo sunt occupati, immodica siti cōficiuntur, vnde quoq; dipsacō græci affectū nominant: qui ex retentricis sane renū facultatis impotētia cōtrahitur, attractricis autē maiore robore, vt totū corpus ob immodicum calorem exhauriat exugātq;. Itaque aduersus hunc pugnantes, cibum pleniorē, quiq; difficulter confici queat, nec liquidus sit, offeremus, veluti alicam cum  
rosa



rosato, vel rhodomalo, vel hydromalo, vel vino non vetusto, vel aliàs quodam calido. Ex oleribus autem intybum, serim, lactucas. inter pisces erunt saxatiles, suum petunculi, vuluæ, pira, mala, punica mala, & frigida potio. Item polygoni succus, heleniumq; recte ipsis propinatur ex vino nigro, palmularumq; & myrti dilatum, præcordiis & renibus obducitur polenta ex aceto & rosaceo, folia vitis cotyledonis, parietariæ, portulacæ. sudores excitandi, vomitusq; à potu frigidus, omnibus quæ vrinam mouent, abstinendum. At sanguinem per initia mittere non fuerit alienum.

*De stillicidio vrinæ & eius difficultate.*

CVM neq; inflammatio, neq; calculus, neq; aliud quippiã ex prædictis infestat, vrina autem acris est, totusque habitus, vel etiam reliqua signa, bilem testantur, ex hac vel vrinæ difficultas, vel stillicidium contrahitur. Quare ex usu sunt quæ hanc inalterant contemperantq; ptisanæ cremor, pisces, balnea, victusq; idoneus: acria vitanda sunt, vinum, exercitia, ira & tarda comestio. Quod si vrinæ tenuitas, alborque & reliqua signa frigidam fateantur intemperiem, conueniet vinum calidum, condita, tum quæ vrinam cient & medicamina & cibi. adhæc infestius calidiores. At si præter alborem, etiam crassities in vrina appareat, pituitosus humor cēsendus est, qui ceruicem vesicæ obstruxerit vbi vtendum est oxymelite, tum iis quæ constant ex hyssopo, pulegio, vel thymio, vel silphio, aquæ mulsæ incoctis, item superfusionibus calidioribus. siue autem humor crassus, siue calculus, siue grumus, vel eius generis aliquid obstruens, vrinæ transitum impediat, siphonē rectum catheterē appellauit, indere ex usu est, nisi particulæ inflammatio prohibeat. Porro in febribus vrinæ difficultati medemus, super fuso rutaceo, vel anethino, vel veteri oleo. Si aluus astricta est, iniicietur ab inferiori parte decoctum fœnugræci, vel maluæ, vincitq; insidere agrotantes supra comprehensos in hydreleum, vel aliquod dictarum specierum decoctum cum oleo. Ceratum hoc magnifice proficit, syluestris maluæ radices in siccyonio cum aqua modica decoctæ donec inarescant. ipsæ quidem proiciuntur, succus autem oleo miscetur, rutæ quarta pars, ceræ & castorij quantum sufficit.

*De vesicæ resoluta.*

VESICÆ resolutionem nunc vrinæ difficultas, nunc



spontanea ipsius emissio comitatur, ut in ipso capite de resolutione supra expositum est.

*De urinae incontinentia.*

M V S C V L V S, qui ceruicem vesicae ambit, relaxatus, hoc mali generat. Quare pueris etiam maxima ex parte solet accidere. Communiter itaque roborantibus potissimum uti convenit, ut ornelæo calido & similibus: abstinendum iis quæ valide refrigerant: calidis fouendi potius egri, quatenus fieri potest. Etenim frigiditas veluti resolutionem representat, naturaliter autem hæc opiculantur. Galli guttur combustum ieiuno bibendum in aqua tepida præbetur, vel leucanthemi flores similiter, vel leporis testiculus derafus in vinum odoratum, contra hæc vitia bibitur. † vel calamintha myrrhaq; ante cœnam propinetur, vel rutæ sylvestris semē torrefactum per triduum potui exhibeatur. Caterum pudenda eius qui hoc detinetur vitio, cimolia cum succo herbae perdicij perunguntur.

† Huius loci hæc est lectio in veteri, ἢ καλαμίνθω ἢ σούδαρ ἀὲς πικρῇ, id est, vel calamintha myrrhaq; in vino ante cœnam detur.

*De iocinoris affectibus.*

CAP. XLVI.

I Ecur pluribus vitiis opportunum est. nam imbecillitate, inflammatione, erysipelate, scirro, abscessu, ulceribus & obstructionibus corripitur. Primum de imbecillitate ipsius dicendum est, à qua proprie iocinorosos nominare ægrotantes consueuerunt. Si ergo alius in succum quidem conuersa verum liquidiora deiiciat alimēto minus probe, aut neutiquam in iecur distributo, sic tamen ut venter à noxa sit immunis, attractricem visceris facultatem infirmari suspicio est. Si verò in eis recens caro lota esse videatur, alteratricem, tum eā quæ sanguini creando est dicata. At si ex calida intemperie sit, imbecille, recrementum alui temporis spatio fœculentius apparet, valdeq; fœtidum, bilis insigniter colorata crassaq; descendit. Iam verò etiam quando iecoris substantia cū ea colliquatur, & totū corpus cōsumitur & febris vrget, cibiq; fastidiū, & biliosus vomitus. Cum autem frigida affligit intemperies, neq; frequens, neq; copiosa alius est: quippe affectus longius prorogatur, & certis diebus venter cumulatius deiiciet, sed minus fœtida ceu sanguinis crassi facē, ut propè atra bilis videatur. Itē plures & varij



uarij deiectionum colores, frigidam notant intemperiem, in qua febris languida apparet, facies non collabitur, maior ciborum appetentia inest. Harum intemperierū alterutri si accedat siccitas, recrementa erunt ficciora & pauciora, magisq; ægri sitient: si vero humida, liquidiora & copiosiora, tum sitis minus excruciat. At si inflammatio iecur infestat, omnibus quidem ex æquo dextra parte sub præcordiis dolor est: idemque ad iugulum supra, ad vsque costas spurias infra peruenit. Huic dolori accedit febris acuta, tussis sicca, sitis, cibi fastidium, spiritus difficultas, lingua primo rubra apparet, mox nigra: bilis euomitur, & aluus non respondet. Quum autem similia in pleuritidis signa existant, quo modo hos ab illis discernas, capite de pleuritide comprehensum est. Si vero Erysipelate iecur conflictetur, flammeus ardor gliscit, vrunturq; ægri, & marcor sequitur, qui *μαρasmus* græcis dicitur. Priuatim vero cum caua quidem iecoris inflammationem experiuntur, nausea adest, vomitus, cibi fastidiū, & flammeus ardor intenditur, anima deficit, & sæpe membra perfrigescunt, vt aqua subter cutem transfundi inde incipiat. Rursus si gibbam ipsius regionem inflammatio exerceat, præter alia superius commemorata, tumor quoque manifestus in superficie oculis & tactui conspicuus est. hæc quidem validam grandemque inflammationem testantur. Sin obscura quedam fuerit, iubebimus egro, magnā ædat respirationem. Et si dextra parte præcordia dolere dicat, moderata iecoris inflammatio censebitur. Quod si oblongus inflammationis tumor, qua parte musculi incūbunt, appareat, sed ita vt nullū ex prædictis adsit, illos ipsos eadē inflammatione occupari noscemus. Grauitas autē cū distictione, & doloris, dextra præcordiorum parte sensus, nullo substante tumore, nulla febris vrgente, venarum signatur obstructio, qua venæ portas & concaua iocinoris perreptantes iis quæ per gybba ipsius excurrunt, cōmittuntur. Itaque si in abscessum degenerat: inflammatio, dolor & distictio ipsis increfcit, rigores sine ratione accedunt, dolentesque iocinore, in sinistrum magis latus decumbere nequeunt, rupto autem abscessu, vel per vrinas, vel per aluum cumulata puris subluuius prorumpit. At si tumor in scirrhosam affectionem deciderit, dolores quidem remittunt. sed tumor cū duritie est conspicuus, quæ ambiunt partes extenuantur.



& tempore procedente difficulter poterunt discerni. Quippe aqua inter cutem protinus comitatur, & tota præcordia humiditate conteguntur. Itaq; aduersus calidam iecoris intemperiem, refrigerantibus, tum is quæ viscus mediocriter confirmet, vti consilium est. id autem præstat seris & cichorium, interim crudum, interim coctum cum coriadro assumptum, item decoctum ipsius, epotum, & succus non solum, verum & puluis ipsius mulsæ inspersus & calidis, & frigidis iocinoris vitiis opitulatur. Adhæc intybum troximum & sonchus eiusdem sunt generis. Benefacit etiam mali medici succi cyathus in aquam mulsam demissus, similiterque filicis succus. At si cum obstructione mediocris affligat intemperies, ea ex vino quodam tenui, & quod vrinæ mouendæ est, porriguntur. Catapotium vero quod recipiet radices cichorij drachmas quatuor, chamæpyteos radices drachmas quatuor trita cum melle cocto dantur ad nūcis auellanae magnitudinem, quibus aqua calidam superbibere conuenit, iam ex opio & semine alterci confecta propinantur, ipsumq; Philonis antidotum. In quibus calor intenditur, etiam rosaceum primi meriti ipsis, vel melinum potui datur. Esui, ptisanæ cremor, vel chondri cum hydrosato, similiter panis ex aqua, cum quadam id genus dulci potione. Et summatim cibi erunt, qui mediocriter refrigerant, non obstruunt: vinum omnino circūciditur, nisi alteram ob causam, nempe stomachi imbecillitatem, hoc requirāt, tū enim ex tenuibus & iis quæ græci *διαιτοφόρου* vocant, aquosum aliquod exhibetur: Ac Erysipelas quoq; in eum modum curabitur. Porro in frigida intemperie contrariis pugnandum est. Panis igitur rectè cum vino assumitur, item brassica bis tērve incocta, castaneasq; esse confert & vuas passas tum ex gallinis quod satis est: vinumq; bibant: sed prius ipsis eupatorium, vel asarum, vel medicamentum diapepereon propinari debet. Iam ex iis quæ prius ad cœliacos & dysentericos inscripta sunt, idonea deligi debent: cyphoides autem appellatae compositiones, ad calidas intemperies neutiquam conueniunt. nisi modica quædam caliditas cum humiditate copiosiore oborta fuerit. ad frigidas autem optima sunt remedia, magisq; si cū humiditate, aut iecoris obstructione euenierint. Si vero obstructio ex crassis glutinosissq; contracta humoribus fuerit, corruda & præsertim huius semē datur, item



item lauri radicis cortex. eupatoriumq; ex oxymelite, vel lupinorum amarorū decocto cum ruta & pipere. Ad hæc farina lupinorū pota, & capparis radicis partes duæ, costi pars vna cum vino: & medicamentum diabacanu ad obstructiones quas crassi viscosiq; humores excitarunt salutariter sumitur: præterea iris & pistaciorum fructus cortexq; marrubium insuper & amygdalæ amaræ, & ex ipsis pastilli, dracunculi, ariq; radix, agaricum, acetum scillites, oxymel, iecur lupi, aridum tritum & cochleario datum, omnibus iecoris affectibus ex vino dulci succurrit, itē antidotū Theodoretum efficacissimum est remedium iecori obstructo, scirrhus indurato diuque inflammato. Item colicis & ictericis. similiter etiam picra ex oxymelite. Cibi his dandi sunt calidiores & qui aperiendi facultatē habent, nepe porra ex oxymelite, sylvestris asparagus, & capparis, reliqua; obsonia ex condimento aliquo calefaciente, quodq; meatus reserat, incocta. Vinum tenue ac vetus vtile. vitanda sunt alimēta crassi succi, balnea crebra, ea; potissimū à cibo. Si morbus in vetustatem incidit, etiā venæ sectio purgatioq; adhibenda, si nihil prohibet. Cū autem iecur inflammationem experitur. sanguis ex cubito dextro intrepidè mittendus est, & copiosus si vires sufficient. Extrinsecus farina hordeacea & fœnu græci, & semine lini cum palmulis, vel malis cotoniiis, meliloti flore, absynthio, chamæmelino obducetur. Illud autem in summa præcipiendum est, vt astringentia emollientibus semper admisceantur. Epithemata vero iniici debent, tum quod ad Nileum authorem refertur, tum quod à grato odore euodes dicitur: item Philagrianum & Apollophanis, necnon ex melilotis confectum. deniq; quod coptū appellatur. Porro ad maximas inflammationes hoc valde experientia comprobatum est, absynthij comæ, nardi gallicæ, asari, croci, singulorū vncia, iridis, myrrhæ, styracis, bdellij, ammoniaci suffiminis quod thymiamia appellant, singulorum vnciæ duæ, medullæ vitulinæ vnciæ quatuor, cerati lentiscini libræ quatuor. Ad hæc oxymel ipsis dandum est, simpliciā; auxilia, nempe, asarum, nardus gallica, vel indica, iuncusq; odoratus rotundus, petroselinum. Aluus irritanda est, vtriciæ, vel mercurialis, coctorum esu. In declinatione morbi epithymum & polypodiū ex mulsâ porrigūtur, aliūsq; inaniri postulat per clysterē, initio quidē ex aqua mulsâ cū sale, vel



nitro, facta autē inclinatione, miscetur hyssopū vel origanū, vel cnicum, vel centaureum & cucurbita sylvestris. Summa tim vero caua iecoris pars per aluū: gibba per vrinas expurgatur. Alimentum his dabitur, cremor ptisanæ, in quo apiū decoctū sit. At inflammationis quæ Erysipelatis naturam referat, curationē superius sumus executi. Abscessu autē facto, ruptura adiuuanda cataplasmate trispermo, cum resina, manna, pice, radicibus altheæ, colūbæ fimo, caprillo stercore, præbabitur autem ius decoctorum ad tertias polij & fumarie quæ in ordeo nascitur, item decoctum thlaspis vel cichorij, & chamædryos radicis bibant: vomicaq; abscessus facta, mulsa conuenit, & quæ in renibus exulceratis cōmemorata sunt. Extrinsecus imponitur medicamentum Mnasei, reliquaq; emollientia. Item Icesio, vel quod salicibus cōstat. Si vero iecur scirrho induratum fuerit, parum in medicina spei est, affectu in aquā subter cutem transeunte. Attamen emollientibus admiscenda sunt, ammoniacum, bdelliū medullæ, adipēs, & quæ his similem potentiam obtinent. Portiones expediunt, quæ angustias visceris recludunt absterguntque. Huiusmodi sunt quæ vrinam citant, & calculos confringunt. Adhæc quæ nuper ad iecoris obstructionem dicta nobis sunt: alimento nimirum decenter adhibito.

*De malo corporis habitu, qui Cachexia dicitur. CAP. XLVII.*

**P**incipia hydropicorū affectuum vocare nostri malum corporis habitū, Græci *ναρχία* consuerunt. Auxiliū est, nisi aliquid impedit, in sanguinis detractone, quæ particula tim ac per vices adhibita ad tertiū quartūve diem producit. Sed vacuandi sunt potissimum, qui hæmorrhoidibus, aut menstruis non respondentibus in morbum inciderunt, quemadmodum iis qui copia vitiosorum humorū laborāt, vacuatio sanguinis per venā vitāda est: purgādi autē sunt ex hiera, dia colocynthidos victus erit tenuis, & deficcās. Aquarū naturalium vsus adhibebitur, primū aluminosarū, nitrosarūq; magis, mox sulfurosarū: pluribus diebus interpositis aliud balneū accomodabitur, variōq; exercitationis generi credetur ægrotātes, maximè autē ei quod per medicos aptas, id est reunctores administratur. postea veratrū assumēt mirificè quoq; iuuat ipsos & absynthij potio, & cottabifini, & dropaces. Si affectus in hydropem deciderit, aquæ subter cutem curationi subiicietur, quemadmodum exponemus.

*De*



## De aqua intercutem.

## CAP. XLVIII.

**C**um iecur vehementer perfrikerit, interim sane primario aut inflammatione, aut scirrho, aut alio implicitum vitio, interim lege confortij quod cum aliis partibus habet sanguinis elaboratio non succedit, ac vitiū aquæ intercutis quod hydrops græce dicitur, inde contrahitur, in quo nonnunquam spiritus copia cum humidi momento intra membrā, quæ peritonæos appellatur, & intestina colligitur, ut abdomen percussum tympani modo crepitum elidat: quæ ratione etiam tympanias nuncupatur, qui stomachi, alui, & coli inflationibus, febribusque longis superuenit. nonnunquam vero ex duritie peritonæi, aut vuluæ in mulieribus, aut ex scirrho generatur. Aliquando contra humorum abundantia cum paucissimo spiritu, in eisdem regionibus collecta tanquam in vtre quodam conseruatur. vnde malum, ascites nominatur hydrops, & ipse ex causis quas comprehendimus, contractus. Plurima vero ex parte, ex duritia & scirrho lienis, & iocinoris longisq; intestinorum profluuiis, in quibus fit ut venter quidem intumescat, reliquum autem corpus quod alimentum non sentiat, consumatur. Nonnunquam etiam in tota corporis mole frigidior pituitosiorq; sanguis cōtinetur, qualis partim à iecore descendit, partim ex tota carne corporis veluti in aquam resoluta emanat, adeo ut corpus albido, & pituitæ colore emortui instar appareat, vocaturq; hydrops leucophlegmatias hypofarcidios, vel anasarca. Quem lentæ febres, malus stomachi habitus, hæmorrhoides diu suppressæ fluxus muliebris, spiritus difficultas, vigiliæ sine ratione oborientes, causæq; his consimiles mouerunt. Curatio igitur communis ab euacuatione incipit. Verum ascites & tympanias appellatus medicamenta requirit, quæ aquam educant. Cui autē anasarca nomē est, sanguinis detractio succurrimus, maxime si affectus origo ex hæmorrhoidibus, aut mēstruis suppressis existit, nisi prius cū malo habitu premebātur sanguinem emisserint. Et hic igitur ut in iis qui malam corporis habitudinē sortiti sunt, per vices tēta est vacuatio. Deinde sterco bovis gregarij aridū exactē tritū, coctumq; in posca, vel oxymelite, sulfurisq; pars quarta superinspersa, toti vētris capacitati iniiciatur, vel sterco caprilla in pueri vrina ad sordium spissitudinē macerata, applicato, per ventrē summē ipsos



ipsos purgat. Item cataplasmatibus vtendum ex fermento, fi-  
 cis pinguibus, calce, nitro, iride, cardamomo, sulfure viuo,  
 ammoniaco, baccis lauri, vna taminia, columbarum rura-  
 lium fimo, vel omnibus, vel quibusdam ex his cum oxyme-  
 lite. Post quæ epithema spongium appellatum ex caprillo  
 stercore mirificè humiditatem vacuat, tum per larētes me-  
 tus, tum per aluum. Insequentibus diebus emplastra persic-  
 cantia imponuntur, tum dia iteon, id est, quod ex salicibus  
 est, tum quod icesium dicitur, vel quod Cureo ascribitur,  
 vel diadaphnidon quod ex baccis lauri factum est, vel po-  
 lyarchium, vel epithema diaspermation ex seminibus præpa-  
 ratum. Atque hoc indubiè mirificos præstat effectus, quod  
 sequitur: quippe humores ex alto eripit: lapidis pyritis, sul-  
 furis viui, guttæ ammoniaci, singulorum drachmæ duode-  
 cim, cumini drachmæ sedecim, nitri drachmæ duodecim.  
 Excipiuntur cera modica, & terebinthina, pelliq; illita, toti  
 ventri imponuntur. Ius radicis sambuci decoctæ in vino po-  
 tui datur, vel cucumer syluestris vino austero maceratus  
 per triduum, cyatho vno propinatur. Accessio autē fit quo-  
 tidie vsque ad cyathos tres. Hoc quod subiungitur, varia  
 constat mistura: balsami, nardi, casia, cumini, dulcis radicu-  
 læ, hyperici, iunci rotundi, asari, dauci, amomi, myrrhæ pe-  
 trofelini, calami aromatici, piperis, seselis, spondilij pares  
 portiones, faciūt autem bene etiam singula per se, & omnia  
 quæ vrinæ ciendæ sunt similem facultatem obtinent. Cæ-  
 terum scilla tosta, cum melle trita & linctus modo exhibi-  
 ta, sine grauitate vrinam mouet: coqui autem possit etiam  
 in aqua, iis qui bibere velint. Iam hoc quod sequitur præci-  
 pue bonū est: interioris scillæ libræ duæ, in vini austeri sex-  
 tariis tribus adusque tertias incocta porrigito ex vino quo-  
 tidie, orsus à mystro vsq; ad vnciam. Istud vrinam optimè  
 prouocat, quod recipit aluminis liquidi circa fabæ magni-  
 tudinem: vbi aqua dissolueris, linteoq; percolaueris, ad tres  
 dies propinato, vel vno interposito. Conuenit etiam his pi-  
 cra ex oxymelite. Adhæc Theodoretus, & ex amaris amygdalis  
 pastillus. Plura vero aquam educunt, sed hæc vsus com-  
 probauit, gnidia grana quadraginta, aut quinquaginta, vel  
 lathyrides viginti, aut triginta, vel euphorbij filique quin-  
 que, aut septem, vel squamæ æris drachmæ duæ, aut tres  
 cum micis panis exceptæ, ac in orbiculos digestæ, vel sam-  
 buci



buci radicis corticis succus epotus cum condito, vel chamelæ foliorum, aris combusti, anisi singulorum par modus datur in aqua, per initia quidem drachma vna, diebus aliquot interpositis etiam duæ, & plures. Atque insequentia, mirifica sunt carapotia: aloës, eupborbij, cocci gnidij, singulorum vncia, rhei semuncia, excipiuntur succo brassicæ, singunturq; catapotia, dantur siliquæ septem, aut nouem. Antidotum ex gariophilo, aquam mirabiliter elicit, iam vinum quod aquæ educendæ est, dare tentabimus. Est autem hoc præstantissimum scillæ vnciæ tres, feminis apij, capparis radicis corticis, piperis, singulorum drachmæ quatuor, cocci gnidij decorticati drachma, phylli drachma, malabathri galbuli duo, vini optimi hemina duodecim, mellis crudi libræ sex. Contusa cribataq; vino perfunduntur, scilla simul leuigatur, dantur cyathi tres: post humoris euacuationem, etiam theriaca vtendum est, & stercoris bubuli cochlear ex vino potum quotidie strenuè auxiliatur. item clysteres adhibendi acres, nisi venter sua sponte humescat: tunc enim exiccare ipsum magis conuenit. Porro in mulieribus quas aqua subter cutem male habet, etiam pessus hic utilis est. Anisi, cardomomi, cumini, nitri, aristolochiæ, fœnugraci, pulegij, ficuum interioris pares portiones fusino excepta mulieribus subiiciuntur. Secundum hæc aquis naturalibus, vti continenter expedit: ad hæc in arena contexti desudent: aliis autem lauacris abstinebunt. Quod si vero interim lauent etiam, vtentur in lauacro nitro, sale, sinapi, calce, & persimilibus inspersis. Hæc sanè vel citra lauationem utilia sunt, aridaq; cum oleo ventri adfricata. At si id vitium est, cui anasarca nomen est, reliquas partes excerci, quatenus licet, oportet & siccas ad solem perfricari. Reliqua victus ratio siccior assumetur. Cibus itaque erit salsamentum, sinapi, & allia: ex auibz syluestres, & siccæ magis. Inter olea asparagus, bifacutum, porrum, sinapi, caucalis, reliquaq; syluestria. Obsoniis miscbitur sal theriacus, vel iamblichus: vinum vetus, tenue, ad vrinam mouendam efficax ebibetur. Sin autem facultas datur, ex marina confectum: omnis potio liberalis vitanda est, aquæ in totum. Quod si cum febris aqua subter cutem inuadat, calidioribus, acrioribusq; cibis & auxiliis abstinendum, mixtim vero his vtendū, ita vt ei quod magis vrget, occurramus: si vero id morbi

genus



genus est quo venter sonitum ædit, Tympanias vocatur, purgantia, & quæ vniuersum corpus emaciant colliquantq; releganda sunt, item ex iis quæ vrinam mouent efficaciora. Illis autem quæ extenuare & discutere spiritus possunt, tum intrinsecus, tum à foris vtendum est. aut cucurbitulæ leues crebro toti ventri suffiguntur. Sin id vitij male habet, in quo veluti in vtrem aqua contrahitur ascites vocatur, nisi prædictis cesserit remediis, ad perforationem veniendum est quæ παρακέντησις dicitur, quod nulli alij aquæ subter cutem generi conuenit.

De Liene.

CAP. XLIX.

**C**VM lien melancholicum humorem, qui veluti limus sanguinis existit, à iocinore trahere soleat, si quidē facultas attractrix infirma fuerit, meatūsve obstructus per quem prius trahebatur, niger icterus constituitur, sanguine impuro per totum corpus disperso. At si lienem grauitas, & distentio, vel etiam dolor exerceat, obstructio indicatur: si nihil horū euenerit, attrahendi potentie imbecillitas. Quinetiam si atræ bilis vomitus sine febre aliāve malignitate oboritur, retentricem lienis vim laborare indicium est. Expultricis imbecillitas cibum fastidium efferet, dum nō amplius melancholicum excrementū, ab liene ad ventriculi ostium defertur, appetentiamq; excitat sed in ipso liene obstruitur, primum sanè inflammatio huius, cuius notæ sunt, feruor, dolor, & distentio, excitatur. quæ paulopost in schirrum degenerat, sic vt feruor quidem dolorq; finierit, tumor autem & duritia maneat, Hoc pressis vitio, os foetet, gingiua exduntur, vlcera in cruribus cicatricem non recipiunt, ob quæ simul affecto iocinore, cutem subeuntes aquæ colliguntur, sicut comprehensum est. Itaque intemperies ipsius eandem cum iocinore curationem postulat. si adest inflammatio, sanguis à cubito sinisteriore, vel ab extrema manu dimittendus est, eo quod reuulsio longioribus interuallis fieri debeat, veletiam propter naturalem quandam cognationem: deinde cataplasma inducendum ex quæ citra euidentem calorem extenuant, admixtis quibusdam etiam nunc astringentibus: videtur autem hanc facultatem habere suapte natura, qui vocatur flos salis. Porro est & hoc cataplasma mirificum, fœnugræci triens, farinæ hordeaciæ, nasturcij, singulorum vncia, ficuum pinguium libra, verbenacæ herbæ



herbæ aridæ vncia, ficus, aceto quam acerrimo maceratur. Deinde cum aliis prius contusis incoquuntur, postea iterum coquuntur. Vel stercus caprillum cū cruda ordeī farina coctum ex posca inducitur: adhibeto, si placet, & salis florem, fouendo autem prius cyprino cum aceti momento, malagmatis vtitor, primum simplicioribus, quale est hoc. Cerę sesquilibra, centaurij libra, nitri triens, terebinthinæ, seminis viticis, capparis radices corticis, singulorū quincunx. Coctis quæ liquari possunt, arida insparguntur. iam quod ad Nileū autorem refertur præstantissimū est. Verum vbi inflammatio in scirrū degenerat, valentioribus vti conuenit, vt etiam cutis summa exulceretur, quale est quod ex fimo caprillo constat, & citrinum. huc accedunt Macherionis, Curei, item ex baccis lauri confectum, & ex salicibus. Quod subsequetur, etiam ipse expertus sum, auri pigmenti vnciæ duæ, sandarachæ vnciæ duæ, ceræ libra, terebintinæ libra, picis aridæ tantundem, galbanī vncia, opopanacis vncia, capparis radices corticis, glandis vnguentariæ, singulorum vnciæ quatuor, lachrymæ ammoniaci scrupula sex, nardini, vel cypri vnciæ quinque. Ammoniacum etiam cum aceto applicatum, leni sæpe profuit, item potum scrupulis tribus quater nise cum vno castorei, si priusquam in lauacrum descendant, sicum siccatam comederint, sputoq; eam reddiderint, vel ammoniaci pars vna, castorij tantundem: datur drachma. hæc etiam ad induratos scirrhus, proficiunt, quemadmodum capparis quoq; cortex ex aceto cōtritū, applicatusq;. Idem bibitus aceto, vel oxymelite, crassos, glutinososq; humores vacuat, interim sanguinem. Iam salicis cortex, consimiliter inungitur, & cinis ex officina fabrilī cum cruda ordeī farina ex oxymelite inductus. itē centaurei succus à foris impositus, epotusq;, & lupinorum amarorū decoctū cum ruta & pipere potu assumptum, nec non farina ipsorū obducta, & aqua in qua candēs ferrum subinde extinctum est, febricitantibus per se data cyathis tribus. febris carentibus autem cum vino & aceti cyatho vno, vel rumicis syluestris radices cū scilla tres oboli, vel chamædryos, vel serpilli acetabulum totū cum oxymelite, vel anagallidis, quæ cœruleum florem obtinet, duo oboli, cum posca bibuntur, vel acetum scillites, vel oxymel. Composita autem hæc, panacis radices, guttæ ammoniaci, capparis radices corticis, herbæ lanariæ, scillæ



scillæ tostæ medullæ æquales portiones, exhibentur drachmæ vnius pondere. benefaciat etiam suspiriosis, & hydropicis. *ALIVD.* Myricæ fructus drachmæ quatuor, piperis tantundem, spicæ nardi drachmæ duæ, suffiminis ammoniaci totidem. Teruntur aceto scillino, instar drachmæ vnius dantur ex oxymelite.

*Ad lienem scirrhum induratum.*

CYCLAMINI drachmæ viginti, brionia drachmæ tres, dictamni drachmæ duæ, scillæ tostæ drachmæ octo, herbæ lanariæ drachmæ sex, capparis radicis drachmæ sex. pastillus triobolaris ex oxymelite porrigitur: & qui ex æruca præparatur, non inidoneus est: cibus competit tenuis, acris, ficcus: potio paucissima adhibendæ exercitationes frictionesq; , & sinapismi, interim etiam cucurbitulæ cum scarificatu defigendæ.

*De morbo regio, qui icterus Græce dicitur.*

CAP. L.

**R**Egius morbus, quem Græci icteron appellant, bilis est per totum corpus suffusio, modo atræ, de qua in lienosis à me dictum est, modo flauæ. Differentiis constat numerosis: quarum causæ & notæ hæ sunt. Si enim febricitante agro repente superueniens febrem finierit, crîsim testatur, materia ex alto foras prorumpente, contractum. Medicina non indiget, vt quod balneis & moderata frictione subito discutiatur. Si autem cum febre & biliosis deiectionibus inuadat, & præcordiorum dextra parte grauitas adsit, feruens iocinoris inflammatio significatur: cuius vi sanguis in bilem mutatus, per vniuersum corpus defertur. Sin autem feruor citra grauitatem in ipso subflet, ex sola iecoris calida intemperie, vitium gignitur. Si absque febre alba deiciantur, vesicæ fellis malum ostenditur, vel ipsius meatuum: si grauitas quidem præcordiorum dextram partem premat, obstructorum. sin autem citra illam, facultate imbecillum, vel attractrice, eius qui humorem ex iocinore eliciat, vel expultrice, illius qui ad intestina eundem protrudat. Quippe sanguis biliosus non expurgatus, in totum corpus diffunditur, quemadmodum in nigro arquato fieri dicebamus, statim vero his etiam vrinæ biliosissimæ affatim excernuntur. Cæterum fit etiam arquatus, ex intemperie calida solidarum partium, dum id quod ratione alimenti, ipsis offertur, in bilem transmutant, quemadmodum in aquæ subter eutem genere,



genere, cui nomen anasarca, in pituitosam humiditatem est mutatio. Verum talis arquatus dignoscitur hac nota, quod non subito, ac vna vice, sed paulatim procreetur, sic vt nulum ex commemoratis adsit. Iam verò noxiij medicamenti potus, & virus extrinsecus à venenato animali illatum, regiū morbum parit. Itaq; calidæ iecoris intemperiei, & inflammationis viriūmq; imbecillitatis, curationem suprà sumus persecuti, vbi de ipso agebatur, quam etiam integram huc transferre oportet, ne eadem mihi sint repetenda. At si meatus conceptaculi fellis vtriq; sint obstructi, vel alter dūtaxat, venam in cubito dextro ipsis diuidi consiliū est. Nonnulli vero, tum his, tum illis qui ex iecore inflāmato, arquatum contraxerunt, venam propter minimum dextræ manus digitum, incidunt. Cataplasmatibus quæ inflammationem arcent vtendum est, & purgatione ex hiera, nec non clysteres idonei sunt, potui rectè datur arquaticis, ius apij, vel adianthi, vel rumicis, vel serpilli decoctorū ad tertias, vel absynthium potioni inspergitur. Præclare faciunt raphani succi cyathi duo, cum vini cyatho vno poti. Et cichorei succi cyathi bini, vel terni per se aut cum vino poti. Sed qui iecoris inflammationi arquatum ferunt acceptum, mulsum bibent, vel decoctum tenuis aristolochiæ, vel hyperici, vel adianthi, vel herbæ lanarię, vel erythrodani similiter, vel cornus ceruini scobis drachma, cum vino, vel pastinaci syluestris decoctum in vino, vt tertia pars supersit, vel sulphuris viui drachma in ouis sorbetur. Hæc etiam propter obstructionē arquato laborantibus valde auxiliantur, seminis autem atriplicis scrupuli octo, cū chrysattico, aut alio passo in solij ingressu poti, vacuationem magnam præstant. Rectè etiā picra datur, & sicca, & ex oxymelite, & Theodoretus. Iam ex amaris amygdalis pastillus datur, & cinamomi quantū tribus digitis cōprehendi potest, in mulsi cyatho vno, vel aqua temperata, vel myrrhæ ad fabæ magnitudinem cum piperis granis quinq; tantundemq; cinamomi. Qui verò ex calida solidarū partium intemperie in arquatum inciderunt, molli frictione, exercitiis moderatis, vnctione & balneis tractandi sunt, cibo humido & mediocriter refrigerate, cremore ptisanæ, intybo, feri, cichoreo, piscibûsque, vino tenui aquoso. Qui ex lethali potione, aut ex virulentorū animalium moribus in hunc affectū sunt prolapsi, de iis quinto volumine



tractabitur. Porro si bilis in oculos faciémque se receperit, elaterij instar erui cum lacte muliebri naribus in balneo instillato, & statim in solium descendant, cauentes ne caput immergatur. Post balneum victu, recreatis, rursus medicamentum errhinon in sole, naribus infundito. Bene facit etiã cyclamini succus, porri, & nigellæ. Acetum vero accerrimũ naribus attrahat in solio desidens, contineátq; etiam pressis naribus paulisper, & mirifice vacuabitur.

*De vmbilico prominente.*

CAP. LI.

**C**Ausam vmbilici prominentis, & quomodo id vitij manu curetur, in parte chirurgica docebimus. Quoniam verò nonnulli etiam medicamentis in naturalem statum redierunt, ipsa hoc loco dicemus. Aluminis scissilis drachmæ quinque, flocium vini drachmæ octo, rosacei decem, gallæ immaturæ drachmæ duæ. Vino diluta, & in mellis spissitudinem redacta loco affecto inducuntur. Extrinsecus spongia posca madens superiniicitur, & fasciola deligatur.

**ALIUD.** Fabæ fresæ, corticum gallæ, balaustij pares portiones, coquantur in aqua: vbi dissoluta fuerint, tritaq; diligenter, spōgia, vt prædictũ est, imponuntur. **ALIUD.** Plumbi scobis drachmæ sedecim, cicutæ, mannæ, cerussæ, hypocistidis succi, singulorum drachma, vino dissolutis in modũ prædictum vtitor.

*Quomodo impuberes imberbesq; diu maneant, & particula naturales testesq; conseruentur, ibidem etiam psilothra numentur.*

CAP.

LII.

**C**imoliæ cretæ, & cerussæ æquales partes, alterci succo excipiuntur vt sordium spissitudo fiat, deinde oleo lentiscino quantum sufficit adiecto contundito, ac vtitor.

**ALIUD.** Cicutæ succum, solani, alterci, lupini foliorum tennerrimorum, psillij æqualem modum, vbi contriueris, vtitor, sed locum prius abstergito abluitoq;. Oportet autẽ pridie quàm vsurpare velis, aquam bibere. Medicamentum pilis abolendis dicatur, psilorum appellatũ. Afellorum domesticorum, qui tacti conduplicant sese in orbem, pilulæ rotundissimæ similem, græci *λερωμιλίσσ δνιονας* vocant, drachmæ duæ, sandarachæ drachmæ quatuor, calcis drachmæ octo, aceti veteris cyathus. Lixiuia è ficu tantundem: coquito in fictili, ac in balneo vtitor. **ALIUD.** Calcis viuæ partibus duabus, auripigmenti totidem, terræ cimoliæ parte vna, in



in aqua coctis quemadmodum explicitum est vtitur.

**ALIVD.** Simplex odorisque expers: calcis viux vtriúsque sextarium, sandarachæ vnciam. Coquito vt dictū est, & vtitur. Porro quæ pilos adimant, in oculariis exposita sunt.

*De ramicum generibus.*

**CAP. LIII.**

**C**um intestina peritonæo rupto deuoluuntur, operosa nimium est curatio. cum verò ob raritatem illius descendant, faciliior sanandi ratio est: Ac huic malo pueri potius, vrpote humidioris naturæ, sunt opportuni, multiq̃ue adeo citra manus operam medicaminibus impositis, & conuenienti deligatura perfanati sunt. Utendum verò est remediis infra comprehensis, vbi hoc solum addiderimus, affectus solo loco differre. Quando nanq; intestinum etiam num suprà in inguinibus iacet, nostri inguinis ramicem græci, βελονικήν vocant. Cum in scrotum iam infrà delapsum est intestinorū ramex, græce ἐντερονήλην dicitur. Malicorij igitur drachmæ, decem, gallæ immaturæ drachmæ quinque, in vini austeri cyathis tribus incoctæ, & leuigatæ imponantur, intestino prius confricato, & aqua frigida superfusa: decimo die soluantur, sed ita, vt eger in lecto maneat diebus triginta, bibâtq; cupressi decoctum cum vino, vel eius globulorum tres obolos, ex diluta vini portione. hoc medicamentum auxiliatur pueris.

*Aliud glutinatorium.*

**S Y M P H Y T I** radices, marrubij succi, amygdalarum amararum, gummi, pares portiones. **ALIVD.** Terebinthinæ fescuncia, ceræ, thuris, myrrhæ, ichthyocollæ, cochlearū cum suis testis, singulorum vncia, ichthyocolla in aceto diebus tribus ante maceratur. **ALIVD.** Cupressi, galbulorum vncia, gallæ tantundem, malicorij semuncia, taurocollæ vncie tres, manne thuris, semuncia, symphyti tantundem, cochlearum cum testis vncia. Galbuli & malicorium vino astringenti diu incoquantur. Et cum reliquis leuigatis excepta, in vsum accommodato. **ALIVD.** Aloës, malicorij, thuris, hypocistidis succi, glutini fabrilis, picis, bituminis, singulorum fescuncia, vini dulcis quod sufficit. **ALIVD** magis variū, facit etiā adultis cum morbus vetustatem nondū senserit: chrysocolle, taurocollæ, sarcocollæ, ichthyocollæ, lapidis Gagatis, lapidis hematitidis rhus, syriaci, & coriarij, acacie



singulorum fescuncia, lapidis pyritis ignem nō experti, magnetis cœrulei coloris, aluminis scissi, mannæ thuris, singulorum vncia, picis brutiæ vnciæ quinque, cochlearum cum testis vncia, argenti recrementi quod helcysma dicitur, vnciæ quatuor, gallæ, squamæ stomomatis, æris singulorū vncia, bituminis vnciæ sex, Myrsinati quod satis est. Vino astringente arida excipiuntur, Medicamento tam spisso vt digitos non coinquinet, vtitor. Quod si iacere non sustineant, triangula ipsos fascia crassiore, quæq; intestina possit constringere, tuto deligabis. A cibis infantibus abstinendum, vino copiosiore, crebris balneis, valido motu, nempe cursu, saltu, clamore, & id genus aliis.

*Ad aquosum ramicem qui hydrocele dicitur, vt humor collectus euacuetur.*

PIPERIS grana centum, lauri bacca octoginta, nitri drachmæ viginti, ceræ drachmæ quadraginta, olei hemina dimidio exceptis vtitor. ALIUD præstantissimum. Lapidis asij floris drachmæ sex, vna passæ acinis vacuæ drachmæ duæ. cumini æthiopici drachmæ octo, nitri rubri tantundem. Trita imposito, fouens vesperi & mane: quidam verò adiciunt etiā sulfuris drachmas octo. ALIUD. Calcem viuā balnei sordibus exceptam cum cerato impones, & paululū nitri calci miscebis. ALIUD. Radicis brassicæ crematæ cinis adipe suillo veteri liquefacto exceptus inducitur: per tri duum soluitur. † Ne autem humoris magna fiat colluuius, hoc vtere malagmate, Ceræ libris duabus & semisse, picis triente, guttæ ammoniaci triente, aluminis liquidi fescuncia. Proficit etiam medicamentum diægiron hoc est ex populo nigra & reliqua extrahentia.

† Antiquus codex, πρὸς τὸ μὴ πάλιν συλλογὴν ὑγρῶ γινώσκειν, Ne autem rursus humor colligatur.

*De inflammatione testiculi scrotique & alijs ipsorum affectibus.*

CAP. LIIII.

SCroti inflammatio hisce agnosceretur notis. locus primo contactu indolescit, feruor, duritiæsq; intensa apparent. Testiculo autem inflammationem sentiente non ex leui tactu dolent affecti, sed innixis validius digitis rubor & durities ipsius per summa minor extare videtur: impressis autē digitis durities in alto occurrit, & febris nonnunquam oritur. Itaque testiculorum inflammationibus propriè conuenit



nit sanguis ex talo dimissus: communiter autem omnibus cataplasmata & cerata. Imponi igitur debent ex lomento diluta vini mixtione cocto cum vis pāsis pinguibus acinorum expertibus cumini, vel hastulæ regiæ radix incocta, contritaq; miscetur tenuissimæ parti polentæ æquali: vice cataplasmatidis adhibetur vel lini semen ex diluto vino, vel fœnugræcum ex mulsā, vel lilij radix ex mulsā aut recentibus vini flocibus cum polentæ polline. Vel senecion, & coriandrum viride cum vis pāsis quibus acini sunt exempti. Sin multus infestāt ardor, foliis alterci cum triticea farina, aut cicerum obducuntur. vel arundinis foliis, vel cucurbita cruda. Si vetustior est morbus cum duritie, cucumeris sylvestris radix in mulsā cocta, leuigataq; cum lolij farina admouetur. Item hoc efficacē est auxilium, vuarum passarum quibus acini sint exempti, vnciæ quinq; cicerum subferuefactorum fescuncia, cumini vncia, sulfuris vnciæ nouem, nitri vncia, resinæ vnciæ tres & semissis. contrita omnia cum melle in cataplasmatidis formam digerens, vtitor. cerata autem hæc sunt, olei cyathus, colophonix vnciæ sex plumbaginis, cumini, vuarum passarum, lomenti singulorum triens, ceræ sextans. Plumbago cum oleo adūscque aliquantulam spissitudinem incoquitur. deinde cera resinæque inditur. Sublata ab igne semifrigida, vis pāsis cōtritis, farinisq; superfundito. A L I V D. Olei anethini & rosacei, ceræ, resinæ piceæ, singulorum quincunx, cumini vnciæ duæ & semissis, stercore asinini fescuncia. cuminum teritur cum stercore asinino, ceratumq; refrigeratum miscetur vnaq; leuigatur, deinde in panniculum illitum admouetur, lana superaccommodata. olei omphacini, vel butyri, vel resinæ æquali modo vtitor. Quod si à sudoribus vlcera in scroto excitentur, galli detritam, vel alumen inspargito, pingui aut hircino felli & perungito. Porro ad testes aphtæ vlcere pressos terram cimoliam cum aqua prius illitam, finito siccescere, calidaque aqua abstergito, myrtum siccam, & smyrnij paulum in puluerem redactum applicato. Si caro in testiculis excreuerit, cinis sarmentaceus nitro & aqua maceratus curat inductus. Pruritu scrotum irritante, nitrum, pedicularia, Græci staphidagriam appellant, alumen liquidum, aceto contritum, rosaceoq; illinitur in balneo. Vbi laueris, candidus oui liquor cum melle parti inungetur.



*De seminis profluvio & veneris insomniis.* CAP. LV.

**S**eminis profluvium quod græcè γονόρροια appellatur, est sinuita ac præter voluntatem excretio, quæ continuè naturalibus non intensis, ex retentricis naturæ facultatis imbecillitate provenit: in qua ex usu est cōquiescere, lumbos pubemque hapso ex vino & melino vel œnanthino cōtegētes: mox cataplasmatibus obducere ex palmulis, malis cotoneis, œnate, acacia, hypocistide, rhu, & similibus. Insidere oportet lentisci, rubi, & id genus aliorum in vino decoctionibus, vel etiā, aquis cibisq; vti siccantibus: post prima morbi tēpora ad exercitatoriam rationem deducere, qua totum corpus, partēsq; affectæ confirmentur. Cæterum quomodo seminis paretur fecunditas, libro primo, ubi de sanitate tuenda agitur, abundè tractauimus. Vbi etiam illorum qui venerem exercere nequeunt, scripta est curatio, itē quæ ad veneris insomnia proficiat. porro iuuabit genituræ profluvio laborātes, & lectus frigidior, & dextri lateris, vel sinistri incubitus, itē medicamenta frigida lumbis substrata, qualia sunt coriadrū, cicuta, cerussa, portulaca: omnia vero ex aceto.

*De satyriasi.* CAP. LVI.

**S**atyriasis est naturalium palpitatio, quæ cuidā seminis vasculorum inflammatoriæ affectioni cum intentione superuenit. Hæc palpitatio nisi finiatur, in seminariis vasorum resolutionem, aut conuulsionem delabi consuevit, ac qui conuulsi fuerint celeriter intereunt. obeuntes autem ventre inflantur, & frigidum sudorem emittunt ac mulieribus quoq; sed raro hoc mali accidit. sanguinem igitur proterius dimittere conuenit, victu vti tenui, & abstemio, eumq; assumere quotidie, valenter nunquā, sed paulatim. Laudatissimum igitur est remedium, beta, malua & mercurialis momentum, & ius esculentum cochlearū: nil mali fuerit etiam ex simplicib. clysterem ab inferiore parte iniicere. Quæ vero vrinam mouent, medicinæ cauendæ sunt, lumbis refrigerantia quoque admouere oportet, vt solani succum, aut portulacæ, aut alterci, aut cicutæ. Necesse vero est, colem, & inter anum, scrotūque locum refrigerantium, quibus leniendi vis inest, aliquo demulcere, nempe argenti spuma cimolia creta, cerussa, aceto dilutis, aut aqua, aut vino dulci, aut sapa. supino cubitu cōquiescere nocuum est. Rursum confert bibere nimphææ radicem, iridē, & adiantum. Ru

ta ve



te vero succi potus profuerit, & seminis profluuiū laborāti, & cui naturalia sunt arrecta. Cibus datur frumētaceus modicus, sitis indicitur. At si prorogatur vitiū, cucurbitulę cute ferro incisa defigēdę sunt. Si plenitudo adsit etiā hirudinib. vacuare, & vētrę cruda ordeī farina oblinere, alienū nō est.

*De priapismo.*

CAP. LVII.

**P**riapismus est firmum genitalis incrementum, quod in longum latūmq; intumescit, citra veneris appetentiam. flatulentus nimirum est spiritus qui particulam in tumorem attollit, ex humoribus crassis, & viscosis modici caloris opera procreatus. Notum vero est cuilibet, particulas non esse calfaciendas, sed leniter refrigerandas cerato rosaceo, cum aqua contuso, itē chamamelino cerato in genitali & lumbis imposito, victus & medicamenta exhibentur, quę extenuare citra manifestum calorem possunt. Applicabuntur etiam quę naturali modo operātur, experimentis ac vñ probata. Nymphaea igitur potui dabitur, viticis semen: rutęq; viridis obsonis mixtū. Sed per initia id non assumi debet, vt quod vehementer calefaciat: verum post aliorum extenuantium vñ. Si vacuatione vti libeat per vomitum id facies. Nam per aluum factę, vicinas particulas sæpe fluxioni oportunas efficiunt. Exercitium fricatioq; flatibus discutiēdis rectē adhibentur. Nulli prædictorum venus prodest, nisi quibus ex huius abstinentia semen abundare conicimus.

*De particulis inefficacibus.*

CAP. LVIII.

**Q**ui hoc vitio laborant, nō ruunt in venerem cōq; pusillanimes fiunt. Causa horum est, particularum resolutio, vel seminis inopia. Cum igitur ea quę semini generādo sunt, libro primo inter præcepta salubria exposuerim, tum quę simplici virtute ad venerem incitant, nunc valentiora adicere oportet. Communiter igitur medicamentis quę a lassitudinibus reficiendis, acopa dicuntur, ad resolutionē inscriptis, hic quoq; vtendum est. Priuatim stellio concrematus, in puluerēmq; redactus cum oleo magno dextri pedis digito, illinitur, & venus exercetur: vbi cessare voles, digitus abluatur. Iam medicamentum ex stellionibus varia constans mistura efficax est. Potui vero dantur quę incitant, quale hoc primum est, piperis, baccarum pini, petroselini, ceruini genitalis ramenti, terebinthinę pares portiones. melle extipiūtur. A L I V D. Cicerum crudorum, bacca-



rum pini, singulorum vnciae duae, seminis erucæ, piperis, singulorum vncia, mellis datur quod drachmas duas impleat cum vino. Item satyriace dicta ex multis composita congruet, atque id genus alia. Inspicere præterea oportet reliquas morbi causas, & convenientem ipsis correctionem accommodare.

*Pudendorum & ani remedia.*

CAP. LIX.

**N**aturalium anique; vlcera citra inflammationem oborta, medicamentis indigent, quæ vehementer resiccant: cuiusmodi sunt ex charta combusta, anethum vsum aridum, cucurbita concremata. At siccis recentibusque vlceribus, etiam aloë præsens est remedium, si arida in puluerem redacta applicetur. Porro omnium lenissimum est, & nihilominus efficax pompholyx. At si humidiora euenerint vlcera, piceæ cortex per se lapis hæmatites. sin etiam altè descenderint, manna prædictis miscebitur. Si pascendo serpent, lenticula cum malicoriis inducetur, utendumque est Coraco ex oxymelite appellato, & bithyno, adhuc, eo quod ex charta vsta componitur. Rimas autem naturalium sedisque, Græci vocant rhagadas, inuat resina fricta, cum rosaceo contrita, ut sordium fiat spissitudo, adiecto etiam luteo oui, opioque: vel hederæ foliorum combustorum cinis cum rosaceo in plumbea pila tritus admouetur. Iam pastillus ex ænelæo, & lapis phrygius admodum probata sunt remedia ad rimas, tum sordida circa ani orbem vlcera, præsertim quæ elidi nequeunt. **ALIUD** simplex quod etiam acrimoniam obtundit. Cadmiæ combustæ, elotæque; vnciae duae, rosarum vngue ex foliis defecto, vnciae sex puluis inspergitur parti vino prius abstersæ. Ad condylomata vero faciunt chalcitidis, æsypi, medullæ ceruinæ, rubi foliorum æquales portiones cum cerato, idem præstant pastilli ex ænelæo. Quod si in cole intra genitalis foramen vlcus delituerit, pus, vel sanguis citra urinam redditus fatebitur. Curatur primum aquosa mulla collutum, mox lacte, postea collyrio Asteri lacti mixto, aut pastillo Leuco, aut is qui vocatur dialotarion in plumbea pila subactus demittitur, vel etiam penna tincta perlinitur. inde tenue linamentum tortile vinctum imponitur. Præstantissimum vero est etiam quod capit gallæ, pompholygis, amyli, & aloës pares modos, rosaceo, & plantaginis succo leuigatos.

*Ad naturalium dolores.*

**BYTRYI**, resinæ, paribus portionibus pulchre liquatis obdu



obducito, vel ex seminis linis succo, æquum myrrhæ & resinæ frictæ pondus leuigatum imposito.

*Ad intumescencia pudenta.*

**V**itis foliorum tenerorū triginta numero, cerussæ drachmæ quatuor trita applicantur. Cæterum fotu ex aqua marina frigida coles vtitor & quiete, penemq; deligato. Carnosas naturalium excrescentias, quas Græci thymos vocant, compescit, nec finit rursus augescere cinis palmium cum aceto cataplasmatismodo illitus, item salicis corticis combusti cinis. In vniuersum & thymus, & myrmecia, & verruca penilis quæ dicitur acrochordon per medicamenta valenter exulcerantia eliduntur: iis autem quæ exdunt, emoriuntur. Proprie contra hæc vitia proficit, elaterium cum sale impositum, grossi cum aceto, nitro & farina. Liquor fici illitus, smaridis caput salsum crematum in cinerem, ærugo cum sulfure viuo combusta, tithymalli liquor illitus, ocymi folia cum atramento futorio, vel heliotropij maioris semen cum vino cataplasmatismodo applicatum.

*Ad ani inflammationem.*

**C**ERVSÆ vnciæ quatuor, pompholygis vncia, vel cadmiæ teneræ, thuris singulorum vncia: sereos succi hemina diluuntur, succus autem paulatim affunditur, donec absumatur. Deinde ceratum ex vnciis duabus ceræ, & rosacei libra confectum: vbi deraferis miscetur, validèq; emollitur. Demittitur autem instrumēto quod à pure trahendo *πυλιν* Græci nominant, & superdeligatur, facit autem & ad ani fistula cum inflammationem sentiunt, item aduersus sedis exulcerationes, cum ardore, aut rofione infestantes.

*Ad sedis erysipelata.*

**M**EDICAMENTI, quod ab herbarū succis diachylon appellatur, libra, rosacei quantum satis est, panis puri libra, croci vncia, opij vncia, crocus & opium passo macerantur, panis aqua. Deinde leuigatis ipsis, medicamen diachylon, & rosaceum admiscetur, emolliturque. Vtile est etiam ad podagras calidissimas. **A L I V D.** Arcet etiam ani inflammationem cerussa cum vino rosacéoq; in pila plumbea, & cochleari plumbeo trita inunctaq; vel cerussam & oui candidum rosaceumq; in eadem pila leuigata, dum sordium spissitudinem habeant, perungito.



*Hedricum ad ani dolores.*

ALTERCI folia tenera, portulacę folia tenera, micas panis in vino tinctas, ouorum tostorum lutea pari pondere, rosacei quod satis est. vbi locum rosarum & meliloti decocto foueris, cataplasma imponito.

*Hedricum optimum ad ani inflammationes, eiusdemq; excrescentias.*

CERUSSAE, spumę argenti, suffiminis ammoniaci, bdellij, singulorum scrupula sex, terebinthinę vncia, cerę semuncia. Arida succo solani, alterci, vel portulacę coteruntur. Quę liquatur, vbi illis adiuncta fuerint, excipito. Et emolitis rosaceo, vtitor. Iam medicamentum phicotiche. & dia molibdenes ad hæc dialotario. Præterea pastillus dia halicabu & dia rodio ad ani inflammationes genitaliumq; laudata sunt remedia.

*Ad excrescentias ani.*

EXCRESCENTIIIS si inflammatio adest, vtendū generatim iam commemoratas, & propriè hoc pastillo, cerussę quadrās, pompholygis vncia, argenti spumę sextans, mastichę scrupula sex, alterci succo excipiuntur. Si careant inflammatione, cupressi galbulorum combustorum cinis loco dolenti, vino prius absterfo inspargitur, vel cucurbitę aridę corticis combusti, vel palmularum nucleorum cinis similiter, vel testarū ouorum, & fœniculi cinis, vel succi mali punici foliorū, æqualis modus. Vino albo deterfa pars diebus septem eluitur. callosa autem tubercula calce & auripigmento cum aceto acri trito rectè etiam in sole perungis.

*De hæmorrhoidibus.*

ORIS venarum, quę quod sanguinem fundere solita sint græcis *ἡμorrhόιδες* appellatur, iusto largius inanitis, habitū in aquā subter cutē resolui cōtingit, & affectos, infeliciter cōtabescere: periculum vero est, etiam ne largum sanguinis profluuium accidat, quemadmodum ne idem in totum supprimatur: vnde laboriosa est curatio. Quare cum plures sint hæmorrhoides, vnā purgationis gratia relinquere oportet. Quædam vero superius existunt, non apparentes, eoq; difficilem curationem recipiunt. Cæce autem nihil quidem excernunt, sed dolorem mouent acriorem. hæ itaque succo cyclamini illito adaperiuntur. Contra eas vero quę immodicè fundunt sanguinem, spinę ægyptiæ, foliorum sambuci, artemisiæ, singulorum vnciæ quinque, sideritidis vncia, quatuor, coquantur in aquæ hemipis octo ad dimidias, inde



herbæ proiciuntur. aquæ vero miscetur pulvis hic cretæ sutoriæ, aluminis rotundi, singulorum drachmæ octo, argenti spumæ drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, misyos drachmæ duæ, sereos tantundem. vbi puluerem decocto solueris, septies quotidie irrorato. insecuto die pari modo aliam confectionem mensura æqualem superfundito: sic tertio. Et si reliquæ aliquæ remaneant, quarto die acu compūges: si sentiat æger, aut cruor emanet, decoctum similiter facit. pulueris vero partem dimidiam miscebis. Cum foueris, puluere attingito, vt exacte adurantur. panis ob inflammationē instar cataplasmati inducetur. A L I V D. Panis purus in garū primæ notæ tinctus, vstusq; in nouo fictili, & pertritit applicatur, ano prius vino abluta. Facit etiam ad excrescētias. A L I V D. Sereos drachmæ duæ, chalcitidis drachma, misyos tantundē, atramenti sutorij quod chalcantum dicitur drachmæ tres, aluminis scissi drachmæ nouem, æris combusti drachma, cretæ sutoriæ drachma. sicco vtitor. Cibi erunt iis qui supramodum inaniuntur, pauci sanguinis efficaces, & minimè recrementitij, quiq; siccant, & astringunt, cuiusmodi est chondrus ex posca lotus: oryza & alica. Ex oleribus conueniunt intybus, cichoreum, portulaca: inter vina, quæ astringunt. In hæmorrhoidibus autem obcæcatis, his cōtrarius victus proderit: potissimum vero loliginum, sepiaurum, multipedarum, torpedinis, selachiorumq; esus probè conueniet. hæc enim sanguinem commouent, item quæ mensibus ciendis sunt, hisce congruunt.

*Ad proidentem anum.*

ERYCÆ fructus, gallarum, cerussæ, acacie, hypocistidis succi, piceæ corticis, thuris, myrrhæ minæ, paria pondera. Sicca admovento, ano vino prius austero deterfa: A L I V D. Recrementi plumbi, rhus syriaci, singulorum drachmæ octo, rosarū floris drachmæ quatuor, myrrhæ minæ drachmæ duæ. Vtitor sicut priore. A L I V D. Piceæ corticis, manna, spumæ argenti, singulorum drachmæ octo, cupressi orbiculorum siccorum, plumbaginis singulorum drachmæ duæ, vtitor quemadmodum præceptū est. item vrina ipsius ægri calens adhuc superfusa adiuuat.

*De veteri affectibus & primum de mensium purgatione. C A P. LX.*

**M**ulierum plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt, paucis vero ante tertiumdecimū, aut duodecimum,



decimum, plerisq; autem post quartumdecimum erumpūt. Tempus cuiq; purgationi præfinitum non est, ordinatumq;, multis ad duos trēsve dies, hæud paucis vsque ad quintum profluit, aliis etiam adusque septimum: raro ad duodecimū purgatae sunt. Porro desinunt menstrua aliis anno quinquagesimo, paucis autem vsque ad sexagesimum durant. Nonnullis à triginta quinque annis, præsertim obesīs, menses cessare incipiunt morata igitur purgatione, lauandum est circa statum menstruale tempus, ac præsumetur potui, aut sesamum, aut capitatum porrum cum pipere, & ruta simul incocta. Potio autē ex passō cretico erit, cuius heminae mensura pota ambulationibus mēstrua dimoueantur. Cibus sit, lolligines, sepia, polypodes, & quæ eiusdem sunt generis: quippe sanguinem propriè commouent.

*De mensium suppressione.*

**SUPPRIMITVR** menstrualis purgatio, interim toto corpore male affecto, nonnunquam vero locis peculiari vitio conflantibus ex frigidityte insita, aut ictu, aut intemperie ab origine, seu acquisita malignitate magna vero parte ex abortu: vel principaliore quadam parte primario affecta, nempe iocinore, aut ventriculo, aut thorace, aut id genus aliqua, longo morbo vitiata. At suppressio complures affectus, & longos solet procreare. Cum igitur propter aliquod interaneorum affectum primarium purgatio circumciditur, aut moratur, ex usu maximè fuerit, id quod primario afficitur curare, inde vteri habere rationem. Notæ vero quibus hæc deprehenduntur, in superioribus sunt expositæ. Cum vero nihil illorum adfuerit, constat palam primario affectu vterum occupari. Itaque si ætas non prohibet, aut habitus, aut aliud quippiam, venam oportet incidere, idque non ante statum mensium tempus: sed vbi iam præterierit, decem dies superadiiciantur. Detrahetur autem sanguinis, neque plus duabus libris & dimidia, neque minus vna, si quidem venam diuiserimus. Sin autem non, hiera diacolocynthidos purgari debent, duarum drachmarum pondere, in sex mulsæ cyathis. Si febris adsit, hiera quidem vti non expedit, verum sanguinem mittere in primis febriculæ diebus est opportunum. A purgatione reficiendæ sunt mulieres diebus pauculis: in sequentibus autem, exercendæ obambulationibus, inferiorum frictionibus, & balneo. Cibi cōgruunt distrib



distribui faciles, & liquidi, olera, dulcia omnia, pisces saxati-  
 les, ex auibis teneriores, lactis potio, ex melle confectiones,  
 μελιτρώματα vocant, vinum tenue, album, non adeo vetu-  
 stum. carnes inidoneæ his sunt, & legumina, præter prisanā.  
 Vbi statum mensium tempus propinquum est, dantur ex  
 marinis selachia, & malachia, vt dictum est, item ostracoder-  
 ma, hoc est testaceam cutem sortita, capitata porra, cum ru-  
 ta & pipere cocta, eorumq; ius potui datur: infernæ partes  
 vinculis, tribus quatuorve diebus constringuntur. Cum in-  
 stat tempus purgationis, tollitur deligatura, myrrhæ obo-  
 lus bibitur, aut fabæ instar, vel castorium ex passo, aut mul-  
 sa, vel decoctum artemisiæ, aut saluæ post balneum ex pas-  
 so, & absynthij. Absynthites autem vinum per totius cura-  
 tionis decursum potatur. Vbi accesserit iam menstruale tem-  
 pus, si nihil, aut nulla mentione dignum fuerit excretum, ex  
 talo sanguis detrahendus est. Post septimum, aut octauum  
 diem, purgatione ex hiera vtendum est, secundum quartum  
 diem, dropax inferiori ventris regioni, lumbis & feminibus  
 applicetur, atque aquæ potu triduum vsa, sinapi cum æqua  
 panis macerati portione adusque æquinoctium admoueat,  
 deinde lauet, insecuto mense ficus siccata in vicem panis mi-  
 sceantur decocto scœnugræci, maluæ, pulegij, rutæ, & arte-  
 misiæ. In sinum vero demittetur, fusiñum, aut amaracinū,  
 pessusq; inferatur emneapharmacus, aut libanius. Est autem  
 pessus lana concerpta, & in rotundam, digiti humani formā  
 redacta qua medicamenta contineantur. Hæc igitur curatio  
 plerisque ad purgationem abunde fuit. sin autem vehemen-  
 tioribus indiguerit medicamētis, hæc sunt, iris illyrica cum  
 vino pota, iunci angulosi, ariq; radix, cassia, iunci rotundi  
 flos, & nardus, helenij radice decoctum, myrrhæ ad fabæ  
 Græcæ magnitudinem cum passo ex dimidio mulsæ cyatho  
 pota, atque dictamni decocti cyathi duo, item ammoniā-  
 cum, & sagapenum. Quæ minus stomachi vitiis sunt oppor-  
 tunæ, etiam opopanacis paululum in globulos redactum  
 percocto melli intinctum, assument. Iam verò consueta no-  
 bis semina menses mouere possunt, sed minus: scœniculum,  
 cuminum, apium, daucum creticum, seseli, ami, sison, cicer,  
 fructus cedri, ac omnia quæ vrinam prouocant. Commode  
 etiam sinui muliebrium imponuntur myrrha, absynthij, aut  
 lupinorum decocto trita, aut rutæ succo leuigata, bdel-  
 liumq;



liumq; similiter, styrax, syluestris oleæ gummi, aut rutæ succi itidem, aut longa aristolochia, in collyrii formam concinnata. Per similitur etiam magni centaurei radix, aut veratri, aut liquor scammonia, & cucurbitæ syluestris medulla per se, & artemisia applicata cum ruta, insuper & galbanum suffumigatum. Eadem vero & fœtus solent educere.

*De immoderata purgatione vteri & sanguinis profluuii.*

C A P. L X I I.

**I**mmodicæ purgationes mulieribus oboriuntur, interim mensibus adactis confarctimq; ac concitatus erumpentibus, interim ob legitimum partum quæ plerunque etiam sponte sua cessant: Crebro autem abortus causa, vehementi laborant profluuii, ut subinde periculum accedat. Imprius igitur extremi artus ab alis & inguinibus, vinculis excipiuntur. Posca non frigida potui datur, muliebria ex eadem fouentur, & iniiciuntur locis multæ lanæ, ex vino, oleo, vel rosaceo, vel melino, vel myrteo expressæ. Cibus dabitur chōdrus lotus ex posca: vel oryza, vel alica: vino autem abstinebitur, & hydromalum austerū, aut omphacomeli, aut huiusmodi quippiam ipsis exhiberi debet. Balauftium in posca propinari, vel hypocistidis, vel acaciæ succus, vel lycium, vel samius aster, vel succus immaturæ vixæ ficcus, vel rheon, vel lenticulæ ex Italico fistili combustæ cinis: aut sesamum editur in posca maceratum, quoad molle delicatumq; euaserit: insinuati vero pessi per naturalia, sanguinis fluorem sistunt, hypocistidis succus, aut acaciæ cum manna in aceto contritæ. Mirificè auxiliatur spongia in vino, aut liquida pice demersa, pessarij modo adhibita, vel combustæ ipsius cinis cum aceto, vel posca eodem modo insinuatus. Similiter etiam suberis in Italico fistili concremati cinis. A foris autem imposita iuuant astringentia epithemata, & cataplasmata ex palmulis, & cotoneis: quæ malicoria receperint, aut fageam glandem, aut rubi surculos, aut lentisci folia, balauftium, acaciam, hypocistidem, gallæ modicum, alumen. Maxime vero hoc, taurocolla madescit posca, quousque soluatur. deinde in linteolum validum illinitur, lumbisq; agglutinatur. Efficacia ad hoc sunt, & glutinantia emplastra, veluti Armonia, Icesios, Athene, Meline, Indica, & similia. Pessulis quoque ad sanguinis profluuium uti oportet. Gallæ interius leuigatum, & thuris lachryma aqua diluta naturalibus



bus inferitur, vel cytini, vel mala punica dulcia similiter, vel polygonum tritum. Composito autem, aluminis scissi, gallarum interioris, acaciae succi, mannae, singulorum vncia quatuor, ouorum tostorum lutea quatuor: arida lenigantur succo plantaginis, miscenturque. Cum usus exigit, excipiuntur in pessum ex lana, & in rosaceum intinguntur, insinuanturque naturalibus. Iam cucurbitulae leues magnae frequenter subter mamillas affixae abunde retrahunt. Inseffus autem profluuium sanguinis laborantibus conuenit, ex marino iunco, Graeci vocant oxyechœnum, capitibus myrti, rosis, rhamni foliis, rutae surculis, æquali pondere in aqua coctis insidere iubeto. ALIUD. Mali punici dulcis radicis corticis, myrti, cupressi corticis singulorum tres partes, gallae pars vna, aquae quod satis est. Infundito autem per vterinum clysterem succum plantaginis, aut fereos, aut polygoni, aut solani, aut perdicii herbae, aut psyllij, aut hypocistidis, aut acaciae, eaque lana aut digiro, aut specillo, aut pinna in longitudinem figurata, adusque orificium imponatur. Insuper passillus Andronis per vterinum clysterem infusus cum quodam ex succis commemoratis, aut vino astringente efficax est remedium.

## De fluore muliebri.

## CAP. LXIII.

**V**luae fluor, totius corporis quod expurgatur est distillatio: Talem vero speciem id quod euacuatur, repraesentat, qualem etiam humor in corpore superans obtinet. aliud rubrum, veluti sanguinis sanies, aliud candidum, pituitae soboles est, pallidum aliud, quod bilem testatur, aliud vero aquosum. at si sanguis purus, sicut in venarum sectione, efferatur, attendendum est accuratè, ne quaedam in vulua erosio sit excitata. his notis fluor deprehenditur, loci continue madent humoribus, colore variantibus, laborans decolor est, cibum non sentit, eumque fastidit, in obambulatione difficulter, spirat, oculos habet prætumidos, nunc cum dolore, nunc citra illum, aut cum exulceratione, aut sine illa, aut inflàmata, aut sordida, aut pura. Toti igitur corpori auxiliantur quae citra manifestum calorem exiccant, cum affectus sit humidus, frictio totius corporis, & unctio ex melle abunde cocto, medicamina dantur vrinam ciētia, utpote aqua, cui asarum & apium sit incoctum: vacuatur etiam totum corpus per aluum: praeterea portulaca commanducata, succusque;



cusq; ipsius potus praesidio est. Item balaustium, rubi fructus & flos, quercus liber qui cortici ligni subiacet, & tunica glandis putamini subiecta. Equisetum maximè sistit rubrum fluorem, potum ex aqua, aut vino. Vel hypocistis, lentisci fructus torrefactus, cum vino sumptus, samius aster, lemnia sphragis, coagulum leporis, aut hœdi, aut ovis, aut vituli, aut cerui, vinacea trita, myrti, vua immatura sicca, piceæ cortex. & quæ ad vuluam sanguinis profluuium laborantem dicta sunt, non admodum efficacia. Vbi vero cum labore fertur, per siphonem vteri, clysteremve alicæ succum, aut ptisanæ, aut tragi, aut oryza demittes cum aliquo medicamentorum quæ dolorem sopiunt, ἀνέλκω Græci vocant: & in accessionibus quidem lenire oportet: cum autem remittit, circuitum enim nonnunquam habet, habitum corporis mutare noxium humorem euocando expedit variis gestationibus, obambulationibus, vociferatu, inunctionibus, cucurbitulis, dropacibus ad partes superpositas vinculorum iniectionibus, frictionibus, psilothris, smegmatis, sinapisinis, vomitibus à radícula victus ratione viribus recolligendis dicta, balneis, vino, vario ciborum genere.

*De inflammatione vteri, & declinatione.* CAP. LXIII.

**I**Nflammatio vulvæ, pluribus ex causis oboritur. nempe ex ictu, mensium retentione, frigore, & inflatione: adeoq; ex abortu, & ob sinistram partus æditionem. Comes inflammationis vulvæ est febris acuta, dolor capitis, tendinis basis oculorum, brachialis, digitorum, & colli deorsum retractio, declinatio ad opposita stomachi ex consortio dolor, oris vulvæ conniuentia, pulsus exigui, crebriq;ue. Et si languida fuerit inflammatio, haud valido ipsius vteri dolore torquentur. Sin vehemens, & ipse totus pulsatilem cruciatum percipit, vndiquaq; inflammatione obsessus. si pars ipsius illam sentit, in ea magis dolor intenditur. nam si posteriora ipsius solum laborent inflammatione, dolor lumbos inuadit, stercus longanone compresso, retinetur. si priora, dolor inferiorem ab umbilico ventris regionem occupat, & stillicidium, aut vrinæ difficultas vesica pressa excitatur. lateribus inflammationem expertis inguina tenduntur. & crura grauantur. Extrema ad fundum vteri parte inflammata, in umbilico dolor potissimum cum tumore infestat. Cum vero os vulvæ inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitoque



roq; immisso os occurrit durum rigidumq;. Itaque in cura-  
 tione primum vsui venit fots ex vino & oleo, vel vino &  
 oleo rosaceo super infernam ventris regionem & lumbos  
 per hapsm ex lana puriore citra deligaturam adhibitus.  
 Cibo abstinetur triduum, secundum quod sanguis ex cubi-  
 to mittendus est, si nihil prohibet. alendæ sunt chondro ex  
 aqua mulsa, vel pane, vel ouo forbili, vno die interposito.  
 Post quintum, cataplasma superaccommodatur, polline fa-  
 rinaceo, semine lini, fœnugræco, ex mulsa, in qua papauerū  
 capita decocta, reiciantur, & oleo. at si inflammatio erysipe-  
 latis naturam sortita exandescat, meliloto in passo cocto  
 tritoq; ouorum tostorū lutea adicito cum rosaceo, vel me-  
 lino, vel crocino, & cataplasmatibus modo adhibeto: aut pal-  
 mulas vino temperato feruefactas, cum polentarum polli-  
 ne, & quodam ex enumeratis vnguentis leuigato, applica-  
 tōq; in morbi aut declinatione ceratum nardinum, aut cy-  
 prinum iniiciendum est. Per totum verò morbi decursum,  
 etiam infessus vtiles sunt ex decocto fœnugræci vel seminis  
 lini, maluæ, artemisiæ, & oleo. In iis autem quæ nō sustinent  
 calorem, ex aqua calida rosaceo superfuso: pesos autē in-  
 fusionesque adhibere conuenit ex æsypo, butyro, medulla  
 ceruina, adipe anserino, vnguento susino, & cera thyrreni-  
 ca. in quibus autem calorem ferunt, etiam pessus qui ab au-  
 reo colore chrysus nuncupatur, ipsis cōueniet, item ennea-  
 pharmacus: rursus in quibus non tolerant, ex ouo, rosaceo,  
 adipe anserino, vel gallinaceo adaptabitur. Porro ad inflam-  
 mationes magis furibundas emplastro dia chylon quod est  
 ex herbarum succis in vase fictili cū rosaceo liquefacto mi-  
 scetur succus plantaginis, vel sereos, vel cichorij, vel intybi.  
 Aut hoc vttere: adipis anserini, vel suilli recētis drac. quatuor  
 cerati rosacei, vel susini sextante, ouorum tostorū luteorū  
 vncia, croci drachma, myrrhē tribus obolis, opij obolis duo-  
 bus, vel loco opij, papauerū capitum decocto: si dolor mul-  
 tus excruciat, lachrymā papaueris instar lenticulæ cū lacte  
 muliebri, & succo fœnugræci in pello subiiciendū exhibeto.  
 At si inflammatio cū duritia infestat, tetrpharmacum rosa-  
 ceo solutū, applicatur, vel infunditur. si à naturali sede vul-  
 ua declinauerit, per accessiones similem inflammationibus  
 curationem recipiet. vbi verò remittitur dolor, & declinat,  
 leuioribus vtendum. Quod si malū inueterauerit, noxia ex

immisso  
 morbi  
 capitulo



alto euocantibus vtendum, quæ metasyncriticâ dicunt. Extrinsecus autem duritie oborta, malagmatis pugnâdum, nempe dia melilotum, hoc est ex fertula campana confecto, item Muasei, Icesii, melinæ Serapionis, aut pyrina, victus autem per initia tenuis adhibetur. Vbi paulum declinauerit malum, ægrotantes ad balneû ducentur: varioq; magis cibo & pleniore nutriendi.

*De vuluæ abscessu.*

CAP. LXV.

**I**Nflammatione in abscessum transeunte, dictæ quidem notæ intensiores erunt. Præterea verò inordinatæ febriû cum horrore accessiones obueniunt primis quidem temporibus intensæ, cum doloribus. ad vltimum, vbi suppura-uerit, aliquantulum remittunt. Postquam verò erumpit vomica, dolores acriores subinde visi sunt, ceu lancinantes & punctus modo incidere, febriculæ vehementius instant. Atq; vrina nonnunquâ retinetur, nonnunquâ stercus, impedimêto ab affecta vteri parte facto. Aliàs tumor in pube eminet, & veluti exudationis sensus cû abscessus maior fuerit. At quod in expositis locis est, etiâ instrumêto ad perspicuendû iniecto, aut digitorû tactu deprehenditur præterquam quòd dolores ob neruosam oris vuluæ membranam acriores vrgeant, sicut in fundo sinûque minus doloris percipitur, & digitis quidem tumor non occurrit, os autem gracilius ostenditur. Suppuratio itaq; celerius adiuuanda est cataplasmatibus ex scenugræco, semine lini, farina hordeacea, aut frumentacea, cui ficus coctæ adiciâtur, interim & stercus columbinû. Inseisibus etiam ad inflammationem aptis, frequētius vtendû. Itē pessulis ex terebinthina, mirrha, œsypo, butyro conueniunt. Abscessu autem rupto, si ad vesicam pus euaserit, lactis & cucumeris seminis potu vtendum est: sin ad longanone ruptus sit, lenticulæ & malicorij decoctum indetur aluo. At si in sinum pudendi eruperit, mundum quidem à pure, rosaceum infundetur, aut candidum oleum, aut retrapharmacum regale, aut butyrum recēs. sin autem efferatur faries tenuis, foetida, ceu ab vlcerebus depascentibus, magis astringens erit enema ex myrto, palmulis, & lenticula. Si verò humoribus etiam excretis, inflammatio diuexet, persistere in cataplasmatibus, & inseisibus, ratio est. Cæterum si in vuluæ ostiolo, abscessus sit obortus, neq; rumpatur, partibus, que puri incumbût, extenuatis, ad puris excre



excretionem, quæ manu administratur, diuertere consilium est, ut in chirurgica pertractabimus.

## De vteri exulceratione

## CAP. LXVI.

**E**Xulceratur subinde vulua ex infelici partu, aut foetus extractione, aut eius corruptela, vel ex medicamentis acribus, vel fluore, vel abscessibus diruptis. si igitur propta in conspectum venerit exulceratio, instrumento locis inspicundis idoneo deprehenditur. sin altè defederit, ex iis quæ excernuntur. Humor enim diuersus excernitur: ex inflammato quidem vlcere, paucus, cruentus, aut fœculentus cum magno dolore: ex sordido autem copiosior, & sanies cū minore cruciatu: depascente, fœtidus, niger cū doloribus vehementioribus, aliisq; inflammationis signis, iam quæ laxant medicamina, irritant, contraria leuant. Cum purū vlcus est, humor paucus, æqualis, odoris expers, crassus, cādidus, cum sentiendi facilitate habetur. Si inflammationem experitur vlcus, iis quæ ad illam scripta sunt, vtendum est. Sordidum, ptisanæ cremore cū melle illuendum est, aut tetrapharmacum iniiciendum cum susino, vel mulsā, in qua fœnugræcū sit decoctum, aut malua, aut furfures, aut lenticula cui cortex sit detractus. Porro quò magis expurgetur, etiā marrubium, aut eruum, vel melli adiuncta erui farina, vel iris, vel alumen rotundum, vel aliquid simile inspargatur. Hæc ipsa etiam extrinsecus ex mulsā macerata instar cataplasmatidis illinuntur. Peculiarius prodest hoc medicamentum. Crocus primæ notæ leuigatur cū lacte muliebri, deinde exceptus cerato rosaceo, cū adipe anserino inūgitur linteolo. verū quod infra ponitur, isto quoq; efficacius dolores discutit. Capita papaueris in passo temperato madescunt diebus tribus, deinde incoquuntur, donec intabescant, postea teruntur vnā cum rosæ foliorum drachmis quinq; croci drachmis tribus, iure capitum papaueris admisto, inde ceræ cum rosaceo liquatæ drachmæ duæ ipsis superfunduntur, ac in pessulo subiiciuntur rosaceo perunctis. Salutare est etiam medicamentum ex ouis, croco, rosaceo, adipe anserino, cerui medulla preparatū. Itē Aegyptia citra æruginē mirificè ad exulcerationes cōducit. † vbi aut pascēdo serpūt vlcera cū inflammatione quidē obducitur panis tepida maceratus, ex hydromelite, oleo, althea, fœnugræco, palmulis pinguibus. Iniicietur autem plantaginis succus, solani, polygoni, & fereos primū per se,



mox cum vino austero, aut aceto. At citra inflammationem, si urgeat depassio valentiora iniiciuntur, veluti decoctum malicorij, rosarum, summitatis oleæ, cupressi, malorum cotoneorum, rubi, myrti, lentisci, rhamni, rhus coriarij ex vino astringente. postea verò aluminis, acaciæ, lycij, hypocistidis. ex eisdem vero decoctis parabitur etiam infusus. Si nihil proficitur non alienum fuerit medicamen ex charta cum posca primum demittere, deinde cum aceto, aut Antherā, aut chalcitidem, aut atramentū futorium, ex eisdem liquoribus, & quæ dysentericis cōgruunt: cibis dandus boni succi, modicus. Purgato vlcere, ægrotans balneorum ciborumque varietate sollicitari, vinoq; refici debet, quo caro statim procreetur. Pessi loco subiicietur medicamentū diamoron, hoc est ex moris, remissum cadmia, vel ladano, vel plumbagine. A foris autem emplastrum, quod cicatrici ducendæ est, abdomini coxisque imponitur. Quemadmodum enim cataplasmatum, ita etiam emplastrorum facultas per latentes meatus traducetur.

† Hic locus sic legitur in antiquis codicibus. νομῆς ἢ οἶνος σὺν φλεγματὶ μὲν καὶ πλεονέκτειν ἀρτὴν καὶ δαρπὴν πεφυλαμένω δὲ ὑδρομέλει. Vbi autem est nomen cum inflammatione inducere cataplasma oportet ex pane puro subacto ex hydromelite.

Decanero.

CAP.

LXVII.

**C**ancrorum vuluæ alij cū exulceratione, alij citra vlcus inuadunt. vbi igitur exulceratio non est, tumor in vuluæ ostiolo reperitur durus, inæqualis, prætumidus, colore feculentus, subruber, interim subliuidus, ac vehemens dolor exercet inguina, abdomē, imum ventrem, & lumbos ad manus cōtactum, variāmq; medicinam excandescunt. Exulcerato autem cancro, præter dolores, durities, tumorēmq;, ulcera erosa ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte, sordida, labris prætumidis, albicantia, turpem humorū colluiem concretam habentia. Quæ verò pura videntur, faculenta, liuida, subrubra, & cruenta apparēt: sanies inde manat continuo tenuis, aquosa, nigra, aut ruffa, grauiter olens. Interdum verò & sanguis defertur, aliæq; notæ in vulua inflammata expositæ. Itaq; affectus nulla medicina sanatur. Quemadmodum etiam Hippocrates pronuntiauit, lenire tamen est in fessibus ex fœnugræco, malua, ac cataplasmatissimi



similibus. Insigniter autem leniunt, solanturq; in accessio-  
nibus malua, aut altea in mulsā intabescēs, & rosacei paulu-  
lo lenigata, & applicata. Ad hęc cataplasma ex ficis siccatis  
melilotis, ruta, thure, buniade hērba diligenter cum oleo  
contusa. Item quod constat palmulis in passō coctis, cui ad-  
iecta sint ouorum lutea, polentaq; , vel ex papauere cum co-  
riandro, aut polygonio, aut feri. Hęc in doloribus vsui sunt,  
Postea ceratum iniiciatur ex rosaceo, aut myrteo, aut cœnan-  
thino, aut melino, cum palmulis in passō coctis. propriè ve-  
ro cōuenit preparatū ex amurca in vase æneo collecta, quæ  
torrefacta lenigatur, & rosaceo cerato, adusque emplastri  
spissitudinem excipitur, hęc quidē extrinsecus conferunt,  
intus autem oleum quoq; lenit, vbi fuerint exulcerati, item  
lac muliebri infusum. Pari modo succus plantaginis tepi-  
dus. Sin cruentum sit, succus polygoni cum thuris modico  
dolorem sopit. Ad hęc pessuli ex croco, muliebri lacte, la-  
chrima papaueris, & celsypo. Omnibus autem efficacius est  
etiam ad sedis affectus medicamentum quod recipit: Argen-  
ti spumæ Italicæ lotē selibram, thuris masculi, celsypi, adipi,  
suilli recentis, butyri recentis, ceræ thyrrenicæ, singulorum  
sextantem, rosacei trientem. Argenti spuma ex sereos suc-  
co trita, liquatis iniicitur. Cibus dabitur qui facilè in cor-  
poris membra queat distribui, bonique succi, vinum pau-  
cissimum, aquosum: acrium esus, & alimenti copiā vitandā  
est, vt quibus cibi promptè corrumpantur.

De scirro & duritie.

CAP. LXVIII.

**S**cirrum contrahit vulua, aliās repente, vt nulla causa eui-  
dens præcefferit. plerunq; verò eūdē inflammatio mouet,  
quæ nec soluta, nec in abscessum mutata fuerit. At scirrorū  
genere cōprehendetur etiam durities, quam σκλήρωμα Græci  
vocant, circa vuluæ ceruicem potissimum obueniens: tumō-  
rem quidem pari modo representans, sed minus tactui re-  
nitentem & cum mediocri dolore. Comitatur autem hos  
quoq; vteri in opposita declinatio & tumor qui ratione de-  
pressionis vehementer renititur, cum grauitate, motuq; dif-  
ficili, non crurū modò, sed totius etiā corporis, atq; obeun-  
dis actionibus pigritia. sequitur non probè curatas, malus  
corporis habitus, aquam inter eum representans. Per ini-  
tia igitur sanguis educi, aut purgatio ex hiera Archigenis,  
assumi debet. Deinde cataplasmata ex caricis, celsypo, nitro,







redditur, quibusdam & sanguis erumpit. Itaque decumbere in domuncula angustiore minus luci exposita, modicè frigida cubili immobili, omnibus ex æquo confert, sed ita ut pedes habeant elatiores quietosque. Nam motus quàmlibet fluxionem concitat. Ac tumores duritiæque iis remediis quæ in scirrhis & duritiis vulvæ dicta sunt, p̄sanabimus. Porro hydropicas suffusiones, illis quæ in capite de aqua intercute comprehensa nobis sunt sanguinisque eruptionem, ut etiam fluorem muliebrem curabimus. Caterum sunt qui molam carnem asserant informem, ipsis vulvæ tunicis adhærescentem, fortis modo in lucem adi. Atque hæc morbi species victus ratione laxante tractabitur, quò citius excutiat.

## De inflatione vulvæ.

CAP.

LXX.

**I**Nflatur vulva ex frigore, vel corruptione foetus, vel ex ægro partu ostiolo coniuente, vel sanguine in grumum intus coacto. Aliàs spiritibus in concauo ipsius spatii conceptis, aliàs in raritatibus vulvæ corporis, quas tumor pubis & imi ventris comitatur cum duricie & dolore punctorio, qui ad septum transversum vsque & stomachum inguinæque pertingit, ac sonitus digitorum impulsu timpani modo redditur. Auxiliatur ergo primum sanguis demissus, si nihil obstat, mox in accessionibus interdicia, fomentaque ex oleo rutaceo adhibentur: infusus ex rutæ pulegij, artemisiæ, cassiæ decocto, similibusque, cataplasmata ex semine apij, cumini, anisi, ameos, farina lolij. Adhæc cucurbitulæ, tum leues, tum cute incisa affixæ. At si diutius vitium se prorogauerit, purgatio ex hiera picra utilis est: dropacæ, sinapismi, & aquæ naturales. Obstetrix autem prius digito peruncto inserto grumum incumbentem si cōtingat, auferet, leniter ipsum dissipās, rursumque admovebit cataplasma, ex ficu, nitro, & absynthio. At epithemata mollientia erunt, Polyarchion, dia spermaton quod est ex seminibus, & diadaphnidon, ex baccis lauri præparatum. Præterea pessi ex ruta, melle, & nitro. Maxime verò hic conducet, ficuum pinguium contusarum drachma, cumini drachmæ duæ, aphronitri drachma. at acrimoniæ causa, in lac prius immergantur. Iam emollientes pessuli sunt huic vicio accommodati.







scula, excitabitq; & ea admovebit, quæ per sternutamenta euocât, ex castorio, struthio, & pipere. vbi accessio cõquirit, vomitum cogere, cibum nullum aut paucum præbere oportet. A septimo die, purgatio ex hiera diacolocynthis dabitur, post triduum cucurbitulæ defigentur lumbis & iliis. Mox castorei potione vtemur, nunc artemisiæ decocto, nunc ex mulsâ, in quibusdam enim hoc vel solum ad integram morbi curationem abundè fuit. Inseßus porrò & pessus mollientes his adiungentur. Atque hæc ad accessiones proficiunt, verùm vt totum corpus reficias, à sanguinis dimissione auspicatus, ad purgationē ex hiera transfredieris. Inde picran ex aloë factam exhibes drachmæ pondere cum tribus aquæ mulsæ cyathis, diebus continuatis, vel interpositis mensura duarum drachmarum, cum senis aquæ mulsæ cyathis. Iam dropacismos, cucurbitulas, & sinapismos vtiliter applicas, nec non acopa ex euphorbio. Postea exercitiis vti, frictione & vocis exercitio prodest, denique & aquis naturalibus.

## De vuluæ procidentia.

## CAP. LXXII.

**V**ulua procidit rarò quidem, sed multis occasionibus, vel enim ab alto delapsa, & in coxas firmata, mēbris, quæ interaneū id cõtinēt, ruptis, aut extractione secundarum simul ipsam extrahentium, vt quæ eidem adhærescant quemadmodum in partu difficili: vel indiligentius imperitiūq; extracto fœtu, vel ex vulnere, vel aliqua animi perturbatione, scilicet nuntiato filiorum interitu, aut hostium insultu, aut periculosa nauigatione, aut eiusmodi quadā causa: Vt cū tota corporis mole soluta, vulua simul sit deuoluta vel ob resolutionem, imbecillitatēq; particularum, vt in declinātib; ætate potissimū accidit. Procidit autē iuxta os ipsius. Quidā verò & totā vuluā prolabi memorię produnt, quod à vero longè abest. Qua enim ratione fursum redacta queat affirmari? Conuenit igitur fœcibus clystere prius euacuatis, vrinaque excreta, quò vulua vndiquaque sit libera, laborantem figurare supinam, vt coxas habeat sublimiores, poplitēsque flexos cruribus diuarcatis. Deinde hapsum capere ex lana, figura & crassitudine sinui muliebri proportionalem, tenuiq; linteo circūdare, & in succum acaciæ, vel hypocistidis vino dilutum demergere, tum vuluæ inferere, & citrà violentiam totum quod procidit fursum age



re, quoad tota moles in sinu factus subsederit. Inferna ab umbelico regio spongia in posca expressa extrinsecus contegenda est. Mulier iacebit extensis adaptatisque inuicem cruribus, ut alterum alteri incumbat. Inde cucurbitulae agglutinabuntur cum flamma copiosiore umbilico & utrisque illis: naribus odorata admovebuntur olfactanda. Tertio die lana sinui iniecta, mulier insideat in vino nigro austero modice tepido, vel in decocto myrti lentisci & malicorij. his probe peractis, lana ingesta tollitur. Altera inuicem prioris eodem humecta medicamento inseritur. Cataplasmata à foris imo ventri superiniiciuntur ex palmulis, polenta, vel lenticiula & malicorio cum oxymelte, ac tribus diebus interpositis rursus hæc fient, quoad perfecte curationem absolueris. At si processu temporis id quod prolapsum est, putredinem fuerit expertum, id ipsum auferetur, nullius metu periculi. Etenim vulua vniuersim ablata, ubi computruerat, mulierem superuixisse commemorant.

*De muliebrium locorum clausura, quam phimon appellant.*

## CAP. LXXIII.

Oci muliebres circa ipsorum os clauduntur, vel ex precedente exulceratione, vel in scirrhum durata inflammatione. Curabuntur in seſsibus qui emolliant, ex hydreleo & fœnugraci decocto, consimilibusque; cataplasmatibus & pessulis. Porro si malum inueterauerit, suffimentis vaporibusque iis qui ex aromatibus consunt utendum erit. Iam verò soluit etiam hoc vitij cum nihil aliud sit quam vulua ostioli astrictio, pessulus ex æsypo, nitro, resina, & terebinthina.

*Vt sterilis mulier concipiat.*

## CAP. LXXIIII.

Communiter itaque, ambobus cōgruit, & viro & mulieri vniuersum corpus cōseruare probe temperatum, laboris, cibi, balnei & reliquorum omnium mediocritate, & quod inter ea maximum est, curare ne habitu sint obesiore. Neque enim pingues liberis procreandis sunt idonei, eò quod genitalibus mutuò se contingere haud possint commodè, tum quod momentum seminis emittant. Neque tamen nimis extenuati, liberis operam dare feliciter queunt. Iuuabunt autem ipsos omnia calefacientia & leniter infantia: vinum itaque, calidum modice sumptum. Et ex oleribus, eruca, horminum, erisynum & consimilia: ruta verò & calamintha omnino vitanda sunt. At si humorum quodam vitio fœmina non

*fronaca bolli  
um in b loto  
mifidafina  
in didoto bland  
vile mmo impu  
p. v. de m. f. f. f.  
cl. p. d. d. i.  
f. u. i. n. f. e. b. a. n.  
t. a. m. p. i. p. d. e. r. b.  
g. i. n. g. i. b. e. c.*



non concipiat, hos expurgare, aut proba victus ratione emē-  
 dare expedit: Proprie verò mulieribus conueniet, curam lo-  
 corum genitalium quàm fieri potest maximam habere, &  
 menses sine villo impedimento emanare. Cum igitur pro-  
 pinqua est purgatio, cibi potusque quàm maximè licet, me-  
 diocritatem, curæ habebunt. & ex iis quæ purgationi irri-  
 tandæ sunt, aliquid assument, cuiusmodi sunt adorata ole-  
 ra & acria, utpote scandicem, erithmon, fœniculum, apium,  
 smyrnium. Porro vuluæ intemperiem corrigere oportet:  
 frigidiores itaque notat menstruum retentio, victus fri-  
 gidior, & crassi succi, stupidum quid in ventris parte infer-  
 na lumbis, & cruribus oboriens. Quæ verò penitus refri-  
 xerunt, ne venerem quidem appetūt. Quare conuenit cum  
 aliis remediis, tum fomentis omnibus & iis quæ constat suf-  
 fitibus, calorem reuocare. Nec abs re fuerit, castoreum bi-  
 bere, & ex seminibus odoratis, cuminum, anisum, pulegij co-  
 mam, iuniperi fructum, pipere singulis adiecto. at fomenta  
 ipsarum vuluarū, partim vapores erunt qui inferius per sel-  
 lam assumētur, partim aqua calida ad collutionem iniecta,  
 in qua decocta sūt saluia, artemisia, ruta, iuncus odoratus an-  
 gulosus, pulegium, acorum, semināq; odorifera: hæc singu-  
 latim etiam inferiori ventris regioni ab umbelico applican-  
 tur. Præsidio est, & polyarchi epithema. Item inferioris ven-  
 tris coxarūmq; fricationes nihilominus conducunt. Insuper  
 in pennis subiiciuntur ex myrrha, ruta, galbano & castoreo,  
 vbi prius aqua mulsa, aut marina vuluam foueris. proficit  
 etiam ad hæc pessulus gone appellatus. Calidiores locos fa-  
 tetur corpus totū calidius, menses pauci & laboriosi, genita-  
 liāq; mulieris exulcerātes, corriguntur modicè humectis &  
 frigidis, cuiusmodi sunt olera quidem lactucæ, maluæ, bli-  
 tum, cucurbita, cucumis, pepon, atriplex, portulaca, aliiq;  
 cibi consimiles. vesicæ abdomini et lumbis frigida applicā-  
 tur cataplasmata, succiq; illinuntur. At humiditatis vitio  
 fecunditatem frustrari indicat in coitu, vulua humescens,  
 tenuius & copiosum menstrū. His victus utilis est siccior,  
 labores, superiorū perfricationes, vomitus, cibi sicci & me-  
 diocres. Profuerit & vuluam acerbis medicaminibus con-  
 tinere, quale est lentisci decoctum, myrtorū, rosarum, rhus,  
 iteni mali granati floris, rubi ramusculorum teneriorum,  
 & gallæ. Sicciorē verò vterum contrariis curare oportet,

antipmiliari  
no vboane  
na pdrmy  
afiphoes  
fing in pdr  
et fpmiliari  
et fpmiliari

ad ocula  
na mpaada  
fmi ad fmi  
D fmi mliari  
in fmi mliari  
a vboi fmi  
gida quafpe  
pdr fmi  
fomi.

fmi mliari  
fmi mliari  
fmi mliari  
fmi mliari  
fmi mliari  
fmi mliari  
fmi mliari  
fmi mliari

ad ocula  
na mpaada  
fmi ad fmi  
D fmi mliari  
in fmi mliari  
a vboi fmi  
gida quafpe  
pdr fmi  
fomi.

ad ocula  
na mpaada  
fmi ad fmi  
D fmi mliari  
in fmi mliari  
a vboi fmi  
gida quafpe  
pdr fmi  
fomi.

ad ocula  
na mpaada  
fmi ad fmi  
D fmi mliari  
in fmi mliari  
a vboi fmi  
gida quafpe  
pdr fmi  
fomi.

ad ocula  
na mpaada  
fmi ad fmi  
D fmi mliari  
in fmi mliari  
a vboi fmi  
gida quafpe  
pdr fmi  
fomi.



balineis dico, inunctione, & alimento humido, olerosoque, mediocri vino & non nimis vereri. Quod si à crassioribus succis concipere impediuntur, siquidem rodens aliquis fuerit, mulierem probè purgare conuenit medicamento quod cuilibet humori proprium est. maximè autem picra ex aloë: mox sero lactis aluum ducere, & victum probiorem deligere. Pituitosos autem humores laboribus vacuare, sudoribus, & vomitu: vel per inferiora. Cæterum ex medicamentis epithymum quoque, euphorbium, piper, dauci semen, petroselinum semen, omnia contrita drachmarum duarum pondere potui rectè dantur. Hoc & ventrem probè ducit, ac vuluam calefacit, quemadmodum sæpe iam menses eruperunt etiam iis quæ purgationem non sunt expertæ: Postquam vero vterum emendatum esse constiterit, menstruis benè respondentibus, tunc venus est ineunda, purgatione desinente. Iam verò, quoniam spiritus similiter in vulua inclusi cōceptionem impediunt, notas ipsorum ex capite de vuluæ inflatione sumemus. Medemur autem parciore primum victu, mox cuminum, anethum, apij semen, rutæ, anisi & pleraque aromata præstamus, partim potanda, partim subiicienda. Conniuentes locos aperiemus iniectionis clysteriis odoriferis, fomentis, que ex malua, semine lini, fœnugræco, & oleo. Nōnunquam etiam melle, validioribusque; artemisia, cunila, calamintha, pulgionio, & anthemide. Præter hæc conuenit vti terebinthina, nitro, cucumere agresti, elaterio, casia, picis sero. Quibus autem os hiat, victus, fomenta, medicamina sicciore astringentiaque; grana mali punici, lentiscus, rubi radices, myrta, & quæ humidiori vuluæ congrua sunt adaptantur. Peruersiones autem fomentis instaurare ac dirigere oportet, item iis quæ molliunt, insertis. venus autem à tergo exercita, ad concipiendum videtur conducere.

De vuluæ scissuris, condilomatibus, & hemorrhoidibus.

CAP. LXXV.

**I**N vuluæ ostio rimæ, quas Græci rhagadas vocant, ex enixu violento fiunt. Primum sanè latent cum recentes adhuc ex partu sunt dolores, postea verò paulatim percipiuntur, aliàs manus tactu, aliàs in coitu. quando & propter affricationem cruorem reddunt. deprehenduntur autem sinu aperto. etenim diruptiones scissuræque in ostioli circuitu oculis patent. In quibus manuum operationem rodentiaque;

medi



medicamina vitantes, simplicioribus in se sibus, pessulisque utemur. prodest etiam tetrastachmum dilutum. At si calum contraxerit, medicamento quod charta constat, ex rosaceo utendum. Sin autem ipsius vim non tulerint, iridem illyricam terebinthina exceptam imposito. vlcibus iam cicatrice obductis, conueniet ex cadmia præparatum, aut aliquod ex iis quæ sedi consecrata sunt: veluti quod dia lythargyru, hoc est argenti spuma inscribitur. Cû verò scissuras veteres in condylomata degenerare contigerit, similibus excindi, adq; cicatricem duci debent. Cæterum hæmorrhoides vuluæ os, & ceruicem infestant, quæ in partibus instrumento ad perspicendam vuluam accommodato exploratis, deprehendentur, inde quod ex crescentia in accessionibus appareat dolorifica, cruenta & subrubra. At vbi remiserint, fluxio citatur citra dolorem subliuida & fœculenta. In his igitur cum morbus remittit, *voluella* modò fieri queat, præhensas amputare oportet: sin minus, certè medicamentis ipsas desringere, partim attingentes sicco malicorio cum galla, aut huiusmodi aliquo, partim iis quæ in vulua sanguinem fundente exposita sunt vtentes: quæ etiam profluuiis, & hæmorrhoidibus conducent, eo potissimum distinctis, quòd vulua continuo cruore manet per remissionem non solum in menstrualis purgationis tempore.

† In antiquo libr. hæc est scriptura, & ἡ τῶν αἱμῶν ἀπὸ τῆς αἰμορροΐδος, id est, quæ ob imbecillitatem sanguinem fundentibus. &c.

De partu difficili.

CAP. LXXVI.

**D**ifficilis partus accidit, aut vitio parietis, aut fœtus, aut secundarum, aut foris aduenientium. parturientis quidem, si crassa obesaq; sit, aut vulua tota exigua, aut dolorum imperita, aut timidiuscula, aut inflammationem in locis genitalibus aliave particula experta, aut alio quodam modo laborans, aut natura imbecillis vt fœtum nequeat propellere, aut si ante tempus pariat. At fœtus vitio, si vel inusitatae magnitudinis existat, vel exiguus & modicæ grauitatis, vel magui capitis, vel monstrosus, vt, biceps, vel mortuus, vel viuus quidem, sed imbecillis, vt foras non possit procedere, vel si plures fœtus sint. Nam Herophilus, quinque ædidiisse mulierem, memoriæ prodidit. Vel si figuram naturæ contrariam obtineat. Naturalis siquidem figura est fœtui: prima quidem, qua manus femoribus porrectæ sunt,

&



& caput nusquam inclinans ad os vuluæ rectâ dirigitur. Proxima huic, vbi in pedes conuersus est. Aliæ omnes præter has à natura abhorrent. Ob secundas, quod velamentum intus est, partus redditur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiem, aut priusquam opus est propter subtilitatem abrum-patur, humore siquidem euacuato, infans præ siccitate aggre deuoluitur. Ab externis difficultas oritur, aut frigore, quod vuluam densauerit, aut calore immodico, qui vires dissolue-rit, aut ex quodam fortuito accidente. Si igitur ex astrictio-ne, aut veluti foetu adfirmata pariendi oriatur difficultas, la-xatione prius opitulandum, infundendo largiter oleum dul-ce, & calidum, cum decocto fœnugræci, aut maluæ, aut fe-minis lini, aut etiam oua, quod leniendi facultate prædita sint. Deinde & pubem cum abdomine & lumbis cataplasmate obducere, quod semine lini constat, aut aqua mulla, aut hydrelæo, in se sibusq; similibus prodest. Insuper laxationes balineis moliri, nisi febris, aut alia quædam occasio impe-dierit, mouereq; parientem sella in aëre calido mediocriter. Nonnulli etiam conuassationes validas, sternutamentisq; ciendis idonea adhibuerunt. Timidæ, mentis robur admo-uendum: imperita dolorum docebitur, vt validissimè spiri-tum comprimat, & ad inguina depellat. Animo deficiens iis quæ deliquio abigendo sunt, naribus admotis recreabitur. Alleuiata mediocriter, cibo modico refocillabitur. Obe-sam mulierem in lectulo resupinam figurare oportet, vt ad femina genua succlinat, inflectatq; quò vulua ad abdomen tendens, è directo ostioli habeatur, quod ceratis, aut pingue tudine delinire digito oportet, & sensim aperire. Atq; si mor-bus aliquis particulas malè habeat, etiam huic prospicere. Ad hæc stercus detentum molli clystere emoliri, & secundas clausas diuidere, aut digitis, aut ferramento quod *πολυδάκτυλον* vocant, in ipsis occultato, sinistra manu præcedente. ac humo rem quendam oleosum in vuluæ spatium interius clystero indere. Verùm vbi foetus præter naturâ figuratus fuerit, na-turalem reddere figuram decet, partim pellendo, partim ad-ducendo, partim flectendo, partim in rectum agendo. Et si quidem manum pedemve præmiserit, non attrahere mem-bro prehensum oportet. magis enim affirmatur, vel luxatur, vel etiam abrum-pitur: verùm digitis humero infantis, vel coxæ affixis rursus in conuenientem locum id quod præmis-sum



sum est, diducere. Porro si cum firma adhæſione, totius infantis indecora fuerit figura, sursum prius ipsum ab utero ore sublimen detrudere consilium est. deinde prehensum rursus ad os dirigere. Postremo si plures vno infantes deferrantur, iterum à superiore, infernaq; parte referes. sic vt omnia sensim & citra contusionem fiant, oleo locis perunctis. Tempus quo in sellam collocabitur parturiens est, cum vuluæ os dehiscens, digito occurrit, & quod præruptum est, procumbit. Verû si non procedat, quod infans mortuus sit, aut alia de causa, ad extractionem quam Græci ἐμβρυοεκτομήν appellant, veniendum est.

Decoxarum morbis.

CAP. LXXVII.

**C**Oxarum dolor ab articulari morbo nihil differt, nisi quod ipsius causa, nempe crassus pituitosusq; humor in sola coxarum compage, articuloq; concretus insideat. Dolor ipsis gibba in natibus regione inguinibusq; ad genua usque, in plurimis autem ad sumum usq; pedem pertinet. Per initia igitur ægro nobis oblato, facibus clystere vacuatis, vena in cubito secanda, cum sanguinis detractione: si autem vetustas vitium occupauerit, ex talo partis affectæ imminutionem sanguinis moliemur. In accessionibus fotu hoc vtendum, Cyprini cyathis octo, aceti cyathis quatuor, nitri cyathis duobus, cachryos cyatho vno. Succidis lanis calida admoventur. Deinde applicabitur ipsis farina lupinorum amarorum cum oxymelite, aut farina lolij, cum resina, cucumeris syluestris radice, nitro, calamintha, cachry, baccis lauri. Iam calamintha sola vtiliter ex oxymelite, aut aqua mulsa admouetur. Emplastro verò hoc quod leniendi facultatem obtinet, vtendum est. Ceræ drachmæ centum, terebinthinæ drachmæ viginti quinque, æruginis drachmæ sex, myrrhæ, galbani, iridis, singulorum drachmæ sex, cedriæ drachmæ quinque. Propinabitur ipsis liquoris cyrenaici quantum eruus implet, aut castorij drachma cum opopanax tribus obolis. Porro radice capparis cortex potui datus, & cataplasmatibus admixtus est remedio. Cum autem dolor multus exerceat, etiam medicamenta à dolore leniendo ἀνδολυα dicta locum habent, vtpote quod ad Philonem refertur, & quod duplici pipere constat. Hoc autem enema inferetur, mellis cyathus vnus & semis, olei tantundem: aquæ cyathi duo, nitri drachmæ octo, terebinthinæ drach



drachmæ quatuor. His calidis iniectis, anus debet foueri, ut longiori tempore ea retineantur: muccosa vacuat, nonnunquam, & sanguinem, quando etiam magis opitulatur. At si malum perseveret, quod rarum est, iterum frequentius eo utendum est, in vicem aquæ, centaurij decoctum admiscendo. Sanguinem vero trahit & thlaspis semen per inferiora inditum, succus elaterij, & medicamentum ex ipso factum, vel quod ipsius radicibus constat. Item oleum ficynium, salforum piscium muria, & oliuarum colymbadum probe per anum ingeretur. Cucurbitulæ coxendici multa cum flamma, cute prius incisa defigendæ, interim quoque hirudines. Quod si his malum non finitur, ad purgationem eundem est, aut ex hiera, aut colocynthidos partis internæ probè contritæ drachma offeretur in aquæ mulsæ cyathis duobus, aut paulò amplius, aut minus, pro laborantis virtute, & alui facilitate dabitur. In aqua verò mulsæ ruta decoquatur. Puls etiam ex cucurbita sylvestri confecta recte hos expurgat. In quibusdam verò & vomitus à radiculis citatus per initia profuit. Cum morbus se remiserit, dropaces ipsis applicantur, acopaque ex euphorbio sunt utilia. præsertim quod à varietate vocatur præcilon, item balineæ naturales his accommodæ. Si desiderantur, in aliis lauabunt balneis, commemoratisq; utendum est acopis, & compositis nitris, medicamento Asclepio, & eo quod ex euphorbio, adarce, nigro veratro, castoreo, pyretro, pipere, pedicularia, quam staphida agriam vocant, simili pondere confit. Secundum balineas inspergentur picis aridæ uncia tres, sulfuris ignem non experti uncia duæ, cuti adhuc calidæ: quæ charta etiam contegetur. At si ne hæc quidem profecerint, vel reliquiis morbi remanentibus, congruum erit & sinapi cum caricis, vel etiam per se illitum. In totum vero hos restituit sanitati, iberidis herbæ usus, quam lepidion quoque, alij agriocardamon hoc est, sylvestre nasturcium appellant. Quæ vero apud nos fruticosa nascitur similibus lauri foliis & multo amplioribus, respondere, multa experimenta testantur, non solum in coxarum, sed in aliis quoque diuturnis affectibus. per æstatem verò longè sunt efficaciora. Atqui si folia tunc non produxerit, cortex ipsius radicis contunditur cum adipe suillo, ut emplastri speciem repræsentet, inde linteolo densiori illitum locis maxime dolentibus imponitur, nempe toti



pe toti in natibus gibbo & femoribus, sinésq; tam diu quoad cuticula superior nigrescat, aut ex toto liueat. Postea ipsum auferes, lotoq; agrotanti ceratū impones, opopanax drachmas quatuor, quæ aceti cyathis duobus dissoluntur, excipiunturq; cerato cyprino: Quod si talium adurentium vsus abominentur, emplastris vti resectoriis oportet, è quorum numero hoc quoq; est, ceræ, resinæ pityine singulorū drachmæ duodecim, terebinthinæ, columbarum syluestrium sterçoris, sæculæ vini combustæ recentis, singulorum drachmæ sex, galbani, sesquidrachma. Atq; ex reficientibus est quod læna appellatur. vtilia verò sunt quæ ex lixiuio & nitro præparantur. Iam nonnulli iis vsi sunt potionibus quæ ad annū continuantur, in quorum grege habetur medicamentum diateffaron vocatum: chamædryos pondo, gentianæ deunx, aristolochiæ rotundæ deunx, rutæ feminis sicci sextarius. hæc tusa cretaq; dantur quotidie cochlearij mensura ieiuno & probè cōcoctione obita, ex duobus aquæ frigidæ cyathis ad annum, donec morbus finiatur. Eadem promittit medicamentum dia hepta, id est ex septem confectū, & quod ad Proclum authorem refertur. Exercitia absoluntur, in ambulatione, continuis, flexionibus, saltatu, & cursu. Cibus mediocriter tenuis & concoctu facilis conuenit. porro si malum nulli ex commemoratis cedit, aliàs in suppurationem conuertitur, aliàs neruis qui artus conuincunt, laxatis, membrum luxatur. Quare cū vitium longius se prorogat, articulum tribus quatuorve locis vrere oportet, vt in chirurgica dicetur, ac complusculis diebus vlcera adaperita, sine cicatrice seruare.

*De podagra & articularijs morbis. CAP. LXXVIII.*

**N**on sola particularū corporis imbecillitas, podagricos articulariósq; cruciatus excitat, quoniā accessiones, siue vlllo temporis interuallo vrgerent, quatenus infirmitas imbecilibus articulis semper incūbit. item ne humor quidē solus hos dolores creat, quandoquidē non solis vitiū articulis insidet: sed vtrunq;, & humor à natura alienus, & particularum imbecillitas morbū adfert articulariū. quoties enim altrix particularū facultas, imbecillior, ciborum grauatur copia, ex qua cruditates enascūtur, humor superās, in quodcunq; articulamentum, quod antea imbecillius euaserit, se confert, & artubus sese insinuans, colligantes neruos disten-



dit, dolorem excitat: neq; enim neruos, per quos motus dispensatur arbitrarius, affectu primario, inflammatio infestat, quoniam oporteret etiam medios internodiorum locos, ipsam occupare, utpote tibias medias aut femora aut cubitos, aut brachia. attamen afficiuntur iidem nerui lege confortij, quod cum articulis ineunt. Quousq; igitur & solus humor pedum articula menta molestat, podagra vitium nuncupatur. Vbi vero causa in omnes corporis articulos compulsa fuerit, ἀρθρίτις Græci, nos articularios morbos appellare consueuimus. Quo vitij nomine, vertebrae, humeros & maxillas comprehendimus, omnemq; articulum, quicumq; morbo implicatur. Nonnulli vero aures, dentes, guttur, & nonnunquam iecur, lienemq; articulariis doloribus conflictari pronuntiant. A quibus nisi de subito vitium in artus sese recipiat eructetq; periculum breui tempore laborantes occupauerit. Sed humor superans qui iuncturis sese inserit, nunc biliosus est, nunc sanguineus, aliàs atra bile vitiosus, plerumque etià pituitosus, crudusq; copia alimenti, aut cruditate, aut otio congestus, verum verustate in articulis crassescit, & glutinosior euadit: sic ut in duritiem cōtumacissimam, quā Latinitophum, Græci poron appellant, occallescat. Interim vero diuersa humorum colluue, vitium contrahitur, ob quod ægrè dignosci, & difficulter medicamentis elidi potest, vel etiam penè nullo remedio sanescit. Caterum hoc mali frequenter antecedit improbus labor, vehemens ambulatio, equitatus creber, vsus veneris intempestiuus, insueta frigida potio, frigidorumq; vel multorum noxiorumve ciborum esus, multus vini vsus. Iam aliqui prolapsu, vel deturbatione, vel propulsu, vel distorsione, vel id genus aliis, prima morbi fundamenta iecerunt, † materia quidem præcedente in corpore, quæ antea conquiescebat, nunc autem à causa primaria est commota. Mœrores autem, curæ, peruigilia, & reliqui animi affectus, non modò mouent, sed ipsi quoq; noxios succos, siue primario, siue ex accidenti procreant. Variæ igitur, ut à me dictum est, affectus causæ habentur. Sed deprehendi tamè faciliè humorum noxam inferentium discrimina possunt, tum suis coloribus, tum iis quæ superueniunt denotata. Siquidem biliosa defluxio præter colorem pallidum & rubidum, caloris sensum doloremq; acriorem efficit & protinus in cutem sine magno tumore erumpit, incandescitq;



scitq; calidis impositis, sicut è contrario iis que refrigerant remittitur. Hoc sanè cū aliis omnibus magna ex parte, tum maximè iis qui à bilioso humore originem habent euenire consuevit. Subinde febris in ipso accessionum statu accedit, quando & sitis conficit. Pari modo in melancholicis, color partis nigrior reddetur in pituitosis, exalbidus & aquæ subter cutē similis apparebit, vbi dolor altius delitescit, & tardius in tumorem sese attollit, quemadmodum si sanguineus humor redundet, cruentus color emergit. Verūm vt singula exactius dinoscas, superior victus ratio reliquaq; consulenda tibi veniunt.

† Rectior est hæc scriptura veteris codicis, *προσσηνυμένους μὲν ἐν τῷ σώματι καὶ τῷ ἡνιμαύοντος τ' ὕλης*, id est, materia antè coacervata in corpore etc.

*Curatio biliosæ defluxionis articulis concepta.*

**I N I T I V M** curationis si flaua bilis articulos exerceat, magisq; ipsius qualitas, vacuatione noxij humoris tentabitur per medicamēta purgantia. quale est maximè quod ex rhodomelite temperatur, tum quod malis cotoniis cōstat, item antidotū ex hiera picra, & aloë catapotia. Per accessiōes verò à foris vtendū rosaceo cū oui luteo, & vini momēto, particulam sensim infricando, herbæ autem admouentur quæ refrigerant, vt solanum, portulaca, altercum, semperuiū, palustris lenticula, feris, papauer, polygonium, rosarū folia, & consimilia: Et nunc per se illinuntur, nunc cū micis panis posca imbutis adhibentur, vel hordeacea farina cū rosaceo instar cataplasmatismis superaccommodatur. At in Erysipelacea inflammatione articulorū manifestò lenietur cucurbitę recētis cortice imposito, aut peponis, aut cucumeris carne, & per se, & cū pane. itē perdicij foliis & hederę cū pane vel tenuiore parte polentę. Ad hæc psylliū farinæ hordeaceæ incoctū, ardētes inflammationes mirādū in modū solatur. simili modo & rosaceū ceratū cū quibusdā refrigerantibus succis illitū, & quod ex fabarū lomento cōponitur. habet autem hoc pacto: ceræ vnciæ quinq;, chamemælini, rosacei, singulorum vnciæ duæ &. S. fabacei lomenti semuncia, ouorum lutea quinq;. **A L I V D** cataplasma. virentes maluę coctę teruntur, psylliū priuatim in viscū redactū, admisceet: † deinde ouorū luteis admixtis, oleoq; chamemæolino applicantur. Si verò tātus vrgeat dolor, vt laborās par esse ferēdo nequeat, medicamēto



ex croco, glaucio & opio vti cōueniet, quæ in posca trita ve  
sublinentur, vel cū micis forma cataplasmatidis obducuntur.  
Galenus autem, huius meminit, lachrymæ papaueris drach-  
mas quatuor, croci drachmam cum bubulo lacte, vel capril-  
lo trita, vel panis micam iniicito, & emolliens rosaceo exci-  
pito, ac vti tor cataplasmate, aut opium crocūque pariter  
trita in lacte, cerato rosaceo excipito. Contulerit etiam ea-  
dem parte in accessionibus ceratum ex turpena pisce confe-  
ctum, item oleum ex eodem expressum. Persimilis est hoc  
efficaciæ, micarum panis aqua, vel posca maceratarum &  
semperuiui, vel portulacæ, vel solani vel palmularum carnis  
& papaueris capitum seminis, pari portione, ouorum tosto-  
rum luteorum & rosacei quod sufficit, accommodato in ca-  
taplasmate. Verū his quæ membris torporem inducunt,  
narcotica Græci vocant, diutius non erit insistendum, quā  
vt doloris vehementiam solum lenierint. siquidem largior  
ipforum vsus, sic insertum constringit humorem, vt in to-  
phaceam duritiem quos græci πώγους appellant occallescat,  
ac diurnas motus difficultates pariat. Ab eorum igitur  
vsu quæ dolorem arcent vel medicamento è succis her-  
barum facto, diachylon vocant, ex chamemæliino resolutio  
vtendum erit, vel eo quod dialtheas appellant, vel huius ge-  
neris alio. Posteaquā verò partem affectam quæ refri-  
xerit recalfeceat, roboranda erit palmulato medicamine  
quod diaphænicinen dicunt, cum oxyrhodino, vel vino &  
rosaceo soluto. At si emplastra detrectent grauenturq;, aca-  
ciæ succum ex posca, vel lycium adiecto croco & glaucio, &  
succo perditij ex posca, delinere conuenit. Viſtus autem ra-  
tio refrigerans humidāq; erit, vt hordei cremor, ex chōdro  
forbitiones: ex oleribus, malua, lactuca, intybus: auium co-  
hortalium maximè pulli, piscium saxatiles, erinacius pecti-  
nes, & eius notæ reliqui. Vitanda omnia calfacientia, & quæ  
pallidam, aut flauam bilem generant, vinum vetus, fuluum,  
& nigellum, & cibi repletio. balineis vtendum aqua potu-  
lenta factis, si nihil prohibet, etiam cum defluxiones ipsæ  
infestant, & cum absunt quantum ad causam pertinet. Tem-  
perandum ab iracundia, inedia, acrium esu, temulentia, im-  
modico labore, & veneris vsu.

† Vetus codex, ἔτα πρὸς μίξας ὠπὸν τὰ λευκὰ, id est, deinde albo oio-  
rum admixto. quæ lectio huic loco magis conuenit.

Cur



*Curatio si sanguis artus infestet.*

IN quibus sanguineus humor redundat, protinus sanguis mitti debet: ac nō in his solum, sed etiam in pituitosisioribus, aut melancholicis. Siquidem in his quoq; succus venis plurima parte continetur, qui copia sua potius quā qualitātē offendit. statim igitur cum quis morbum experiri primum cōperit, sanguinis missio erit tentāda: nam quos iam fluxio frequenter infestavit, ij plus inde noxæ, quā auxiliij sentiunt. præsertim quibus corpus est natura frigidius, aut etiā imbecillius. Post sanguinem detractum, nisi solus ille superauerit, momento temporis interposito, etiam purgationē ex hiera antidoto moliemur, aut Iuliani oxymelitē, quippe hæc magna commoditatē purgant: qui verō ab huiusmodi medicamentis vacuantibus abhorrent, catapōtia quæ sequuntur deuorabunt: aloës, colocynthidis, id est cucurbitæ sylvestris, veratri nigri, scammoniæ, singulorum vnciam, euphorbij, nitri, singulorum semunciam, succi brassicæ, quod ad eā capiendā satis sit. Dantur singulis pro viriū ratione: melius proficiet, si cotoniorum succo excipiantur. Aliud catapotiū quod & in accessionibus, & remissionibus exhibetur podagricis, qualiscunque etiam humor articulos affligat. Recipit aloës selibram, agarici, croci, singulorum semunciam, costi, spicæ nardi, iunci odorati rotundi, floris, opobalsami, casia singulorum vnciam, scammonia sextantem, epithymi quadrantem cum semisse. Modus mediocris instar duorum scrupulorum, summus quaterni scrupuli. Iam verō ex armeniacō lapide catapōtia, mirificè purgāt, ac proprie articulariis doloribus congruunt, tum inter fluxionum principia, tum in decremento, tum in remissionibus, sed quoniam nonnulli scammonia ceu stomacho noxiam fugiunt, dabuntur ipsis præsertim cum pituitosa subluuies torquet, hæc catapōtia, colocynthidis medullæ, veratri nigri, bdellij, gummi, aloës, singulorum vncia, nitri alexandrini, euphorbij, singulorum semuncia, dantur quaternis scrupulis. Ego in vicem gummi epithymum adiciebam. Sunt qui in omnibus articulatorum viciōrum accessionibus, purgatione ex hermodactylis ipsis aluum sollicitauerint, sed attendendum est, quoniam hermodactylus stomacho facessit negotium: anxietatem & cibi fastidium mouet. Quapropter in his vti consilium est, qui obeundarum actionum necessitatem habent. etenim



breui post duos plurimum dies defluxionem ex toto finiant, sic ut consuetis muniis obeundis sint idonei. Notus mihi est qui non hermodactyli substantiam, neque aliquod ex ea compositum medicamentum, sed herbe ipsius decoctum cum aliquo consueto medicamine, utpote aniso, vel apio decoquens ipsum, potui exhibuerit. ac mirum est quam resoluta sepe alio defluxionem sedaret: verum quia, ut nuper retuli, stomacho inimicum est, iis postea quae stomachum confirmant viresque eius recolligunt, mediocri calfactione os ventriculi corrigere oportet, iis autem quae ex hermodactylis fiunt, multo laudatius esse medicamentum Alexander prodidit, quod ex coronopodio temperaretur, quod & eandem vacuationem praestet, & dolores sopiat praeterquam quod stomacho noxam non inferat. Ceterum loco inducentur cataplasmatibus modo in pituitosis, si mediocri dolor afficiat, viridis brassica, apium, cunyla, verbenaca recta, sin acris dolor affligat, farinae foenugraei parteis treis, pollinis loliacei, farinae cicerum, singulorum partem unam. ex aqua malsa, aut vino tenui cum modico cypri no, vel nardino conuenit applicare, maxime per hyemem, item cinis crematae radiceis brassicae, eiusque cauliculorum cum axungia inductus, multis fuit praesidio. Sed sopiendis doloribus recens adhibenda axungia, discutiendo autem humori vetus salsa auxiliatur: bubulum etiam stercus cum hordeacea farina in aqua malsa coctum prodest: vel per se recens & liquidum, vel cum foliis brassicae. Similiter caprillus finus per se, vel cum hordeacea farina coctus in posca. Quoniam vero nonnulli ex iis quae contraria esse videntur remedium senserunt (etenim diuersorum humorum mistura dignotionem postulat) commemoranda iam harum materia est promiscua. Itaque iuuat syluestris atriplex & satiua cum pane applicata, aut verbasci folia cum bulbis & pane trita, vel cum polenta, vel cataplasma ex hordeacea farina cruda. At in quibus obscura morbi est origo, haec semel experiri abunde fuerit, modo ad consimilia transgrediendum est: modo contrariis pugnandum. Neque tamen eisdem diutius immorari consilium est, si nullum ex eis solatium perceperint. Haec quotidie in artibus operibus fieri videmus, ut idem medicamentum vni articulo profuerit, alteri in eodem aegrotante similiter inflammato



mato non modò non opituletur eodem tempore, sed ali-  
 quando (quod maximè est mirum) offenderit. Quippe vnus  
 idemque sæpe articulus, ex eodem remedio nunc iuuabi-  
 tus, paulopost eiusdem appositu, inflammationem conci-  
 piet. Nunquam igitur aliquis cum glutinosus crassusq; hu-  
 mor superat, calidioribus leuabitur auxiliis. Verùm cū acris  
 aut feruida humoris qualitas præcellit, tum refrigeranti-  
 bus solatium inflammationis paratur. Nec miraculum est  
 si materies natura frigidior inflammationis tēpore, & fer-  
 uore æstuet & incandescat, vt bilis, si ita contingat, admi-  
 sionem omittam. Porro tophos in artubus impedit coale-  
 scere lupinorum farina cum oxymelite, vel posca, vel laser-  
 pitio, aut brionix radice cum pane. Iam hoc quod sequitur  
 citra noxam mitigat, & mediocriter discutit, lycij, ammo-  
 niaci, thymiamatis, singulæ vnciæ cum vino veterrimo &  
 oleo omphacino, trite coquuntur, & è lomēto fabarū, quod  
 sufficit, adiicitur, coctæ mediocriter modo cataplasmatibus  
 applicantur. Post inflammationis statum, tumore relicto ap-  
 plicandi bulbi per se, vel cum polline polentæ, ad ruborem  
 vsque. hoc enim modo efficacem vsum exhibent. Quod si  
 nihil hisce cataplasmatibus leniuntur, fotibus & superfusio-  
 nibus erit certandum, maximè si tumor extrema occupet,  
 chamemæli & melilori, aut centaurei decoctis. Nonnullis  
 etiam cappari decoctū abunde fuit auxiliij, hoc tamen quod  
 infra scribitur, omnibus præstat efficacia. Thymus, origa-  
 num, satireia, & calamintha, in aceto quāmacerrimo coctas  
 eiusdem aceti imbre affectæ partes, non semel, aut iterum,  
 sed frequenter in die fouentur cum fiducia. Hoc præsidio  
 permulti pristinam valetudinem recuperant, quibus non  
 pituita solū, sed flaua etiā bilis fuit infesta. Nō desunt qui &  
 subsequens medicamētum salutare sint experti, illicis glan-  
 des in farinam redigunt ac diu coquunt, hoc decocto extre-  
 mos artus per fluxionum initia longo tempore aspergūt. Ar-  
 quæ interius partes habentur, spongiis fouent & per hæc  
 materiæ impetum repellunt. Idem & bile vitiosis artubus  
 conuenit, quemadmodum ex calida aqua sine aliquo deco-  
 cto superfusio. Porro doloribus qui intenso frigore, aut hu-  
 moribus inter articulorum ossa impactis contrahuntur, va-  
 lens hoc est remedium. Olei veteris sesquilibra, nitri ale-  
 xandrini, resinæ terebinthinæ singulorum libra, euphorbi-



uncia, iris sextans, scœnogræci farinæ sextarius vnus & dimidius. his autem ea quoq; quæ aduersus coxendicum cruciatus scripta sunt, pulchrè nimirum opitulantur. multi siquidem aduersus huiusmodi perfrictiones cum morbus declinauerit, sinapi cum siccatis ficis vsi sunt, tum aliis quæ extrinsecus ruborem excitant. Alij verò medicamentum ex cantharidibus admouent, verum hæc in posterum officiūt, nisi aliquo etiam moliente vtantur, vt, diastrutheon & pyxide, & basilio, aut diaclates, aut dia xgiru, aut bromio, aut lysiponio, aut valentioribus acopis. in quibus etiā nerui cōsensus, potissimum & infarctus humorum eueniunt. At ex mulæ lotio, in morbo statu præsertim, & in frigidis defluxionibus fouere commodum est. Pariter conuenit etiā ex vtroque veratro pastillus cum mollis & fungosus tumor articulos implicat, & fomentum ex sale torrido, aut etiam aliter è marina calida per spōgias artus perfudisse vincit. item emplastra ex sale præparata, vel ex lixiuia, & nitro, hisque consimilia cataplasmata, post vigorem morbi auxilio sunt, victus ratio siccior minimèq; excrementitia competit, item inedia, vel parciore cibi: frequētibus balneis abstinendum. At si lauent, nitro aliisque pulueribus vtentur deterforiis. Vbi dolor declinauerit, exercitiis se credent: & frictionibus maxime articulorum, in naturales balineas descendant, aut etiam arena contacti incalescēt. Vomitus à radícula cibisq; assumptis mouebitur. Qui ad hoc se commodè habent, etiam veratro nigro vacuentur per vomitum, vel etiam per aluum inferiorem purgentur.

*Quomodo sanguine infestati artus curentur.*

Q U I ex sanguine dolorem articulariū conceperunt, post sanguinis initio morbi detractionem, remedia commemorata loco dolenti sunt inducēda, si biliosior quidem acriorque sanguis redundet, eisdem quæ in flaua bile diximus, certandum, si frigidior, pituirosiorq; aut melancholicus humor coaluerit, † iis quæ post illa subdidimus præter nimis acria, curationem tentabimus: at si vitium in vetustatem incidit, his quoque locus erit. iam hoc cataplasma in principio proficiet. Malicoria, & rhus cum polenta ex vino detrita obducuntur. A L I V D. Brassicæ folia cocta accuratè conterūtur, aceti flocces cum duobus coctorum ouorum luteis, & rosacei momēto, adiiciūtur, leuigatāq; simul loco iniiciūtur

tur



tur. subinde ea mutando. Cibi assumentur qui extenuant & parum nutriunt: carne igitur & leguminibus & vino copiosiore nigro abstinendum. si autem fieri possit, etiam ex toto vinum circuncidendum. Plurimos siquidem noui, qui prorsus abstemij omnes sanitatem consecuti sint. Alij siquidem per morbi initia omnino liberati sunt. alij in posterum rarius & minori dolore accessiones perceperunt. Quapropter nisi contrarium hinc accidat, aut futurum inde aliquid metuant, perpetuò vitam agent abstemiam.<sup>†</sup> At qui per imbecillitatem, aut perfrictionem aliquid subsecuturū opinentur, ad biennium vsque abstemij, inde ad pristinam consuetudinem reuersi, modicum dilutūque continenter bibent. Oportet autem abstemios in vicem vini decocto anisi, aut alicuius consimilis seminis vti: fructibus pomaceis reliquisque refrigeratoriis abstinere, tum veneris vsu. Qui verò per medicamenta, quæ per annum bibuntur, morbum prorsus tollere voluerūt, multis sanè quibus pituitosus & excrementitius humor articulis incubuerit, opitulati sunt. verū qui calidioribus siccioribúsq; constaret naturis, hos in subitam mortem præcipitarunt, quòd materia ad intestinum, aut renes, aut costas, aut pulmonē, aut principē quādam partem se contulerit. Satiùs itaq; est biliosiore præditis habitu, aut copioso sanguine refertis, vini vsu interdiceret: quòd nullus ex eius abstinentia, in cōmemorata vitæ pericula inciderit: frigidiores autem & recrementis pleni, ex viperis theriaca vti debent, hyeme frequentius, cōcoctione bene obita, per æstatem rarius. vel enim morbo liberabit, vel certè leuiorē reddet, nulli ex prædictis particulis officiens: quoniā verò nonnulli nos etiā cōmemoratis vti antidotis cogunt, nō te lateat id quod ex damafonio constat & quod ad Agapetum, refertur, item quod atacton & octoidon dicitur, & quod Proclo inscribitur, item quod ex scordio, aut corallio componi solitū est, alia pleraq; non mediocriter proficere, omnium verò securissimum est longóque vsu probatissimum, diacorallij. siquidem cōcretas iam in tophum duritias discutit. horum omnium vires & modū vsus, & quid in his caueri debeat volumine, quod compositis medicaminibus dicatum est, reperiēs similiter aduersus articulares dolores, medicaminum quæ psilothra vocant, misturam vsūq; in eodem habitu, nempe pituitosiore. Alij verò



qui à toto se morbo vindicare volunt, integras vulpes oleo incoquant, quo articulariis morbis medentur. Non desunt qui viuas leberibus magnis iniiciunt. alij tantum emortuas. Pari modo etiam hyenas percoquant, oleum hinc cōficiētes, quod discutiendi vim habeat. deinde eo balnei solia complent: in quæ postquam descenderunt, immorari ibidem diutius præcipiunt, vnde sæpe factum, vt non modò artuum tumores, sed etiam vniuersum corpus euacuaretur.

† *Vetus liber, τοῖς ἐν' ἐνείων, id est ijs quæ in illis dicta sunt.*

† *Veteres libri habent hoc loco ὁοοὶ δὲ δι' ἀδύναμιν κατὰ φύσιν ὁ πῶς ἴσως τὸ φαίνοντο, ac qui per imbecillitatem aut per frictionem exuere aliquid videntur.*

*De tophis, quos graeci poros vocant.*

QVONIAM & tophi subinde in articulis creantur modo ob humoris qui ad eos decubuit crassiciem, terrestremque duritiam, modo propter immoderatos discutientium resiccantiūmq; medicinarum vsus, sine earum mistura quæ emolliendi virtute pollent, sciendum venit ea esse conuenientiora, quæ mollientem simul & discutientē naturā fortiuntur. itaq; emolliunt adipēs vetustī, medullā, ammoniacum, bdellium, oleum bene vetustum & styrax. Discutiunt autem & resiccant, nitrum, sal, lixiuiū, adarce, euphorbium & consimilia. verūm ad concretos in articulis tophos propriè facit vetustissimus acerrimūque caseus cum fuillæ carnis præpinguis ac veteris decocto contritus & superimpositus. siquidem sua sponte topho dehiscēte quotidie humor qui intus coierat, eructatur. Valet etiam medicamentum diapernes, vsu probatum, quod duplici modo præparatur. item quæ dia stactes dicuntur. iam hoc peculiariter facit quod recipit spumæ nitri, resinæ terebinthinæ, lixiuij quod calcem adiectam habet, propolis, singulorum triens, ceræ bes, colophonix libra, olei fescuncia: mixtis vtitor, tū in tophis, tum in abscessibus: iam quod ex cynabari temperatur, mirificum est ad tophaceos tumores, aliāque complura: sed agrè paratur. Quod verò dia leptocaryon dicitur, præterquam quod probatum, etiam facile conquiritur, non solum valentioribus, sed teneris quoque corporibus accommodatum, si assumat medicamenti ex melle, vel ex anemone



mone confecti partes duas ad illius partem vnam: quæ si desiderentur, etiam eius quod cerusa constat, subinde equalis modus ipsi miscetur. *ALIUD.* Ad tophos, sandaracham contritam querneio visco excipito, & vtitor. *ALIUD.* Proficit etiam ad fistulas, & agilopas, olei sextarius, spumæ argenti vnciæ octo & semis, auripigmenti vncia. Argenti spuma, oleumque tantisper incoquitur dum manus non inquinet, postea tritum auripigmentum aspergitur, & priusquam vstionem senserit medicamentum ab igne tollito, & vtitor. Ex asij lapidis flore confecta, vbi morbus intermiserit imponuntur, quæ ad omnium articulorum nodos concretos accommodata toto morbo liberare, nonnulli veterum testatum nobis reliquerunt. Et ex salis flore præparatum medicamen si in morbi declinatione similiter imponatur, tumorum reliquias discutere experimenta fidem fecerunt.

*Quomodo quis à podagra se tueatur asseratq;.*

*PODAGRAM* quæ iam constiterit, articuliūve dolorem, sine prædicta medendi ratione aboleri longè difficillimum est. At eam quæ nondum creata est præcauere, facilius, si quis cibis demat, & eis vtatur quæ promptè in membra digeruntur, excrementisq; vacant. item vino moderatiore & exercitationibus satis se cōmittant. Quod ad præfidiij partem attinet, sal minutim in oleo tritus & articulis affrictus, omnes qui se ab hoc vitio vindicare volunt, magnificè iuuat, nisi præter modum sicca intemperie sint præditi, eoq; illitu, & mane, & vesperi por totum vitæ curriculum, & vbi inflammationes inclinauerint, vtendum est.

*Ad perniones qui tum pedum plantas tum calces infestant.*

CAP. LXXIX.

**P**erniones vlcera sunt, quæ ex frigore hyberno in digitis manuum pedumq; cōtrahuntur, Græci chimethla nuncupant. Itaque tepidam aquam marinam superfundere oportet, vel betæ decoctum, vel lenticulæ, vel erui, vel hastulæ regiæ radices. A' superfusione, lenticulæ coctæ vinoque detritæ admouentur, vel ficus ex oleo leuigata imponitur, vel alumen & farina pari modo, in vino pertrita applicatur, aut floces vini subaridæ, aut bulbus recens vino tritus adglutinator, aut allia in oleo fricta, proiectaque, & cera oleo mediocri liquefacta imponitur, aut malicorium incoctum vino, & in tenuem redactum puluerem, cerato rosaceo exceptum



ceptum inducito, prius locum decocto lupinorum irrorans, aut mannam, sulphurq; ignem nō expertum, cum melle cocto imponitur, at alterci succus continenter illitus, ab inflammatione & doloribus vindicat.

*Marcellium ad perniones.*

RAPAE sativæ radice excavata, conicitur in capacitatem ipsius ceræ sextans, olei lentiscini quantum sufficit: cocta in duplici vase ex marina aqua, aut muria, aut lupinorum decocto, hoc quidem superfundito, ceratum vero in rapa liquefactum frigidū imponito. At in exulceratis pernionibus, thuris, aluminis scissi, minij, resinæ terebinthinæ singulorum par modus: adipe suillo diluta inducuntur. Verum si inflammatio exulceratos perniones male habeat, medicamento utendum hexapharmaco quod recipit olei uncias nouem, taurini adipis & fellis, singulorum libram, argenti spumæ uncias sex, colophonix, uncias quatuor, mellis uncias sex.

*Ad digitorum rimas totorumq; pedum quæ rhagades dicuntur.*

PICE liquida delinuntur, aut cancro fluuiatili, aut marino super carbones cremato, testa abraditur, & cum oleo trita ut mellis spissitudo sit, abstergis prius scissuris instillatur. Proficit etiam scillæ medulla oleo feruefacta, item cum terebinthina leuigata, necnon cornu caprillum vsum, exceptumq; adipe caprillo, sed callos circumpurgare oportet, & sic medicamentis uti.

*Ad scissuras calcaneorum & plani pedum, anthera.*

CALCIS viuidæ drachmæ decem, cerusæ drachmæ viginti, ceræ tantundem, aut triginta, porcina pinguedinis recentis uncia septem, colophonix uncia nouem, succi lini seminis cyathus, olei dulcis uncia quadraginta: teneram plantam efficit ut aliud nullum. A L I V D. Adipis caprilli, ceræ, olei singulorum pari mensura vtor. A L I V D. Malicorium aceto incoctum diebus quinque applicatur, deinde loco vndiquaque purgato calx viua cum oleo, aut sordibus imponitur. A L I V D. Scilla cocta oleo, ipsa quidem fricta proicitur, oleo verò in quo tamen terebinthina liquefacta sit vtor.

*Ad attritus calcanei ex longo decubitu.*

CERAE, olei, argenti spumæ, mellis, pares modi, proficiunt



ciunt in omni exulceratione, plantæ pedum, calcanei, super-  
næ partis, & internæ digitorum, magisq; si vlcus vngui sit  
propinquum.

*Ad sordida plantæ vlcera emmoton, facit etiam genitali  
exulcerato.*

A M V R C A E cyathus, aceti cyathus, cocta vase æreo do-  
nec melleam spissitudinem habeant, & trita separatim, pro-  
sunt. Item squamæ æris drachmas duas, mannæ tantundem,  
lanarum succidarum mollium, quantum manu comprehen-  
di potest, inuolutarum tedæ, vstarumq; cinerem totum ex-  
cipito, & vtor, in vulneribus quidem vino diluens. in natu-  
ralibus autem & pedum plantis passo. A L I V D. Amurcæ,  
mellis despumati, paria pondera, hoc etiam cicatrices tollit.

*Ad intertrigines, ex calceamentis.*

P V L M O agnus, suillus & caprillus benefacit, verum  
coria ex veteribus calceamentis combusta, si inflammatio  
vrget, nihil quidem adferunt præsidij, sed illa finita, multū:  
vel cepa cum gallinæ adipe copiosior adiicitur, vel galla cō-  
busta in spergitur, vel acacia aceto diluta illinitur.

*Ad clauos callosq;.*

C A P. L X X X.

C Lauis prius vndiquaque purgatis, inducitur medica-  
mentum quoddam ex edentibus, quæ septica Græci vo-  
cant, aut ærugo rasilis, aut sandaracha, aut syringiacus pul-  
uis, aut collyrium syringiacum loco gummi, ammoniaco  
exceptum. Est autem clauus teres figura callus, candidus,  
clauorum capiti similis, qui in omnibus corporis partibus,  
sed pedum plantis, digitisq; præcipuè nascitur. Tollitur au-  
tem longiori tempore, etiam si quis excedentem clauum par-  
tem continuè abradat scalpello, aut pumice affricet, simili-  
ter etiam callos. Proficit lupinorum crudorum concrema-  
torū cinis cum melle, aut misy, liquida pice exceptum, me-  
lanthion cum vrina pueri venerem non experti, vel oui lu-  
teum, fabarum lomento cum aceto incoctum. At hoc sub-  
inde expertum est, cantharidum, atramenti sutorij, casto-  
rei, par modus singulorum, excipitur terebinthina, vt em-  
plastri fiat spissitudo, clauoq; prius circunciso, imponitur.  
A L I V D. Feculæ, calcis viuæ, visci, singulorum pares por-  
tiones, cum stillaticia lixiua, vel vrina pueri venerem non  
expertum.

Ad



*Ad vnguium vitia, & primum de reduuijs. CAP. LXXXI.*

**R** Eduuia, Græci paronychiam appellant, abscessus est qui ad radices vnguium coit, cum parua adhuc est, & prima habet rudimenta, galla cum melle eam reprimat, & confirmari prohibet, vel Musæ pastillus, vel Heræ, ex aqua. At ubi caro iam præter naturam excreuerit, eò curatio dirigenda est, ut per rodentia medicamenta absumatur, rumpaturq; , valet autem ad reduuias, tum aurium sordes, tum lycium. suppuratas autem reduuias, acu adacta humorē emitte, spongiamq; aqua imbutam imponere oportet, vel lentikulam applicare ex aqua tritam, aut palmulatum cum vino, vel rosas virides, vel siccas, aqua maceratas tritasq; , vel polentam cum aqua: efficax est reduuiis etiam lupinorum farina melle, vel mulso macerata. Exulceratis reduuiis opitulatur hoc medicamentum. Aeruginis, argenti spumæ singulorum drachmæ quatuor, sarcocollæ tantundem, super linamentum ex vino & spongia imponitur. Conuenit autem carnem vndiquaque ab vngue diducere.

*De pterygijs.*

**P**TERYGION carnis incrementum est, aliquam vnguis partem operiens, ex reduuia, aut alia huiusmodi causa proueniens, aduersus quam auripigmentum & manna pari pondere inspargitur, super autem, linamentum ex vino et spongia imponitur. **ALIUD.** Chalcitidis squamæ, malicorij æquales partes. Excipiuntur fico tosta & melle, parte affecta, lupinorum decocto prius aspersa. Quod autem siccum est in vngue circuncidito.

*Ad digitorum pterygia putrida, item ad pudendorum vlcera.*

**L**ACHRYMÆ thuris drachma, squamæ drachma, æruginis rasæ drachmæ quatuor, mellis cyathus, teruntur in sole donec subflauescant. Et loco vino prius irrorato per splenium inducuntur.

*Medicamentum quod subito pterygia deficcat persanâtq;.*

**S**OROS combusti drachmæ duæ, thuris tantundem, æruginis rasæ drachma, cum melle contrita, ipsi pterygio inducuntur. Valet etiam ad reliqua maligna horum locorum vlcera, nigritias & putredines. **ALIUD.** Squama æris, palmularum carne excepta, aut ficorum vitior. **ALIUD.** Columbæ stercus cum polætæ polline ex passo coctum pertritumq; calens imponitur, item squama per se inspersa, pterygia



rygia desiccatur. Oportet autē crebro, angulum vnguis pterygion pungentem, ne increseat, scalpello superimmissio, adimere.

*Ad vngues contusos.*

MYRTI, & mali punici foliis teneris vngues obducito.

*Ad cruentos vngues.*

FARINA pice mista imponitur.

*Vt vngues qui laborauerint abscedant.*

SULFVR tritum adipe suillo exceptum iniicitur.

*Vt scabri vngues abscedant.*

VISCI quercini, sandarachæ, fœnugræci singulorum pondo sextans, cantharidum, thapsiæ singulorum uncia, acetum quod satis est. ALIVD. Propolis atticæ, ceræ, bituminis, singulorum drachmæ duæ, sulfuris ignem non experti drachma, oleo nō inquinat, in usu calefactum vnguibus applicatur. ALIVD. Picis liquidæ, ceræ, colophonix, terebinthinæ, guttæ ammoniaci, sulfuris viui, aphronitri pares portiones, ne manus inquinent. ALIVD. quod separat scabros vngues sine exulceratione. Bituminis, auripigmenti, sandarachæ, sulfuris viui singulorum drachmas quatuor, resina excipito & vitior, dissoluens per dies septenos. ALIVD. Eruina farina, felle ouillo, vel vrina ouilla imbuta vitior, vel calce viua cum oleo, vel chia cum opobalsamo, vel visco, atramentum sutorium, sulfurq; viuum quod satis est, exceptum, pelli illitum superinducito, vel herba pedicularia, cū aceto trita vitior, vel resinæ terebinthinæ drachma, sandarachæ duplicata portio simul radici vnguis imponitur, diligentiq; fascia illigatur. Cum autem vnguis exciderit, ceratum myrteum cui medicamenti ex resina paululum adiectum sit, superaccommodatur.

FINIS III. LIBRI PAVLI AEGINE-

TAE, IOANNE GVINTERIO AN-

DERNACO MEDICO

INTERPRE-

TE.

PAVE



# PAULI AEGI- NETAE LIBER IIII.

IOANNE GVINTERIO  
ANDERNACO IN-

TERPRETE.

\*

*De elephantia.*

*C A P. I.*



ECTE<sup>a</sup> mea sententia† Cappadox Aëtius  
memoriae prodidit, auxiliorum vim mor-  
bis fortiolem esse oportere, eoq; elephan-  
tiam nunquam curari, vt qua nulla poten-  
tior medicina reperiatur. Si enim cancer  
veluti elephantiasis quædam vni obortus  
particulæ inter morbos insanabiles vel ab ipso Hippocrate  
relatus est, quanto magis elephantia, seu totius corporis  
cancer aliquis, ab omni abhorrebit remedio? Cùm enim atra-  
bilis, ex qua huic affectui origo est, duplici modo genere-  
tur, (vel enim ex melancholico sanguine, faculentiorq;  
& veluti eius limo: vel bile flaua, vtrisque nimium vstis, na-  
scitur) subrubicundam quidem elephantiasim mitiorem  
quodammodo, vt autem verius dixeris, minus malignam,  
prima ipsius differentia procreat, reliquam verò, & mali-  
gniores in qua totum corpus fœdatur vlceribus, & extre-  
ma decidunt, altera flauæ bilis supra naturæ modum adustæ  
foboles, producit. Quapropter morbo iam vstis manus ad-  
mouenda non est. At si recens adhuc malum est, vt nihil ex  
summis deciderit, nulla autem infestaret exulceratio, neque  
tamen eminentiæ tuberosæ plurimum exurgant, sola au-  
tem facies aspectu ingratiôr, deformiôrq; sit quodammodo,  
eaque non admodum indecora appareat, curationem expe-  
riemur. Nonnulli siquidem haud pauci, sola capitis adustio-  
ne multos qui hoc inceperant vitio corripî, ne vincerentur,  
inhibuerunt. Protinus ergo interinitia sanguis mitti debet,  
& magis vere, in quo potissimum hæc lues, & nascitur, & in-  
tendi



tenditur. paucis diebus interpositis, nouem decemve, pulte diacolocynthidos ipsos purgabimus, non semel, verum subinde, ex ratione virium quantitatem medicaminis adauēuri. Item ex hiera purgatio his est idonea. Rursus interpositis circiter decem diebus, lactis fissilis serum dabitur, neq; minus tribus heminis, neq; amplius quinq;. Insequenti tempore non fisso, aut recens multo lacte nutriuntur. Ob quæ si morbus remittat, eodem vti cibo debent: si remanet, lacte abstinebunt: acribus autem assumptis vomitus cietur, à radícula, aut cibis. Proficit & ex albo veratro post hæc purgatio: bis quidē, si fieri potest, vere, semel per autumnum adhibita. Malo victis neq; sanguis mitti, neq; veratrum exhiberi debet, cum materia neq; ex cute in altum deriuari, neque hinc etiamnum minui possit. sed ea quidem ad ventrem, & intestina deducēda est. Medicamentis autem noxia euocantibus vtendum, metasyncritica dicunt, & summam cutem desiccare, & astringere oportet. Leues igitur cucurbitulæ ventriculi ori & præcordiis agglutinabuntur, eadem membra etiam dropace delinentur. Modico temporis processu rursus ad superiora reuertendum est, à purgatione quā præstat hiera, incipiendo, prætermissa sanguinis detractio, vt quæ plus noxæ, quàm præsidij esset allatura. Atque hoc circuitu ad ternas vices quaternasve per annum vti expedit, vere potissimum & autumnō. potare his prodest aceti cyathū, cum cedrini liquoris cyatho, & brassicę crudæ succi cyathis duobus. mista dantur manē & vesperi. Vel syderitidis herbe folia torrida denarij pōdere in vini cyatho, vel cornu ceruini drachma, & scillitici aceti quantū cyathus implet, quotidie post matutinā obambulationem potui exhibetur. reliqua verò pro ratione temporis his offeruntur, vel scillæ lotæ drachmæ quinque in mulla, vel melle. eclegmatis modo: vel liquoris cyrenaici ad erui magnitudinem, melle & butyro subacti, vel eboris ramenti drachma semissis cum vini cyathis duobus, vel cumini æthiopici drachmæ tres cum melle, instar eclegmatis. His amplius iuuat theriacorum pastillorum drachma in vini primæ notę cyatho leuigata epotāq;. Similiter etiam scilliticorum pastillorum drachma bibitur. Et calaminthæ succum ceu efficacissimum potu auxilium commendant. incipiendum dicunt à cyathis ternis adusq; senos. Cæterum omnibus his efficacior est theriace



ex viperis, tum potui data, tum extrinsecus illita. Cum autē viperarum copia datur, nihil æque proficit, ac viperarū carnes comeste, albo iure ex copiosiore aqua, sale, porro, & anetho decoctæ, vsq; dum spinæ dissoluantur, sed capitibus ipsorum caudisq; digitos quatuor prius amputatis, interaneisq; ipsorum ablatis & cute. Item theriaci sales eadē per se promittunt, cum obsoniis assumpti. Tali enim ipsorū vsu accidit, nonnunquam squamas, † vel ceu vulpis pellem quandam ex cute elephantiorum decidere.

† Aldinum exemplar habet καππαδοκῶν ἀρετῶν, Cappadocem Arctæum. quæ lectio rectior mihi videtur.

‡ Vetus codex, συμβαίνει ποτὶ λεπίδας ἢ δῖον τινα λοπὴν, quo loco legendum arbitror, ἢ δῖον τινα λοπὴν. est autem λοπὴς τῆς κρομμύς λεπίδος, id est, cepæ tunica, ut sit sensus, veluti cepæ tunicam & tenuem illam pellem.

Victus ratio talis erit.

A SOMNO manu molliter permulceatur, aluoque deiecta gestetur, vocem exerceat: deinde perfricetur & vario exercitationum genere vtatur, nunc saltu, nūc magis, alteribus, & folle. Postea sudore, quem illinc contraxit, absterfo delinetur adipe vrsina, aut vulpina, aut hircina, aut auis alicuius, aut butyro recenti. paxillo tēporis interposito in lauacro perūgetur succo fœnugræci, aut prisanæ cremore, aut ammoniaci momento, quod aceto subegeris. A balneo deterfus perungetur oleo lentiscino aut cœnanthino, aut myrteo. Vinoque modico cum alumine, vel ammoniaco, ut fordidum sit spissitudo. Rursus teneris panniculis abterfus dimidia hora conquiescat. Inde potu aquæ ad vomitum sollicitetur, digitis in os, aut pinnis demissis. post vomitum detur potui vinū absinthites, aut organites. Cibus erit panis hordeaceus, vel maza ex polentis. Inter olera, beta, lactuca, raphanus, porra, brassica aquis binis edulcata, & capparitis. Ex marinis ostrea sumuntur, pelorides, erinacei, pectines, tellinæ simul cum betis incoctæ: salsamentum vetus ceu in medicamenti vicem adhibetur. Vino autem per totum morbi curriculum & venere similiter abstinendum. At cum vires ex purgationibus lacepsitæ recreantur, paxillum duntaxat vini tenuis & aquosi assumitur. quando & acria circuncidi deb



debent, exceptis condimentis. Recteque ipsis datur ptisana, oua, chondrus elotus, lac, mel cum pane, malua, rumex & fifarum: piscis molli præditus carne: Ex iis quæ volatu fidunt, probis donata succis: Inter fructus, ficus, vua, & vuæ passæ: ex dulciariis mellitis conferunt, quæ pini nucleis, aut amygdalis frictis, & cnico, constant, iis qui bis quotidie cibum capere solent: graue autem his est molestumque, semel duntaxat eum assumere. Interiorum cura habita, smegmatis in balneo vtendum ex decocto betæ, aut fœnugræci cum aphronitra, aut sapone, aut myrobalano: interim & psilothris. Abstergit itidem portulaca cum aceto detrita, tenue semperuium, rumicis radices aceto incoctæ, alumen cum sale. Item sandarachæ par modus ex vino, & oleo lentisci. Huc spectat medicamentum, ad vtiginis speciem quæ alphos dicitur, accommodatum, ex alcyonio, nitro, myrto, sulfure, fici agrestis foliis siccis, cum aceto tritum, illitumque: idem præstat quod ex sepia testa concremata sit, pumice, nitro, terra cimolia extorrefacta, gummi, galla omphacitide pari pondere siccum inspersum, aut ex aceto infricatum. Hoc autem mirabiles habet effectus: rumicis radicum fasciculus qui manu comprehendi possit, nitri drachmæ quadraginta, thuris vigintiquinque, sulfuris tantundem, ex aceto Aegyptio illinitur. Similiter hoc efficax est, quod recipit auripigmenti drachmas decem, sulfuris ignem non experti drachmas octo, costi drachmas duodecim, calcis viuæ drachmas quatuor, ceræ totidem, baccarum lauri aridarum drachmas duodecim. Hæc macerantur populi albæ foliorum succo, aut crasso decocto. Vbi mellis spissitudo est facta, illinuntur. ALIVD. Radicum rumicis fasciculi duo, aceto incoquuntur, & in pilam coniecti coteruntur læuiganturque. Deinde alcyonij libra, aphronitri vnciæ octo, sulfuris ignem non experti libra, cochleæ testarum combustarum triens, † chamaeleontis cum radice triens. Omnia simul læuigantur, donec sordium fiat crassitudo. Deinde illinuntur per æstatem in sole frequenter, hyeme in balneo vsq; ad desudationem. Item Aesculapij aridum smegma pulchre his conueniet, ac omnia quæ communiter dicuntur smegmata, imo etiam ea quæ alphis dicata sunt propriè huc pertinent. quemadmodum & quæ nunc aduersus illa prodidimus. At tumidas eminentias si inflammatione rententur, aut exulcerata sint, delinètur lycio indico, vel glaucio,



vel aloë, vel Andronij pastillo, aut polyidæ sphragide. Cataplasma ipsis aprabitur ex chondro cum succo polygonij, vel plantaginis, vel parietaria trita. Insuper melissæ herbæ viridis folia cum axungia tunsa, applicataq; mirabiliter proficiunt. Etenim rubor in partibus excitatur, sed ex facili remittitur pane applicato, aut cerato ex amygdalino atq; color naturalis redit. Exulceratis rectè accommodantur emplastra, tum ex diphryge præparatum, tum ex vino melinū. Adde Coracion, quodq; constat ex oxymelite, & pastillum Andronij, pompholigem, & cadmiam. indicium verò est totum morbum mitescere. si prima vlcera cicatricem recipiant. Ad spirandi verò difficultatem eorum qui elephantia laborant, aselli sub aquariis degentes, quinque, aut sex, ex aqua mulsæ cyathis tribus potantur. Iam verò quædam ex iis quæ ad ægrè spirantes inscribuntur, ipsis quoque communiter competunt. Aquarum naturalium vsus adhiberi debet, ceu maximè necessarius, præsertim aluminosarum, ferrumque resipientiū. & si fieri potest, frigidarum. Conferūt ipsis si etiā bibantur, nec non marinæ arenæ vsus. Eandem habent efficaciam omnia quæ desudationes mouent. Quoniam verò affectus hic, non minus ac pestilentia contagiosus est, quàm longissimè ab vrribus remoti ægri, in locis mediterraneis, frigidis & ubi sit hominum si fieri possit, infrequentia habitabunt, inde verò ad confinia migrabunt, † tum ipsorum causa, tum illorum potius, qui, vt verò simile est, ipsis incident. Quippe & aëre fruentur commodiore, & alios hac lue non inficient.

† Vetus liber habet, χαμαιλέοντες & μέλαν & ῥίγας, id est, chamaeleontis nigri radices vncia tres.

† Hic locus sic legitur in veteribus libris. Διὰ τὴν ἀντὶς καὶ τὸς ὥς ἐκείνους ἐν τοῖς μένους συχνότερον, id est, tum ipsorum causa, tum illorum potius qui (vt verò simile est) frequentius incident.

De lepra, & scabie, quæ psora dicitur.

C A P. II.

**V**Terq; affectus, cutis asperitudo est cum pruritu, in qua corpus absumitur colliquaturq; originē ex melancholico humore trahens: sed lepra altam cutem orbiculatim depascitur & piscium modo squamulas ex se remittit. Scabies verò summa infestat potius variè figurata, furfuraceaque remittit: in quibus sanguinis dimissio adhibenda est, si corpus



pus magis plethoricum videatur. sin minus, purgatio certe ex iis quæ attrabili vacuandæ sunt. Extrinsecus autem vtre communiter vtroq; veratro, calcemq; habe elotam & siccam: in ipso autem vsu, aqua diluens ad sordium spissitudinem illinito. A L I V D. Saluæ, oleæ æthiopice lachrymæ, singulorum drachmæ octo, capparidis radicis corticis, gummi, singulorum drachmæ quindecim. Inunguntur ex aceto ad solem, propriè verò lepras disiciunt anemone applicatæ, ite vitis albæ radix. Composita verò hæc, lolij farinæ chœnix, cardamomi albi drachmæ quatuor, nitri spumæ drachma, atramenti sutorij drachmæ octo, hastulæ regiæ radicis mediæ drachmæ quatuor. Aceto pertrita, & in cerati spissitudinem coacta illinuntur, parti prius nitro detergæ: vbi solueris (solues autem tertia die) & frigida aqua elueris, rursus inungentur. A L I V D. Hastulæ regiæ radicis succi vnciæ sex, sulfuris ignem non experti, mannæ, singulorum drachmæ decem, nitri drachmæ octo, aceto subacta illinuntur. Ad scabiem peculiariter facit, ex simplicibus herba pedicularia, staphis agria dicitur, lupini amari, cardamomum cum aceto, lilij radix cum melle, resina terebinthina, sulfur, cicer, caprillum stercus. Inter cōposita, misy & chalcitis pari modo ex vino humidiores scabies delinuntur. A L I V D. Rhododaphnæ tenera folia in olei sextario simul incoquito, donec arescant. Ac vbi proieceris, oleo adiunge ceræ dealbatæ vncias tres, postquam soluta refrigerataq; fuerint, sulfuris viui vnciam inspergito. ad solem, vel in balneo perungito. nonnulli simul cum rhododaphne etiam scillam coquunt. A L I V D. Medicamenti *Αιέχυνον*, hoc est ex succis herbarum confecti vnciæ duæ, ceræ tantundem rosacei vncia argenti spumæ vnciæ tres, cerusæ totidem, liquidæ picis vnciæ sex, stercoris argenti vnciæ duæ, sirici tantundem, aceri quod siccis læuigadis sufficit. A L I V D. Cerusæ semuncia, amyli tantundem, plumbi vncia, lotariorum rubrorum vel anchusæ, vnciæ duæ, ceræ vnciæ sex, rosacei vnciæ nouem. Anchusa probè cum rosaceo coquitur, deinde reliqua adiiciuntur. A L I V D. Oua decem, vel quot ad vsu opus est, aceto quâacerrimo macerantur, quousque putamen ipsorum tenerascat, lutea in eodem aceto coquuntur, læuiganturque rosaceo, & reliquo aceto etiam argenti spumæ modicum ad sordium spissitudinem coactum illinitur. A L I V D. Quotū quæ



in aceto commaduerint, lutea tria, rosacei vnciae sex, sulfuris viui vnciae tres, laeuigatis prius cum aceto luteis & sulfure, ceratum adiicito. Argenti spuma verò oxyrodino detrita, vt emplastri crassitudo fiat, acriores scabies exterit. Iam verò ex lapatho smegmata, & ex iis quae elephantice faciunt, plura communiter tum ad lepras, tum ad psoras conueniunt.

## De Impetiginibus.

CAP. III.

**I**mpetigines ex serosis tenuibus, acribusque humoribus, crassioribus aliis mistis contrahuntur, celerrime in scabiem, & lepram transeuntes, quapropter remedia validè siccantia requirunt. Corpore igitur toto, si opus fuerit, euacuato, simplicia quidem ipsis conferent, cicer, veratrum, erinaeceus saxatilis, pix cerato, resinaeque mista, crocodili terrestres stercus, atque sturnorum, cum oryzam solam ederint. Plerique hoc solo impetigines mentum infestantes, aliamve particulam, aboleuerunt. Tritici multum capitur, incudique ignitae cuiusdam imponitur, & quicquid inde humoris defluit, calēs adhuc impetiginibus illinitur. Puerorum impetigines, hominis salua continuè defricantur. His opitulatur pruni gummi illitum. In vetustatem incidentibus viticis folia cum aceto detrita applicantur, vel capparis folia similiter. Composita verò haec, sulfur cum thuris lachryma, aut cum ammoniaco, subactum aceto illinitur.

## Pastillus ad impetigines.

**CLVTINIS** fabrilis drachmae quatuor, thuris drachmae tres, aceti cyathi dimidium. aceto soluta illinuntur. **ALIVD.** Chalcitidis, gummi, singulorum drachmae octo, sulfuris igne non experti, misyos, singulorum drachmae sex, squamae aris, acaciae, singulorum drachmae duae, aceto delinuntur.

**ALIVD.** Sulfuris viui, nitri spumae, singulorum drachmae quatuor, cachryos grana sexaginta, leuigantur ex aceto. Sola verò pars vitata inungitur, sed ita, vt quae integra est, non coinquinetur: exarefacta, aqua frigida eluitur. **ALIVD.** Veratri albi drachmae octo, farinae lupini, buccinorum combustorum, nitri, singulorum chœnix. Arido medicamine defricantur. Porro impetigines, quas *αγφίς*, id est, feras appellant, mediocriter siccantibus remediis non discutiuntur, acrioribus autē irritantur. Adhibere igitur oportet medicamenta abundè quidem efficacia, sed quae non valenter erodunt, quale est istud,



istud, Glaucij, thuris, alcyonij, bituminis, sulfuris, gūmi, singulorum vncia, aceto inungitur. A L I V D. Picē aphricanam cum aceto coctam liquatāmq; illinito. A L I V D. ad impetigines & pruritus. Atramenti futorij, sulfuris viui, nitri, thuris pari modo, in impetiginibus quidem, aceto adiecto, in pruritu autem, vino vtitur. A L I V D. Leichenicon, ab impetiginibus curandis nuncupatum. Guttæ ammoniaci, erui farinæ, lupini farinæ æquales portiones aceto illinuntur

## De Pruritu.

## CAP. IIII.

**P**RURITUS qui senibus accidit, ex toto nunquā cōsanescit, verū lenitur infra positis remediis. in reliquis ætatibus, si ex prauo humore contrahitur, qui nimirum biliosus, aut pituitosus putris vel etiam falsus est, per ipsius vacuationem tollitur. Porro cognoscitur ab ætate, temperamento, victus ratione, anni tempore, regione, & reliquis his consimilibus. Si igitur in venis simul cum sanguine redundare videatur, à sanguinis dimissione auspicandum est. Sin autem qualitate magis peccet, congruis eo medicamentis vacuato, ad externam curationem diuertemur. Lauandum itaq; prorsus ieiuno est, nonnunquam & modico cibo sumpto, iterum lauandū: quippe vitium? vix inhumescit, detergitur autem scœnugræci decocto, aut betarum, aut furfurum, aut maluæ agrestis & satiuæ, aut prisanæ. Præter hæc, farinæ etiā fabacæ, vel lupini, vel myrobalani, vel smegmatis ex pepone præparati, quod *πρόνυτον* appellant, si inueterauerit, lauatio similiter quidē cōuenit: fots autē ex saluæ decocto, myricæ, mercurialis, origani, pulegij, baccarū lauri, cucumis syluestris radicis, capparis, lixiuio, & oxalme. Deinde respergūtur arido nitro, vel cū scœcula aceri, vel quod recipit nitri spumæ sextariū, thuris, sulfuris viui singulorū librā, cimoliæ librā semissem. Vel hoc, Aphronitri, sulfuris viui, alcyonij combusti, pari modo. siccis vtitur, vel cū quodam ex suprā dictis decocto. Si autem placet, etiam veratrū siccum inspergito, sine pingui addito. Illinitur autem cum oxelœo herba pedicularia cōtrita, vel sulfur, vel sandaracha, vel omnia, vel sinapi cum myrobalani expressio, & oxelœo, vel vtere cochleis combustis leuigatisq; melle, vel tunicis radicibus, vel smegmatis inde confectis, vt in capite de elephantia comprehensum est, aut quibusdam ad scabiem efficacibus. Si autē exulceratio partes exercuerit, parygro, vel



diapompholygos appellato medicamine vtendum, vel ceræ vncia liquefacta in cyprini cyatho, cui sulfuris adiecta sit vncia. A L I V D ad pruritus. Nucum agnarum rancidarum vncia, sulfuris tantundem, apij succo leuigatis vtitor in balneo, membra affatim defricans. Hoc solum multis tum scabiosis, tum alio pruritu detentis, abundè fuit. Item apium per se viride tusum infricatumq; in balneo vehementer auxiliatur. Similis effectus est perdicioni, & acerna resina cum rosaceo soluta, illitq;. A L I V D. Oryzæ puræ & nimis candidæ, vnciæ tres, tusa cretæque aceto quàm acerrimo læuigantur, donec sordium fiat spissitudo, adiiciaturque priuatim sulfuris viui detriti vncia. mixtis perbellè in balneo vtitor, diutius defricans. At in iis qui superfluitatibus magis redundant, pari portione illorum temperata, præstantius remedium reddetur.

*De Leuca.*

## C A P. V.

**L**Euce, cutis quædam ad albidius mutatio est, quæ viscosa, glutinosaq; pituita contrahitur. Quoniam verò non quælibet leuce curatione recipit, notas ipsius tales habeto. Acu per summa leucæ pūgito, sed cute non penitus: & siquidē sanguis emanauerit, sanabilis est: sin lactea humiditas, desperata est. Vel panniculo laneo asperiore infricata cutis, si quidem rubicundior euaserit, medicinæ locus est: sin idem color remanet, non consanescit. Et quæ plura corporis loca obsidet, leuce, difficilior tollitur, quàm quæ pauca derurparit, item vetustior, quàm recens minus in medicina spei habere censenda est. Nonnulli igitur adustionem quæ feramento candente administratur, in leuca probarunt, sed ita, vt hæc vel sola valetudini sufficeret. Alij vero dolorem inde cicatricemque secuturam veriti, vt quæ non minus ac leuce indecora sit, medicamentis crustam inducentibus, qualia & cicatricem aiunt concolorem efficere, vti sunt. Alij, & horum inefficiam repudiantes, tincturis vti maluerunt, imposturæ potius quàm auxiliij rationem habentes, quæ sanè omnium maximè vitari debent, quòd affectus celeriter renascatur. Itaq; subiectis vti medicinis cōsiliū est. ad arcæ seminis roris marini, sulfuris viui, singulorum paria pondera, tusa & in cerniculo priuatim creta, deinde simul cum aceto in puluerem sat multis diebus detrita, in sole illiuntur, non cumulatè, ne cutis exulceretur. Procedente autem



tem tempore†veratri & gallæ similiter momentum adiicitur. A L I V D. Fici nigræ furculis, aceto maceratis, contritisque misceto, aphronitri, sulfuris ignem non experti, myricæ fructus, parem singulorum modum, vbi nitro cutem defricaueris, perungito: solique exponito, animum attendens ne exulceretur. Archigenes autem fici foliis, calcis viuæ eo quod satis est, mixto, similiter vsus est, vel infricatas (inquit) leucas, albo veratro, donec sudore diffuentes reliquo corpori concolores fiant, illinito synopide, vel mediade, vel acu transfixa punctas quoad cruor emanet, illinito synopide, cum aceto, vel prius absterfis, vt est comprehensum, perungito, fici liquore recenti, & folio eiusdem affatim infricato.

†In veteri libro hæc est scriptura, λευκὸν ἰαλεβόρον, veratri albi.

De Alphi albo, & nigro.

CAP. VI.

**A**lphi cognato leucis modo generatur, sed illæ quidem altius cutē mutāt vt pilos quoq; sibi similes procreent. Alphi autem summam cutem infestant, quanquam & ipsi cum vetustatem sentiunt, penitius recedunt: vt etiam albos pilos producant, idque humoris qui subest ratione. Etenim ex pituitoso humore albi ducunt originem, nigri autem ex melancholico, vtrisque; igitur commune prodest auxiliū, elota calx aqua soluta, aut dracūculi radix, cū aceto applicata, simili modo vtrunq; veratrum eisdem efficax est, item lupinorum amarorum decoctio superfusa, eorumque farina, ex aceto, vel oxymelite inducta, iam capparis radice cortex cum aceto, liliūq; radix cum melle, cæpa ex aceto in sole illita, crocodili terrestres finus idem præstat, pari efficacia & sturni excrementum, cum oryzam duntaxat ederit, sepiæq; testa cōcremata. Compositū verò hoc præstans est, Alcyonij, nitri, singulorum sextans, veratri albi, sulfuris viui, singulorum vncia. Nonnulli vero & floces vini combustas adiiciunt. A L I V D. Sulfuris ignem non experti, nitri spumæ, singulorum drachmæ quatuor, seminis roris marini grana septem, teruntur cum aceto. solum verò alphum perungito, sed ita vt integram partem non attingas. siccatum medicamen aqua frigida eluitur. A L I V D. Farinæ lupini, buccinorum, & nitri singulorum chœnix, veratri albi, drachmæ octo. Arido pars defricatur. A L I V D. Erui farinæ libræ duæ, erucæ seminis, amygdalarum amararum, cucumis



syluestris radicis, singulorum libra: mulso simul leuigata delinuntur, & hora interposita per spongiam abluuntur. facit etiam ad ephelidas, varos, & cutis sordes.

*Ad Albos albos experta.*

**S**ULFVRIS ignem nō experti, sextarij duo, calcis viuæ candidæ, vnciæ quatuor, albumina ouorum quinque, olei nardini, & aceti momentum. sulfur primum in puluerem coigitur, mox oleum nardinum ei superinfunditur, rursusq; leuigatur, deinde acetum instillatur, & iterū teritur, calcem vero priuatim loram semel, bis, tēve, sulfuri adiicimus, vnā cum ouorum aquato, & denuō cōterimus. collectus humor effunditur. pauxillum verò relinquentes, vt vnguentū queat illini, in hunc modum vtimur. **A L I V D** probatum. Sulfure viuo, fici foliis aridis, aphronitro, alcyonio, terra cimolia, myrto, ex aceto vtitor. **A L I V D** Archigenis. Fici foliorum quæ in vmbra exaruerint, sulfuris, aluminis singulorum æqua portio cum aceto inungitur, aut foliorum fici, drachmæ quatuor, nitri drachmæ duæ, alcyonij cōbusti tantundem, aceto in balneis illinuntur. Priuatim nigros exterit efficaciter sandaracha, cum sulfuris dimidio, sed cute nitro prius defricata, in sole perūgitur. albos verò tollit atramēti sutorij, æruginis, æqualis modus, nitri duplicatus, sine pingui infricatur, illiniturq; vel cachryos, sulfuris viui adarcæ æquæ portiones, ex aceto pertritæ infricantur, illinunturq; cū inaruerint abluito, locū perfricans. Idem facit & leucis.

*Ad Stigmata, ex commentarijs Archigenis.*

CAP. VII.

**S**tigmata curabis, si quod matulæ adhærescit, cum aceto quā acerrimo illinas, vel calcis viuæ partem vnā, nitri ossi fului dimidiā, cum aqua in sole illinit. At vbi exulcerationem, fuerint experta, cicatricem tanquam vlceri inducito. Crito verò iubet confricatæ nitro prius cuti terebinthinā illini resinā, linamentisq; ligatam sex diebus relinqui, septima deinde solui, & acu pungi stigmata, & sanguinē qui flueret spongia detergi, interiectoq; breui tēporis spatio, tenui sale confricare locum. Tum imponi, ad dies quinq; medicamentum quod recipit, thuris, nitri, calcis viuæ, ceræ singulorū drachmas quatuor, mellis octo. Quum enim à parte medicamentum deposueris, nigrum in eo offendes. **A L I V D** vnguentum. Piperis drachmæ duæ, rutæ drachmæ, quatuor, sandarachæ drachmæ quatuor, auripigmenti drachma mel-

lis



lis quod saris est, cuti prius nitro infricatae illinitur, item aliis priori consimiliter peractis, per triduum soluitur, & nigritie absterfa, rursus inungitur. Exerit enim (inquit) diebus viginti, tam integre, vt nec exulcerationem, nec cicatricem relinquat. ALIVD quod Criticon dicitur. Thuris drachmae quatuor, nitri drachmae duae, atramenti sutorij drachmae quatuor, cerae drachmae sex, piperis drachmae tres, calcis drachmae tres, thapsiae totidem, auripigmenti drachma vna & semis, sandarachae drachmae tres, mellis quod sufficit, vt ere quemadmodum superiore Oribasius tradit ranunculum applicatum, vel capparis folia stigmata exterere. At si altius fixa non discutiantur, modicam vero cutem attingat, crusta ferramento frigido excitata tolluntur.

*De Exanthematis.*

## CAP. VIII.

**E**Xanthemata generantur, ex crasis in cute impactis humoribus, magisque adhuc in superiore pellicula cum densa est. In quibus igitur, si etiam in alto humorum copia subfiterit, primum purgatio tentanda est. Nam si hoc neglecto, prius discutere aggrediaris, obstrues ipsos potius quam per cutem euacuabis. Sin autem nullae in alto deliteant humorum colluies, per cutem vacuare oportet, nec procul attrahere, si aluo, aut vomitu vacationem moliri velis. sed humorum qui cuti impacti sunt, curationem medicamentis experire, quae exurunt, calfaciuntque, maxime quum lata sunt exanthemata, siquidem ex frigido admodum, crassoque humore, talia sunt procreata. Lauri igitur tenerorum foliorum, rutae & mannae, aequalem singulorum portionem detritam, & lachrymam thuris oleo subactam delinito, vel betam teneram incoctam, tritamque inducito, aut cerae drachmas octo, sulfuris tantundem, salis drachmas sex. Arida in pollinem coacta, & olei cyatho dimidio superfusa, omnia simul incoquito, factoque emplastro vtor. Sed coctioni sedulo assistendum est, vehementer bonum remedium existit.

*Ad epinyctidas.*

## CAP. IX.

**E**Pinyctides vlcuscula sunt, sua sponte erumpentia, pustularum specie, & subrubra, quibus diruptis, cruenta fannes defluit, per diemque non magnopere excruciant: per noctem vero, graui magis quam pro ratione vlceris, dolore torquent. Itaque liquor laseris aqua solutus imponitur. nam citra rofionem deficcat, aut cicuta in laeuorem detrita inducitur



citur, aut brāsica cruda cum aqua, aut apium cum polenta trita applicatur, aut alterci folia, cum melle pertrita admoventur, aut solanum per se, & cum coriandro viridi, aut oliue foliis vtitor cum aqua coctis: aut vuas acinis exemptis, leues, splenio illitas imposito, vel adianthum ex melle tritum. Vitari debet acrium, acidorum, & falsorum efus, fomenta, balneum & insolatus.

*Depustulis, quæ Græcè phlyctenæ dicuntur.*

C A P. X.

**P**ustulæ quæ non sua sponte rumpuntur, sed graui dolore excruciant, acuta perforari acu debent, vt humoris colluies habeat emissarium. Deinde humore leuiter expresso cutis præposita finitur, donec impleatur. At si vulnus connueat, denuo pustula perforanda est similiter & exprimenda, tum cutis astricta, seruanda quandiu id quod sub ea exulceratū est, ad cicatricem peruenerit. Priusquam igitur pustulæ aperiantur, cocta lenticula cum aqua leuigata inducitur, vel mali granati virgulta, cinere calido tepesfacta imponuntur, & loci attinguntur. Quod si ruptæ fuerint, & vlcus excitatum, adeps suillus liquefactus & argenti spuma detrita mistus, in linteumque illitus admouetur, vel lilij radix in aqua cocta trita que cum cerato imponitur.

*Ad epinyctidas, & phlyctenas.*

**A**RGENTI spuma & sulfur ignem non expertum pari portione cum aceto applicantur, item myrtus in lauiorem redacta, sordium illitione cum oleo & vino, benefacit, tum his, tum calidis eruptionibus, & papulis feruentibus, gliscentibus capitis vlceribus, furunculis incipientibus & adustis medicamentum, & quod molybdæna, & quod ouis præparatur.

*Ad Ambustæ.*

C A P. XI.

**A**mbusta medicamentis indigent quæ modicè abstergant, non euidenter calefaciant, aut refrigerent: Itaque terra chia, cimolia, cretica, omnisque leuis terra illita cum aceto non admodū acri, vel aqua, præclare facit, prohibetque pustulas excitari. item oui albumen crudū statim impositū, lana molli exceptum. etenim refrigerat leuiter & citra rofionem desiccatur. idē efficit atramentū scriptorium illitum, vel lachryma thuris aqua diluta, vel lenticula cocta tritaque vel eruus applicatur. At ex aqua calente vstiones priusquam pustulæ oriantur, oliuarū salsa rum aqua continuè superfundun



duntur, ipsæq; oliuæ salsæ cum polenta contritæ inducuntur, aut alumen scissile, pertritum cum aceto illinitur, aut fel taurinum cum aqua copiosiore liquatum inungitur, aut lixiuium superfunditur, garo, aut muria fouetur, aut bulbi liliorum, aut hyacinthi, aut narcissi cum rosaceo triti, & in sordium spissitudinem coacti delinuntur. Marcellus autem hoc compositum tradit. Panniculi melle imbuti & hordei farina inuoluti, combusti; cineris mittuntur drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, butyri drachmæ octo, ceræ, seui caprilli, rosacei, singulorum drachmæ sedecim. At pustulis iam excitatis, rhus cum polenta tritum aceto applicatur, aut calcem viuam cerato mixtam, illitamq; linteolo imponitur, iam quod spherion dicitur medicamentum, ambustis vtile est, partes exulceratæ porris contritis obducuntur, aut portulaca contrita cum polentis, aut columbæ fimi linteolo inuoluti cōbusti; , & oleo diluti cinere vtitor. Mirificè proficit pini aut piceæ cortex, aut adianthum aridum, læuigatumq; : aut myrti folia combusta, pertritaq; inspargantur. efficax autem vnumquodq; horum est, & si cum cerato componitur, item quod rubræ anchusæ radicis siccæ, & in lauorem contusæ trientem recipit, ceræ albæ dodrantē, rosacei vncias duodeuiginti, iam quod cerusa constat cum modica cerui medulla, laudatum est remedium.

*Ad eos qui flagris cæsi sunt.*

CAP. XII.

**C**erusæ argenti spumæ æqualis portio, ceræ quadrupla cum susino, aut rosaceo, emplastri modo inducitur, primo die priuatim susino solo vtitor, vel croci drachma, tragacanthi tantundem, ouum integrum, sine putamine, unita cæsis imponuntur, item pellis ouis recens excoriata calens adhuc circumdata, quolibet efficacius die vno, & nocte persanat.

*Quo modo pili adustis renascantur.*

CAP. XIII.

**P**ili ambustis nascuntur, si fici folia in fictili tosta, cum cerato in emplastri modum imponas, aut caricæ drachmis octo, sampfuci drachma, tritis cum oleo donec cerati fiat spissitudo, vtitor, vel detrimenti lapidis drachmas centum, æris squamæ drachmas decem cum aqua subactas in pastillos cogito, in vsu partem vnam cerati partibus octo diluito.

*Ad abrasa, quæ aposyrmata Græci dicunt.*

CAP. XIII.

Abra



**A**brasa & superficiem infestantia vlcera, primum aut vino, aut aceto, aut muria aceto mixta quæ oxalmæ dicitur, astringes. Deinde medicamentis, ad cicatricem ducendam vtère, tum liparis, tum ex albis emplastris trypheris. Summè autem facit quod cerusæ partem vnā recipit, ammoniaci dimidiā, myrtei quod satis est. Ammoniaco ex aqua in læuorē trito cerusa miscetur, myrteumq; superfunditur: vtitor lipara. Vel lapidis detrimento, squamā aris admisceto, & myrteo in læuorem coactis vtitor, aut cimolia, & argenti spuma, ex vino, recininoq; & myrteo tritis vtitor.

*Ad abraſa, intertrigines, inueterata vlcera, ſenilem tene-  
ramq; cutem.*

**ARGENTI** spumæ chryſitidis drachmæ quinquaginta, ceræ drachmæ viginti, reſinæ ſiccæ ex picea drachmæ duodecim, olei ſeſquicyathus. Argenti spumæ oleo incoctæ reliqua adiciuntur: rudicula agitatis, vel etiam in pila emollitis vtitor, ſed cutem abraſam ab vlceribus non oportet amputare, ſed medicamentum ei inducere: ſic enim glutinabitur, vel nigreſcens. At vlceri, quod eroditur, ſordidumque eſt, ſi carne nudum hiat, vix cicatrix obducitur. Cæterum abraſa tuetur ab inflammatione, rhu rubrum, ſi illinatur læuigatum, cum melle, aut lentifci coma cremata, & cum melle impoſita.

*Ad abraſa, ſlagris caſa, & articulorum contuſiones medicamen-  
tum, quod dolorem leuet anodynū appellatum.*

**ARGENTI** spumæ, cerusæ, ſingulorum vnciæ decem, ceræ vnciæ ſex, olei puri, aut roſacei ſeſquilibra, amyli vnciæ duæ. Ad eadem valet Pelarion quoque ex helcyſmate, id eſt, recremento argenti paratur, item medicamentum quod ovis conſlet.

*De formica & verruca.*

CAP. XV.

**V**Trunque vitium, cutis excreſcentia eſt exigua, calloſa, & plerunque figura teres: ſed formica, quæ Græcè myrmecion dicitur, latiore baſi, † ſimilem ſi quis non trectet mordentis formicæ ſenſum inducit. Verruca autem, quæ Græcis vocatur acrochordon, anguſtiore, vt chordæ ſummo aſſimilata, pendere videatur. Hos igitur tumores, elaterium cum ſale inſtratum tollit, thuris lachryma cum aceto, groſſi cum aceto, farina, & nitro, liquor ſici illitus ſimiliter facit: tithymalli, ſmaridis caput ſalſum concrematum,  
arug



ærugō cum sulfure ignem non experto combusta, ocymi folia cum atramento futorio, sarmentorum adhuc viridium vstorum quod distillat, fimus ouillus cum aceto, hircinum fel illitum, heliotropij magni semen, cum vino applicatum, ruta cum nitro & pipere, nitrum cum vrina pueri venerem non experti, stercus bouis gregarij in aceto.

† Huius loci duplex est scriptura, una in vulgatis codicibus, ἡγεὶ πρὸς τὰς ἀποφύγας ὁμοίαν αἰσθάνειν, id est, si quis deradat sensum mordentis formice similem inducit: altera est, πρὸς τὰς ἀποφύγας, id est, si quis constringat.

De Ganglio.

CAP. XVI.

**G**anglium neruorum concretio est, ex ictu, aut lassitudine oboriens, in pluribus quidem corporis partibus, præcipuè verò motui dicatis, nempe manu summa, & pedibus. Quo in vitio Archigenes calcem viuam vnà cum adipe anserino, & terebinthina, imponendam censet. Doles vero medicamento, quod lapidem achatem recipit, utitur. At Oribasius, eo quod subsequitur, cerusæ, resinæ, è pinu, olei veteris, singulorum vncia, ammoniaci suffiminis, galbani, singulorum tantundem, ceræ vnciæ quatuor, aut pilam plumbeam (inquit) crassio rem vertebræ modo, ganglio ampliorem imponito, deligatoq; pondere siquidem longiori temporis spatium ipsum dissoluit, atque hoc nos utimur.

De inflammatione.

CAP. XVII.

**O**mnes ex æquo tumores calidos, quibus dolor, feruorque adest, nostri inflammationes, Græci phlegmonas appellare consueuerunt. Verum pro diuersa quæ ipsos facit, materia, hi quoque euariant. Cum enim sanguis probus, & crassitie mediocris, in particulam aliquam subito confluerit, ac propter copiam impactus inhæserit, inflammatio propriè appellata nascitur. Cum vero flaua bilis in parte aliqua substiterit, herpetem: vbi & sanguis, & bilis flaua simul incubuerint, erysipelas excitatur. At cum sanguis, qui influit, calidus impensè, & crassus fuerit, carbunculos mouere solet. Itaque ab inflammatione quæ peculiariter phlegmone dicitur, & multis semper accidit, incipiendum esse iudico. Tumor rubens, dolorificus, tangenti renitens, & calidus ex sanguine, vt à medicum est, probò originem trahit: qui, sanguinem dico, nunc ex toto fertur corpore, nunc in aliquam particulam copiosus incumbit,



cumbit, sic ut à vasis nequeat contineri, exciditque aliquid roris modo in ampla partium quæ intercedunt, spatia. Saepe verò vitium hoc vulneribus, fracturis, vlceribus, aliisque pluribus externis causis superuenit. Cum itaque inflammatio repente euestigio particulam quampiam sine manifesta causa præcedente obsederit, totum vero corpus, parti contagium transmittat, vniuersum quidem id, sanguinis dimissione, vacuari oportet. quod autem inflammationem experitur, superfundere ac obducere medicamentis, quæ non calefaciant, humectentque, sed illuuiem humoris repellere sint idonea. At quod iam in affectam partem se receperit, euacuatur. Itaque illinitur cataplasma quod constat semper uiuo, mali punici corticibus, vino incoctis, rhu & polenta. hoc & similibus cum dolor vehemens non vrget vtendum est. Vbi vero particula fluxionem cum dolore ampliore senserit, ne sic quidem calens aqua oleumve adhiberi debet, aut ex farinis cataplasmata, ut quæ fluxionum vitiis omnia sint inimica, doloris tamen vehementia leniri eo quod constat passo, rosaceo, ceraque modica, & lanis sordidis quæ æsypi multum contineant. Per æstatem quidem frigida, hyeme tepida excipiuntur, applicanturque, sed ita ut superiores quoque affectis partibus loci, spongia vino austero imbuta, aut posca frigida comprehendantur. cæterum miscentur cum cataplasmatibus vtiliter etiam herbae. Parietaria igitur ad omnem inflammationem accommodata est, tum per initia, tum in augmento, consimiliter glaucium, atriplex, malua, lactuca, cucurbita, calidis illite, benefaciunt & tribuli vtrique inflammationibus ex influxu concitatis. brasiica vero durefcentibus valet. At ubi immutatio his oboritur, nec pus subsidet, curationem tentabis emplastro, quod ex chalcitide conficitur, aut quodam persimili fluxionibus dicto, lanam verò puram vino austero imbutam extrinsecus medicamento superaccommodabis. Atque hac ratione inflammationibus ex humoris defluxu contractis medeberis. Eas autem quæ occasione cuidam feruntur acceptæ, si calefacias, humectesque, non offenderis, ac si vsus quandoque postulauerit, scarificare ipsas, conueniens erit. At si ob defluxionem ortas inflammationes scarificatione diuiseris, præsertim per initia, malum quoddam haud mediocre ægrotanti accerses.

D.



## De exterioribus corporis abscessibus.

CAP.

XVIII.

**Q**uod si fieri non posse tibi videatur, vt suppurationem impedias, panem hydrelæo incoctum delines, aut farinam hordeaceam cōsimili præparatam modo. particulam iure radice althææ incoctę fouebis. At si tumor ad suppurationem contumax est, aut ægrè discutitur, cataplasmate ex ficis siccatis vtere: oportet autem ficus dulces pinguesq; incoctas aqua eliquescere, ac ius ipsarum in tenuis mellis speciem cogi, farinamq; hordeaceam adiici, & si quidem tumor discutitur minus autem ac conuenit, cum ficis siccatis incoques hyssopum, oryganumve: si voles magis intēdere, salem decocto iniicies, diligenter animum aduertens, ne siccando nimium pars in scirrhum occalescat. Tale si quādo videris, cucumis syluestris radicem, aut althææ, aut bryoniæ aqua simul decoques. valentior autem & discutiendo promptior, dracunculi radix est, ipsumq; medicamentum, quod dracunculo constat, validè huiusmodi vitia disiccit. Nonnunquam igitur solum hunc decoques, nonnunquam & ficus siccatas admiscebis, farinamque simul cum adipe. Iam anethinum oleum crudos humores, incoctosque tumores, & concoquit, & discutit. Item pix duros ac crudos tumores vniuersos cataplasmatibus indita concoquit, magisque liquida. MEDICAMENTVM compositum, † quod abscessus iam coctos expellit, vt subinde pus in splenio reperiatur. nōdum verò coctos in totum discutit. Lapidis pyritis drachmæ duodecim, ammoniaci triti tantundem, lomenti drachmæ sex, exceptum pice, liquida, pellicque illitum imponitur. Splenium verò non prius aufertur quàm sua sponte deciderit. sed medicamentum non multo antè præparari debet, vt quod confestim siccescat. In his autem si tumor non dissipatus fuerit, & pus sub eo delitescat, parte scalpello diuisa, id ipsum vacuabitur; cura deinceps adhibita ne oleum, aut aqua admoueatur, verum si vulnus abluere interim oporteat, aqua mulsa, posca, vino & mulso vtendum est. Si verò inflammatione conflictetur, ex lenticula cataplasma inducitur. vbi inflammatio abest, alio quodā emplastro medicamento in huiusmodi sectionibus vtemur. quinetiam eo quod constat chalcitide. Cæterum super ipsis iniicitur spongia lanæve vino austero imbuta, vulnere autem nullum pingue medicamentum ac-

t



commodatur, quale est tetrapharmacum. nam vehementer postulat siccescere.

† Hic locus est expressus in veteribus lib. τὰ μὲν ἴδη περιμένα τῶν ἀποστημάτων ἀπὸνως ἐξιδῶν δύνατον, id est, quod abscessus iam coctos nullo negotio expellit.

*Quæ abscessus rumpant.*

QUONIAM nonnulli abscessus ferramento diuidi non sustinent, tentanda sunt & medicamenta, quæ ab extrahendo dicta sunt epispastica: narcissi radix in pollinem detrita, ex mulsa cum irino cocta applicatur, vel tenera arundinis radix, minutim detrita cum melle. quod si dura fuerit, mulsa prius incoquetur: vel aristolochiam cum melle applicato, rumpit autem picis aridæ & propolis creticæ par modus, cicatricemque inducit.

*Dionysia ad abscessus mirabilis, item ad mammas & inguina, epispastice, quæ per latentes meatus discutit.*

OLEI veteris, aquæ singulorum libra, hydrelæum incoquitur paulatim mox, aphronitri vnciæ sex adiciuntur, mysos vncia vna vel duæ, incoquantur donec manus non inquinent. Deinde miscentur mannæ thuris, ceræ, terebinthinæ, singulorum vnciæ sex.

*Ad neruicos abscessus.*

CERÆ, colophonix, butyri singulorum libra, picis aridæ, mellis, singulorum libræ duæ, vnciæ sex, æruginis vnciæ tres, visci quod satis est. ALIVD epispasticum. Suffiminis ammoniaci selibra, ceræ, terebinthinæ, singulorum triens, sulphuris viui quadrans: nitri quadrans. Smilion autem medicamen appellatum, & quod porris constat, validè tumores iam mutatos rumpit. Quod lini seminis succum recipit, per commodè discutit, mutat, rumpitque. At mitioribus abscessibus medicamenta congruent etiam ad parotidas inscripta. Atque hæc de abscessu, qui ab inflammatione emanat. Galenus autem memoriæ tradidit abscessum nulla præcedente inflammatione constitui, quæ ex probo sanguine habet originem. Statim siquidē ab initio (inquit) humor aliquis aliàs specie alius, in parte quadam collectus, vicina illi corpora excoriat tempore, & à subiectis dirimit. Sanè inueniuntur in huiusmodi abscessibus cum scalpello sunt diuisi, omnigenæ, tum humorum, tum solidorum quorundam corporum spec



species. Etenim stercore, vrine, grumo, humori mel referenti, mucosoque: ad hæc ossibus, vnguibus & pilis, consimilia corpora reperiuntur, imò & animalcula subinde inuenta omnibus propè quæ ex putredine subnascuntur simillima, Præterea in abscessibus potissimum inueteratis, qui humorum ex loco in locum decubitu prouenerint, colligi tradit, quæ lapides, arenas, testas, ligna, carbones, lutum, sordes, amurcam & fæcem repræsentent. Quare absolutior exteriorum maximè corporis abscessuum significatio compèdiosè tradenda est, tum eorum qui medicamentis discuti non possunt. Abscessus itaq; est carniū seu partium carnosarum, nempe musculorum, venarum, arteriarum corruptio, mutatioque. In genere abscessuum nonnulli tunica comprehenduntur, vt atheromata, steatomata, melicerides. Alij sine tunica constituuntur, quæ generis vocabulum vsurpant, vnde sermo hic noster procedit. Porro abscessuum generationem plurima parte inflammatio præcedit, de qua disceptatū est. Interim protinus ab initio, quemadmodū nuper dicebamus enascuntur. Comites abscessuum sunt, igneus loci feruor, tumor eminens, ruberq; magis ac antea, durusq; cum dolore punctorio, pulsu & grauitate, vt aliquid ex particula suspensum esse videatur. Quòd si verò locus insignis extiterit, febris accedit & rigor inordinatus. noctu potissimum dolor fatigat, & febricula. Est cum inguinis inflammatio, proximis in glandulis exciteretur. Vbi verò abscessus in totū fuerit absolutus, magna parte decrescit, punctus obueniunt pruriginosi, & leuiter stupidi, tumor in mucronem acutū magis fastigiatur, tactu lenis, cedensq;, superficies in vertice auellitur. Dico aurem hæc de his qui foras rumpuntur. Si igitur vel medicamētis, vel sua sponte rupti fuerint ammoto medicamine, curationem tentabis, parte iam purè vacuata: si aliter accidat, aperire ipsum in eum modum oportet, quem in chirurgica explicabimus.

## De Gangrena, &amp; Sphacello.

## CAP. XIX.

**C**UM inflammatio, neq; discutitur, neq; in pus mutatur, sæpè in gangrænam, & siderationem, quæ Græcis dicitur sphacellos, incidit, de quibus iam sermonē instituimus. Gangrænas, enim appellant, cum membrū aliquod ob inflammationis, qua conflictatur, magnitudinem emoritur: neque iam confirmatas sic dicunt, sed quæ etiamnū fiunt. Eius mali



vis est, vt nisi celerrimè succurras, facilè affecta pars, quatenus vicina cōprehendit, mortis habitum repræsentet, & hominem iugulet. Vbi verò membra sic vitiata in totum sensu fuerint destituta, affectum non amplius gangrænā, sed iam sphacelum nuncupant. Quin & ossibus hoc mali accidit, cum caro ipsis circumdata, praua scatens sanie, ipsa hac imbuerit, ac putredine consumpserit. Cum itaq; membrum ex toto, vita, sensu motuq; priuatū est, confestim præcidi oportet quàm proximè sanæ parti. Gangrænam verò curamus, sanguine ex parte vitiata affatim emissio, vel enim vena incisa sanguis corruptus, cum vena amplior in ipso membro appareat, detrahendus, vel cute totius corporis diuisa, multis altisq; plagis. vbi verò sanguinem emanare permiserimus, medicamentum aliquod putridis consecratum induci debet, quale est, farina erui, aut lolij, aut lomentum, ex oxymelite. Quòd si valentius imponere cogites, salem aditico, aut pastillum Andronis, aut eius generis aliquem. Faciunt ad gangrænas, & vetustæ nuces: cortex autem ipsas expurgat; item liquor tithymalli tempestiuè & mediocriter adhibitus. Opitulatur ipsis & lupinorum amarorum decocti ius superfusum. Nonnulli verò vbi putridam partem præciderint, quò securius mali radicem euellant, candens ferramentum adigunt, in quibus sale cum porro vtendum est. Vt autem crustæ citius decident, cataplasma deinde accommodatur ex pane, vel hordeacea farina, vel triticea ex hydrelæo incocta. Item medicamenti cephalici puluis ex melle, tetrapharmacum, & Macedonicum vt appellant, vtiliter imponitur. Iam panis cum apio tritus, aut ocymo, sic iris vel panax, vel aristolochia, vel acorum cum melle, vel thus, crustas probè separat. Idem præstat Macherionis medicamentum, & Isis linamento illita ex melle. In teneris autem corporibus abundè est etiam erui farina ex melle.

*Ex Oribasij commentarijs ad Gangrænas.*

AERVGINIS rasæ, minij, aluminis scissilis, singulorum par modus, aqua detritus gangrænis illinitur, scalpello vndiq; exasperatis. Item lolij farina cum raphano & sale, nonnunquam etiam aceto. vna passa acinis vacuata, cum cortice ex sale & oxymelite. Ad hæc nucum iuglandium medulla, myrti folia vino incocta, tritaq; ex melle: raphanus cum aceto, crustas etiam ad ossa vsq; rumpit.

De



## De Herpete.

## CAP. XX.

**C**um bilis flaua nullo mista humori excreta in particu-  
 lam quampiam decumbit, malum herpes nuncupatur.  
 Si quidem substantia crassior sit, acriorq; tota cutem adusq;  
 carnem subiectam exulcerat, vocaturq; herpes exedens. Si  
 verò tenuior & minus acris calidaq; pustulas exiguas, per  
 summam cutem milio similes excitat, ob quam similitudi-  
 nē, herpes miliaris dicitur. At Oribasio authore, pituita cū  
 flaua bile mista, miliarē herpetem creat. Corpore igitur to-  
 to medicamine quod ducēdē bili est, euacuato, loco affecto  
 refrigerantia siccantiaq; inducuntur. principio capreoli vi-  
 tis, rubi, & plātaginis applicātur. postea verò lēticula his mi-  
 scetur, interim & mel & polenta. Item cataplasma, quod ad  
 inflāmationes ex confluxu inscriptū est exēpto semper viuo.  
 Verum exulcerata pastillis inungūtur, passo, aut vino tenui  
 & austero nō veteri, aut posca aquosa solutis. inducitur &  
 glauciū, eiq; consimilia ex aqua. Cum autem nihil proficit  
 acetum admiscetur. †succo autē plantaginis, aut solani, aut  
 vino diluta magnificē auxiliantur: aut lini semen torridum  
 oleo vinoq; incoctū, inq; laeuorem redactū imponitur: aut  
 terra cimolia, solani subacta succo perungitur, & argenti  
 spumæ vnciæ quatuor, porri succi cyathi dimidiū, betę suc-  
 ci tantundē, laeuigata illinūtur: at inueteratis iā huiusmodi  
 vlceribus, Musæ pastillus & Andronius efficax est. **A L I V D**  
 ad herpetem pustulosum. Recrementum plumbi ex vino au-  
 stero laeuigatum illinitur, superiniiciuntur betę folia vino  
 incocta, vel ceræ triens, myrtei vnciæ sex, stercoris plumbi  
 triens, vino diluta illinūtur: at vbi id quod serpit repressum  
 fuerit, cerato ex recremento vtitor, aut lente cocta cū mel-  
 le partem obducito. Ad herpetem verò qui sub cute affli-  
 git, retrimentum plumbi, rutæ laeuigatę succo excipitur, aut  
 ceratū myrteum in vicē rutæ. **A L I V D**. Lanæ veteris illotæ,  
 circa tedam combustæ drachmæ duodecim & semissis, ceræ  
 drachmæ vigintiquinq; recrementi plūbi vncia vna. S. seui  
 caprilli curati lotiq; ex aqua drachmæ vigintiquinq;, myr-  
 tei vnciæ quinq;. **A L I V D** ad herpetas acutē depascentes, co-  
 rij mali punici dulcis drachmæ sex, argenti spumæ tantun-  
 dem, lanæ illotæ circa tedam combustæ drachmæ tres, ce-  
 rę drachmæ duodecim, cerusę drachmę octo, thuris, alumi-  
 nis scissi, singulorū drachma, vino aut myrteo excipiuntur.



† Hic locus sic legitur in veterib. καὶ χυλῶν ἢ ἀρογλώσας ἢ σπύχων  
 αἰνίς, καὶ ἐψήσας δίνω μεγάλως ὀνήσεις, id est, ex succo plantaginis aut so-  
 lani, & ubi ex vino coxeris multum inuabis.

## De Erysipellate.

## CAP. XXI.

**G**alenus tumorem ex feruente & tenui sanguine conflatum priuatim quidem & propriè erysipelas, appellauit: cum verò ex ambobus, sanguine & bile constat, vtique ab eo quod in mistura superat nomen vitio indidit. Etenim ubi sanguis excellebat, inflammationem erysipelaceam, ubi bilis flaua præpollet, erysipelas inflammatorium dixit. Verùm communius tumorem ex sanguine & bile calidioribus factis conflatum, Erysipelas appellauit. Vtro autem modo dicas, nihil adeò ad præsidiorum vsum interest. id verò scire oportet erysipelata quæ capiti potissimum oboriuntur, plus faceßere negotij, adeoque esse periculosa, vt nisi efficax consequantur auxilium, interim quoque affectos strangulent. Quod simul ac fuerit deprehensum, protinus ab initio vena in cubito præsertim humeraria debet incidi. sin autem hæc non appareat, eam quæ se conspectui obii- cit. At si quid sanguinis dimissionem impediat, purgatione vtendum ex medicamento quod bili ducendæ est. Hac sanè & in aliarum partium erysipelatis vti, vel clysteriis efficacioribus oportet, tum ipsis illinere quæ influentem materiam refrigerantium virtute repellunt, collectam verò, calefacientium mediocriter & humectantium discutiant priusquam particula liueat, aut nigrescat, adhibita semper cura vt perliquida inungantur, ita vt frequentius immutentur, primis per spongas molles ablotis, siquidem multus particulæ feruor celeriter in vaporem erumpens, hæc deficcet. Cæterum requirunt erysipelata per initia, vt dixi, quæ refrigerent cum humiditate, non astringant: quale est semperuium, portulaca, psyllion, lenticula palustris, feris, cucurbita, solanum, altercum, lactuca, glaucium, item apiū, & rhamni folia per se vel cum pane inducta, item ceratum ex aqua admodum frigida. His miscetur etiam opij aliquid, lachrymæ papaueris, cicutæ & mandragoræ. Iam cōposita medicamenta inducuntur, fiētque ceratum, cera dealbata rosacei quadruplo admixto ex oleo omphacino sine sale confecto: his in pila emollitis, aquæ frigidæ superfunditur,



ditur, quantum potest recipi. Si verò aceti tenuis & pel-  
lucidi momentum temperes, præstantius medicamentum  
habiturus es. Item polenta cum herba quadam frigidio-  
re ex iis quas enumerauimus affatim membrum refrige-  
rat. Idem efficiunt palmulæ pingues cum horum aliquo  
mixtæ. Ad hæc pars etiam delinetur cerusa, vel terra ci-  
molia, aut figulari cum solano, aut argenti spuma cum  
rosaceo, aut chalcitide cum oleo passoque, aut cerusa cum  
aceto & lycio, vel acacia cum aceto. Cum feruor remit-  
tit vtendum simplicibus quidem, sulfure viuo & menta  
cum oxyrhodino, aut ruta cum absinthio, aceto & oleo,  
aut argenti spuma cum porri & betæ succo, compositis au-  
tem, priuatim in capite hoc pastillo. Argenti spuma, ceru-  
sa, croco, sulfure ignem non experto, opioque cum passo.  
Communiter autem omnibus, minio sinopico, chalcitide,  
misysto, erugine rasa, atramento sutorio, alumine scis-  
sili pari pondere ex aceto vtitor. A L I V D. Sulfuris viui, ce-  
rusæ, opij, acaciæ paribus singulorum portionibus ex ace-  
to. Cataplasma ad erysipelata, herpetas, abscessus, paroti-  
das & ambusta. Althææ nouellæ foliorum tenerorum libra:  
cocta in hydrelæo perbellè teruntur, adiectoq; rosacei triē-  
te, argenti spumæ, cerusæ singulorum vnciis duabus &  
semisse, iterum læuigantur cum succo coriandri, aut sem-  
peruiui, aut solani: deinde micis panis adiunctis vt empla-  
stri formam induat, illinitur. Hoc autem emplastro vti-  
tor quod recipit recinini pondo, myrtei pondo, vnguen-  
ti quincuncem, argenti spumæ trientem, æruginis rasæ  
sextantem. Aerugo & argenti spuma aceto læuigantur.  
Ceratum ad erysipelata & ambusta. Ceræ albæ triens,  
rosacei quadrans, oua sex, perdicij herbæ triens. Vbi ve-  
ro inflammatio membri conquieuerit, aut vetustatem ex-  
periatur, cataplasma illi, priusquam liueat, ex cruda farina  
ordei est imponendum. Quod si liuor iam occuparit, cu-  
te scarificatu incisa, cataplasma induci, locusque perfundē  
ex aqua calida dulci debet, sed & marina & muria interim  
conducet, quin etiam ipsi cataplasmati talis aqua, vel ace-  
tum, vel muria cum aceto misceatur. Deinde commemo-  
raris medicamentis compositis cura adhibita vti licet. Nam  
si inflammatio remaneat, aut in pus, aut in putredinem con-  
uertitur:



De phymate, bubone &amp; phygethlo.

CAP. XXXI.

**A**utore Galeno, bubo, phyma, & phygethlon, glandularum affectus sunt: bubo quidem inflammatio, & phyma autem glandulae inflammatio ad suppurationem spectans. Aliorum vero quorundam sententia communiter omnes, qui à natura abhorrent, ceu abscessorij tumores quamcunque corporis partem obsideant, phymata appellantur. Si quidem Hippocrates in hunc modum scribit. Quibus phymata vrinarium meatum exercent, hi abscessu in vomicam erumpente liberantur. At bubones qui prolapsu, aut aliis vlceribus, aut doloribus contrahuntur, periculo vacant: febribus autem superuenientes, qui plurima parte ex pestilentiali lue solent incidere, deterrimi sunt siue femora, siue alas, aut ceruicem inuaserint, Verum priores initio, quemadmodum inflammatio, qualibet, auxiliis repelluntur, quae refrigerant astringuntque, vel spongiis ex posca impositis, vel lanis oleo crudo vinoque imbutis, vel rosaceo, vel melino, vel lentiscino, vel myrtheo, deinde iis quae digerunt vtendum. At si corpus vniuersum succis aequabiliter redundet, prius ipsum vacuari conuenit. vbi iam inanitum est, vlceris in quo id prouenerit, cura haberi debet, sicuti in capite de vlceribus explicabitur. Glandula si inflammatione tetetur, lanis oleo quodam laxante, irriguis, recte lenitur, totumque ipsis membrum inuoluitur. Cum tumor ad suppurationem spectauerit, non prompte diuidere, sed medicamentis quae cerati speciem referunt, discutere nitimur, cuiusmodi potissimum est ex perano confectum. Item quod ab herbis dicitur botanicon, si per haec non discutitur rumpere adgrediemur, aliorum abscessuum modo, similiterque illis mederi. In iis autem qui ob febres aut omnino humorum abundantiam procreantur, cauere debent repellentia, ne materies penitus detrusa cursum reperat, sed ab iis quae discutiunt, statim curationem incipere consilium est. Si autem nihil prohibet, nempe aut aetas aut virtus, sanguis prius est cubito dimittetur. deinde loco fomenta inducentur ex decocto chamæmeli aut anethi, aut eius generis alicuius. Reliqua medicamentorum sylua, maxime ex iis quae tertio volumine ad parotidas dicta sunt, transferenda est. Item ex illis quae nuper contra inflammationes prodidimus, quemadmodum etiam phygethli curatio, tum hinc tum ex remediis erysipelati accommodatis petetur. Aster atticus herba quam  
& bu



& bubonion, quasi dicas inguinariam, ea ipsa de causa vocant, non solum illitus, sed etiam contactus, bubonibus auxiliari creditur. Phymata autē priuatim discutit adianthum si illinatur, atriplex, parietaria, althææ radix vino incocta, ammoniacū cū melle emollitū inductumq; , viscus cum resina, ceratoq; . Rumpit autē abscessum propolis, lupini amari ex aceto illiti, cucumis syluestris radix, terebinthina excepta, capparis radix similiter, nitrū cum fermento aut ficis.

† In antiq. codicibus quedam leguntur quæ in vulgatis exemplaribus desunt. Phygethlon enim ita describitur, φύγεθλον δὲ τὸ φλεγμονώδες ἰσχυρίπιδας, ἢ ἰσχυρίπιδας φλεγμονὴ τοῦ ἀδένος. id est Phygethlon autem est erysipelas phlegmonodes, vel erysipelatodes phlegmone glandule.

De furunculo, qui dothien appellatur.

CAP. XXIII.

**F**urunculus, tumor est abscessum præ se ferens, qui ex crassius humoribus in carnosius plerunq; partibus concipitur, mitis quidem, cum in sola cute coit: peruicax autem, malignusq; vbi subter actis radicibus in superficiem erumpit. Dissipat autem furunculum, triticum mansum & impositum: mastichæ ægyptia, vix passæ quibus acini sint exempti cum sale tritæ, ac admotæ hunc aut difficiunt aut rumpunt, vel siccæ fici hydromelite incoctæ imponuntur, vel resina ficis mista inducitur, vel ipsæ ficus siccatæ cum fuerint pingues dissectæ, vel fermentum cum nitro, vel lini semen cum melle, vel alterci folia, trita cum butyro. Composita vero hæc proficiunt, quod ex fermento, quod polline farinaceo cōstat, & quod priuatim à furunculo græcè dicitur dothienicon, fomenta autem adhibentur ex spongiis mollibus continuè calenti aquæ intinctis, deinde sic medicamenta iniiciuntur.

De terebintho.

CAP. XXIII.

**O**ribasius terebinthum sanè phymatis speciem esse affirmat, in cuius extrema parte pustula nigra incumbit: hac rupta id quod subiacet abrafo simile apparet. vbi scalpello diuiseris, pus inuenitur. Dioscorides autem Alexandræus literis mandauit terebinthos cutis esse excrescentias, rotundas, nigrouirides, terebinthi fructum referentes, atq; has aliis phymatum tumoribus similiter curari censeret: auxilia ex suprâ comprehensis huc transferenda.

De carbunculo.

CAP. XXV.

c 5



**C**um sanguis magis melancholicus effectus inferuescē-  
 que aliqua se parte receperit, carbunculus fieri solet,  
 quod vlcus est crustaceum plerunq; à pustula ambustis con-  
 simili, interim verò & sine hac incipiens. Cæterum inter ini-  
 tia, quibus hoc malum instat, in particula omnino pruritus  
 sentiunt, deinde pustula, nunc vna, nunc plures tenues exo-  
 riuntur, miliorum quorundam instar: quibus perruptis, si-  
 militer crustaceum vlcus prouenit, quale ferramenta cāden-  
 tia excitant, modò crusta ipsa cinereum colorem, modò ni-  
 grum præferente, sic vt inferiori carni continua adhære-  
 scat, & quodam modo affixa sit depascaturq;. Reliqua au-  
 tem caro circumposita, feruidam refert inflammationem,  
 quam Græci phlogosim appellant, & colore nigrescit, splen-  
 detq; bituminis & picis modo. talis autē est bilis exacte atra.  
 Verum carbunculi, qui carnem inuaserint, cōfestim circum-  
 scibuntur: qui membranas, neruosq; occupant, diutius re-  
 manent, luenq; subiectis corporibus impartiunt, vt etiam  
 inflammationes quæ erysipelatis naturam respiciant, in ipsis  
 excitentur. plerisq; itidem in suppurationem conuersi sunt.  
 multis febres simul accedunt. Iam verò carbunculi ex cau-  
 sis populatim grassantibus excitantur. Curatio ipsorum, nisi  
 admodum fuerint exigui, à vacuatione sanguinis è vena ad  
 animæ defectionem vsq; dimissi, tentanda est: mox scarifi-  
 catus recte accommodatur, plagis ob succi crassitiem altio-  
 ribus: particulæ laboranti inducuntur, quæ modicè reprimunt  
 dissipantq;. tale est cataplasma, quod ex plantagine &  
 cocta lente constat, quod recipit panis furnacei micam. Est  
 autem panis, nec omnino à furfure purus, nec nimium eius  
 habens, super ipsum verò vlcus valens aliquod medicamen-  
 tum imponitur, cuiusmodi est Andronis, Pasionis, & Poly-  
 dæ, diluūq; id vino aliquo dulci, ad sordium spissitudinē de-  
 bebuit. Item massalioticum aridum, vel & ipsum similiter di-  
 lutum. Item radix dracunculi, vel aristolochiæ, vel liquor sil-  
 phij, vel cirenaici, singula ex aceto probè delinentur. At quæ  
 erysipelatis naturam referunt, supra comprehensis ad id  
 vitij remediis perungentur. Quæ verò partes consortij le-  
 ge affici putantur, succidis lanis ex œnelæo madefaciendæ  
 sunt. Vbi iam ardor acquieuerit, carbunculis iniiciuntur ce-  
 rata cephalica, diluta, illitaque in linteolis. generosissimum  
 est quod herbis, tum illud quod nitro cōstat, item arida vl-  
 cerei



ceribus depascentibus dicata, per se, & cum rosaceo. Cum autem durities remanet, vtemur melino Serapionis, operam adhibentes, vt quàm celerrimè carbūculi suppurent. Quod quidem fiet, si die bis noctu semel tum cataplasmata tum medicamenta mutes. At quò radicitus carbunculos diuellas, dirimāsq; ab adiacentium commercio, malum punicum acidum, minutatim concisum in aceto coques: vbi intabuerit, in læuorem deteres, linteóq; illitum induces: cum siccescit, aceto humectabis. Item nucis auellanae veteris vel etiam non veteris medulla carbunculos maturat rumpitq;. Hoc præstant & cupressi folia, tum germina, nouelli & molles galbuli cum polenta, vua acinis vacua, ficus siccata vino incocta, papaueris ceratidis flores, liquor silphij, cum ruta & mellis mometo, pix liquida cum vuis passis, & suillo adipe.

*Ad carbunculos vehementer efficax.*

ARGENTI spumæ libra, olei veteris libra & semissis, auripigmenti vncia. Oleo cum argenti spuma dum manus nō inquinat incocto, sublatoq; ab igne, auripigmentum adiicitur, rursusq; medicamentum coquitur donec nigrescat, tritis in pila vtitor in linamenta filatim carpta illitis.

*Ad gangrenas, vlcera vetera, chironia, strumas, podagram: priuatim verò ad carbunculos, præsertim eos qui palpebras infestant.*

OPII, acaciæ, misyos tosti, squammæ æris, singulorum drachmæ duæ, atramenti sutorij drachma, alterci seminis drachma, tritis ex aqua vtitor, probè facit & tetrapharmacum quod quintam thuris partem contineat. Aduersus naturalium carbunculos, chalcitidis, atramenti sutorij, singulorum drachmis octo, aphronitri drachmis duabus, ex aqua tritis vtitor. Valet stercus quoq; ouillum, torridum cum melle. In Alexandria Serapiade quæ orchis & triorchis dicitur viridi, cum micis panis, cataplasmatibus modo vtuntur ad carbunculos, omniaq; crustosa. Vbi verò crusta exciderit, communis vlceris modo curabis.

*De cancro.*

CAP. XXVI.

Cancer in qualibet corporis parte oriri consuevit, siquidem in oculis, & vulua, quemadmodum in ipsorum capitibus expositum est, aliisq; pluribus particulis, sed præcipuè in foeminarum mammis accidit, quoniam natura fungosæ & inanes, crassissimam atræ bilis, vnde hoc vitium contrahitur,



hitur, materiã promptè possunt excipere. ex eo enim humore cū referbuit, cancri proueniūt. atq; si acrior illa fuerit, cū exulceratione. Quapropter colore magis quàm inflāmatione nigricant, sed ita vt tantā caliditatem non experiantur. Venæ autem quæ circa sunt intumescunt, intendunturque, cancri animantis pedum modo, vnde & appellationē hanc vitium est sortitum. Nonnulli verò inde sic nūcuparunt, quòd difficillimè ab his partibus quas obsederit, euellatur, quemadmodum cancer aquaticus animans. Hoc malum planè propter succi crassitiem non consanescit, vtpotè quod nec repelli, nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cedat, vel quod etiam mitiora negligat remedia, vehementioribus autem irritetur, exandescatq;. Prima sanè cancri initia prohibere, ne augecant, licet si melancholicus humor prius vacuetur, quàm in affecta particula radices subter egerit, impactusq; sit. vacuatio quidem primum tentanda est, sanguinis dimissione, si nihil prohibet, mox purgatione, per initia quidem ex simplicioribus petita, quale est epithymō, quatuor drachmis, & S. in sero lactis, aut mulsæ exhibitum. Deinde ex hiera, quæ nigrum veratrum recipit. Loco autem dolenti inductum subsequens remedium, sine dolore facit exulceratis: solani succus linteo molli duplici in eum tincto imponitur. Extrinsecus autem lana molliuscula, & ipsa succo imbuta circundatur, cura adhibita, ne hæc siccescant succo, continentius superfuso. Iam vti diutius poteris in cancris exulceratis medicamento quod pompholyge constat. Nec inepta sunt, quæ tertio volumine de vuluæ cancris prodidimus.

*Ad carcinode, malignaq;, tum ad sedis tuberosa vlcera, item ad naturalium vel testiculorum, vel mammarum inflammationes.*

IN plumbea pila pistillo plumbeo lemniam sphragidem ex posca, & mulsæ, vel lacte conterito, vt nigrescat: vel rosaceo, vel immaturo oleo, succove semperuiui, vel cotyledonis, vel lactucæ, vel psyllij, vel vux acerbæ tritam similiter inungito. Crebrior victus ægro dabitur, ptisanæ cremor, lactisq; serum, ex oleribus malua, atriplex, bletum, cucurbita, piscium saxatiles, omnis generis aues præterquā palustres.

*Archigenis ad carcinode, & maligna vlcera.*

CANCRO RVM fluuatilium crematorum, & cadmiæ par modus in pollinem coactus inspergitur, aut cancrorum cinis



cinis vnà cum cerato inducitur, item erysini semen detritum cum melle accommodatur.

*De molli & laxo tumore, qui œdema Græcis dicitur.*

CAP. XXXVII.

**C**Vm de tumoribus qui succis calidioribus contrahuntur, disputatum sit, iterum de contrariis agemus, ab eo quod Græcis œdema dicitur, exorfi. Quemadmodum enim ex biliosa fluxione, erysipelas, ita ex pituitosa, œdema laxus quidam atque indolens tumor excitatur. Equidem scimus aliter quoque œdemata prouenire, nempe in pedibus, in aqua subter cutem affectibus, habitu corporis contabescente, qui phthoë Græcè dicitur, & malo, qui cachexia. Atq; in illis quidem tumor hic affectus qui hominem premit accidens est, nullam seorsum, curationem propriam postulans. Satis enim est, si quidem curatione egebit ipsa tum crura perfricare oleo cum sale, aut etiam oxyrodino sal habente. At si ex pituitoso humore in particulam influente œdema constitit, abundè quandoq; est spongia posca imbuta, cum ligamento leuiter stringēte imposita, quæ ab inferiori parte incipiens, suprà finiat. Esto autem spongia, modò conductura sit, recens, si huius copia non est, eam, cuius erit facultas, detergebis, expurgabisq; nitro, magisq; aphronitro, & lixiuio. Quod si per hæc tumor non subsideat, paululum aluminis iniicies, commodum autem est tenerrimum ellychnion, posca madens impositum: bonum est, & glaucium. Quod si in vetustatē œdema inciderit, parti oleo prius inunctæ spongia ex lixiuio imponitur, eiusq; violentiore constrictione curatur. discutit autem, ac comprimit tumores laxos cedentesq; quælibet terra illita, magisq; Aegyptia, tum isatis domestica.

*De inflatione.*

CAP. XXVIII.

**I**Nflatio ex flatuoso spiritu nunc sub cute, nunc sub membranis, quæ ossibus circundantur, & musculis, collecto, nascitur. Porro is colligitur aliquando in ventre & intestinis, itemq; in medio horum spatio & membranæ, quæ peritonæos dicitur, vt in aquæ subter cutem genere, cui nomen est tympanias. Differt quoque hæc ab œdemate, quod pressa digitis, fossulam non repræsentet, & sonitum tympani modo ædat. Membrorum autem densitas, tum spiritus simul crassities efficit, vt idem spiritus non dissipetur. Vnde

curan



curandī ratio huc dirigenda est, vt membra rarefacias, crassioresq; spiritum extenuas, quod medicamenta tenuissima & potestate calida praestant: atque in ventre quidem & visceribus oleum tenuius quod rutam habet incoctam, aut aliquod ex calidis seminibus, qualia sunt, cumini, apiij. Interim vero & cucurbita iustae magnitudinis citra cutis incisionem umbilico bis, terve defixa, inflationē discussit. Musculis autem ex contusione, quemadmodum propulsu inflatis particulas calidis nimium, & acris excandescere contingit. Quare per initia medicamenta quae magis leniant adhibenda. Vbi facta est inclinatio, ea quae discutiant. Utendum igitur sapa, cum olei momento, ac ex lanis succidis calida excipiantur, vel etiam ceratum ex cespypo admiscetur, cura adhibita vt caliditas permaneat, frigus enim non conducit. Vbi iam aeger lenitus, sopitusq; est, acetum admiscetur, & nitrum, aut aphronitrum, deinde & lixiuium. Postremo emplastris utendum quae discutiendi vim habent, quod inflatio subsidat, quale est quod sequitur, Sordes balnearum subferuefactae percolantur primum, vt purae euadant, & rursus lebeti iniiciuntur, tritaq; calx restincta farinae modo etiam inspergitur, dum luti fiat spissitudo, ac utitor. Hoc efficacius est medicamentum ex sycomoro compositum.

De intortis & contusis.

CAP. XXXIX.

**A**rticulis intortis, contusisq; faciunt lanæ succidæ, aut spongia oxelæo imbuta impositaq;, item bulborum elixorum pars tenerior cum melle, viticisq; folia, sal, nitrum tostum, laeuigata cum cerato inducuntur. Iam superfusio aquae dulcis, aut marinae calentis vtiliter adhibetur. Vbi vero inflammatio, & dolores conquerint, intortæ partes etiam recte perfricantur.

De carne contusa, & sanguinis subter cutem coitu quod Græcè ecchymoma dicitur.

CAP. XXX.

**C**arne à graui quodam corpore, quod extrinsecus superinciderit contusa, venisq; exiguis indidem diuortium expertis. sanguis profunditur per subsultum, quod Græci *νατὰ διαπύδνω* appellant, vnde sub cute collectus, ecchymoma dictum efficit. Cute inquam, non diuisa, tanquam tumor tactu mollis & cedens, comitatur, liuidus, & magna ex parte indolens. Eò igitur animum tendimus vt sanguinem qui continetur dissipemus, idq; confestim priusquam nigruerit.



rit. Per initia sanè nonnihil ex astringentibus, iis quæ discutunt, admiscere oportet, eò quòd tunicæ venularum contusa densationem requirant: inde etiam solis discutientibus sine astrictione utemur, ac scarificatis initio ecchymomatis, ita subsequenter curationem accommodabimus. Ad inueterata autem ecchymomata, raphanus applicatus prodest. Quippe discutit ea ubi erodere inceperit, aut raphani succus, cum micis panis inductus. Cæterum ecchymomatis species sunt, suggillata, & liuores ex ictu, hyposphagmata dicuntur. Item sanguinis inter vngues concursus ex percussu proueniens, de quibus priuatim tertio volumine dictum est. Verùm de vnguium vitiis, in parte chirurgica differemus.

*De ruptis & anulsis.*

## CAP. XXXI.

**R**uptio cum ecchymomate prorsus accidit: curatur autem medicamentis mediocriter calefacientibus, quale est ex nigris populis acopon, aliaq; huic consimilia. At altioribus rupturis magis acria, magisq; incidentia accommodantur. Talibus sanè & cucurbitulæ vsus proficit. Ergo si euocatum celeriter per halitum ecchymoma totum est, facile dehiscens ipsa caro coalescet. Sin longiore spatio sordes copiosa succreuerit, ruptum deinceps coire non potest, sed tantum propè ipsius labra admoventur. quo fit vt leui momento ea facile separentur, & medius inter ipsa locus superuacuo humore repleatur, nihilq; aliud, quàm assidue novum quodammodo ecchymoma creetur, primo persimile, nisi quòd citius quàm illud dissipetur, vtpote ex tenui magis sanie nunc constans, cum per initia è sanguine ecchymoma esset. Conuulsum autem fibris quibusdam laceffit distrahitisque leniri tantum desiderat, quoad dolor sopiatur, quippe conglutinari nequeunt. Itaque Aristolochia rotunda ruptis conuulsiq;, si quid aliud, idonea est: similiter centaurei maioris radix eiusq; succus, rheum, costus, bdelliū cum oxymelite pota.

*De scirrhis.*

## CAP. XXXII.

**E**xactus quidem scirrhus, tumor est præter naturam sensus expers, & durus: non exactus autem vix sensibilis est. ac qui sensu vacat sanari non potest: qui agrè sentitur, vix sanescit, si quidem humor vnde huiusmodi vitium contrahitur glutinosus crassusq; est, qui particulis quæ scirrho obducuntur impactus solui contumaciter repugnat. Est cum  
statim



statim ab initio constituitur, augeturq; , plerunque vero à medicis qui erysipelata & inflammationes vehementer refrigerauerint, astringerintq; , originem fortitur. Quòd si quis ea quæ valenter discutiunt medicamenta, partibus scirrhus obductis admoueat, huic paucis primis diebus, manifestò scirrhus decreuisse videbitur. Cæterum quod de affectu restat, id reddit insanabile. siquidem toto quod in eo subtilissimum erat dissipato, quod reliquum est desiccatum, ceu lapidosa concretio relinquetur. Quapropter conuenit diffusorium aliquod medicamentum, & emolliens habere, quod non validè calefaciat atque desiccet. Huius autem generis sunt medullæ omnes, magisq; ceruina, & vitulina. Ex adipibus commendatur, leonina, pardalis, vrsina, deinde tauрина. Inter aues anserina, & gallinacea & phasianica, sicciorque caprilla, & hircina. Ad hæc ammoniacum suffimen, bdellium maximè scythicum, styrax qui humentior est & pinguis: ac Aegyptiaca mastiche. In aliis sanè particulis scirrhum expertis his seorsum vtendum est, tum iis quæ inde componuntur. verum in tendonibus & ligamentis, lapis igni candens, aceto acerrimo extinguitur, & siquidem haberi potest, pyrites: sine eius copia non est, molaris, in quo pars affecta commoueri debet, vt vaporem ascendētem recipiat, atque inde rursus medicamen quod emolliat imponitur, oleo tamen tenui non aqua quotidie ab initio per totum morbi curriculum pars affecta perfunditur: interim oleo in quo althææ radix ac syluestris cucumeris sit incotta. A balneo autem in totum ægri abstinebunt, vel certe frequēti, sed posteaquam scirrhus emollitus fuerit, ammoniacum pinguisimum aceto quàm acerrimo maceratū particulæ: sat multis diebus inungitur. Deinde rursus emollienti medicamine vtendum, quod receperit galbanum, & opopanax, eaq; pinguisima. eiusmodi vero sunt potissimum, ex petasone confectum, & quod ad Amythaonem refertur, & strumis dicata medicamenta.

## De strumis.

## CAP. XXXIII.

**S**trumæ glandulæ sunt scirrhus indurata, quæ in ceruice, Salis & inguinibus maximè nascuntur. Curatio earum, cum illa quam in scirrhis tradidimus cōmunis est. Priuatim vero lupinorū amarorū farina ex oxymelite cocta applicatur, ea quoq; phymatis proficit: vel bouillum sterus aceto incoct



incoctum inducito, id etiam tumores scirrosos omnes dissipat. probè autem discutit strumax calx viua melle, vel gymnasiurū sordibus excepta, vel oleo, vel adipe suillo: aut calcis nitriq; par modus, nasturtij, & fœnugræci quadruplum cum melle, malagmatis modo imposita duritias dissipant, in pus conuersas rumpit loliacea farina cum fimo columbæ & semine lini vino incocta, grossi syluestres, & satiui, aut nasturtium album detritum cum pice liquida malagmatis forma applicatur, aut cucumeris syluestris radicis siccæ, lauri foliorum siccorum concrematorum cinis cū terebinthina inducitur, aut pediculariæ herbæ, & nitri æquale pōdus, erucæ duplum cum resina iniicitur, aut stercus caprillum bouillūve aceto incoctum, aut erui farina in vrina pueri viderem non experti macerata exceptaq; pice, cera, & oleo liquefactis, aut anguem mortuum in ollam coniectum gypsoque oblitam in fornacem mittito, concremati cinerem æquali fœnugræci pondere misceto, melle excepto vtitor, item quod aspidibus constat medicamentum, mirificæ virtutis est, tum quod ex struthio cōficitur, tum quod cucumeri syluestri, tum quod cedrio liquore confit: strumas ad supurationem perducit, aut diffundit hoc, myrrhæ drachmæ decē, ammoniaci thymiamatis drachmæ septem, visci quercini drachmæ octo, galbani drachmæ quatuor, propolis drachma, in pila cōrunduntur. Ad strumas mammarum duritiāsque proficit subscriptum medicamentum, visci elaborati, resinæ siccæ, ceræ, singulorum pondo, galbani quadrans.

*Ad strumas exulceratas, & sine vlcere.*

CERÆ, resinæ pityinæ, adipis suilli infulsi, marrubij, eruginis rasæ, singulorum selibra.

*Medicamentum ad strumas, quod dicitur cheradicum.*

OLEI veteris pondo dua, ceræ pondo, colophonix triens, nitri, tantundem, alia duodecim membranis detractis in oleo per triduum macerantur. deinde cocta cum fricta fuerint, proiiciuntur, eliquatis oleo postquam ab igne amoueris, nitrum tenuissimum inspergitur: rumpit etiā abscessus. ALIVD. Cineris è ficu vnciæ duæ, aluminis scissi vncia, aphronitri tantundem, picis liquidæ vnciæ septem.

*Exedens cheradicum.*

ALUMINI scissilis, sandarachæ, singulorum drachmæ



quatuor, squamæ æris drachma, auripigmenti tantundem, arido strumas conspergito, at si cancri naturam induerint, rosaceo maceratis bis die vtor.

De steatmate, atheromate, & meliceride. CAP. XXXIII.

**C**um hæc quoque inter abscessus, quemadmodum in illis dicebamus, habeantur, singula propriam appellatione à similitudine rerum quæ in tumoribus continentur, sortita sunt. Alij siquidem ipso veluti pingue quiddam seu adeps subest, alij melli simile quippiam, alij quasi tenuis pulicula. Consilium igitur curationis est commune, ut quod tunica illa contineat, discutiatur, aut medicamentis totum exedatur, aut sectione auferatur. Quidam enim ex iis tumoribus triplici hac ratione curantur, ij nimirum qui liquidiores humorem continent, qualis est meliceris: aliqui duplici tantum ut atheroma, quod & sectione auferitur, & medicamentis exeditur, steatoma verò nec discuti, nec exedi potest, sed manu duntaxat curatur. Quomodo autem vnumquodque horum agnoscas, in parte chirurgica edocebere. At medicaminum, quæ dissipandi vim habent, materiam, ubi actum est de strumis, reperiēs. Priuatim verò meliceridas hoc dissipat, viuæ passæ acinis exemptis octo, squamæ drachmæ tres, parte fomentis prius lenita imponitur. **ALIUD.** Ladani, bdellij, galbani, ammoniaci thymiamatis, propolis, terebinthinæ, singulorum æqualis portio in pila contunditur: facit etiā strumis, parotidibus, furunculis, phymatis. At Archigenes contra meliceridas commendat aphronitrum & veratri partem duplam, cum cerato duriori impositam, exedentibus autem in cute circumdata, uti non licet. Hac igitur prius meliceridas, atheromata, vel etiam strumas medicamentis adurentibus detegere oportet, simplicius illorum est quod recipit calcem viuam, saponem & lixiuium. Variū autem magis, quodque reconditum seruari potest, capit calcis viuæ drachmas quatuor, fæculæ quæ est fex vini combusta, nitri liquidi tosti singulorum drachmas duas, miniæ drachma, lixiuium tertur: ubi mellis liquidioris crassitudo facta est, ter feruefacito, ut mediocrem spissitudinem habeat, pixide plumbea reposito, lixiuiam super distillans ne subito exarescat. valet quoque ad verrucas, myrmecias, pterygia, clauos, callos, cicatrices supercrescentes, fæcula bimestri non vetustiore cutem delinito: ubi arescere inceperit, sponsia elotam rursum perun



perungito: vbi nigruerit denuò ablues medicamentis crustam inducentibus: postquam autem crusta deciderit, exedentia adhibentur. Medicamentū exedens validè citra rofionem, squamæ aris drachmæ quatuor, sandarachæ drachmæ duæ, veratri nigri tantundem, cum rosaceo vtitor.

**ALIUD.** Squamæ, sandarachæ, vrticæ seminis torrefacti pari mensura cum rosaceo vtitor. **ALIUD.** Erynaceorum combustorum, sepix testæ, auripigmenti æquale pondus ex rosaceo: quæ ambiunt partes orbiculatim omnes prius delinito cerusa cum oleo. Item efficax est compositio ex calcis viuæ partibus duabus, chalcitis parte vna, auripigmenti parte vna.

*De fauis.*

CAP. XXXV.

**F**Auis qui Græcis cerion dicitur, tumor est qui in cute foramina habet, per quæ humor crassitudinē mellis referens excernitur: rectè igitur ipsi imponuntur vix passæ cū ruta, aut fici folia mollissima cum melle, aut nasturtiū cum lini semine ex melle, aut cucumis domestici radix cū melle, aut sulfur viuum cum cerato, vel terebinthina. Cæterū variam magis fauorum curationem moliere, si quæ tertio volumine de manantibus capitis vlcerebus dicta sunt, in hunc locum transferas.

*De simplici vlcere.*

CAP. XXXVI.

**Q**Voniam simplex vlcus continui solū est diuissio, si quis partes diductas fascia orbiculatim circumdata committat, vtique citra aliquam aliam molitionem coalescent. Cum verò alterum vlcere os in obliquum spectauerit, inde deligaturā tentare & in contrariū ducere oportet: cū vtraq; illius labra eò vergant, à duobus principiis incipiendum est, & ora sic adducenda. Nam cū nihil intra oras inciderit, nempe pilus aut arena, aut oleum, aut sordes, aut id genus aliud, omnino vlcus concrescet. quod si magnum sit, adeò vt diductæ partes in totum prædicta deligatura committi nequeant, futuris ipsæ prius adducentur, deinde sic deligatæ, glutinatoriis, vt vocant, præfidiis vtetur, quæ collectā humorum subluuiem desiccare & consumere queant: aliam, ne influat, prohibere.

*Quæ vlcera glutinare possint.*

CAP. XXXVII.

**Q**VERCUS folia applicata vlcerebus glutinandis sunt. Itē salicis, brassicæ, oleaginis fruticis quæ chamelæa di-



citur & fructus & folia & cortex, succusq; austerioris plantaginis, papyrus, posca aut vino imbuta & in orbem circumdata, Recentia vlcera glutinant pini & piceae folia, cortexq; recens ligamēti modo circumdatus cum aqua aut posca, aut vino caseus recens laeuigatus: extrinsecus imponuntur, folia rumicis aut vitis, aut betae, aut lactuca. At ex acido lacte caseus qui oxygalaētinus dicitur, vulnera quoq; ampliora committit: pira syluestria quae achrades dicuntur, fluxionem reprimunt. equisetū si applicetur, etiam si nerui fuerint praecisi, isatis satiuā in duris corporibus vlcera etiam si musculorum capita affligant, idem praestat, cupressi folia, germinaque & nouelli galbuli mollēsque etiam duris corporibus proficiunt, sed miscēdus est pollen farinae, qui à pariete propinquo molae assumitur, myrrha cū aqua illita, vel lachryma thuris, terraeq; lumbrici etiam neruorum praecisiones glutinant, pentaphylli folia cum melle, allia combusta applicata. Inueteratis vlceribus anagallis prodest cum cerato. hordeum combustum, & cerusa cum myrtei cerati triplicato pondere. Ad capitis vlcera valet, myrrham aridam inspergere non madefactam, quippe celeriter contrahit, vel aloē aridam, vel aristolochiam tritā & melli ex vino incoctam dum mediocris fuerit spissitudo, in linteam illinens applicato. Composita autem ad glutinandum sunt Barbara, Chryse, Nicolai. item dia iteon quod salicibus, diadictamni quod dictamno constat, atque alia his consimilia quae magnis potissimum vulneribus glutinandis sunt.

*Si dolor & inflammatio vlcera exerceat.*

C A P. XX XVIII.

**S**I dolor & inflāmatio vulnera obsideat, vsus est medicamentorum quae desiccant, atq; inflammationem arcent. Ex liquidis igitur laudatissimum est vinum, deinde posca. Si verò etiam cū sordibus inflammatio infestet, mulsa aquosa conuenit. Ex iis autem medicamentis quae siccandi potestate praedita sunt, communiter quidem conferent, inflāmationibus dicata, si oleosa acriaq; excipias: priuatim hoc proficit, malum punicum dulce vino incoctum tritūque applicatur, mirabile nimirum & multiplici vsu commendatum est remedium, facit enim tum ad capitis, tum naturalium vlcera, tum ea quae toto corpore excruciant, oculorūq; inflammations. Arsi erysipelas, aut eiusmodi quippiam vlceri accessit



accefferit, iis vtendum præfidiis, quæ aduersus illa inscripta sunt.

*Si maturari, & ad suppurationem perducere nequeant.*

C A P. XXXIX.

**R**ecentia quidem vlcera, & quod inflammatione adhuc occupentur, non suppurantia, concoquit maturatq; ex simplicibus, aqua temperata superfusa, farina triticea, vel chondrus, vel panis, vel glutinum librarium, cum terebinthina obducta, item cesa, crocus, lachryma thuris, pix, rosaceum, adeps suillus, vitulinusq;. Inter composita verò tetrapharmacum quod linteolis illinitur, rosaceo subactū. Vetera autem & callosa maturant, simplicia quidem vna passa domestica, styrax, galbanum, myrrha, ladanum, pix, resina, butyrum, mastiche, ægyptiaca, & œsypum. Composita verò ex resinino, dictum aceron, id est, absq; cera, quod ad Galenū authorem refertur, si linteolis illinitur, oleo veteri aut resinino solutum, item quod à duplici colore dichromō dicitur, pari modo & basilicum, similiaq;.

*De causis vlcibus.*

C A P. XL.

**C**auum vlcus carnem quæ periit restitui postulat. cuius generandæ materies sanguis moderatus est, & probus. Huius igitur mediocritatem ex alimento sufficienti conciliabimus, temperiem verò probam ex bonis ciborum succis, & proba particule in quo vlcus est temperatura. At in recremento quod euacuatur, tenuē quidem, humidum vlcus reddit: crassum verò, sordes, circum ipsum coalescentes, eoq; medicamentis eget quæ modicè siccāt purgantq;. Eiusmodi sunt lachryma thuris, hordeacea farina, eruorumq;, fabarū lomentum, iris, aristolochia, cadmia, panax, & pompholyx. Quod si nihil medicamentū ad creandā carnē inductū proficit, ad aliud sic digrediendū est. At si plusculū sordis sit, humidiusq; vlcus, sciendū venit medicamentum intra modū deficasse, intendendūq; esse ipsum mellis mixtura: sin purū & absque humore cernitur, vltra, ac conuenit desiccavit, ac oleo pleniore dilutum ceratū inducere oportet. Accidit nō nunquā carnem à medicamēto valentiorē colliquari, vt fordidū humidūq; vlcus appareat, quemadmodū ab iis quæ minus ac par est, desiccant. Verū hoc vlcus dum cōsumitur, cauū magis euadet, labris prætumidū, rubens præterea & inflammationis particeps. sæpe verò ager manifestā erosionē



percipit. Alterum illud quod à parum siccantibus remediis humescit, nihil horum succidaneum habet. Putrilago igitur lignorum, & potissimum eorum quæ moderata astringēdi abstergēdīq; virtute donata sunt, quēadmodum & vlmus, purgant vlcera, puraq; iam facta, carne replent, vel anemona appositæ. item piceæ cortex derafus, tritusq; cum cerato & linteolis illitus cauis vlceribus auxiliatur, & præsertim recentibus, vt quæ carne destituta reficiat, repleatq;ue. Composita verò, vbi pura quidem sunt vlcera, accommodantur, quod ostreis cōstat, quod Manathoni adscribitur ex vini fæcula, & quod ex aloë conficitur, quod Melitera appellatur aridum, & quod amyli, mannæ, thuris, alicæ, erui, pares portiones recipit. similiter quod è thure confit, & aphroditariū. Sin autem sordibus magis scateant, cephalica appellata arida conueniunt, & quæ linteis illinuntur, vt Trophos dictum, Isis Athene, ex atractilide præparatum, Italicumq; & quæ experientia comprobauit.

*Quæ sordida vlcera purgent.*

CAP. XLII.

**S**ordida vlcera siue caua, siue plana fuerint, probe purgat aristolochia cum melle, terebinthina cum pari rosaceo & melle, vel loco rosacei butyro, iris illyrica ex melle, oliuæ colymbades applicatæ. Ad ea verò quæ neruosis obueniūt, terebinthina cum butyro liquefacta: sordidis nimium & depascentibus benefacit marrubium cum melle. hoc etiā crustas deiicit. Composita autē remedia hæc sunt, amurcæ coctæ, mellis despumati, aluminis phorimi, hoc est liquidi, paria pondera. ALIVD. Serapiadis herbæ, quæ & triorchis dicitur, sicca, iridis illyricæ, marrubij sicci, aristolochiæ, singulorum drachmæ octo, erui farinæ drachmæ decem, arido vtitor & cum melle. Insuper ad sordida vlcera facit tum Aegyptia, tum ex salē cerata liquefacta, tum Indice, tum Athene, tum viridia diluta. Ad hæc, quod pumice constat, & ex eruo, sicca, pastillusq; melanchlorus, hoc est, nigroviridis, similiter etiam Criogenes appellatus.

*Ad vlcerum vermes.*

CAP. XLIII.

**A**d vermes qui in vlceribus procreantur arcendos, primum quidem est, vt humiditatē putredinemq; eorum opificem tollas. Cæterum necant vermes communiter quidem omnia quæ ad aurium vermes inscripta sunt. Ad eos autem qui vlcera infestant, Archigenes commendat cerusam,

po



poliumque, pari modo cum pice liquida illitum.

*Quomodo caro vlceribus supercrescens exedatur.* CAP. XLIIII.

**S**upercrescens vlceribus caro medicamentis quæ valenter exiccāt tollitur, cuiusmodi est diphryges inspersum squama æris, omniaque testacea combusta, & erinacei concremati vtrique cum toto corpore. Verum hæc modicè purgant, & supercrescentia continent. Asiæ vero petrae flos, validior est, hoc magis fori, chrysocolla, chalcitis, misy: combusta minus rodunt: item æris flos: similiter etrugo omnibus est valentior, sales autem concremati, humentes & flaccidas carnes consumunt, sic etiam linamenta carpta è panniculo, muria acriori imbuta & resicata, quæ si imponantur, mediocres carnum supercrescentias exedunt. Aerugo, cum æris squama interea refertur quæ validè excrecētia supprimunt. Composita Rhodia (vt dicitur) arida, psaron, ad hæc, xanthon, sine morfu retinent. At maximas carnum excrecēcias, adusque penitiora crustis obducunt, pastilli Faustiani, triti inspersiq; & medicamentum, quod à solis æstu heliocaes dicitur, aridum. Adde his quod recipit calcis viuæ, squamæ æris, & mannæ thuris, pares modos. Idem ea quæ nimium excreuerunt, fungisque respondent, cum melle, purgat: cum cerato, carne replet.

*Arida compositio ad carnem compescendam.*

**A**R G E N T I spumæ, chalcitidis, æruginis, plumbaginis, singulorum æqualis portio. A L I V D vehementer reprimēs citra rosionem, valet quoque ad pascentia vlcera, & præsertim gingiuarum vitia, quas epulidas vocant, necnon ad dentium candorem. Calcis viuæ pondo, auripigmenti selibra, hoc auripigmentū siccum, inquam, ex aqua detritū calci viuæ, cadmiæ modo lotæ adicitur: in puluerem radaetis siccis vtor, ex pastillis autem, tum qui Pantolmius dicitur, tum qui ad polypum inscripti sunt, pulchrè coërcent, sic emplastra viridia & præcipuè id quod ex sale Cappadocico præparatur, similiter, & iis summè carnem supercrescentem in vlceribus continet.

*De vlceribus serpētibus, & putridis, et phagedæna.* CAP. XLIIII.

**S**upervusiones vtilēs sunt vlceribus depastis, putridisq; ex Saceto, posca, aut vino astringēte, aut aqua frigida, aut marina, aut decocto lēticulæ, malicotij, balaustij, lētisici, myrti,



spinæ ægyptiæ, aut aliquo ex iis quæ astringunt & siccant. Cataplasma his ipsis exhibetur ex farina erui, alumine liquido, panis filiginei mica, gobio veteri, aut alio salsamento veteri carnis illote, terebinthina liquida pari pondere detritum, vel aristolochia, vel reciniorum foliorum succus æqualis, æruginis pars dimidia, ex aqua vt mellis sit spissitudo illinitur: si crusta nō deciderit, elaterij parem modum ærugini admisceto. putridis efficax est fori si tritum inspergatur. Et super linamenta carpta arida, vel aristolochia rotunda, vel gallæ, æquo pondere cum oleo illinuntur, vel cucumis sylvestris radix, vel brasicæ, vel betæ, vel cucumeris folia, illigata calidis cineribus recoduntur. Vbi verò emollita fuerint, cum sale trita imponuntur, valenterq; repurgat: vel oleæ summitates in vino decoctæ cum melle inducuntur: vel chalcitis applicatur, vel apij semen cōtritum, vel lini semen læuigatum, cum atramento sutorio inducitur, vel thymum, vua passa, & ficus incoctæ applicantur, aut fici folia in læuorem trita cum melle, aut nitrum, cuminū & farina ex melle, aut cucumeris sylvestris radix, aut scilla cocta ex melle, aut foreos drachmæ duodecim, chalcitidis drachmæ decem, misyos drachmæ quatuor, cum dimidia aceti acerrimi hemina, læuigantur donec arefcāt: exceptis vteris, specillū intingens, ac vlceri circumadigens, superq; duplex linteculum ex œnelæo imponis: sin inflammatione sint occupata, altercum cum polenta, aut brasicam cum melle obducito.

*Ad putredines quamlibet partem occupantes, & vlcera quæ depascunt.*

CALCIS viuæ, chalcitidis, singulorum drachmæ duæ, auripigmenti drachma: hoc quoque ad digitorum pterygia & phagedænas efficax est. Item naturalium carbunculis cum melle vtiliter adhibetur. In reliquis vitiis arido vtitur, super splenium ex resina inducito.

*Ad omnia quæ depascunt vlcera, quæq; os infestant, item ad sanguinis profusum, & carnem excrecentem, aridum, compescens, longè vtilissimum.*

CHALCITIDIS, misyos, vtriusque crudi, drachmæ viginti, squamæ ferri drachmæ sex, gallæ omphacitidis drachmæ octo.

*Ad serpentia vlcera & putredines.*

SALIS drachmæ duodecim, aluminis qualiscunq; combusti drachma, squammæ, pumicis combusti, singulorum  
par



ar modus: valet & ærugo rasa cum misyi combusto, pice liquida excepta, squamâq; ferri cum oleo.

*Ad vlcera pudendorum depascentia.*

H A E C & meleterion dictum nomis proficient. Item dia oxymyrsmes, hoc est ex acuta myrto, itē ex charta medicamen aridum omnibus nomis efficax est. Accedit huc coracian ex oxymelite, pastillus Andronis, & qui huic respōdet. Eadem vero hæc medicamēta phagedenis quoq; cōgruunt, nam & ipsa vlcera sunt quæ depascunt, exeduntq;.

*Ad flaccida humiditate vlcera foetidaq;.*

L E M N I A sphragis ex aceto, vel oxymelite, vel posca, vel vino subacta, ad luti spissitudinē illita benefacit, aut cupressi folia, germina & galbuli teneri, aut cucurbitæ aridæ concremata cinis, aut platani corticis cōbusti, aut anethi cremati similiter, aut lanarum fordidarū vstarū, aut plantago, aut isatis per se, vel cum polenta, vel peucedani radix arida.

*Quomodo cicatricē vlceri inducenda sit.*

C A P. XLV.

**S**I carnem vlcerum quæ cicatrice indigēt, siccemus, astringamusq; adeo, vt non modo id quod præter naturæ modum superfluum est, discutiamus, sed etiam illud quod naturale est, attingamus, superficiem vlceris cuti similem reddemus. Ad hoc autē sunt idonea, galla acerba, & mali punici cortices modicē siccantes. Quæ vero præter astringentem sine morſu exicant, ea quoq; cicatricē inducunt, veluti myrrha, argenti spuma, ostreâq; concremata. Nam hæc quoq; si inspergantur, arida, sæpe cicatricem inducunt: pini cortex cum cerato myrteo, hederæ flos cum cerato, lilij radix cum rosaceo, resina ex pinu arida, pumex tostus, squama æris pari portione, siccis vtitur, idem etiam reprimat: vel pumici trito, manne thuris & diphrygis singulorū miscens paululū, vti tor, vel argēti spumæ partē vnā, diphrygis dimidiam cum cerato instar splenij impones. Vetera autem ad cicatricem ducit viscus, cum lachryma thuris, ærugo cum diphryge æquali, ceratoq; myrteo: vel cētaureum minus recens applicatum. At humidiora cyperi radice obducito: sedis autem naturaliumq; vlcera, præsertim si inflammationem experiantur, aloë persanat læuigata, arida, vel ex aqua aut squama æris, aut chrysocolle in sole cū cera emollita inducitur.

*Aridum ad cicatricem inducendam.*

O S T R E O R V M drachmę duodecim, pollinis thuris drach

v 5



mae sex, cadmia drachmę quatuor: facit & Nomis. A L I V D. Aristolochia, drachmae sex, pini corticis drachmae sex, pollicinis thuris tantundem, pumicis, colophoniae, iridis, singulorum drachmae quatuor. A L I V D. Cornu ceruini combustum drachmę quatuor, pini corticis vnciae sex, cerusae vncie quatuor, æruginis rasae vnciae nouem, cadmia drachmae octo, sedecim. A L I V D. Cytinorum, atramenti sutorij, singulorum drachmę sedecim, squammę eris, aluminis scissilis singulorum drachmae octo, gallae drachma. A L I V D. Cerusę, argenti spumę, singulorum drachmae octo, recrementi plumbi, gallae, myrrhę aridę singulorum, drachmae quatuor.

*Ad cicatricem inducendam.*

A L V M I N I S scissilis vncia, trita in aqua sextario maccatur: vbi solueris, aqua linamenta imbuīs, & sicatis vteris.

*Emplastrum ad cicatricem inducendam ex simplicioribus.*

C E R A E drachmae quadraginta, argenti spumę drachmae triginta quinque, diphrygis drach. octo, myrtei heminae dimidium: efficax est his quoq; Palmulatu, quod phœnicine dicitur, item ex cadmia, rum myrsinatum, & consimilia. Ad ea vero quę cicatricem vix recipiunt, cerę myrtei singulorum drachmae sex, cadmia drachmae sex, plumbi, thuris, singulorum drachmae duę, aluminis scissilis, æris combustis singulorum drachma, æruginis rasae drachmae duę: die interposito soluitur.

*Diu inueteratis & agrę ad cicatricem venientibus.*

C A D M I A E, chrysocollę, aluminis scissilis, singulorum drachmę octo, æruginis, squammę æris, singulorum drachma, resinę pityinę drachmae quadraginta, cerę drachmae centum, myrtei quod satis est. A L I V D. Cerę resinę pityinę, singulorum vnciae sex, cadmia tantundē, chalcitidis crudę vnciae tres, myrtei quantum satis est: vino læuigatur cadmia cum chalcitide, quando caniculę sidus oritur: latiore vterre splenio, quod platysma dicitur: super id linamentum carptum & spongiam ex vino inducito. A L I V D. Aeris combustis, aluminis scissilis, singulorum vnciae duę, salis ammoniaci drachmae duę, cerę vnciae sex, colophonię tantundem, myrtei vnciae duę, arida in sole diebus viginti ex aceto læuigantur, vbi mellis facta fuerit spissitudo, cera eliquata refrigerataque emolliendo miscetur. Valet etiam ad hac medicamentum ex pumice, item Isis, & id genus alia.

De



De maleficis vlceribus dolosisq; cacoethe Græci vocant, aliàs chironia & telephia.

CAP. XLVI.

**I**nueterata & quæ vix cicatricem recipiunt vlcera, alij chironia appellantur, ceu Chironæ medicinæ peritissimo indigentia: alij telephia, quod in tali vlcere Telephus conseruerit. Inspiciendum igitur venit, num & totum corpus vitioso redundans succo huiusmodi fluorem vlceri transmittat, ac qui superat humor, conuenientibus vacuari debet remediis. Si verò varix cruribus vlcere infestatis illum imperiat, etiam hic auferri debet, sicut in parte chirurgica explicabitur: aut venæ sectione ipsos vacuabimus, abundè sanguinis detrahentes. deinde loco inducemus auxilia quæ fine morfu reficiendi vim habent. simplicia igitur ex pumice, diphryge, squama, ærugine, calce mediocriter lota: alumen scissile tritum inspergitur: hyssopi drachmæ quatuor, vuæ passæ tantundem, nitri drachmæ duæ, loco prius melle illito applicantur: squamæ aris drachmæ decem, aluminis drachmæ duæ, cum ceræ drachmis decem emollitis in sole, imponuntur.

*Composita hæc sunt, emplastrum ad chironia.*

**CERVSÆ** vnciæ octo, aluminis scissilis vnciæ duæ, squamæ aris drachmæ duæ, salis ammoniaci, thuris, æruginis rasæ, malicorij, singulorum vnciæ duæ, calcis viuæ vncia, ceræ libra, myrtei libra vna & semis, arida vino teruntur. hoc medicamento protinus ab initio callum excindit, & reconditum seruatur, postremo autem in vsu emollitum myrteo, cicatricem inducit. **ALIVD.** Argenti spumæ libra, olei libræ duæ, chamæleontis nigri, radicis aristolochiæ, gallæ omphacitidis, singulorum vncia, galbani, guttæ ammoniaci, lachrymæ thuris, singulorum vnciæ duæ, præparato radicibus viridium arundinum agitans. Archigenis ad chironia, tum malefica vlcera quæ tibias mammaeq; obsident, item strumas & parotidas. Adipis bouilli libræ tres, terebinthinæ quincunx, pollinis thuris septunx, terræ sardæ dictæ, qua scriptores vtuntur quincunx, his quæ liquari possunt in arida coniectis vnitisq; vtor. **ALIVD.** Archigenis, ceræ triens, olei omphacini, pollinis thuris, veleius lachrymæ, diphrygis, squamæ singulorum drachmæ quatuor, arida cum aceto læuigas, vbi mellis spissitudo facta, cerato mices, & vteris diluto quod linteolis possit illiri. **ALIVD ad mulie**







hæret abstergendam aquosa mulsa potabili, elui debet: erum vt coalescat, vino aut mulso: deinde ad glutinās medicamentum transeundum. Sin cauus sinus carnem requirat, primū, medicamento, q̄ charta cōstat, aridi paululū cum multo rosaceo inferi conuenit. deinde carpto linamento os obturari. Inde emplastrum Iſis aut Machæionis, aut simile quoddam vnā cum rosaceo cerato liquidiore solutum indicitur. Vbi vero carne mediocriter sinus fuerit repletus, conglutinans quoddam medicamentum impones, quemadmodum & recens cruentum vulnus curabas. Huius autem generis sunt, Barbara, Dichroma, & scirrha, id est, fulua appellata. Maximè verò omnium quod ex recinino, & metallicis sine cera præparatur fulvum Galeni emplastrum conueniet. Post medicamentum, spongia recens ex mulso, aut vino circumponitur, & quā fieri potest mollissimè, deligatura à sinus fundo incipiens in ipsius os desinet, linteorū verò circumductus fundum sinus sine dolore constringat, paulatim vero soluatur vsque ad sinus oras, emplastro extrinsecus sinui circumdato, sed ita iuxta oras descisso, vt sanies queat excerni: quod fiet paruo quodam alio emplastro superimposito ex eodem medicamento ob effluxum laxo: fines id adusque solutionem, qua tertio quoque die facta id ipsum auferes mutabisq̄: quod toti sinui circumdatum est relinquens. Nota verò erit an sinus ima coaluerint, si sanies probè emanet pauca, & concocta, aut si nequaquam effluat: insuper eodem in sinu si neque dolor aliquis sensibilis, neque tumor, sed tota regio contracta, sicca, & doloris expers appareat. At si pus etiam maturum in ore modicum conspicias, multo magis de sinu conglutinando sperandum est. At si primo altero ve die sanies quædam tenuis è sinu excernatur, nihil adeò de glutinatione despera, quippe medicamenti virtus humorem tenuem † ex subiectis partibus frequenter extundit, vnde partes sicca mediocriter factæ coeunt, & glutinantur. Tertio verò die aut quarto ab initio si cruda per os sanies euaserit, scito sinum non coisse, eodemque medicamento non insiste, nam cum propter humiditatem quāpiam, vt verisimile est, à parte decidat, nō alienum fuerit etiam mutare.

† Antiquus codex habet, ἐκ τῶν ὑπερκειμένων, id est, ex superpositis partibus.

De



*De sinibus laceris detritisq;.*

**V**bi abscessus tardè sectus fuerit, vel medici imperitia, vel eius qui curatur timore, & cutis sinui obducta tenuis diruptaq;, quod Græci ab attritis vestium laciniis rhacodes dicunt: nec fieri potest, vt prædictis collutionibus adimatur, glutināte vtendum medicamine, temperatura liquido viribus autem sicco. tale est palmulatum dictum ex chalcitide, veteri dilutum oleo, vt neque admodum sit durū, neque manus intinctas inquinare desierit, deinde vino mediocriter vetusto maceratum, postea orbiculatim cum decenti deligatura impositum. Conuenit autem laceræ vt comprehensum est, cuti, potissimum mel, quoad emplastri spissitudinē habet coctum impositumq;: Præstiterit autem post illitionē lacero in sinu factam, myrrham in pollinem coactam, cribro suspenso ei inspergere, vel aloē, vel thus, vel simul omnia. Expertus autem sum, tenue centaureum in hunc vsum mirabile esse medicamentum. succedit huic symphytum, deinde iridis illyricę radix, postremo erui farina. Nonnunquam vero inter coquendū ea melli insperguntur, cum cacabus ab igne tolletur. Melius autem fuerit, si lebece iam à flamma amoto hæc fiant, deinde diligenter agitemus: vbi medicamentum tepidum euaserit, sinui imponatur, illigeturq; sicut expositum est.

*De fistula.*

## CAP. XLIX.

**F**istula sinus est callosus, qui magna parte ex abscessibus nascens, ab arundinearum fistularum translatione appellatur. Si itaq; in os desinat, curari sine manu haud potest, nisi temporis spatio, squama vltro vel os deciderit. Si vero in os nō finiat, medicamētis quæ callos elidūt & conglutināt persanabitur. Itaq; callos excindūt hæc quæ subiungā. Spondylii radix circumrasa impositaq; fistularū callos eximit, item veratrum nigrum duobus tribusve diebus insertum idē præstat. Ad hæc amurca cocta & in collutionem adhibita. Iam sory crudum vel cōcrematum cum vini diluti momento ad collutionē iniectum: item sory & crocomagma cum hydro melite, vel elateriū terebinthina exceptū in penicilla cogito, imponitoq;, vel laserpitij radices succum infundito. Id quod sequitur callos consumit: æruginis drach. duodecim, ammoniaci drach. duæ, excepta aceto in longū inducuntur.

*Collyrium quo fistulis exterendis vter.*

G V T T A E



**G**VTTAE ammoniaci, atramenti sutorij, æruginis, misyos, chalcitidis, gummi pari modo excipiuntur aceto. **ALIVD** ex his quæ Heliodori chirurgica scribuntur. Cadmiæ, misyos, atramenti sutorij, æris combusti, gummi, singulorū drach. quatuor, chalcitidis crudæ drachmæ tres, excipiuntur pueri ceneris non experti vrina & finguntur collyria, ex quibus uno fistulæ imposito, panis mica aqua madens extrinsecus superacommodatur, mutaturq; sæpius donec inflammatio conquirit & crusta exciderit. **ALIVD** quod in Alexandria cecepi, Anchusæ radicum, misyos tosti, chalcitidis, æruginis, luminis scissi, atramenti sutorij, aloës, singulæ vnciæ, cantharides quinque, aceto trita in collyria coguntur. **ALIVD**. Atramenti sutorij drachmæ duæ, chalcitidis, æruginis, singulæ drachmæ, excipito ammoniaco & vtitor. Cum autem callus fuerit extricatus, ærugine cocta cum mulla purissima octupla in collyrij formam redacta, repurgatur. Vbi vero callum eliseris, iis quæ carnem procreant vti opportunum est.

*Collyrium ad carnem generandam.*

**A**LOES, myrrhæ, ammoniaci, ouorum putaminum combustorū cineris, æquale pondus, aqua detritis omnibus collyria formantur, imponunturq;. **ALIVD**. Myrrhæ, aloës, thuris, malicorij, æqualis modus aqua excipitur, quidam vero taurino felle, carnes etiā oleo quod immaturis vuis expressum est eluuntur. Notus mihi est, qui cedrino liquore fistulas collueret, ac mirum quanta res felicitate successerit. Postquam vero carnes produxeris, glutinatorio vtendū medicamine, quomodo in aliis sinibus præcipitur. At cum fistula arctior, longaq; fuerit, Galenus ait, neque callum adhuc, sed sordiciem tantummodo contraxerit, primum lixiuiam demisi, deinde eandem tantisper inibi permittens dum sordes excidisse sperassem, medicamentum applicaui. Est autem id quod recinino oleo constet superius commemoratum.

*De vlcibus disruptis.*

**C A P. L.**

**N**onnulla vlcerū cicatrice obducta, frequēter haud magno tēporis interuallo, iterū inflammatione tentantur rūpunturq;: siquidē osse quodā affecto, interdū caro circumdata ex facili cicatricē recipit, ac sana ex toto esse videtur: verū cursu humoris valido paulatim ex osse in alto cōtabesceēte, tū inflāmatio, tū pus oboritur, quod cicatricē deradit.

Curatio



Curatio igitur eiusmodi vlcerum tantam requirit siccitatē, ut os affectum decidat. Huius autem sinus concauos promptè replebunt papaueris syluestris ficiq; folia cum polenta subtiliore parte leuigata, atque ex vino applicabis, vel alteri ci semen, & atramentū sutoriū pari pondere contrita imponētur, vel peucedani radix de subito squamas ossiū separat.

*De articulorum vlceribus.*

CAP. LI.

**C**um articuli carnosus partibus ficciores existant, exulcerati ficciora medicamenta requirunt. Probè igitur facit pastillus Polyidæ ex vino subactus donec sordiū fiat spissitudo. Item quæ similiter huic deficcant medicamina. Item marina, muriaq; frequenter irroratos, melius affici conspeximus. Quare in articulis iis vtendum est quæ maiori etiam ficcandi virtute pollent.

*Quæ spicula, aculeos, spinas, & consimilia educunt.* CAP. LII.

**A**culeos, arundines, insuper spicula & spinas extrahit vtrumq; anagallidis genus, aristolochia rotunda, ammoniacum cum melle, alterci semen laeuigatum inspergitur, arundinis radix contusa melliq; mista in linteolum largum illinitur, imposita de subito educit.

*Si ex vena, arteria ve, & naribus sanguis profluat.* CAP. LIII.

**P**articulis sanguinem fundentibus, figura ei quam in sinibus exposui contraria, rectè adhibebitur, nempe quæ sursum vergat, neq; id tamen immodicè, nam periculū est, ne dolore oborto, vas rursus sanguinem profundat: cum nihil æquè sanguinis profluuium excitet, inflammationesque augeat, ac dolor. Cum itaq; sanguis erumpit, statim digitum ori vlceris vasculi iniicito, innitens leniter premensq; citra dolorem. nam simul & sanguinē continebis, & grumum vlneri induces. Quinetiam si altius deliteas vas quod sanguinem emittit, diligentius perdisces, & situm ipsius, & magnitudinem, item vena sit, an arteria: deinde si exiguum vas existat, aliquo ex his quæ sanguinem reprimunt vtendū est. Optima vero eius generis sunt, quæ obstruendi vim obtinent, vnde Græcis emplastica dicuntur, ex resina fricta, farinæ triticeæ polline, gypso composita, similiaq; , oui cādido macerata, & cum leporinis pilis imposita: at si amplum vas existat, hamo ipsum attollere conaberis, & mediocriter circūages, sanguine represso: siquidem vena extiterit sine funiculo sanguinē his ipsis medicaminibus sistere tētabis: si arteria,



teria, alterum è duobus facies, aut funiculo circumposito, aut toto uase præciso sanguinem coërcebis. Est, cum magnis quoque venis funiculos circumdare cogimur, quemadmodum nonnunquam easdem totas transuerfim nimirum amputare, in cuius rei necessitatem venit, in venis quæ à penitioribus rectè sursum feruntur, præsertim per arctū quoddam spatium, aut principes particulas, sic enim utraq; pars utrobique & reflectitur: & vulnus à vicinis corporibus premitur contegiturque: tutius autem fuerit utrunque facere, funem quidem radici vasis circū dare, quod autem inde procedit abscindere. his sic peractis, vulneri celerrimè carnem inducere, priusquam funiculus à vase decidat, si enim subito carnem contraxerit, & locus alibi inanis reperiatur, id quod Græcè vocatur aneurysma sequitur. Dignosces autem num vena an arteria sanguinem profundat inde, quod huius flavior tenuiorq; sanguis existat, & cū pulsu vacuetur, † illius autem nigrior, & sine pulsu. Subsequens igitur est omnium optimum quæ nouimus ad carnem inducendā medicamentorum, quo etiam ad cerebri membranarum hæmorrhagias uti securissimum est, item ad colli vulnera, ipsarūmq; venarum iugularium quas sphagitidas Græci vocant, etenim & harum sanguinem citra vinculum cohibet. Recipit autem thuris lachrymæ pinguisimæ partem vnam, aloës in mollioribus quidē corporibus partem dimidiatam, in durioribus æqualem, ac in vicem lachrymæ thuris, tenuissimæ eiusdem partis tantundem, cum oui albo subigitur, dum mellis fiat spissitudo. deinde leporis pilo mollissimo excipitur, mox vasi ipsi, tum vlceri vniuerso copiosissimè imponitur. Deligandum verò extrinsecus est fascia ex tenui linteo, cuius fasciæ primi quatuor aut quinque amplexus super ipsum vas profluit, iniicietur. hinc ad radicē ipsius distribuetur, postea ubi tertio solueris die, si tutò adhuc medicamentum vlceri adhæreat, aliud rursus orbiculatim circūdabis ac veluti cōtegens iterum, deligabis quemadmodum prius. at si sponte sua primum reiecerit linamentum, vasis radicem digito leniter comprimens, ne videlicet quippiam confluat, hoc quidem sensim auferes, alterum verò impones, atque hoc modo quoad carne obducatur vas, curabis, ita ut semper accliuus particulæ figura sine dolore seruetur. At quæ crustas generant, quoties illæ decidunt, nudam magis partem quàm na-



turaliter esse debet, efficiunt, multisq; iam ex iis quibus crusta decedit, sanguinis profluuium quod egrè suppressi queat superuenit, quanquā & his vtendum est cū magna vrget necessitas. Maximam verò necessitatem vel crustam inducentibus medicaminibus, vel ignitis ferramentis vtendi putō, vbi ex erosione putrescentis alicuius profluuiū sanguinis concitatur. Quinetiam cū in huiusmodi affectibus totū quod putredinem expertum est exciderimus, tutius est vel ipsius quasi radicem adurere vel medicamentis quæ crustam faciunt vti: hoc autē maximè tum in pudendis, tum in sede fieri cōsuevit. At scopus crustam generantium medicamentorum erit calor cum astringione, quemadmodum in chalcitide, misy & atramento sutorio habetur. Quæ autē ex calce viua conficiuntur, vehementiora quidem his sunt, ceterum quia calx non astringit, crustæ citius ab ipsis decidunt, hære autem ipsas longè est vtilius, quippe ad basim earum caro supernascitur, efficiturque vasis profluentibus veluti operculum, at huiusmodi sanguinis profluuium isatis fatiua si inspergatur probè coercet, vel gallæ combustæ. Porro ipsa ferramenta ignita ex aceto aut vino restringere oportet. In vniuersum sanguinis profluuium sistunt, simplicia quidem, aloë, thus, eiusque pars subtilior, terra samia, ærugo ferri, lanarum crematarum cinis tenuissimus similiter, sterces asini & equi, bitumen modicum, malicoriū, diphryges, galla, myrtus arida, alumen omne, tum crudum tum combustum, resina fricta, vitis cortex, aut folia arida, platanorum galbulorum pollen tenuissimus, maximè cum humorem concretum deposuerit: priuatim autem ex naribus profluuium imposita reprimant iunci acuti semen, vrticæ foliorum succus, chalcitis, authyllis cōcremata, pili leporis, ferulæ medium vsum cum aceto, + sterces asinuum siccū vel humidum, succus porri cum thure, ellychnio exceptus: composita verò ad quodlibet sanguinis profluuium hæc quoque faciunt, spongia recens in liquida pice mersa & bitumine circumlita, olla recenti cōcrematur, cineris partibus duabus, miscentur plumbi & stammeos, singulorū pars vna. **ALIUD.** Thuris lachrymæ, eiusque partis tenuioris, sulfuris ignem non experti, æqualem modum inspergito. **ALIUD.** Chalcitidis drachmæ viginti, lachrymæ thuris vel tenuioris eius partis drachmæ sedecim, resinæ frictæ, gypsi, combusti,



busli, singulorum drachmæ octo. ALIVD crustas inducens sanguinèque reprimens. Chalcitidis, æris combusti, atramenti sutorij, misyos tosti paria pōdera, item Rhodia dicta, & Xanthe probè sanguinem cohibent.

† Hic locus sic rectius legitur in vet. ἡ φλέβος μελάντερον τε καὶ παχύτερον, &c. *vena autem nigrior & crassior sine pulsa.*

† Rectior est scriptura in veteribus lib. ὀνόνις ξηρὰ ἢ ὕγρὰ. id est, *Ononis sicca vel humida. Quid autem sit Ononis, Dioscorides & Galenus docent.*

## De nervis convulseratis.

## CAP. LIIII.

**N**ervis vulneratis aut punctis, ex sentiendi quod obtinent, acumine, inflammatio & dolor immodicus accidit. Quare & febres & cōvulsiones his oboriuntur, quibusdam & delirium ob commercium quod nervi cum cerebro obtinent. Interim verò in aliis quoque ambientibus particulam vulneratam locis inflāmationes, & abscessus ex ipso nervo vulnerato ob coherentiam solent accidere. Ratio igitur est, cutis vulnus apertum inglutinatūque relinquere, quò per id sanies effluat. At si punctus in conspectum non veniant, etiam duabus lineis sibi continuis incidere præterea oportet. Remedio autem est, si corpus plethoricum sit & magna vrit inflammatio, primum à sanguinis demissione auspicari: si verò vitiosis repletum sit humoribus, etiā purgatione utendum est. Medicamenta verò vulneri applicantur quæ dolorem leniant, & effluxum saniei patefaciant, non facta præsertim diuisione. Itaque aqua calida, quam reliquis inflammationibus sit accommodatissima, vulneratis tamen nervis est inimica, ac præstiterit eos oleo subtili, quod astrictionis sit experts, ad sensum calido irrorare, neque enim frigida neque tepida admodum tutò adhibetur. Verum ex medicamentis idonea est terebinthina resina, per se quidem, in pueris & mulieribus & iis qui molli sunt carne, cum euphorbio autem emollita, in duris corporibus: & si nonnunquam duriora contigerint, cum oleo quodam subtiliore. Cataplasmata verò in nervis, qui inflammatione tentantur & putrescunt, adhibebis hordeaceam farinam, aut fabaceam, aut eruinam,



in lixiuio, cum oxymelite coctam. Si putredine careant punctura neruorum, recte cerato uteris, quod recipit cere quadrantem, euphorbij vnciam, aut columbini fimi in duriusculis corporibus, olei sextantem, interdum etiam terebinthine vnciam: ut autem emplastri figuram induat medicamentum, vncie vni euphorbij, sex vncias singulorum sequentium, cere, resinae frictae, olei, picis liquidae iniicies. At si in vicem resine propolim pinguisimam indideris, multo id reddes praestantius: atque hoc ad nervos punctos laudatum est remedium: idem & a rabioso cane morsus efficax est. Aceti sextarius, picis pinguis libra, opopanax quadrans: opopanax aceto solutus magis laeuigatur, pix liquefacta mixtaque coquitur: medicamentum compunctis nervis idoneum est, ut quod os puncturae non sinat conuiere, quemadmodum nec in his qui a rabido cane morfi sunt, vlcus in cicatricem coalescere: sed efficax solis duris corporibus: si autem in pueris, aut molli carne praeditis, punctura affectis, uti cogites, licet ipsum ex digerente quodam amaracino, aut opobalsamo, aut oleo veteri liquefacere. Conuenit etiam medicamentum basilicum quod nitrum recipit, aut calcem viuam, aut euphorbium, aut sulfur viuum, aut syluestris columbae fimum, aut opopanax, aut sagapenum, aut liquorem cyrenaicum, aut castoreum, ac in medicamento libram, dictorum alicuius vncia debet iniici. Facit autem bene neruorum vulneribus & praefertim puncturis: quin & in agro ubi nullius copia datur, propolim recentem pinguemque vulnere poteris inducere, aut fermentum maxime vetustum, per se aut cum propoli mixtum, vel cum liquore tithymalli: cataplasmatibus utendum ex oxymelite factis, aut lixiuio cum lomento fabarum, aut eruorum farina, aut cicerum, aut lupinorum amarorum, aut hordeacea, aut subtiliore polenta, idque non solum dum inflammatione tentati sunt, sed iam inde ab initio protinus. Caeterum quae relaxant cataplasmata in neruorum vulneribus semper vitare oportet. At si nervus non punctus, sed plane cesum vulneratus fuerit, cute etiam quae interueniebat diuisa, ut nudus appareat rectusque, non transuersim dissectus, commemoratis ex euphorbio & tam acris nullis utere, quippe nudus cum sit nervus, vehementem ipsorum vim ferre nequit. Quare calcem quae saepius aestiuo tempore lota sit, & oleo liberaliore intincta, assumes. Proficiunt hic & quae

ex



ex pompholyge confecta sunt, item quod melle constat, rosaceo largiore liquefactū. Sed ea adhibenda cura est, ne quid ex iis vulnus contingat. quandoquidem neruus ipse & sensibilis maximè est, & temperamēto suo frigidus, & principum corporis partiū primati cōtinuus, imò ne oleo quidem eiusmodi vlcus irrorare cōuenit, hinc enim sordidum redditur. Abluēda igitur à vulnere sanies est molli lana specillo subūctorio circumuoluta. Quòd si omnia ex animi sentētia processerint, etiam vinò dulci madefacere citra periculum licebit. sed in robustioribus Polyidæ pastillo in linamentum ilito cum sapa calida vti. postquam neruum denudatum cōtexeris, linamēta extrinsecus circūducere oportet ex medicamento quod angustis vulneribus faciat, nempe eo quod euphorbio præparatur, aut fimo columbarū: sed ita vt etiā sanas partes ampliter comprehendat. Quum verò transfuersum nerui vulnus est, maior conuulsionis metus impendet, ac quæ ad curationem vulneris spectant. hīc quoq; sunt eadem, quanquam nonnulli in vulnere adhuc recenti futuris vti sunt, ac medicamento aliquo conglutinatorio: verū futuras non summæ nimium cuti, sed altius moliri cōuenit, ne quæ in imo sunt inconglutinata dehiscāt: rursus cura adhibenda est, ne ab acu neruus compungatur. Caterū in summa sciendum erit, in neruorum vulneribus medicamentum naturā calidius quod puncturis medetur, diuisionē nerui nō posse curare, vt qui rosiōnem ipsorum feruorēq; sustinere nequeat: neq; quòd diuisionibus medetur, puncturis cōuenire: non enim virtus ipsius altè quā angusta est cutis diuissio, penetrat. Victus itaq; adhibebitur tenuior, lectus mollis, oleūq; calidum alis, capiti & ceruici superfunditur, at si in crure neruus vulneratus sit, inguinibus, inferioribus vētris partibus, & locis vicinis: balneo in totum donec inflammatio inclinauerit, abstinendū est, quum aquæ cōtactus nequaquam, vt dixi, ipsis cōueniat. Quoniā verò nonnulli citra id manere cōsuetudinis gratia nō sustinent, siquidē læsa particula in manu fuerit, cōnādū est quatenus fieri potest, ipsam aqua seu calida, seu multo magis frigida nō madefacere. Si pes vulnus acceperit, quoniā fieri nequit vt nō madescat, vbi lauacrum ingressuri sunt, emplasticū aliquod medicamentum vulneratæ parti superaccōmodabis, iterū extrinsecus linteolos multiplicatos plures oleo imbutos iniicies, iterum



fasciam ex linteo à foris deligabis, deinde rursus in ipso balneo fasciam oleo prius superfundes, cū æger in solium descēdet: vbi lauerit, omnia quę imposita sunt abiicies, ac prædicta totius curationis ratione vteris. Cōtusi verò nerui vbi simul cū his cutis cōtusa exulcerataq; fuerit, cataplasma ex fabarū lomento & oxymelite postulant, nonnunquā adiicitur erui farina & iris. At si dolor contusioni adest, picē liqui dā admisce: sin autē citra cutis cōtusionē euenerit, magis discutiens adhibebitur, nempe oleū calens, anethinū dico, superfusum continuē, aut rutaceū, aut irinum, aut amaracinū, Quod si totus neruus præcisus sit, periculū quidem nullum sequetur, verum particula debilis manebit. Curatio autem eius cōmunis est cū ea quę aliis vlceribus accommodatur, hæc quidē ex simplicioribus remediis in neruis conuulneris curatio abunde est. quidā verò cōpositis vti cōsueuerūt, cuiusmodi sunt, ex metallicis confecta, Barbara appellata, Cissinum, ex senecione præparatum, melanchloron, Indice, Harmonia, & Athene, quorū & cōpositionem, & vtendi modum septimo libro reperies. Sed quia nonnulli præpotētium etiam sumptuosius ad neruorum vulnera remediis vti volunt, Galenus literis prodidit, ad puncturas neruorū, hæc, cinamomi, dictamni, fœniculi, singulorum vncia, amaraci sextans, ceræ bes, opobalsami dextans, terebinthinæ vncia. ALIVD. Liquoris cyrenaici vncia, ceræ quadrans, opobalsami libra. Ad denudatos neruos hoc valet. Cerę vnguentarię quadrans, vnguēti spicati aut foliati, aut nardini libra, pompholygis, spicæ nardi, amomi, phylli, singulorum vncia, atq; hæc supra spem respondere Galenus pronuntiauit.

*De articulorum contractione seu ligatione, quę ancylo-*  
*lofis dicitur.* CAP. LV.

**A**Rticulos ex humoribus infarctis ac neruea quadā tensione contractos, detentōsque, ancyas, & ancylofes appellare consueuerunt. In quibus remedio opus erit quod emolliat relaxetq;. Communiore igitur his remedia conueniunt, quę in particulis scirrho induratis ac adeo quę in resolutis cōmemorata sunt, propria verò magis, irroratio ex hydrelæo, in quo decoctū sit lini semen, fœnugrēcū, althea, laurus, cucumeris agrestis radix, ipsumq; oleum ficyonium. Vbi his artus irrorati fuerint, accommodantur primū acopa  
simp



simpliciora, cuiusmodi ex nigra populo, ex abiete, Bromium, quod ad Basileum refertur, Pyxis, deinde Aristophaneum, & quod Asanito attribuitur. Validissima, Lisoponium appellatum, & Pœcilum: emplastra, quod Amythaoni adscribitur & Anicetum. Laudatissimum verò quod recipit bdellij, adipis virulini, suffiminis ammoniaci, iris illyricę singulorum drachmas sedecim, opopanacis, galbani, cachryos, styracis, thuris singulorum drachmas octo, piperis grana centum sexaginta, ceræ libram semissem, resinæ terebinthinæ tantundem, irini sedimenti quod satis est, & vini quantum sufficit: tunditur hoc medicamentum. Est & acopon non inefficax dissolutum irino, aut cyprino, aut laurino. Inter acopa vero & emplastra, medicamentum medium est diapternes variis confectum misturis. Verum acoporum vsus molli adhibebitur & continua frictione, ita vt simul affectum articulum experiare, an flecti possit, & extendi.

*De articulis relaxatis.*

CAP. LVI.

**L**Axantur subinde articuli ob longos febrium morbos, colicos & resolutorios, præsertim vbi calidior ipsos humidorque intemperies occupauerit: atque motus inde impeditur. Succurrit his acaciæ succus aqua dilutus & parti superfusus: aut rubi, aut myrti, aut lentisci, vel vlmi radicum corticis decoctum congruet, aut malicorium applicatum, aut myrti folia, cum cerato myrteo imposita. Nam colligantes nerui firmari desiderant facultate quæ astringat desiccetque. huiusmodi igitur medicamenta articulis imponi debent, cuiusmodi ex salicibus est & oxyra, & palmulatum quod vinum astringens, aut acetum assumpserit. Multi vero eiusmodi impotentiam à frigore fieri putantes, deinde calidioribus vsu præfidiis, maiorem noxam intulerunt.

*De lumbricis.*

CAP. LVII.

**T**Res sunt vniuersæ lumbricorum differentię: prima rerum secundum crassitiem, altera latorum, tertia eorum quos ascaridas nuncupant. Origo omnium generum est ex cruda, crassa, pituitosaq; materia & putredini accommoda, qualis in pueris aliisque voracibus colligitur: nō autem ex calida, acri, aut melancholica substantia. Hę siquidem alimenti naturam egressæ, lumbricis procreandis ineptæ redduntur. e contrario autem, biliosa potissimum recrementa



etiam hos perimunt. At si quando flava bilis una cum lumbricis infra, aut etiam vomitu eruperit, ipsos quidem intestina obsidere, humorem vero biliosum ventriculi os aut aliam quampiam particulam occupare scito. Cuiusque igitur ipsorum differentiae speciem, generationem, locum, notas, curationemque exequemur, à rotundis exorsus.

*De rotundis lumbricis.*

TERETES igitur lumbrici speciem habent omnibus perspicuam, quod sanè aliis frequentiores sint in gracilibus plerumque intestinis consistunt, & superiore ventriculum subeunt, ideoque frequenter per os reiciuntur. quibusdam & è naribus redditum sunt: atque hoc genus infantibus peculiare & plurima parte cum febricula: sed per febrium initia, orti, substantiam ex subiecta corruptione retinent: in statu, ex malitia morbi: in declinatione, toto ad melius mutato. Etenim Hippocrates memoriae mandavit bonum esse indicium teretes lumbricos prodire cum morbus ad iudicationem tendit, qui subito etiam intereunt. Sequitur autem eos qui rotundos lumbricos continent, rosio intestinorum & ventris, tussis exigua cum siccitate irritantes: nonnullos comitatur singultus quoque, & somnus cum palpitatione, itaque sine ratione expergiscuntur, nonnulli & cum clamore expergescunt, & iterum sopiuntur pulsus inaequales & febres augescunt inordinatè, quae cum extremorum perfrictione, tertiam, interim quartam, die vel nocte accessionem sine rationem habent. Infantes autem etiam mandent lingua inaniter exerta, & dentibus strident, oculis coniuvent, voluntque coquiescere, excitantibus ipsos indignantur, oculi apparent, genaeque rubescunt, ac rursus liuent: atque haec paulatim & ex intervallo. Quibusdam nausea & rosionis causa stomacho peculiare creatur, atque acri cibum respuunt, compulsi autem ad cibum nauseabundi vix quod assumitur deglutiunt, vel etiam assumptum reuomunt, plerisque vero alius descendit corruptos cibos egerens, & tympani modo inflatur. Reliquum corpus sine ratione contabescit, neque esurie, neque euacuatione modica suborta. Atqui non in omnibus omnia quae iam commemorauimus signa inquirere oportet, sed nonnulla ex eo quod praepollet, interim & plurima. Haec autem eueniunt, dum animalia per intestina serpunt roduntque, febris autem calor vapores sursum cerebro transmittit prauos, ex putri



putrida in vetriculo collecta humiditate exhalantes, in quibus amborum partim similiter curam habere conuenit & febris & lumbricorum, partim de febre parum solliciti, lumbricos de corpore eximere conuitemur. Multi siquidem nulla lumbricorum cura habita, exesi ab ipsis sunt, & conuulsi interierunt. Alij produnt se lumbricos vidisse, qui ex inguinibus acri eruperint. Cæterum occisos hos omnes prius educes: occides autem, amaris potissimum vsus remedijs. Cum igitur febris & lumbricorum communis sit curatio, cõueniẽt auxilia simpliciora: potui igitur dabitur chamæmelorum decoctum vel myxariorum, vt appellant, vel ipsa myxaria decocta esui dantur: item sereos succus, aut coriandri semen cum aqua calida vel cum posca, vel myosotidos herbæ decoctũ, vel cornus ceruini ramentum, vel minium synopicum tenuissimum, ac olei immaturi amarissimi paulatim cochlearia duo absorbeãt, quã enim amarũ est, lumbricos occidit: quã lubricum, detrahens ipsos cũ stercore reddit. At si inflammationem distentionemq; viscera experiantur, cataplasmate vtendum est, quod lini semine, farina leaceæ, absinthio & bryoniæ radice constar, ex hydromelite vel etiam humido fotu ex oleo chamæmelino, vino, absinthij semine, & aloë, præcordijs accomodato. Vbi vero nõ vehementer febres molestant, miscenda est myxariis mentha & exhibenda est. Cum ad integritatem ventum est, efficaciora quoq; vsurpantur, quale est decoctum seriphij vel calaminthæ, vel filicis, vel cardamomi semen, vel mali punici acidi radice ius ad tertias redactũ, vel fricti cumini, vel nitri fului, singulorũ scrupula tria, vel sandonicũ vel abrotanum, vel etiã ambo simul, cum melle in catapotia coacta, vel lupinorum amarorum scrupuli terni vel brassicæ, vel erucæ semen læuigatum, vel absinthinum, quod etiã solum frequenter abundẽ fuit. Dantur autem & terna lotæ aloë scrupula: quod remediũ est laudatissimum: in validioribus illota quoq; aloë vtimur. quia vero infantes aloẽ cochleari non admittunt, supinis fasciola ipsis detẽtis, ore ad apertum per clysterium quoddam valido munitum canali, inuitis aloẽ quã penitissimẽ transmissam iniicimus. Atq; hæc mirifica medendi ratio in pueris est, qui difficulter possunt tractari: quibus etiam cibos subinde sorbiles, quemadmodum iis qui cibum auersantur, infundimus. Cæterum & cyphi &



masuaphium rectè dabitur, item cornu ceruinum combustum cum pipere & melle vel oxymelite, reliquæque ex oxymelite ipsis dare conabimur: præstiterit autem si acerum scillinum fuerit, præsertim ætate prouectioribus, aut sinapis cum oleo & aceto ad cochlearis magnitudinem. At qui lumbricis, cum alui profluuiio infestantur, præbent plantaginis succum, ipsamq; plantaginem aridam assument, ex æquopartibus enim utriq; & fluori & lumbricis efficax est. Cataplasma huius accommodabitur ex farina ordeï cruda, filici, absinthio, farina lupini, sandonico & abrotano. Iam vero & malicorium acacia, galla, vel balaustium admiscebitur. Quoniam vero nonnulli subinde amaras portiones ceu ingratas respuunt, ex iis quæ modò comprehensa sunt, dabuntur non manifestè amara. His accedent insuper chamæpitrys, marrubium, helenium, baccæ lauri, acacia, thymus, pulegium, carpesium, iuncus odoratus angulosus, polypodium, iris, cnicon, erythrodanon, spinæ ægyptiæ cum pipere, singula sex scrupulorum instar: item decoctum menthæ, mori radicis succus decoctum uero, petroselinum reliquæq; odorata semina. extrinsecus autem inducitur aloë cum melino & vino. hoc & appetentiâ excitat, quæ vix magno negotio recipitur: miscetur autem sæpius aloë absinthium: aut felle taurino, cum amaris quibusdā prædictis umbilicum impleto: aut oleum ex rhododaphne factum sæpe delinetur, aut liquor cedrinus & solus & cum cerato, toti ventri imponitur, aut pix arida trita inspergitur, vel mentha, vel melanthium cum rosaceo, vel etiā seriphij decoctum ipsis admiscebitur, vel fraxini persicæ folia in pollinē detrita applicamus. Utendum verò est & medulla cerui, vnguinis modo, in umbilico, inferiore ventre & lumbi: ceratumq; adiungatur, si res postulet, hoc, Aloës, absinthij, farinæ lupini, seriphij, melanthij, singulorum scrupula sex, ceræ vncia & semissis, chamæmelini quod satis est, felle taurino arida lauigantur. Porro ab inferioribus partibus mulsam iniicere sæpius expedit, quò lumbrici mellis dulcedine illecti deorsum descendant: si autem putrefacti in alto corporis non excernantur, sed potius vapores sursum mittant, educendi sunt, aut aloës, aut medicamenti amari ex ea confecti potione, quandoquidem etiam in aliis mediocris alui vacuatio, non expers est præsidij.

† Integra huius loci scriptura est in antiq. codice. ὁ πρῶτος τοῦ αἵματος ὁ δὲ δεύτερος, oculi caui apparent.

De



*De latissimulmbricis.*

**L**A T V S lumbricus mutatio est ( vt ita dicam ) adnatæ in anteriori intestino membranæ in materiam animalis modo nobilem , quæ sæpe tota redditur longitudine incredibili , vel pars ipsius excernitur : dissolutus vero , non coalescit : & nunc in iis etiam qui febri carent , abundat : nunc febricitantibus accidit , ex longo morbo continuas stomachi rosiones inferens , ac impotentem ciborum appetentiam . Nam quod animatum euasit , in intestinis obiectum rapit alimentum , vñ alio statim opus sit , & nisi assumpserit , intestina rodantur , His occupatos comitatur corporis gracilitas & pulsus inæqualitas , cum inæqualitate : at quod certissimum est indicium , cum recrementis nonnulla semini cucurbitæ similia excernuntur . Curatio concordat , potio enim ex acris pectita , & aliorum esus , tum filicis vel centaurei decoctum , & potum & ab inferioribus partibus inditum , vel calaminthæ vel dictamni , vel pulegij : dabitur autem in aluum & muria . Præbire vero hoc medicamentum quod sequitur , neq; iis qui aliis lumbricis infestantur , inutile est , si febre potissimū vacauerint . Nitri rubri , piperis , cardamomi pares portiones : datur terni scrupuli cum vino aut aqua calēte . A L I V D eclegma . Piperis , baccarum lauri purarum , cumini Aethiopici , mastiches , pares modi , mellis quod satis est : datur cochleare vnum mane , & dormituro . At si efficacius id fieri desideres , nitri quoq; rubri parem portionē adicies . A L I V D . helenij , suffiminis ammoniaci , piperis in alio filicis , singulorum drachmæ quinque , cum oxymelite calido : tempore interposito dabitur euphorbij drachma , vel duæ prouectioribus potui . A L I V D . Filicis acetabulū , nitri drachmæ duæ , datur vnum cochleare aquæ euacuatione prius facta : satius autem erit si etiam scammonij momentū assumat . A L I V D . Mali punici acidi radicem corticis in summo decorticati drachmæ quatuor , piperis tātundem , cardamomi drachmæ sex , marrubij drachmæ duæ , melle dantur , porro prius assumpto . Verum vt ex toto affectus discutiatur , theriacem quoque exhibebis , si valida febris non prohibet .

*De ascaridibus.*

## CAP. LVIII.

**A**scarides , vt modò etiam diximus , specie lumbricorū continētur , vermib⁹ similes quæ in extremo lōganone

&amp;



& musculi anum stringentis *σφιγνς* Græcis dicitur, initio reperiuntur, vehementem locorum horum pruritus excitantes: generant speciem hanc praua alimenta, perfrectio, & ciborum corruptio. Vacuari, igitur debent in infantibus, glandibus ex melle, cum salis momento, vel nitri: in prouectioribus, acri muria, aut decocto centaurei, cum nitro & melle, aut cucurbitæ syluestris, aut absinthij, aut chamæleotis, aut anchusæ, aut cnici, aut hyssopi, aut pulegij, aut calaminthæ, aut lupinorum: secundum clysteres sublinetur longanon, simplicibus quidem, acacia, aut hypocystide cum nitro, aut rhu syriaco cum alumine liquido: at quibus aluus astricta est, lemnia sphragide, cum vino: compositis autem Andronis pastillo, similibusq;. Cedrinus autem liquor ipsis iniicietur per clysterem multis peruium foraminibus, quales ab utero metrenchytæ appellantur: aut carnem salsam commodè impositam deligamus, quamdiu sustineri possit, eamque frequenter mutare oportet. Caterum communiter omnes quos lumbrici male habent, pili ichneumonis iuant, suffiti. Cibi præscribentur ipsis probi succi, & qui facile in membra digeruntur, nec lumbricorum effectricem causam adaugent, nec vires superari permittunt, propter quas & vinum aquosum exhibebimus: frequentius autem nutrire ipsos ob hoc ipsum oportet, ne alimenti expertes lumbrici rosiones pariant. dabitur autem cibus, tum præcipuè quum potissimum nutriti magis fuerint. At si alui profluuium fuerit, sciendum est lumbricos magis abundare, cibo non distributo, ac iam sorbiles agris cibi dantur, admixtis quibusdam etiam astringentibus, verbi gratia, pyris, aut malo cotonio, aut malis punicis, præcipuè acidis, à foris autem ventri remedia continentia inducuntur, de quibus supra dictum est.

## De dracunculis.

## CAP. LIX.

**I**N India & superioribus Aegypto locis dracunculi generantur, ceu animalia quædam lumbricos imitantia, in partibus musculosis, puta brachio, femore, tibia: in pueris etiam latera sub cute perreptant & palam mouentur, deinde cum diu extremum aliquod dracunculi remanserit locus suppurat, & cute ipsius adaperata, initium ipsius progreditur: cum trahitur, dolores mouet, præcipuè abruptus. Quapropter nonnulli dicunt plumbeam molam ex dracunculo sus



aspiciendam ne vniuersim, sed particulatim molis pondere decidat. Alij verò hos damnant quòd nihilo magis ponere molis plumbeæ dracunculus abrumpatur, & dolores varios concitet. iubent partem in aquam dimitti calidam, quò dracunculus tepesfactus foras prorepat, deinde digitis ipsum membratim extrahere. At Soranus neque animal horrusus, sed nervosi cuiusdam substantiam esse putat, quòd opinionem motus solum præbeat, siue autem hoc sit, siue quod prius dictum est, Sorano & Leonidæ, aliisq; visum est, calida superfusione & cataplasmatibus concoquentibus in his uti ex mulla, farina triticea, aur hordeacea. Est cum emplastri vsu eiusdem potentia probant. Conuenit autè & quod ex baccis lauri & quod ex melle constat: emortui siquidem horum vsu dracunculi, nimirum quod continetur corpusculum excidit. Suppuratione autem facta, nisi exciderit, cutis diuidenda est: vbi denudaueris, quod continetur auferes, & cutem linamento penetrabis, ac deinceps eam curandi rationem adhibebis quæ puri sit maturando.

\*

## FINIS IIII. LIBRI PAVLI AEGI-

NETAE, IOANNE GVINTERIO

MEDICO INTER-

PRETE.

\*



## PAVLI AEGII

## NETAE LIBER V.

IOANNE GVINTERIO

ANDERNACO IN-

TERPRETE.

\*

*Quomodo quis ab omnibus communiter virulen-  
tis bestijs se tueatur.*

## CAPVT I.



DE VIRVLENTIS bestiis præcipientes, ab  
iis quæ in omnibus huiusmodi communi-  
ter proficiunt, exordiemur, ita, vt quomo-  
do quis ab illarum iniuria se tueatur, prius  
expediamus. Si igitur aliquis necessitate  
quapiam coactus, loco feris frequenti ob-  
dormiat, vbi potissimum salamandræ aut phalangia, aut  
serpentes aliqui abundant, horum cauas latebras allio in  
aqua detrito, aut aliqua ex herbis quas exponemus, obtura-  
re conuenit. Suffitus autem rectè excitantur ex cornu cerui-  
no, caprarum vngulis pilisve, lapide gagate, bitumine, bdel-  
lio, galbano, cupressi aut cedri rasura, melanthio, peucedano,  
viticis foliis, nepita, sagapeno, castorio, cachryos radice,  
cunila, aut ex reliquis grauitè olentibus aliquo. Culces au-  
tem propriè persequitur suffitus ex atramenti sutorij, me-  
lanthij syluestris, seminis cumini, paribus modis. item fimus  
bubulus eosdem fugat. Ad hæc etiam ignes incendere cre-  
briores vincit, fugiunt enim magna parte feræ eorum  
splendorem. Cæterum torum substernere ex hastula regia,  
nepita, vitice, pulegio, polio, cunila bubula, abrotano, ex-  
pedit. At si toto huiusmodi toro vti non datur, † stratis sal-  
tem imponenda sunt. Iam vero animum adhibere oportet  
iis quæ coquuntur, aquæ & vinorū cadis, vt exactè sint oper-  
culati. Focus autem non sub arboribus quibusdam excita-  
bitur,



itur, præsertim pinu aut picea. in his enim salamandræ, & cruceæ lethales crebræ versantur, quæ ab ignis tepore calefactæ, decidunt in obsonia aut alia vasa, si non fuerint operata. Qui vero tutiores esse volunt, iis cõuenit etiam ceratum corpori oblinere liquidius, ex cera, rosaceo, galbano modico, scobe ceruini cornus exigua, vel etiam æthiopico cumino. peculiariter autem maluæ folia cum oleo detrita si illinantur, ab apum & vesparum morfu præseruant.

† Hæc ita leguntur in antiquo libro, περιε γέν τῆς τοῦ μύου ἀντιδιδύαι, id est, circum lectum saltem ipsa ponere oportet.

*Communis omnium qui à virulento quopiam morfi vel icti sunt, curatio.*

CAP. II.

**Q**uod si feriri aliquem aut morderi à venenato animali contigerit, homo adhibendus est qui vulnus exugat, non tamen cum ieiunum esse oportet, verum etiam vino os colluisse, & oleum in eo continere. Deinde particulæ commorsæ, si admittit, cucurbitulam cum multa flamma adhibere oportet, sicut vicinæ etiam partes scarificentur. Nam virus vnà cum sanguine, & spiritu rursus ita extrahitur. Item exulcerata adurere ac crusta obducere, adeoque præcidere conueniet, si fera quæ momordit, lethalis fuerit, quales aspis, cerasæ, vipera, similesq; aliæ sunt quemadmodum Galenus memoriæ prodit, vinitorem quendam à vipera morsum, vbi feram cognosceret, falce læsum digitum statim abscidisse, atque in totum periculo liberatum. At si venenum per corpus fuerit dispersum, sanguis statim demittendus est, præcipuè si is qui percussus est, plethoricus existat exhibere cum cibus edendum piper aut allium conducit: potui, vinum validum: recentibus vaporibus, & conuenienti naturæ caliditate, corporis temperamentum reple re, deinde iis oblinere, quæ commorsam partem possunt calefacere, & vellicare. Imponetur itaque cinis brassicæ aut fici aceto mistus, aut lixiuia, aut garum, & cape cum polenta aut pane: item porra abūde cum sale, aut pix liquida cum sale, calida: aut cedrus, aut fimus caprillus. Conuenit autem ipsis acetum calidum quoq; superfundere, in quo nepita sit incocta: aut acetum & aquam marinam aut acetum cū muria. Cæterum locis affectis gallinæ, & magis galli gallinæ, aliæve animantia per medium dissecta, calida imponi debent. Nā virus transsumunt euocantq; , & dolores mitigāt.

Emplastr



Emplastra quoque vtiliter applicantur, tum hoc quod sale  
tum illud quod cachry & adarce constant: in totum, quæ a  
rioris sunt potentia. Omnes vero communiter & morfi, &  
icti à quocunque tandem virulento animali, præterquam  
interiora omnino offensa non sint, potabunt serin, aut erio  
cen, aut astragalon herbam cum aceto, aut bitumen, aut  
paliurum similiter, aut veteris rhu decoctum, aut mustela  
inueterata drachmæ duæ ex vino sumptæ, præfenti sunt res  
medio, vel marinæ testudinis sanguis, aut castorei drachma  
cum diluta vini portione, aut roris marini tantundem, aut si  
cyoniæ radicis aut porri succus, aut chamæpitys, aut smyr  
nium, aut cinamomum, aut aristolochia, aut viticis semen,  
aut cupressi pilulæ, aut seseli, aut piper, aut trifolij semen,  
aut baccæ lauri, aut cæcer fluuiatilis tostus aut elixus: item  
composita hæc Theriace vtilis est.

*Theriace aduersus virulenta & lethalia venena, viperæ mor  
sus, & scorpionis ictus.*

BRYONIAE, opopanacis, iridis illyricæ, roris marini ra  
dicis, zingiberis, singulorum drachmæ quatuor, aristolo  
chiæ drachmæ quinque, lachrymæ thuris, rutæ syluestris,  
singulorū drachmæ tres, farinæ crui drachmæ duo: singun  
tur pastilli vino, danturq; singuli qui treis obolos pendeāt,  
ex eodem vino. Caterum purgatio omnibus conueniet, de  
sudationes, & theriace ex viperis assumpta.

*De rabiosi canis morfu, & metu aquæ, quæ hydrophobia dicitur.*

C A P. III.

**E**Xordium sermonis à rabiosi canis morfu capere, quàm  
ab aliis maluimus, quòd animal & fœcundum prouen  
tu, & contubernale homini existat, rabieq; sæpius corripia  
tur, & ægrè caueri possit, ac periculum ab eo fit inuitabile,  
nisi multis aliquis & conuenientibus vsus fuerit præfidiis.  
Rabiunt canes plerunque in æstu vehementiore: vt autem  
Lycus memoriæ mandat, interim etiam per frigora maxi  
ma: rabidi autem & potum & cibū auersantur, siti premun  
tū, neque tamen bibunt: anhelant præterea non parum, au  
res inclinant, saliuam & copiosam & spumantem ædunt,  
muti in totum sunt, & veluti insani, vt ne domesticos qui  
dem agnoscant: infiliunt itaque sine latratu omnibus pari  
ter & bestiis, & hominibus, mordentq;. vbi momorderint,  
statim quidem nihil molestiæ adferunt, præterquàm ex  
vulne



vulnere dolorem: postea verò aquę metum, hydrophobiam Græci appellant, faciunt, qui cum cōuulsione, totius corporis rubore, præsertim faciei sudore, & anxietate accidit, aquam fugiunt, & dum vident, & dum admoventur: nōnulli etiam omnem humorem: alij canum ritu delatrant, & obuium quemque dentibus appetunt, morfuque suo in alios eandem affectionem transferunt. Porro accidentium, aliorū quidem causa manifesta est, occupatis scilicet veneno partibus vniuersis: metum verò aquę nonnulli ex immodica fieri siccitate dixerunt, quasi humida ipsorum substantia in contrarium penitus habitum mutata. verum Rufus talem melancholię speciem ipsis oboriri pronuntiauit, veneno humorem illum imitato: quemadmodum alios melancholicos nouimus alia timere. quę causa superuenit etiam iis qui dicunt canis qui momorderit imaginem in aquis opinari se videre. At ex iis qui hoc vitio sunt occupati, nullum, præterquam vnum aut alterū, superuixisse, ex historia didicimus, eosque non à rabioso cane morsos, sed ab homine quodam morso vitium adeptos. At ante affectus huius occupationē multi etiam quos canis momordit, seruati sunt. hinc igitur curatio auspicanda est. Quoniam verò subinde, eo quod tūc aquę metus non inuadat, (magna enim ex parte circa quadragesimum ferè à morfu diem solet ingruere, quibusdam & post sex menseis, proditum est nonnullis post septē quoque obuuisse) nonnulli canem qui momorderat non rabire arbitrati sunt, properarunt vulneri cicatricem inducere: vnde ipsi causam huic affectioni dederunt. hac autem probatione vsus deprehendes, morsus rabiosi ne canis fuerit, an nō. Iuglandibus nucibus concisis vulnus diligenter obstruitur, sequenti die ablata, gallinaceo, aut gallinæ in cibo apponentur: ac primum sanē non attingent, fame autē vrgente si edant, rem considerato. Nam canis qui momordit si nō fuerit rabiosus, viuent: si rabidus, sequenti die peribunt. atq; tunc ad vulneris dilatationem properandum est, iterūque post paucos dies eadem probatione vtendum, & si nō perierint gallinacei, tunc vlcus ad cicatricem perduces, nullum veritus periculum. Hanc itaq; probationem Oribasius tradit. Quod si ex commemoratis indiciis accuratē canem rabire cognouerimus, statim iis medicamentis quę aperiundi vim habent, vtēmur. Primū igitur ex aperiuntibus est, quod



pice, aceto quàm acerrimo, & opopanace constat, in capite de neruorū vulneribus explicatum: at si qui morsum accipit, delatationem cutem habeat dilui: ipsum irino debet aut balsamo, aut eiusmodi aliquo: vel vlcera prius fomentis adiuta, allio obduces. hoc quod sequitur etiam crustam facit.

*Aridum ad crustam in canis rabiosi morfu excitandam.*

SALIS fossitij drachmæ octo, chalcitidis drachmæ sedecim, scillæ tantundem, rutæ viridis drachmæ quatuor, æruginis rasæ totidem, marrubij seminis drachma: vtitor primū arido vt crustam inducat, deinde cum rosaceo, vt crustæ excidant. Cæterum partes affectæ ad dies quadraginta duos, vt minimum, sine cicatrice seruentur.

*Cataplasma quod oras vulneris latas in rabidi canis morfu seruat.*

CEPÆ cum sale & ruta inducuntur, aut laserpitium cū sale, aut salsamentum vetus, aut cinis sarmentaceus cum oleo, aut allia, aut sambuci folia, aut mentha, aut apiastrum, singulatim, aut cum sale: aut iuglandes nuges, cum allio, sale & melle, aut cinis fici, cerato exceptus. vulnus autē aqua abluetur, in qua decoctum sit chamamelum, & syluestris lapathi radix. Nōnulli & ferro candenti vlcus adurunt. Cæterū potui assument cōmorfi, simplicia quidē, lycium, absinthiū, liquorem silphij, chamædryn, scordiū & poliū: composita autem hæc, cancerorum fluuiatilium, sarmentorum vitis albæ, in cyprio vase, aut æreo combustorū, cochlearia duo, gentianæ radicis læuigatæ cochlear vnum, cum vini meri veteris cyathis duobus, ad dies quatuor potui dato. aliqui verò & perdicis sanguinis duo cochlearia addunt. Capiēs autem cancos dum luna increfcit, priusquàm sol exoriat. iis autem qui eodem die non biberunt, duplicem portionem exhibeto, interim & triplicem. Iam theriaca ex viperis rectè datur. Purgare expedit medicamento ex cucurbita syluestri, ita vt quotidie id exhibeas, cum decocto elisphaci, aut sideritidis heraclis, quam & dialyson appellant: nonnulli verò & iecur canis qui momordit, edendum dederunt. Cæterum victus ratio talis adhibenda est, quæ simul veneni vireis hebetet extinguatque, simul & descensum ad interiora prohibeat: quæ duo præstare potest, vini dulcioris vetusti & meraci, lactisque potio. idem efficiunt allia, porri & cepæ in cibo sumpta. At si per initia ob impedim



dimentum aliquod non præsumpta quæ retulimus remedia fuerint, carnis præscissio vel cucurbitulæ vel vstio non adhibenda est, vt quum iam venenum penitus secesserit: medicamentis autē quæ euocent, Græci metasyncritica vocant, vt consilium est, aquæ metu videlicet non oborto. purgatio ex hiera & scissili lacte petetur. item sudoris euocatio, dropacismus & sinapismus, toto corpore particulatim adhibebitur. omnium tamen efficacissima deprehensa est purgatio quæ fit per veratrum.

*Ad morsus canis non rabiosi.*

CAP. IIII.

**C**anis non rabiosi morsus, quum & ipsi virulentæ cuiusdam substantiæ sint participes, statim aceto irrorans, lata manu morsum ferito, in super nitrum cum aceto tritum ex alto in partem fundito, deinde spongiam recentem aceto, aut ipso nitroso aceto madidâ imponito, triduo id ipsum superfundens, tandem enim consanescet: vel erui farinam oleo maceratam imponito: aut spongiam recentem, aut lanam succidam aceto & oleo imbutam accommodato, aut rubi folia cum aceto tinsa inducito, aut cepam tritam cum melle, vt origani comæ, salis, cepæ, pares singulorum modos cum melle: vel marrubium nigrum, quod & balloten dicunt, cum sale. ad feruidos autem iam morsus, erui farina melle macerata admouetur. peculiariter enim his efficax est: in inflammatione confluentes, argenti spuma trita ex aqua oblinito.

*De vespis & apibus.*

CAP. V.

**A**piū ictu dolor sentitur, locus rubescit, propinquæ partes tument increscuntque, aculeus in vulnere relinquitur. In vespis autem similia quidem, sed intensiora omnia sunt, nec aculeus relinquitur. Remedio sunt aduersus vtraque lutum, & bubulus fimus, illita: & lac ficulneum, aut læuigata mori arboris folia, aut malux: aut farina ordeacea ex aceto imponitur. quinetiâ muria aut marina aqua fouere conducit.

*De phalangijs.*

CAP. VI.

**P**halangiorū morsu, locus ipse quidem rubescit, & veluti punctus per ambitum apparet, nō autē tumet neque incalescit, sed leniter rubidus frigore & pruritu vexatur. Comites notæ percussorum sunt perfrictio, tremor, corporis



grauitas, sudor frigidus, dolor validus, pallor, continua vrinæ excernendæ incitatio: quibusdā & vrinæ difficultas, colicis intensio, oculi hument: inguina & poplites intenduntur rigentq; cōuulsorio modo, valida stomachi rosio vrget, lingua sermonem manifestò non explicat, vomitus aquæ vel aranearum textis similium erumpit. sunt etiam quibus per vrinās, & aluum eadem descēdunt. demissi igitur in aquam calidam dolore liberantur, ac rursus validè indolent. Auxilio est, si extrinsecus cinerem ficulneum cum sale læui ex vino maceratum, imponas: aut radicem syluestris punicæ tritam, aut aristolochiam, cum farina ordeacea aceto madefactam. Iam & vlcera fouere marina aqua calidiore, aut apiastris decocto, cōducit, eiisdemq; folia imponere. ad hæc balneum frequentius vtile est, atq; his potionibus medicis vti: abrotani semine, anetho, aristolochia, agresti cicere, cumino æthiopico, cedri baccis læuigatis, platani cortice, trifolij herbæ feminæ, myricæ semine, singulorum drachmis duabus cum vini cyatho & viridium cupressi foliorum aut pilularum decocto, vino temperato. Ferunt nonnulli & cancrorum fluuiatilium succum cū lacte & apij semine datum, periculo subtrahere.

*De araneæ ictu.*

## CAP. VII.

**E**st quoddam etiam aranearum genus quod percussu validos dolores circa media præcordia excitet, item ruborem, & vrinæ difficultatem, nonnunquam & suffocationem. Leuantur autem ictu hisce remediis: cumini syluestris thebaici, aut viticis feminis, aut albæ populi foliorum potu, vel alliis solis assumptis & vino meraciore superbibito iuantur.

*De scorpionis ictu.*

## CAP. VIII.

**A**scorpione ictis locus quàm primum inflammari incipit, duratur, rubet, & cum dolore circumtenditur, nunc feruor, nunc frigus vicissim inuadit, acceditque dolor qui itidem modò decrescit, modò intenditur. comitatur ipsos sudor, horrois sensus, tremor, extremorum perfriictio, inguina his attolluntur, particula intenditur, sæpe etiam flatus cum sonitu per sedem erumpunt, pili rigent, cutis fit discolor, dolorque tota cute affligit, ceu acus spiculo excipit. His auxiliantur protinus, lac ficulneum instillatum vulneribus, ipseq; scorpio qui percussit minutim contritus, vneriq;



neriq; impositus, sibi remedium est. post hæc est sal tritus cum lini semine salutariter imponitur, item althææ herbæ semen: succurrit & sulfur viuum resina terebinthina exceptum: similiter etiam galbanum splenij modo dilatatum impositumq; nepitæq; læuigata & applicata, & ordeacea farina in vino parata & in rutæ decocto exhibita. auxiliatur his etiam trifolij herbæ semen læuigatum iniectumque. Ad hæc, potiones hæc conueniunt: aristolochiæ drachmæ duæ, præsertim corticis cum vino, gentiana tusa, pulegiumque abundè decoctum, item baccæ lauri numero decem læuigatæ, nepita cum posca largiter incocta, cyperis cum vino, ruta similiter, lac ficulneum & laserpitium, si adsit, si desideretur, parthico liquore vtendum erit. benefacit etiam trifolij ocimique semen epotum. idem præstat argenti spuma subito ictui præter opinionem imposita omnium autem horum vicem præstat balnei continuus cum multo sudore vsus, vini potio plenius diluta. Porro composita hæc potari debet: sulfuris viui fabæ Aegyptiæ instar cum piperis granis octo, in dimidia vini hemina: vel liquor laserpitij cum cancro detrito in vino: aut melanthij, cumini æthiopici, viticis seminis, pares portiones cum vino.

*Ad scorpionum periculosorum & phalangiorum ictus.*

Fecis drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ quatuor, rutæ syluestris seminis drachmæ tres, castorij, erucæ seminis, singulorum drachmæ duæ: excipiuntur sanguine hirudinis marinæ. dantur quaterni oboli cum vini meraci vel aceti cyathis tribus. A L I V D. Pyrethri, aristolochiæ, singuli trientes, piperis drachmæ duæ, liquoris laserpitij drachma: exhibetur ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem.

*De scolopendra terrestri & marina.*

C A P. I X.

**A**T si scolopendra momordit, communiter quidem locus affectus in orbem liuescit attolliturq; aliquando feci similis, rarius autè ruber apparet, exulceraturq; statim ab ipso morfu adeo vt vix magno labore curari queat. præter hæc etiam toto corpore pruriginis sensus percipitur peculiariter autem iis qui à marina scolopèdra impetiti sunt, aquosus pellucidusq; tumor interim efficitur: à terrestri, rubens. Plagæ igitur imponi debet sal bene tritus vel ruta læuigata, aut cinis aceto maceratus, aut scilla. Fouendus locus



est muria cum aceto. Archigenes autem oleo calido libera-  
liore fieri id iubet & prædicta sic imponi. Potui dabitur ari-  
stolochia cum vino, aut serpillum, aut calamintha, aut syl-  
uestris ruta, aut trifolium, aut succus radicis hastulæ regiae  
dimidiæ heminae mensura cum vino.

**S** Ad stellionis transmarini morsum. CAP. X.  
Esamo trito cataplasmatibus modo obducito.

De fele. CAP. XI.

**Q** Vi à fele mordentur, validè quidem dolent, & locum  
affectum liuidū habent, sed statim cepæ & allia ictui  
applicata, auxiliantur. in super eorundem esus, vino meraco  
superassumpto, remedio est.

De mure araneo. CAP. XII.

**V** Bi verò mus araneus nocuit, sequuntur dolores pulsati-  
les, & in singulis detiū eius animalis ictibus, rubores: pu-  
stula insurgit sanioso humore plena, propinquæ partes o-  
mnes liuent: cute pustulæ dirupta, album vlcus apparet. nam  
ad membranas nervosas deraditur. ad hæc, excidunt etiam  
partes exesæ de passionibus oborta, his quæ serpunt simili: præ-  
ter ea etiam intestinorum tormina comitantur, vrinæ diffi-  
cultas, & frigidi madoris vndique eruptio. Auxiliatur ipsis  
galbani spleniū per se impositum, vel tritum cum aceto, vel  
ordeacea farina, cum oxymelite applicata, ipseque mus ara-  
neus qui momordit dissectus admotusque sibi est remedio. ad-  
uersatur etiā pyrethrum illitum, vel mali punici dulcis co-  
rium incoctum, vel malua syluestris, vel allia contrita, vel  
sinapi læuigatum cum aceto: itē ex calida muria fots con-  
ducit, deinde ordeū vsum ex aceto applicatum. Potui pro-  
pinabitur abrotanum ex vino coctum, aut sisymbrium, aut  
serpillum, aut eruca, aut galbanum, aut elelisphacum, aut  
teneræ cupressi pilulæ cum oxymelite, aut pyrethrum cum  
vino, aut chamæleontis radix, aut hœdi agnive coagulum,  
aut gentianæ radix, aut verbenaca, quæ etiam imponitur  
cataplasmatibus modo: ipsumque murem qui momorderit, exa-  
ctè detritum cum vino bibunt. Efficax hoc etiam quod se-  
quitur: myrrhæ drachmæ sex, aristolochiæ corticis drach-  
mæ quatuor. porrò ad muris aranei & scolopendræ mor-  
sum, sal cum liquida pice rectè applicatur, aut cedria cum  
melle, aut allium cum fici foliis & cumino, aut calaminthæ  
folia, vel ordeum etiam cum aceto.

De



*De viperæ tum mare tum fœmina.*

## CAP. XIII.

**I**N viperæ tum maris tum fœminæ morfu similiūmve ani-  
malium virus iaculantium, dolor loci statim ab initio se-  
quitur, mox totius corporis: apparent etiam in morfu duo  
foramina paruo inuicem spatio discreta, fluitq; ex his san-  
guis humorq; saniosus, deinde oleosus, postremò etiā ærugi-  
nosus, quem nonnulli virus viperarum esse dicunt. præter  
hæc tumores iuxta morsum subrubri liuidique assurgunt,  
corporis color perit: vertigines oculorum, stomachi resolu-  
tio, & animæ defectus oboritur, quibusdam etiam vomitio-  
nes biliosæ, vrinæ angustia: insuper pustulæ in commorsa  
parte erumpunt, veluti in ambustis: item depastio ipsam in-  
uadit, ad viciniā procedens, gingiuarum his cruentatur, accedit  
etiam tremor, sopor, & frigidi sudores. minori autem cum  
periculo liberari, quos viperæ mas, quàm quos fœmina mor-  
dit, videntur: ex his ipsis minus periclitantur qui ci-  
bum præsumpserunt. In curatione autem præstantissimum  
remedium est, alij esus, & vini meraci potio, adeò, vt si ali-  
quis vti sustineat, nullum præterea remediū desideret. edun-  
tur etiam vtiliter & porra & cepæ & salsamentum quàm a-  
cerrimum. Sunt qui & ranas in cibo elixas dederunt. bene-  
faciunt & hæc quæ sequuntur cum vino singulatim pota: te-  
studinis marinæ sanguis resiccatus cum cumino syluestri,  
coagulum leporis, aut hinuli tribus obolis, ceruini genita-  
lis sicci, anchusa tenuifolia tota, hanc autem nonnulli etiam  
collo suspendunt, porri succus dimidiæ heminæ mensura ex-  
mulsa, apiastri foliorum succus, syluestris ruta, gallinarum  
cerebrum, panacis radix cum vino incocta, agarici drachma,  
iuniperi baccæ, hastulæ regię radix, pistacia trita, viticis se-  
men, mustelæ inueteratæ siccataq; drachmæ duæ: echini ra-  
dix succusq; canceri fluuiatiles aut marini per se, cumq; her-  
ba pedicularia, sale & polio: aristolochiæ radix cum myr-  
rha, gentiana, baccis lauri, æquali modo melle excepta. atq;  
hoc quod subiungam mirificè efficax est.

*Oribasij ad viperarum morsus.*

Anisi acetabulum, piperis, drachmæ quatuor, aristolo-  
chiæ corticis, opij, castorij, myrrhæ, singulorum drachmæ:  
passo læuigata in pastillos instar fabæ Græcæ cogito, & pro  
viribus cuiusque exhibeto, cum ternis diluti vini cyathis.

**ALIVD,** ex Lyci cōmentariis medicamentum viperæ mor-



sibus praesentaneum. Myrrhae castorij, piperis, sandarachae, singulorum drachma, anethi seminis acetabulum: laeuigata ex passio dantur. ALIUD, Ex Archigenis commentariis. Cancros viginti cum farinae triticeae quod satis est, in pila diligenter contundito, admixtaque nepita & salis momento, pastillos fingito & siccato: in usu, cum lacte applicato, vnumque cum mulla potato. At si fluuiatiles canculos desideres, marinis vtor. extrinsecus autem plagae inductus caprarum firmus ex vino strenue auxiliatur: aut lauri folia cum oleo incocta, aut baccae lauri, aut nepita, ericae, ruta, apium, abrotanum, galbanum in splenio adhibitum, origanum viride laeuigatum, gallinacei pulli dissecti, † & protinus calidi impositi: farina erui cum vino macerata crebro emplastri forma illita, raphani cortex laeuigatus, scilla cocta, farina hordeacea ex oxymelite, cucumeis syluestris folia cum tenuissimo farinae ordeaceae polline, fex vini similiter cum farinae polline, ruta cum sale & melle, surfures in aceto coctae, cinis cum aceto, cedrinus liquor cum sale, pix liquida cum sale. Foueri debent trifolij decocto aut pulegij, aut muria aceto adiecto. Quum autem subcruenta pustulae euaserint, ipsas scarificabis, ita ne excories. deinde multa aqua foueto, lenticulam coctam cum melle obducito, dum confanescant. At ex viperis antidotum proprie his & potum & plagae impositum efficax est.

† Melior est vetus cod. ἐπιτιθέμενοι δερμοὶ καὶ συχνῶς ἐπαλλάττομενοι, id est, calidi impositi & frequenter permutati.

De amphibena & scytale.

CAP. XIII.

Consimilia ex horum moribus eueniunt, eademque ipsis auxiliantur, quare peculiarem aliquam descriptionem sortita non sunt.

De drymo. Galeni haec praefatio.

CAP. XV.

Dryinus in quercuum radicibus vitam agens, tam malefica parataque ad nocendum vi est, ut calcatus solum, pedes hominis cute nudos relinquat: totisque cruribus tumorem laxum quera oedema vocant, copiosum excitet. Ad haec quod multo magis est mirabile, ferunt omnes eorum pariter manus excoriari qui curationem vitij administrauerint & si quis vlciscendi studio interemerit, dicunt hunc praeuē admodum olere, illoque suo foetore omnium aliorum odorem sensum auferre. Ictis ab hoc animali tumor circa locum vi-

tium



iatum cum rubore excitatur, pustulæ in circuitu assur-  
unt. aliquando aquosa sanies emanat, stomachi erosio ve-  
at, & torsiones. Congruit ipsis aristolochia vino pota-  
tem trifolium herba, radixq; hastulæ regiæ consimiliter as-  
umpta. prodest cuiuscunq; quercus fructus læuigatus, &  
potus. Itidem ilicis radices tusæ, & loco admotæ auxi-  
antur.

De hæmorrhoo, & prestere seu dipsade.

CAP. XVI.

**Q**ui hæmorrhoi ictum sensere, validos experiuntur cru-  
ciatus, admodum exigua angustaq; redduntur corpo-  
ra ex dolore continuo, multus ex plaga sanguis erumpit: &  
si cicatrix toto corpore inducta fuerit, rumpitur, funditq;  
sanguinem. cruenta excernuntur recrementa, sanguis qui  
defluit, in grumum concretus est: tussi ex pulmone sangui-  
nem reiiciunt, quem euomentes etiam sine remedio inter-  
eunt. A dipsade percussos ardor intolerabilis vrget, sitis tan-  
ta excruciat, vt nec extinguere nec intermittere possit, copiose po-  
tum ægri hauriunt, eadem tamen siti conficiuntur, tãquam  
nihil planè hausissent, similesq; toto habitu sunt iis, qui an-  
tea potus nihil hauserint. vnde propter continuam potus  
assumptionem prester ab vrendo, dipsas à sitiendò serpens  
appellatur. Multi autem veterum ab hæmorrhoo & dipša-  
de commotos ceu desperatæ salutis & conclamatos esse pu-  
tauerunt. Porro si specialia aduersus feram præsidia desi-  
deremus, communia tentare oportet, ac protinus scarifica-  
tionē vñtionemq; adhibere: & si liceat partem vitiatam præ-  
cidere. deinceps autem acria cataplasma imponi debent. vti-  
lia sunt omnium ciborum acrium esus, præsertim quæ ex  
falsamentis petuntur, vini meraci potio, & lauacrum. hæc  
autem continuè, & exiguis temporum interuallis subinde  
adhibenda, priusquam morbi corripuerint. nam vbi illi se-  
mel emerferint, nulla medicorum ope iuuantur. Cæterum  
remedia quæ loco inducuntur, contra morsus inscripta repe-  
rimus, dipsadis quidem, portulacæ folia contrita ex aceto,  
polentam, rubi folia cum melle læuigata, plantaginē, hyssopum,  
allium album, porrum, rutam, vrticam, hæmorrhoi  
præter iam dicta etiam hæc benefaciunt, vitis folia cocta  
cum melle læuigata. per os autem hæmorrhoi ipsius caput  
crematum potui datur, aut allium cum irino oleo: esui dan-  
tur etiam vuxæ pallæ.



*De natrice quam Graeci hydron dicunt.*

CAP. XVII.

**N**atricis morfu vlcus factum dilatatur, & liuescens augetur, sanies ex eo nigra, copiosa, & foedi odoris, qualis ex depascente vlcere, excernitur. Curatio mali, tēporis processu, & vix procedit: imponetur itaq; morfibz origanum laue, ex aqua maceratum. confert & cinis quercus, oleo tēperatus: vel ordeacea farina cum melle deliquato bibitur, item aristolochia drachmis duabus diluta vini potione, vel in poscā duobus cyathis: deinde marrubij succus aut decoctum cum vino, aut nasturtium sylvestre, aut semen hastulæ regiae seu flos, aut foeniculi semen cum vino: item recens fauus cum aceto comeditur.

*De Cenchro.*

CAP. XVIII.

**Q**uod si cenchrus nocuit, morsus eius viperæ similis est, putredo comitatur & carnes intumefactæ prius, vt in aqua inter cutem, defluunt, lethargo veteribzq; premuntur. Testatus Herasistratus est, iecur ipsis, vesicam, & colon affici: resecutis siquidem ipsis, partes quodammodo corruptæ inueniuntur. His igitur lactucæ semen cum lini semine applicatum auxiliatur. succurrit & satureia trita, ruta sylvestris, serpillum cum hastula regia laeuigatum: potui vero datæ protinus, centaurii radice drachmæ duæ cum ternis vini cyathis: aut aristolochiæ radix similiter. nasturtium itidem & gentiana, potu conducunt.

*De Ceraſte & Aspide.*

CAP. XIX.

**T**ria aspidis genera Galenus prodit, primum eius quam chersæam quasi terrestrem vocant, mox eam quæ chelidonia dicta est, tertiam ptyada appellarunt, quæ omnium est perniciosissima. siquidem erecto collo, extensoq; pro distantia loci, ad quem dirigit, venenum in hominem iaculatur. hanc memoriæ tradit, reginam Cleopatram, quum Antonio deuicto Augustus eam capere vellet, sinistræ mammæ admouisse, morsamq; ab ea interiisse, vt quæ longè celerimam mortem inferat. Porro ceraſtis morſu locus cum duritie & pustulis intumescit, emanat ex vulnere sanies, modò nigra, modò subpallida & porraceo colore: totum corpus varicum modo attollitur, genitale arrigitur, mens alienatur, oculi obscureſcunt: postremo, conuulſione vt in tetano pereunt. Verum aspidis morſus acus puncturæ similis, omnino exiguus sine tumore apparet, sanguis non copioſus, sed  
exi



exiguus & niger destillat, subita oculorum hebetudo inuadit, dolor corporis multiplex admodum, sed mitis, nec sine voluptate comitatur. Quapropter rectè Nicander cecinit:

*Et vir perit absque dolore.*

M V T A T V R color & virescit, stomachi rosio exigua infestat, frons continuè reuellitur, palpebræ sine sensu veluti in somno commouentur, atq; inter hæc morsprehendit, ne tertia quidem diei parte dilata. His itaque vtrisque membri affecti mutilatio mox à morfu facta, succurrit: eoque sine mora, si fieri potest, præcidendū est. & in his & propinquis partibus omnem carnem circumsecare statim, & radicitus vsq; ad os excindere oportet. deinde reliquæ ferro candenti excicandæ sunt. etenim horum virus, sicut & basilisci, taurino sanguine similiter, celerrimè sanguinem in arteris & spiritum coagulat.

*De basilisco.*

CAP. XX.

Hæc bestia rarò quidem hominum oculis occurrit. Erastriatus autem hæc inquit: quum basiliscus momorderit, plaga sub aureo colore tingitur. conducunt ipsi, inquit, castorij drachmæ tres potæ. similiter etiam papaueris liquor. Nos autem hæc experti non sumus.

*De pastinaca marina, & muræna.*

CAP. XXI.

IN marinis nempe pastinaca & muræna, agnitio manifestata est, pisces enim hi ab omnibus cognoscuntur. Auxiliantur ipsorum moribus lactis ficulnei guttæ quatuor aut paulò plures, cum ramusculis serpilli tribus aut quatuor, & quæ ad vipersas commemorata sunt.

*De dracone marino.*

CAP. XXII.

Marini draconis ictum plumbo infricato, aut serpillio trito obducito, aut lente elixa, aut sulfure cum aceto, aut dracone ipso euiscerato. foueri locus vrina humana debet, absinthium cum diluta vini potione bibi: aut elelisphacus, aut surculi ficulnei, in dulci vino dilutum, aut piscis ipsius cerebrum.

*De scorpione marino,*

CAP. XXIII.

Scorpij marini ictum sanat nullus piscis dissectus impositusque, sulfur viuum cum aceto infricatum, bacçæ lauri tres tritæ potæque.

*Quomodo testudinis marinae sanguis preparetur.*

CAP. XXIII.



**T**estudinis marinae sanguis in hunc modum prae-  
paratus, reponitur. In ligneo aut fictili vase resupinata te-  
studine, caput ipsius celeriter amputato. concretum autem  
sanguinem in multas partes arundine diuidito, impositoq;  
operculi instar vasi cribro, in sole reponito: siccatum exci-  
piens vitior aduersus viperarum morsus, vt praedictum est,  
drachmis duabus cum vno aceti cyatho. sequenti drachmis  
quatuor, cum duobus cyathis: tertio die, drachmis octo cum  
tribus aceti cyathis.

*De crocodili morsu.*

CAP. XXV.

**A**D crocodili morsus nitrum cum melle tritum vsq; dum  
vltus repurgetur, imposito: deinde repleto melle, bu-  
tyro, medulla ceruina, adipe anserino. Galenus autem tra-  
dit se cognouisse qui a crocodilis commorssi, adipe ipsorum  
imposita vulneribus, exacte fuerint adiuti.

*De hominis morsu.*

CAP. XXVI.

**N**on extra institutum fuerit, cum virulentis bestiis, etiam  
hominis morsus conscribere. siquidem maligniores  
multo aliis vlcibus apparent, praesertim si ieiunus momor-  
derit, prius leguminibus vsus, & praesertim lenticula. Com-  
muniter itaque quae in aliis virulentis commemorata sunt,  
etiam in his extrinsecus per initia moribus applicare con-  
ueniet, praeter ea quae nimium acria, adurentiaq; sunt. pecu-  
liariter autem oleo morsum prius illitum, fœniculi radice  
cum melle obducito, aut lomento cum posca & oxyrhodi-  
no, frequenter immutans. Emplastro autem hoc vttere, quod  
recipit squamæ æris, galbani, æruginis singulorum vnciam,  
ceræ libram, plumbaginis libras duas, olei sextarium: plum-  
bago cum oleo prius incocta assumet æruginem, & squamā:  
vbi coierint, quae liquari possunt adduntur. Finita autē in-  
flammatione, communis vlcis modo etiam hæc curabis.

*De venenis.*

CAP. XXVII.

**Q**um de virulentis bestiis succincte tradiderimus,  
proximum fuerit, vt de venenis sermonem aggre-  
diamur, simplicia quidem referentes eorumq; notas & re-  
media, tum communia, tum specialia: composita autem ex  
studio omitemus. etenim nonnulli variorum medicamen-  
torum lethalium compositiones exposuerunt, quae nocere  
magis, quam iuuare legentes possunt. neque enim exacta  
horum indicia in his qui assumpserunt, inueniuntur, vt etiam  
cong



congruum ipsis remedium quæas adaptare. Quum igitur hæc varia ex superante in ipsis vi appareant, id etiam aliquis rectè quod exhibetur, varium adaptans, nonnunquam ex æquo, nonnunquam ut excellat, medebitur. Incipiemus itaque & hic rursus à præcautione.

De venenorum præcautione.

CAP. XXVIII.

**D**E venenosis medicamentis disciplinæ ea pars quæ præcauere illa, & declinare præcipit, longè difficillima est. propterea quod ij qui huiusmodi insidias homini clàm machinantur, tanto id astu faciunt, ut vel peritissimus quisque decipi possit. siquidem amaritudines venenorum dulci aliquo admixto, obtundunt, grauemq; odorem odoramentis additis operiunt. interim ceu ad sanitatem, salutisq; gratia in morbis hæc propinare crediti, quod genus est ab sinthiū, abrotanum, opopanax, castorium, venena ipsis admiscunt, tum in cibis, puta solidioribus, vel obsoniorum varietate adumbrantes, ipsa offerunt. vnde cui in suspitione huius doli vita fuerit, vitare eum oportet condita elaborataque cibaria, omneisq; in gustu qualitates intensiores, exempli gratia, dulces, acidas, & falsas. potissimum vero aquæ quod satis est præsumere oportet, restincto enim hac appetitu, postea qualitates aliæ à stomacho non apprehenduntur. veruntamen alia quædam ratio asserendi hominem ab iniuriis venenorum, est efficacior. Conuenit enim quum suspicio mali medicamenti accepta fuerit, præcomedisse aliquid quod obtundere venena possit, & inefficacia reddere: cuiusmodi sunt caricæ cum nucibus iuglandibus, ruta, salis grumo, & quæ mala medica dicuntur: item naporum semen drachmæ pondere cum vino, aut nepitæ folia, aut terram quam lemniam sphragidè vocant, aut rutæ folia viginti: nullumq; nocebit venenum. Iam verò antidota cum vino quotidie fabæ Aegyptiæ instar assumpta, tutò admodum præseruant, quale est quod terrestri crocodilo cōstat, dia scincu dicitur, & quod à variorum animalium sanguine dia hæmaton vocatur, & Mithridatium. hoc aliquando etiam ipse rex Mithridates vsus est, quotidie præsumens, ut à lethali medicamento se vindicaret, præseruaretq;. Quum igitur à Romanis captus, bis lethali medicamento epoto, mori non posset, gladio sibi ipsi vitam ademit. Quoniam verò etiam citra insidias propter necessitatem aliquando locis desertis nociuis

versan



versantes, fortè sub arboribus, vt picea aut pinu cibum assumunt, diligenter attendendum est, ne ex his aut superioribus locis mortifera labantur animalia, & vasa, tum quibus hauritur vinum, tum quibus aqua, tum quibus obsonia incoquantur, exactè operculentur, quemadmodum in virulentorum animalium præcautione expositum est.

*Communis venenorum quomodocunq; assumptorum curatio.*

CAP. XXIX.

**A**T si nonnulli lethale venenum sponte sua, vt mortem sibi consciscant, assumpserint, qualia multa in hominū vita solent accidere, aut etiam aliquorum insidiis, siquidem nobis constet quod veneni genus potatum sit, protinus ad conueniens ei remedium descendemus, vt in horum enumeratione dicitur: at si medicamen exhibitum tunc nobis fuerit incertum incognitumq;, conuenit statim ad ea quæ communiter ad quæcunque venena sumpta congruunt, diuertere. Nam indicia quæ comitantur si expectes, nihil planè in medicina spei est, ægris propter moram iam deploratis, desperatisq;. Actutum igitur nulla mora interposita, oleo calenti per se, aut etiam cum aqua exhibito, vomere cogendi sunt. Si eius copia non est, butyrum cum aqua calida ingeri debet: aut maluæ, lini ve seminis, aut tragi frugis, aut fœnugræci, aut vrticæ seminis decoctum. Non enim solum vomitionibus euacuabunt, sed aluum quoque subducent, & venenorum malignitati aduersabuntur, acrimonias ipsorum hebetantia, præsertimq; oleum. quod manifestò inde licet cognoscere. Si nanq; cutis exulcerandæ studio, cantharide aut calce viua, aut eiusmodi quodam acri vtaris, corpus oleo prius oblitum, non exulcerabitur. imò neque corpus astringere potueris, oleo præunctum. Præterea vomitus non modo quod nocium euacuat, utilis est, sed interim haustu venenum odore, concretis grumis, aut colore prodit. odore siquidem & amaritudine, cicutam: colore. cerussam, vel gypsum: concretis grumis, lac aut recentem sanguinem: halitus grauitate: virus qualitate & odore, leporem marinum, & rubetam ranam ostendit, vt per hæc ad accommodata singulis remedia via non sit difficilis. Admiscabitur autem oleo maluæ decoctum, aut anserinus adeps, aut ius ex carnibus pinguibus, vel gallinarum: aut ex lignorum cinere facta lixiua. Facit etiam hac nitrum detritum cum hydromelite  
porum,



otum, vinum copiosum & vetus: & quæ adipe aut butyro  
 constant. Verum iis quæ in ventriculo hærent, per vomitum  
 ablatis: quod intestinis illapsum est, clystere acriore e-  
 vacuabimus. Post hæc lac potui dabimus. nam ab hoc quod  
 efficit, & venenosum est, facile immutabitur. Iam vero me-  
 dicamenta omnibus communiter convenientia offeruntur,  
 quale est, minium lemnium, abrotanum, agaricum, erysi-  
 num, eryngij radix, pastinacæ erraticæ semen, vel nepitæ,  
 cardum gallicum, castorium, medulla viridis ferulæ, nerij,  
 quod rhododendron est aut rhododaphne flores, marrubij  
 succus, laserpitium aut liquor ipsius, sagapenum, opopa-  
 nax, peucedani liquor & radix, aristolochia longa, rutæ syl-  
 uestris semen, folia cestri, quæ betonica dicitur. danturque  
 singula drachmæ pondere cum vino. Efficax in id est, polij  
 herbæ decoctum & picis liquidæ linctus. generosissimè e-  
 tiam opitulantur antidota superius comprehensa, magisq;  
 ex viperis theriaca. non autem easdem vireis habent, si post  
 medicamenta lethalia, assumantur, quas præsumpta. quæ  
 enim ipsoꝝ quantitas præsumpta ad affectum cauendum  
 est sufficiens, hæc si quadruplo auctior, aut quintuplo post  
 præstetur, adiuuat: idq; non semel die, sed bis etiam. sic enim  
 & Galeno illi admirando visum est.

*Enumeratio simplicium venenorum.*

CAP. XXX.

**I**Nter venena, animalia quidem sunt vitæ noxia hæc, can-  
 tharis, buprestis, salamandra, piceæ eruca, lepus marinus,  
 rana rubeta, & mutescens palustris rana, hirudines deuora-  
 tæ: ex seminibus, altercum, coriadrum, psillium, cicuta, me-  
 lanthium: ex liquoribus, meconium, opocarpasum, thapsiæ  
 succus, elaterium, mandragora: ex radicibus chamæleon, a-  
 conitum, thapsia, ixia, veratrum, agaricum nigrum, eph-  
 meron, quod nonnulli colchicum dicunt, quod in colchide  
 nascatur: ex ramosis & oleribus, smilax, quam nonnulli  
 thymium vocant, Romani taxum, solanum furiosum, quod  
 etiam dorycnion appellant, sardoë herba, quæ species est  
 ranunculi, papauer corniculare, pharicum, toxicum, ruta  
 syluestris, fungi: ab animalibus autem, sanguis tauri recēs,  
 lac cui coagulum sit admixtum, mel quod ad heracliam na-  
 scitur: metallica, gypsus, cerussa, calx, auripigmentū sanda-  
 racha, argenti spuma, adarce, plumbum, & quod vocatur  
 argen



argentum viuum: ex iis quæ domestica & in quotidiano vitæ vfu sunt, vinum copiosum raptim à balneo potum, aut passum, aut frigida aqua similiter.

*De cantharide.*

CAP. XXXI.

**Q**ui cātharidem assumpserunt, eos notæ grauissimæ commitantur. ferè enim à stomacho vsq; ad vesicam cuncta illis morderi sentiuntur, gustum similem pici aut cedri-  
no liquori habent, dextra præcordiorum parte inflammationem experiuntur, vrinam difficulter, sæpe etiam sanguinem per eam reddunt: item per aluum ipsis excernuntur, qualia in torminibus intestinorum egeri solent. præterea animo linquntur angunturq; , & vertiginibus laborant: tandem vero mente alienantur. Succurrit ipsis vomitus ex hydrelæo petitus, & lactis potio, terræ cimoliæ drachmæ quatuor cum mulsâ, nuclei pinei, cucumeris semen. Adiuvat bene & ius pingue ex bubula factum, aut anserinum, aut ouillum: carnesq; gallinaceorum, aut agninæ, aut ouillæ, aut porcellorum, omnesq; flaccescentes coctura longiore, & pingues cum lini semine elixæ: vinum iridem dulce, & copiosum, thuris corticis drachmæ quatuor. Post cibū iniicietur per clysterem cremor oryzae aut chondri, aut tragi, aut ptisanæ, aut maluæ, aut lini seminis, aut althææ, aut fœnu-græci. interim etiam mulsâ cum nitro intestino absterfo, conuenit hæc rursus inferere, postea vero inflammatione occupata medicamentis ex lini semine & ordeo lenire. per initia enim offendunt. deinde & lauacris aquæ dulcis vtendum est, item vnguentum irinum rosaceumque potui dabitur.

*De buprestî.*

CAP. XXXII.

**B**uprestî potione absorpto, in gustu viroso simile quippiam percipitur, dolor stomachi ventrisq; vehemens committatur, eademq; partes in speciem hydropici intumescunt, extima totius corporis cutis intenditur, vrinaq; cohibetur. Profunt ipsis quæcunq; aduersus cantharides opitulantur. priuatim autem conducunt, post euacuationes & vomitu, & clystere factas, ficus aridæ, item earum decoctū ex vino. Vbi vero periculum iam de suo acumine remisierit, declinatque, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac muliebre bibere, conuenit.

De



*De Salamandra.*

## CAP. XXXIII.

**Q**uibus Salamandra data est, eis lingua inflammatur, mens impeditur, tremor cum torpore quodam & resolutione urget, partes quædam corporis in orbem liuoribus variantur, ut subinde permanente veneno, putrefactæ defluant. Ad quæ omnia faciemus quæ in cantharidibus dicta sunt. propriè autem resinam è picea, aut pinu, vel galbanum cum melle offeremus, aut nucleos pineos cum decocto chamæpitios, aut vrticæ folia cum liliis in oleo decocta, testudinis marinæ vel terrestris oua elixa, ranunculorū ius esculentum, incocta simul ipsi eryngij radice.

*De pinorum eruca.*

## CAP. XXXIII.

**P**inorum eruca pota, statim sequitur oris palatiq; dolor, valida linguæ inflammatio, stomachi, intestinorūque cruciatus, quæ cum pruritu circumtendi sentiantur: feruor itidem toto corpore affligit, & stomachi fastidium urget. Succurri debet nō aliter quā iis qui cantharidas biberunt. priuatim autem in ipsis loco simplicis olei melinum adhibebimus.

*De marino lepore.*

## CAP. XXXV.

**L**eporis marini potum, gustus sequitur piscibus virosis non absimilis, tēpore procedente aluus indolet, vrina supprimitur: si quando autem eruperit, purpurei coloris cernitur. præterea qui illum assumpserunt, auersantur oderruntq; pisceis omneis: sudor foetidus erumpit, biliosusq; vomitus, nonnunquam sanguine mixtus superuenit. Adiuvari autem debet hoc malo circumuenti, lacte asinino aut passo continuè exhibito, aut maluæ radice & foliorum decocto, aut cyclamini radice trita ex vino, aut veratri nigri, aut scamonix liquoris drachma ex mulla, anserisque sanguine recenti adhuc calido. item caneros fluuialeis solos, si sustinet, offerre oportet. Nota autem salutis est, quum piscem quoq; possunt comedere.

*De rana rubeta & palustri.*

## CAP. XXXVI.

**R**ana rubeta, aut palustris hausta, corporis tumorem inducit, pallorēque intensum, buxo similem, egrè spiritus trahitur, os foetet, singultus infestat, aliquando etiam semen sine voluntate prorumpit. facile autem post vomitum reficiuntur, multa meraci vini portione assumpta, arundinis radice drachmis duabus, aut cyperi totidem. Cæterum co-



gendi sunt obambulare celeriter & currere, ob torporem qui ex hoc malo contrahitur, adhuc quotidie lauare.

*De hirudinibus.*

CAP. XXXVII.

**H**irudines deuoratas, cum aqua & adhærescenteis faucibus, inde adeò dignoscēs, quòd vètriculi os veluti exstione vellicatur mordeturq; atque hæc etiam nota est hirudinis deuorata, nonnunquam & sanguinem floridū, hoc est viuum excreant, hirudinibus gutturi affixis, quas muricæ sorbitio expellit, aut betæ folia cum aceto, aut niuis glebula cum posca epota, gargarizandum quoque nitrum cum aqua, & atramentum sutorium cum aceto. At si gutturi adhæserint, in calidam aquam descendant. item lupinorum farinam assument, frigida in ore retenta eximentur. quippe frigida aqua appetentiores, ad eam festinant profiliuntq;. Nonnulli cimices iis quibus sanguifuga deuorata erat, exhibuerunt. ego autem (inquit Galenus) aliis in his vtens, cimicibus nunquam opus habui.

*De chamæleonte.*

CAP. XXXVIII.

**C**hamæleonte nigro assumpto, valida superuenit ventris erosio, dolor, cum totius corporis peruersione, tremor, mox conuulsio incidit. item vomitiones pituitosæ & spumantes, quibusdam etiam singultus aduenit, vox nihil sonat, facies distorquetur. His autem conuenit cremor tritici pinguis, calidus epotus, item dulce vinum aquosum calidum, vomitus, lactis potio, mollis clyster, fomentaq; ex cataplasmatibus. ad eum verò qui suffocationem parit liuoremque, abfinthium bibitur, aut nitrum cum oxymelite, vel radiculæ: fortusq; præcordiorum congruet.

*De alterco.*

CAP. XXXIX.

**S**i altercum aliquis, aut ebibit, aut comedit, mente alienatur ebrij modo: facilem tamen curationem recipit, mulsa liberalius pota, & lacte, præcipue a sinino: sin minus, caprillo, aut vaccino: ficuumq; siccarū decocto, benefaciunt ipsi & nuclei pinei, & cucumeris semen cum passo assumptū, præterea vinum salsum cum recenti adipe suillo & passo: vriticæ semen similiter, vel nitrum cum aqua conducit: insuper cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus, cepæ, & allia, singula cum vino sumpta. Caterum conquiescere cogendus qui altercum hausit, vt id sicuti qui vinum biberunt, concoquat.

D:



## De coriandro.

CAP. XL.

**C**Oriandrum latere propter odorem non potest: potum verò raucitatem facit & mentem mouet, consimiliter temulentis. Loquuntur itaq; qui id sumpserunt turpia, totius corporis ipsorum odor coriandrum indicat. Adiuvantur, vbi id oleo aut irino vnguento, vt suprà monstratum est, eduxerint, vino meraciore cū absinthio, & per se potio: ouis- que vacuatis in sese detritis, cum muria sorptis: ad hæc muria ipsa bibitur, & ius salsum & gallinaceum & anserinum: postremo passum cum lixiuia sumitur.

## De psyllio.

CAP. XLI.

**P**syllij potu totum corpus refrigerat torpētq; cum resolutione & tristitia, vt animum despondeant. Præsidio sunt omnia quæ contra coriandri potum commendantur.

## De cicuta.

CAP. XLII.

**C**icutā potā caligo vertiginēsque insequuntur, vt nec minimum videre liceat: item singultus, mentis alienatio & artuum perfrictio comitatur: vltimoque conuulsi qui eam sumpserunt, præfocantur, cessante à motu omni in arteriis spiritu. Per initia igitur, quemadmodum & in aliis, vomitu eam eliciemus, deinde hac euacuatione vsq; quod in intestina delapsum est, excernemus: ac tunc, ad vini meraci potionem veluti præsentissimum remedium transibimus, per interualla eam exhibentes: in quibus interuallis lac vaccinū, aut asininum, aut absinthium cum pipere & vino, item castorium, rutamque & mentam cum vino exhibebimus, præterea cardamomi, aut styracis drachmam, aut piper cum vrticæ semine ex vino, aut tenera lauri folia: similiterque laserpitiū, aut eius liquorem cum oleo & passio. Item passum per se potum, præclarè opitulatur.

## De papaueris liquore.

CAP. XLIII.

**P**apaueris liquorem, epotum, subsequitur veternus cum perfrictione & pruritu adeò vehementi, vt subinde veneno incalescente tanta oboriatur prurigo, vt qui id biberunt, ab ea excitentur, adhæc toto corpore veneni odor sentitur. Saluti est post vomitiones oleo factas, acri vri clystere. itē oxymel cū sale potū proficit: aut cū calido rosaceo, mel: præterea merū copiosius, cū absinthio & cinnamomo: necnō acetū calidū per se: insuper nitrum cū aqua: origanum cum



lixiuio, rutæ semen cum pipere, ipsūmq; piper cū castorio & oxymelite, vel satureiæ, aut organi decocto, vino addito. Cæterum excitare ægros oportet iis quæ naribus admouentur, & in aquam calidam deducere, fomentisq; propter accedentem pruritum adiuuare: à lauacro, pingui iure, cum vino aut passo, vti. Iam medulla cum oleo pota ipsis opitulatur.

*De carpesia liquore.*

CAP. XLIIII.

**C**Arpesiæ liquor potus, soporem & strangulatum præcipitem inducit. Eodem remedio, quo & cicutæ, auxiliamur.

*De mandragora.*

CAP. XLV.

**A**ccidit mandragoræ potu quàm primū sopor, viriū resolutio validus veternus, vt nihil à morbo qui lethargus dicitur differat. quibus antequàm horum aliquod eueniat, vomitus conducit: post hunc, aqua mulsa, nitrum, & absinthium cum passo, aut vino dulciore sumpta. caput rosaceo foueri & aceto debet. corpus excitari commoueriq; adhibenda itidem quæ odoratu excitant, piper, sinapi, castoriū, ruta cum aceto trita, pix liquida, lucernarum funiculi combusti extinctiq;. Quod si ægrè excitentur, etiam quæ sternutamenta mouent, adducenda, aliisq; communibus remediis in his quoq; vtendum est.

*De aconito.*

CAP. XLVI.

**A**conitum statim quum potum est, in lingua cum astrictione quadam dulcescit: inde vertigines, præsertim in exurgendo, & oculorum humiditates inducit, thoracis, grauitatem & præcordiorum, ita vt multi flatu erumpant. In quo vitio vomitu venenum educi debet, & aluus clystere subduci. Potiones contra aconitum hæ proficiunt, organi, rutæ aut marrubij cum vino, aut absinthij, aut erucæ, aut abrotani, aut chamæleæ, aut chamæpityos. Prodest ipsi & opobalsami drachma cum vino. item coagulum hœdi, aut leporis aut hinuli cum aceto. adhuc ferri recremētum aut vinum in quo ipsum ferrum, aut aurum, aut argentum sit restinctum. insuper lixiuium cum vino, & gallinacei elixi carniūve pinguium ius cū vino assumptum. Cæterum chamæpitys quæ peculiariter aduersus aconitum conducit, in Heraclia Ponti, vbi & aconitum nascitur, holoeros appellatur, Athenis, didonia; in Eubœa, sideritis.

De



## De ixia.

## CAP. XLVII.

**I**Xia quæ & vlophonos dicitur, odorem habet & gustum iniquum sumitur ocimi, linguæ inflammationem validā inducit, mentem abalienat, atque omneis naturaleis excretionibus supprimit, strepitus tumultusq; alui elidit cum animæ defectu, nec quicquam tamen eiicitur. Adiuuatur læsi ab ea, postquam vomitionibus fuerit educta maior veneni portio, aut alius soluta, absinthij diluto cum vino pleniorē aut aceto aut oxymelite poto: item rutæ sylvestris semine, vel laserpitij radice: similiter tragorigani decocto cum prædictorum aliquo, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut Laserpitio, singulis oboli pondere. Prosunt cum vino etiam nucis iuglandis nuclei lauigati, resina, castorio, & ruta additis, singulis drachmæ pondere. Proficiunt itidem chamæleæ drachmæ duæ, aut thapsiæ succi totidem cum aqua multa. vtiliter & acetum calidum bibitur.

## De ephemero.

## CAP. XLVIII.

**E**phemerō, quod nonnulli Colchicon eo quod in Colchide nascatur, vocant, aut bulbum agrestem, epotum proitibus, totum corpus prurire facit, velut vrtica & scilla tactum irritatūque: interiora erodit, stomachum vrit cum ponderosa grauitate. Inualeſcente autē malo, cruenta strigamentis mista per aluum egeruntur. Succurrendum, vt salamandræ, vomitionibus & clysteriis: sed antequam vireis sibi asciscat venenum, dari debet foliorum quercus, aut glandium, aut malicorij, aut serpilli decoctum cum lacte bibendum: aut polygonij succus, aut furculorū vitis, aut rubi, aut tenerarum ferularum medullæ, aut myrtorum cum vino. item ipsorum myrtorum in lauorem detritorum, maceratorūq; in aqua, dilutum potum auxiliatur: benefacit itidē castanearum interior tunicula, si cum aliquo ē succis quos prædiximus, assumatur: origanum quoq; cum lixiuia potū, in idem efficax est. Adeo verō exactum præsidium est lac vaccinum calidum potum, & simul in ore contentum, vt hoc præſente nullum aliud desideretur.

## De smilace.

## CAP. XLIX.

**S**milax, quæ à quibusdam thymion, à Romanis taxus nominatur, pota perfrictionem totius corporis & strangulatum, mortemque maximè præcipitem inducit: quibus



omnia auxiliantur, quæ & cicuta epotæ.

*De solano furioso, quod dorycnion à nonnullis dicitur.* CAP. L.

**D**Orycnium potum, quod aliqui solanum furiosum appellant, gustum quidem ceu lactis repræsentat, singultus crebros facit, linguæ humiditatem, & cumulatâ sanguinis eductionem: per aluû mucosa feruntur simillima torminosi. Auxilio sunt, antequam horum aliquod fuerit secutum, quæ in ephemero dicta sunt, vomitus dico & clyster, & quæcunq; potiû venenû possunt excernere. Propriè autê ipsi succurrit aqua mulsa aut lac asininum caprillûmve, & dulce vinum tepidum cum anisi modico potum: item amygdalæ, & elixa gallinarum pectora, idem præstant conchyliâ cruda pariter & tosta, in cibo, adhæc locustæ marinæ & gammari, & ius ex ipsis esculentum potui assumptum.

*De sardonîa.*

CAP. LI.

**Q**Uæ sardonîa herba nuncupatur, ranunculi species est: pota autem vel comesta mentem abalienat, conuulsiones adfert cum labrorum contractione, vt risus imaginem præbeat, à quo affectu etiam risus sardonius non laudabili dicterio inter homines iactatur. Cui vitio priuatim post vomitionem conducit aqua mulsa liberalius exhibitâ, lactisq; potio. item corporis totius respersio inunctioque, ex medicamentis quæ calefaciunt petita. vincit item in hydrelæum calidum descendere, deinde corpus inungere & valenter infricare. summâtim, vt in conuulsione tota curatio administranda est.

*De papauere corniculato.*

CAP. LII.

**P**APAUER quod corniculatum appellatur, esum potûmve, eadem quæ papaueris liquor inducens pericula, iisdem quoque curatur remediis.

*De pharico.*

CAP. LIII.

**P**HARICUM dictum toto gustu nardium syluestrem repræsentat: potum verò resolutionem cum furore & conuulsione excitat. Aduersus quod, vbi vomitu fuerit eductum, absinthium cum vino propinatur: item cinamomum aut myrrha, aut nardum Cilicium, quod nonnulli isatin vocauerunt: aut spicæ nardi drachmæ duæ, myrrhæ oboli duo cum passo misti: aut iris crocique flos ex vino. Caput ipsorum dera sum farina ordeacea cum ruta trita, & aceto cataplasmatibus modo obducere conuenit.

De



## De toxico.

## CAP. LIIII.

**T**Oxicum inde nomen videtur accepisse, quod barbari sagittas, quas toxemata vocant, eo illinant. ubi potum est sequitur labrorum & linguæ inflammatio, mētis furor, qui coëceri non possit, variis obnoxius imaginibus. eoque difficilem curationem recipit: raro etiam nonnulli qui id biberunt vitæ restituuntur. Oportet igitur continere ipsos vinculis & cogere, & vi adigere, ut vinum dulce cum rosa-cco bibant, reddantque per vomitum. Item raporum semen cum vino potum peculiariter ipsis confert, & quinque; folij radix, hircinus caprillusve sanguis potui datus. ad hæc, quercus cortex aut fagi aut ilicis cum lacte laugatus potusque proficit. Idem faciunt mala cotonea manducata, vel trita cum pulegio, ex aqua pota: prætera amomum, & balsami cum vino semen. Qui vero mali huius periculum euaserint, diu in lecto decumbunt, & quum surrexerint, attoniti ac stupentes reliquum vitæ tempus transigunt.

## De fungis.

## CAP. LV.

**F**ungorum alij genere, alij copia offendunt. integri sumpti strangulatus laqueis simileis inducunt. his statim communi præsidio resistendum est, & qui eos hauserunt, oleo ad vomitum cogendi. Mirifice his proficit lixiuium ex sarmentis aut ex pirastri surculorum cinere cum posca, sale vel nitro, potum: item pira ipsa syluestria aut folia simul incocta, vim strangulandi quæ fungis inest, tollunt, eademque in cibo conferunt. ad hæc oua gallinarum elixa & in posca pota, aristolochiæ drachma aut absinthij, cum vino, in super mel delinctum potumque cum aqua. Prodest apiasrum cum nitro, panacis radix & semen cum vino, floeces vini combustæ, cum aqua, aut atramentum sutorium cum aceto, raphanus itidem aut sinapi, aut nasturtium in cibo sumptum. Quoniam vero nonnulli fungi à venenatis corrosi non modo strangulant, sed etiam intestina exulcerant, dari debet absinthium copiosum & ficuum decoctum, origanique; ad hæc ex aqua mulsa, vomitus confert, in calidam descendere, & crudam farinam ordeaceam præcodiis admoovere.

## De sanguine taurino.

## CAP. LVI.

**S**anguis tauri recēs occisi potus, spiritus difficultatem & strangulatum procreat, dum tonsillarum & gutturis meatus cum valida conuulsione obstruit. Iam lingua iis qui san-



guinem hauserunt rubens inuenitur, dentes tincti, & vestigia cruoris concreti inter ipsorum commissuras. In hoc malo vomitus vitari debet, grumi enim attractu ad sublime relati, magis gulæ inculcantur. Exhibentur ergo quæ sanguinem coëuntem soluere, & aluum subducere possunt, vt grossi liquore suo pleni cum posca & nitro. huc facit etiam omne coagulum cum aceto, & laserpitij radix cum suo liquore. similiter etiam brassicæ semen, lixiuiumq; ex cinere ficulneo: item cunilæ folia cum pipere, rubique succus cum aceto. Iam verò aluus rectè subducetur. Solent iis qui seruantur inferius recrementa fœdi odoris egeri: stomachus & venter ordeacea farina cum aqua mulsa obduci debent.

*De lacte intus congelato.*

CAP. LVII.

**L**Ac potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum, multam strangulationem parit, eo quod in grumos coit gelaturq; Auxiliatur huic malo, antidoti modo, coagulum, si cum aceto frequenter bibere compellas eum qui lac hausit. item conferunt nepitæ folia arida, aut succus ipsius similiter, aut laserpitij radix liquorve cum posca: idem præstat thymus cū vino, & è cinere lixiuia. salsum verò nihil offerri debet, nam hinc lac magis coit ac in caseum transit. nec vomitus in hoc malo conducit, nam in grumos concretum, dum ad stomachum assurgit, strangulat.

*De melle quod in Heraclia nascitur.*

CAP. LVIII.

**M**El quod in Heraclia Ponti prouenit, aut esum, aut bibitum, eadem pericula quæ aconitum, infert. quare & eadem vtrique conueniunt remedia. Facillimè autem curantur qui id hauserunt, continuo hydromelitis potu, cui rutæ folia sint admista.

*De gypso.*

CAP. LIX.

**G**ypsum potum strangulatum parit, in lapidem coalescens: vnde transferre oportet huc præsidia quæ aduersus fungos conueniunt. datur etiam in hoc malo malux decoctum loco olei. pingue siquidem quum sit, & lubricas vomitiones procreet, corpora deradi non finit: quod lapidescens gypsus facit. Porro conducit & oleum in mulsa, & ficuum decoctum, lixiuiaq; è ficulneo, aut è sarmentorum cinere facta cum vino copiosiore, item origanum, aut thymus cum lixiuia acetove. Clyster ex passio & malux decocto in anum dabitur.

D.



## De cerussa.

## CAP. LX.

**C**erussa propter colorem facile deprehenditur, quoniam sponte sumpta palatum & linguam, denticulq; commissuras albefacit. præterea singultum, tussim, linguæ siccitatem, extremorum perfrictionem, cum menthis ab alienatione, & difficili corporis motu, inducit. His prodest aquam mulsam, aut ficuum, aut malux decoctum propinare. item ac calidum, vel sesamum cum vino tritum, aut lixiuum è vitium sarmentis: aut oleum amaricinum, siue irinum, vel persicorum ossa cum ordeï decocto: vel lachryma thuris, vel prunorû gummi, aut vlmî humor qui in folliculis ipsius seruatur, cum aqua tepida. Iam vomitus continuè cietur. Proficiet etiam succus thapsiæ, vel liquoris scammonia ter- ni oboli cum aqua mulsâ poti.

## De calce, sandaracha, &amp; auripigmento.

## CAP. LXI.

**C**alx, sandaracha & auripigmentum pota, ventris & intestinorum torsiones cum vehementi rosione faciunt. quare omnia quæ temperare & soluere ea possint, adhiberi debent, item quæ vomitiones facileis & aluum lubricam efficiât, qualis est hibisci & malux succus, decoctumque lini seminis aut tragi, aut oryza: lac præterea copiosum, aqua mulsâ, iura pingua, bonique succi.

## De argenti spuma.

## CAP. LXII.

**S**puma argenti pota, quam Græci lythargyron dicunt, sgrauitatem stomachi, ventris, & intestinorum, cum torsionibus validis infert: nonnunquam & intestina pondere vulnerat disrumpitq; , vrinam impedit: corpus eorum qui eam biberunt, intumescit, & coloris plûbei fiunt, & deformitatem acquirunt. Adiuvantur, secundum vomitiones, agrestis hominis semine cû vino: myrrhæ drachmis octo, absinthij, hyssopi aut apij semine: aut pipere, aut ligustri flore cum vino: palumbium fimo arido cum nardo & vino.

## De plumbo.

## CAP. LXIII.

**P**lumbi scobs aut lotura pota, similia inuehit argenti spumæ pericula: eadêmque requirit præsidia.

## De argento viuo.

## CAP. LXIIII.

**E**t argentum viuum potum, eadêmquæ spuma argenti infert, atque eisdem remediis qui id assumpserunt, adiuvantur. adhæc prodesse ipsis videtur lac copiosè datum. cæterum & hi vomitionibus sollicitabuntur.



*De veratro albo, thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta syl-  
uestri, nigella, & pappis.*

CAP. LXV.

**H**Abenda cura est & eorum quæ iuuandi gratia exhibentur, saepe vero non minora aliis pericula adferuntur, cuiusmodi sunt superius commemorata, nempe veratrum album, thapsia, elaterium, agaricum nigrum. hæc enim strangulatus excitant, aut magis quam opus est, purgant: in quibus strangulationes, ut in fungis & similibus comprehensum est, curabuntur: nimias purgationes, iis quæ excretionibus cohibent, sistimus. Iam vero quæ paululum nocere videntur, interim tamen pericula inferunt, negligi non debent: cuius generis est sylvestris ruta, melanthium, recentes pappi, flores autem sunt spinæ quæ cactos dicitur, in quibus solus vomitus adhibitus laborantes sanitati restituit.

*De familiaribus ac domesticis, nempe vino & aqua frigida.*

CAP. LXVI.

**A**qua frigida subito ac cumulatim pota, vinumque meracius copiosum, dulce, præsertim à balneo, aut cursu, validisque exercitiis strangulatus & dolores concitat. in quibus sanguinis dimissio protinus adhibita & inanitio, imminens periculum dissolvit.

LIBRI QUINTI FINIS, IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRE-

TE.

\*

PAVL



PAULI AEGI-  
NETAE LIBER VI.  
IOANNE GVINTERIO  
ANDERNACO IN-  
TERPRETE.

\*

*Proæmium Chirurgicæ.*

CAPVT I.



QVONIAM chirurgica in partes duas didu-  
cta est, vt vna sit quæ carnis vitia tractet,  
altera quæ ossium, tam in rupturis quàm  
luxationibus comprehendat, ab ea quæ  
carni seruit in præsentia exordiemur, con-  
sueti & hîc vsi compendio. Rursus igitur  
à superioribus auspicantes quomodo caput, præsertimque  
eius vertex vratur, exponemus.

*Quomodo caput aduratur in lippientibus, ægrè spirantibus, &  
elephanticis.*

CAP. II.

CVM humor oculis influit supernè, cumque difficilis vrget  
spiratio quæ humiditatis excrementitiæ copia è capite  
inferius in thoracem transmissa, & particulas indidem con-  
tinuo suo cursu offendente contrahitur, caput per medium  
hoc modo vrunt. Vertex ad cutem prius tonderur cutis ad-  
usque os ferramentis candentibus, nuclei modo rotundis  
aduritur. quod, vbi crusta deciderit, raditur. Nonnulli vero  
vbi id ipsum os addusserint, faciunt vt squama inde recedat  
exigua, quò faciliè humores illinc perspiratu dissipètur eua-  
cuenturque, seruato diu vlcere, deinde sic ipsum ad cicatri-  
cem perducunt. At in elephantiasi curanda, quinque non-  
nulli crustas in capite excitant, vnâ in priori parte supra  
sinciput, alteram hac inferiorem, paulo superius quàm frons  
habetur, vbi ferè pili desinunt: ac aliam in occipitio, quod  
Græci opisthocranion vocant, reliquas duas iuxta ossa à  
squamis



squamis dicta lepido, de quæ superius aures conglutinant: vnâ ex his, parte dextra, alteram sinistra: atque ita pluribus squâmis detractis, & copiam, & crassitiem humorum euaporatu ex alto capitis deriuantes, lumina offendi prohibent. Iam lieni quoque aliud ferramentum adigunt, vt primo melancholici recrementi opifici per crustam in cute excitatam medeantur.

*Cum humor capitis cutem inflat, ea q̃; intumescit & prementi digito cedit hydrocephalon dicitur.*

C A P. I I I.

**S**I humor natura aqueus capitis cutem subit, vitium propriè hydrocephalon appellatur: accidit autem pueris quàmprimum in lucem æduntur, capite ab obstetricibus parum dextrè presso, aut ex causa latente, aut ex vasis vnus, pluriûmve ruptura & sanguine qui emanat in ociosam inutilemq̃; mutato substantiam, aut materia ob meatuum raritatem resudante, ac inter cutem & membranam quæ caluariam integit, pericranion Græci vocant, erumpente: vel enim inter hanc, & cutem humor consistit, vel inter pericranion & os, vel inter os & cerebri membranas. Cum itaq; cuti & membranæ caluariam integenti, humor interiacer, tumor sequitur, tactu mollis, concolor, indolens, turgidus, puluino sublimi, & paucis particulis subiectus: digitis prementibus facilè cedit, & rursus assurgit. Quibus pericranion & os intercedit humor, reliqua sanè respondent, sed tumor durior multò est & lentè cedit, vt qui etiam pluribus corporibus subfit, dolorq̃ue magis vrget. Si inter cerebri membranam & os humor se receperit, tumor quidem erit, sed qui prementi non cedat, neque tactu sit mollis, tamen violenter pressus cedat, siquidem os infantium recens adhuc compactum facilè cedit, præsertim cum futuris rarefactis humori transitus foras pateat: cognoscitur ex facili inde quòd humor cum illum constringere volumus, ex aduerso repressus in altum effugiat. Dolor his acrior obuenit, caput totum in diuersa agitur, frons ipsis foras producta est, oculis cernunt inconniuentibus, & crebrius illachrymant. His igitur ceu desperatæ salutis non est manus adhibenda, & si maximè nonnulli chirurgicorum terebra perforatum os exemerint, vt in capitis fracturis dicitur. At si intra cutem & membranulam quæ sub cute caluariam cingit, humor sit collectus, tumore quidem exiguò substante,

VNA



na linea per medium transuersa caput incidendum : si membranulæ caluariam inuoluenti & ossi colluuiæ interueniat magisq; caput inturgescat, duabus utemur lineis per medium se mutuo secantibus : si magis adhuc sit turgidum quatuor, tribus, ad similitudinē H literæ. Vbi manu humorem exemeris, insertis linamētis commodè partem deligabimus, & usque ad tertium diem œnelæo perfundemus, inde solum medicamento in linteolum illito persanabimus. Quod si longiore spatio os carnem non recipiat, leuiter ipsum rademus.

*Quomodo arteriæ diuidantur, arteriotomia dicitur. CAP. IIII.*

**I**N longis oculorum defluxionibus, tum vertiginoso affectu, arterias post aures incidere consueuimus. Radenda igitur posterior capitis pars, & digitis notanda est. Nam arteriæ situs ex loci pulsu faciliè deprehenditur. deinde ipsam linea scriptorio prius atramento ducta, duos digitos longa, usque ad os diuidere oportet. Quod si in conspectum ita non venit, incidendum circiter trium digitorum interuallum, atque tunc manus iniicienda; sic ut arteriæ transuersim dissecentur, quousque & pulsatilis sanguinis fluor apparuerit, & instrumentum os propius accedat. Vbi sat fluxerit sanguinis membranula, quæ caluariam sub cute ambit, diuisa, ne extensione inflammationem contrahat, rasoque osse penicillum ex panniculo vulneribus debet insinuari, & medicamento quod linteolis illinitur adhiberi, quod si remaneat etiam hoc os lene, similiter id scalpello rademus.

*Quomodo vasa diuidantur, quæ angiologia dicitur, eorumq; adustio sit administranda.*

CAP. V.

**I**N hemicranicis, & in iis, quorum oculos aut longus, aut etiam acutus dolor ex calida, acrisq; fluxione infestat adeo ut in temporum quoque musculis calor, laxusque tumor, œdema vocant Græci, excitetur, omnes medici vasorum diuisionem probarunt. Derasis igitur primum in temporibus pilis, digitis vasa notabimus, sic ut fomenta præcesserint, aut etiam ceruix ligata sit: vbi iam vasa oculis sese obiecerint, atramēto notabuntur, & cutis ex lateribus, tum sinistrae manus nostræ digitis, tum ministri leuabitur, ipsumque vas superficialia linea incidemus, deinde vbi totum penetrauerimus hamulis eleuatum & à membranis vicinis instrumento quo illæ detrahuntur, denudatum, suspendemus

undiq



vndiquaque liberum, et si tenue vas fuerit, per hamulum cum, elato ei circumductoq; membranam detrahemus, ita vt partem quoq; ipsius apprehendamus. At si magnum est, duplex acu funiculus subiicietur, aut linum crudum, aut aliud quoddam validum, ac quamprimum vas in rectum scabipello diuisum, sanguinis quantum satis est fuderit, in vtroque extremo quod denudatum est, lino ligabimus, quod intercedit excisum, aut protinus, aut cum soluetur auferre conuenit. Nonnulli etiam candentibus ferramentis citra sectionem vasa adurunt plagis satis altis. vbi iam ferro negotium absolutum est linamentis carptis siccis vulnere oppleto, splenium quoq; superaccommodatum deligabimus. postquam solutum fuerit, medicamenta carni generandae accommoda, tum arida, tum quae linteolis conceptis illiuntur, nec non cicatrici inducendae apta, ad curationem absoluendam inducemus, nimirum vbi vincula deligaturae computruerint exciderintq;.

*Quomodo frons incidatur, hypospathismum vocant. CAP. VI.*

**I**nstrumenti species nomen administrationi dedit: vtimur autem hypospathismo, in quibus fluor multus, & calidus in oculos defertur, faciesq; rubescit, & in fronte sensus quidam & discursus veluti vermium, aut formicarum oboritur. Derasis itaq; in fronte pilis iubebimus, vt inferior gena moueatur, cauentesq; musculorum ad tempora motionem, tres lineas rectas pari spatio distantes in fronte incidemus, latas quidem singulas duos digitos, altas adusque os, trium digitorum intervallo inuicem discretas, secundum sectionem tenuem, spatham subiicientes à linea quae in finistiore tempore ad mediam tendit incipiemus, totum quod interiacet excoriantes cum membrana quae caluariam incingit, deinde rursus spatulam à media ad reliquam demitemus. Deinde scalpri quod scolopomachærion dicitur, aciem in primam coniicientes lineam, vt acutum ipsius latus carni quae ab interna parte cuti cohæret accommodetur, retusum vero, osi. propellemus ipsum adusque mediam lineam, omnia à capite ad oculos descendantia vasa præcidentes, non autem vsq; ad cutis superficiem: rursus à media ad postremam ipsum deducemus, similiter vasa amputantes. Vbi mediocriter sanguis effluxerit, extusis grumis, tria linamenta torilia singulis incisuris inferemus, panniculūq;



imq; implicitum aqua madentem superiniectum deligamus. Postridie cenelæo non solum vlceribus resperfis, sed etiam temporum musculis, auribusq; propter inflammationem, tertio die cum solueris, superfusione diu vtendum, & asilico rosaceo soluto, linamentis insertis curationem quæ estat, absolueamus.

*Quid agendum in sincipite secando, Periscyphismum appellant Græci.*

CAP. VII.

**I**N quibus multa, & in alto vasa fluorem copiosum oculis transmittunt, tribus lineis transuersis coronæ modo sinciput secatur, quæ ratio periscyphismus Græcè vocatur. Hoc morbo laborantium comites notæ sunt tales. Primum oculi alimentum non sentiunt, exigui, & ad visum impotentes, sunt anguli erosi, palpebræ exulceratæ, & pili ipsorum deflui, lachrymæ tenues admodum & acres cum calore deferuntur. Dolor in alto capitis acutus & vehemens virget, sternutamentum continuum. Itaq; derafo capite, transuersam lineam sine musculorum in temporibus, motus offensa, vt dictum est incidemus, quæ à sinistiore temporum parte incipiens in alteram desinat, habeatq; terminos, vbi motus nullus est, paulo superius quàm frons habetur, ducta: sic vt futura capitis per verticem tendens ad aures, Græcis dicitur *τρίγωνία*, vitetur. Leonides per mediam frontem lineam deducit. Cæterum offe detecto, penicillis, aut linamentis pluribus inuicem separabimus, extrema diuisionis deligabimus, & vino oleoq; mixtis vt prius dictum est, aspergemus. A solutione cum inflammatio iam declinauerit, os radetur, quoad caro suppullulare incipiat, rationemq; carnis producendæ accommodabimus medicamentis aridis in id efficacibus vtentes, quale est, quod recipit farinæ triticeæ partes duas, colophonix resinæ partem vnā. Item quale est Cephalicum appellatum. Item quod ex pumice ad carnem creandam conficitur. Nam cutis crassiuscula cicatrice densata, & occlusa vasorum ora per initia pituitæ impetum in oculos deferri prohibent.

*De superioris palpebræ futura, alijsq; modis.*

CAP. VIII.

**G**Ræci appellant *στρίλασις*, cum naturali pilorum palpebræ ordini, alij præter naturam pili succrescunt: quod vitium ex fluida affectione cōtrahitur quādo humor qui in-

fluit,



fuit, copiosus quidem, sed rosionis & acrimoniae expers fuerit. Nam acrior, aut falsus magis, aut alio quodam modo rodens, spatio temporis etiam naturales palpebrae pilos corrumpit. Interim igitur in hac affectione, futura utimur: interim in phalangosi cum cilium introspectat pilorum acie simul cum eo inuersa, interdum etiam in palpebris relaxatis, quando naturales pili bulbum compungunt. Aeger itaque in sedili collocabitur, vel aduersus, vel à sinistra, superiorque palpebra inuertetur: siquidem longos habeat pilos, illos ipsos indice & magno sinistrae manus digito apprehendemus: sin admodum breueis, acus filum ducens per medium cilium in exteriorem partem transmittetur, deinde per filum sinistra manu sublata palpebra, dextra, cuspide specilli post filum in rugas plicasque coacta inuertetur, & subtus linea interius quam pili pungentes habeantur per cilium ducetur, à maiori angulo usque ad minorem pertinetes. filo autem post interiorem sectionis lineam subiecto, pollice manus sinistrae exiguum quoddam linamentum implicitum obiciunt, supercilium attollemus, aliaque parua linamenta implicita summis angulis imponentes famulo posterius stanti iubebimus, ut palpebras per ea attollat, atque tunc lineam veru modo rectam, obeliam Græci vocant, primum scalpello futuris aptato incidemus paulò superius quam naturales pili existant, ab angulo ad angulum tendentem, altam ut sola possit cutis diuidi: post eam, lunatam adhibebimus, incipientes quidem unde & veru similis linea inceperit, in tantam vero sublimitatem tendentes, ut totam cutem quæ superflua est circumscribamus, desinentesque similiter ubi & illa iam commemorata linea. Postea cum cutis duabus lineis circumscripta myrti similitudinem repræsentet, angulo qui ad dextram nostram spectet hamulo transfixo totam hanc cuticulam excoriabimus, deinde vibicibus spongia ter quaterve ablutis, oras vulneris contrahemus, à media auspicantes, acum vero per ipsam interiorem sectionem transmittentes: porrò filum ex lana esto. Cæterum quod eius superfluum est amputabimus, non prope futuras, sed ut circiter trium digitorum longitudo otiosa pendeat, eamque per frontem exprorectam, cum emplastro quodam conglutinante applicabimus, palpebrae autem pilos à futuris, cuspide acus liberabimus. Hic igitur agendi modus & communis



munis & securus est. Nonnulli excoriationem fugiunt, eoq; post ductam subtrus lineam, vossella palpebris continendis accommoda, hoc est, ad palpebræ ambitum apprehendendū figurata, id quod superest cutis, eleuatum, scalpro amputāt, ac futuras, vt comprehensum est, adiiciunt. At si in parte aliqua solum palpebræ ex pilis oriatur punctura, illi etiam soli manum adhibere conuenit, deinde linamenta implicita posca madida imponemus, deligabimúsque imbuentes ipsam partem posca aquosa vsque ad tertium diem, quo ligaturam soluemus, ac superflua fili parte abscisa oblinemus palpebras, vel croco, vel glaucio, vel aliquo collyrio, quod inflammationem arceat, vt, croceno dia rodon. At si inflammatio- nem futuræ patiantur, etiam emplastrum aliquod lene ipsis superaccommodabimus, & veluti lacte infuso oculū lenie- mus, laxiores autem redditas futuras amputando abstrahe- mus. Notus mihi quidam est qui palpebra, vt dictum est, ex- coriata, futuris non vteretur, sed medicamento cicatricem inducente curationem absolueret. Nam vulnere ad cicatri- cem veniente, palpebram ex parte attollens pilos extra in- clinare coëgit. Quemadmodum igitur alius quispiā ne ex- corians quidem palpebram neq; externis duabus vtens di- uisionibus, sed interiore solum adhibita, palpebræ rugas di- gitis vel hamo attollebat, item duabus arundinulis aut la- mellis quibusdam palpebræ longitudinem æquantibus, la- titudinem angusti scalpelli, quod venis secandis adhibetur, superfluam totam cutem mediam prehensam cōstringebat, vtriusq; ipsius terminos deuinciens. Atque hac ratione, tota posterior cutis alimentum non sentiens, eoq; emoriens, in- tra decimum aut plurimum quintumdecimum diem cum arundinulis aut lamellis excidebat, ita vt nulla ferè cicatrix appareret.

*Quomodo palpebræ medicamento vrantur.*

C A P. IX.

**V**isionem palpebrarum ex vrente medicamento factā, omnes, vt vno verbo dicam, veteres damnauerunt, tum propter medicamenti acrimoniam oculis insidiantem, tum quod ex immodica vstione affectus nascitur, quem Græci lagophthalmum appellant, in quo hiantibus palpebris qualicunque de causa lumen offenditur. Quoniam verò multi à pilis semper punctionem experiunt, ne vocabulum qui-

A



dem futuræ frequenter audire sustinentes, detinent plerumque nos etiam inuitos, tanquã aliis destituti præsidii vitionem per medicamentũ adhibemus. Compositio verò medicamenti hæc recipit, calcis viuæ partes duas, saponis gallici vel communis totidem. Quidam etiam aphronitri partes quatuor læuigatas lixiuio, aut saponario, aut alio, è ficu, aut quercu, aut vrina pueri impubis excipientes mucrone scalpelli palpebræ iniiciemus, tantum in myrracei folij figuram, adurentes, quantum etiam in descriptione cõprehenderimus. vbi iam primo medicamēti impositu cutis fuerit adusta, eo spōgia ablato rursus aliud iniiciemus, tam diu id cuti inharere sinentes quousq; nigrescat. Sin id non affectu fuerimus, etiam tertio inducetur. Postquã verò cutis nigruerit, & reliquum iam crusta oborta medicamentum ablueris, & balneis & superfusionibus, quousq; crusta deciderit, vtemur. Inde rasilibus linamentis & penicillis teneris, cicatricem moliemur.

*Si oculus cute non obtegatur, lagophthalmum dicitur.*

C A P. X.

**L**agophthalmon vocant cum superior palpebra sursum retracta est. Accidit autem hoc vitij, aut naturaliter, aut ex cicatrice vulneris, eiúsq; vel sua sponte facti, vel ex futura, vel vitione, vt nuper dicebamus, parum dextrè administrata: in qua etiam solum mediocris emendatio fieri potest si palpebra crassitiem amplam habeat. conuenit enim ipsa cicatrice diuisa, & oris per linamentum diductis, etiam deligatura prorsus vsq; ad absolutam curationem vti, ita vt nõ nimium sicca, sed relaxantia magis vnguina adhibeantur: quale est fœnugræci succus superfusus & basilicum tetrapharmacum quod linteolis illinatur resolutum.

*De inferioris palpebra futura & vitione per medicamenta.*

C A P. X I.

**Q**uot pilorum affectibus superior palpebra opportuna est, tot etiam inferior. Etenim vltra naturæ suæ modum excrescens, inuertitur, & phalangosim, & distichiã sustinet. Eodem igitur modo quo in superioris palpebræ futura, vtendum est, ordine inuerso: primum lunata incidi linea debet, ne sanguinis fluor opus impediat, deinde recta. Subtus vitanda est sectio, quoniam palpebra inferior pondere suo genuino promptè inuertitur. Caterum reliqua curatio



in superioris palpebræ futura tractata, hîc quoq; cōueniet, præter quàm quòd filorum excessus fronti non sint agglutinandi. At si in hac etiam affectione manum extimescens, stionem potius è medicamento deligas, hanc quoque iam raditam habes.

## De ectropio.

## CAP. XII.

**Q**uemadmodum superiori palpebræ vitium vocatū lagophthalmion, ita inferiori ectropion oboritur: verū id intercedit discriminis, quòd hoc non è natura prouenit; sed nonnunquam ex relaxatione, quam medicamenta in id efficacia, inflammatione præcedente concitarint: nonnunquā ex futura, aut inartificioſa vſione palpebra inuertitur. Acu igitur duo lina trahente carunculam tranſſuemus, à ſiniſteriore angulo ad dextrum deducta. Deinde lino vtriſq; ipſius extremis admoto, carunculam per acum attollemus, atq; ita ipſam ſcalpello excindemus, auferentes ſimul cū ea & acum. Atq; ſi figuram palpebra receperit, & æqualiter ſit conuerſa, ſatis manu proſectum eſt. Sin autem poſtea quàm caro fuerit ablata, adhuc inuertatur, auerſum ſcalpellum quam partem Græci cyathifcum nominant, iuxta cuſpidem, palpebræ ſectæ ſubiiciemus. ac in externa illius parte duas inciſas lineas, à duobus factæ ſectionis angulis, auſpīcantes, in acutiem quandam ducemus, eāſq; in vnū cogentes, particulam Græcorum literæ Λ ſimilem amputabimus, vt eius acuta pars infrā ſpectet oculum, latitudo ſuprà, cilium appellatum reſpiciat. Secundum hoc diductas oras acu ex lana filum ducente cōmittemus, duabus futuris contenti. Quòd ſi verò futuræ, aut vſioni fertur acceptum ectropion, etiā ſub inferioribus palpebræ pilis per ipſam primam cicatricē lineam ſimplicem incidemus, labriſque diductis linamenta inferemus, ac aliis præſidiis, quæ in lagophthalmis comprehenſa ſunt, vtemur, præter quàm fomentis, vſq; dum futura fuerit conglutinata.

## De anabrochiſmo &amp; vſione ferramento adhibenda. CAP. XIII.

**I**n quibus haud multi palpebræ pili habentur, qui oculū irritent, ſed circiter vnus, aut duo, aut plurimum tres, inuicem propinqui, anabrochiſmum græcè dictum, probamus, iſque ſit hunc in modum. Per acus tenuiſſimæ auriculam capillus muliebris, aut ſimpliciſſimum byſſinum linum tranſmittitur, duobus ſimul extremis commiſſis, vt quod



inferitur duplicē habeat ansulā, alterūmq; huiusmodi si si  
aut capillus ansulæ iniiciatur: traductaq; acu per cilium ubi  
pili enati apparēt, pilum, pilosve ansulæ impositos, auriscal-  
pio detrahemus. Et si quidem palpebræ pilus prehensus est  
ansulā attrahimus. Sin verò vnus, aut plures exciderint, per  
infectum principium rursus ansulam deorsum trahemus  
iterūmq; pilo, seu pilis in eam positis, attrahemus. At si vnus  
duntaxat pilus gracilis oculum pungat, etiam alterum ex  
naturalibus palpebræ pilis simul euellemus, inunctum prius  
gummi, aut alio quodam glutinante, deligabimūsq; donec  
pilus coalescat. Nonnulli autem vñtionem præponunt anatis  
brochismo: palpebram inuertunt, extractoque vulsella pili  
pungente siue vno, siue duobus, vel etiā tribus, candens aut  
specillum, quod vtroq; extremo in cuspidem abeat, aut au-  
riscalpium, aut eiusmodi aliquod tenue instrumentum loco  
eo adigunt, vnde pilus, pilivē sint euulsi. Sic enim cute den-  
sata, nullus pilus enascitur.

## De hydatide.

## CAP. XIII.

**H**YDatis pinguis quædam est substantia, palpebræ cutis  
præter naturam substrata. In aliquibus autem, & præ-  
sertim pueris ceu natura humidioribus augescens, malorum  
superuenientium causa redditur, dum oculum pondere succi  
grauat, eoq; fluxionem excitat. palpebræ igitur ipsis subten-  
supercilia aquam inter cutē representant, nec vt par est sur-  
sum possunt attolli. Si verò digitis ipsas deprimamus, inde  
digitos separemus, quod medium intercedit, inflatur. Horis  
autem antelucanis potissimum defluxione tentantur, neq;  
contra solis splendores cernere sustinent, sed tamē illachry-  
mant, continuīsq; lippitudinibus infestantur. figurato igitur  
rur commodē ægroto, digitis duobus, indice & medio pau-  
lulum distantibus palpebram constringemus, collectionem  
quandam hydatidis ad medium digitis interpositum molie-  
tes. Ministro autem posterius stanti caputq; ægrotantis fir-  
miter continenti iubebimus per medium superciliij palpe-  
brā modicē attollat. Nos sumpto in manus scalpello, ipsam  
per medium lineā transversa diuidemus, non maiore quā  
in sanguinis per venas detractio fieri solet. alta verò vt  
totam cutem diuidat, vel etiam hydatidem ipsam attingat,  
sed cura omnino debet adhiberi. plerique siquidem altius  
demisso scalpello, vel mēbranā quæ à cornus similitudine

Cera



Ceratoïdes dicitur, violarunt, vel certè palpebræ musculōs conuulnerunt. Atq; si quidem protinus hydatidis in cōspectum venerit, ipsam extrahemus: sin minus, iterum diuisionem leuiter moliemur. Vnde si apparuerit digitis cum lincolo molli apprehensam huc, illuc, nonnunquam etiam circumactam mouendo extrahemus. vbi ablata fuerit impluitum panniculum posca madentem impositumque deligabimus. Sunt autem qui & leuigatum salem specilli capitulo diuisionibus inserant, vt si ex hydatide quippiam fuerit reiectum, ipsam consumat: postquam solueris si desit inflammatio collyriis quæ illini possint, aut lycio, aut glaucio, aut croco curationem expediemus. Sin inflammatio vrgeat, cataplasmatibus ad ea inscriptis, alijsq; præsidijs medebimur.

*De palpebris commissis.*

CAP. XV.

**S**uperior palpebra interim cum inferiori cilio coalescit, interim cum membrana adnata, interim etiam cū ea quæ ob cornus similitudinem græcè ceratoïdes appellatur, ac morbus oculum tractatu difficilem efficit. Couenit igitur vel auriscalpio, lato palpebræ spatio subiecto, vel ea per hamulum eleuata coalitum scalpello ad pterygia excidenda idoneo dissoluere, cura adhibita ne cornea membrana vulneretur, atque inde procidentia occasio fiat. Vbi incideris, succo in oculum infuso linamentis palpebras diducemus, ne rursus commissura fiat, lanaque ouo madente imposita post tertium diem extenuantibus & quæ cicatricem inducunt collyriis utemur.

*De chalazis.*

CAP. XVI.

**C**halazium otiosi humoris in palpebra cōcretio est: quæ si ab exteriori parte palpebræ coaceruetur, scalpello extrinsecus transuersa linea incidi debet: deinde auriscalpio, vel aliquo huiusmodi instrumento Chalazion auferemus. Quod si magna est diuisio, aut dehiscit, futuris oras commitemus, ac emplastro utemur. Si ex igua est, omisis futuris, curationem absoluemus. Si ab interiori parte fuerit, vt per cartilaginem ipsa pelluceat, inuersa palpebra & transuersim intus diuisa, chalazion tollitur: quo facto, muriant vulnere infundemus.

*De verrucis & encanthide.*

CAP. XVII.

**P**alpebrarum verrucis, & in maiore angulo encanthidibus appellatis vulsella prehensis, scalpelloque amputa-



tis chalcitidem laeuigatam imponemus.

*De vngue oculorum, quod pterygion à Græcis vocatur.*

C A P. XVIII.

**P**terygion neruosa membrana est: quæ ab oculi angulo maiore plurimum initium capiens, per minorem ad interiora progreditur, officitq; oculo, quod motû ipsius, bulbi contractione impediatur, & quod progrediens, totam pupillam cõtegat. Cũ igitur facilius curationē recipiant, quæ tenuia sunt, & albicant, hũc in modũ admoũeda manus est. Diductis palpebris, vnguẽ hamulo modicẽ inflexo exceptũ attollimus. Acũ verò, pilũ equinũ, aut linũ validũ ducentẽ, ac paululũ inflexam per summa ad vnguis dimidiũ traicimus. Et lino quidẽ vnguẽ deligatũ sublimẽ eleuamus, pilo autem partem pupillę proximã defecantes, vsq; ad extremũ exco-riamus. Reliquã partẽ maiori angulo vicinã scalpello futuris dicato ex basi abscindimus, ita vt angulicã carunculam relinquamus, ne ea ablata, humor postea semper descendat, rhyada Græci vocant. Aliqui lino vnguem eleuatam vt diximus, scalpello in id accommodato, totum illũ exco-riant, cauentes ne à cornu dictam Ceratoidem tunicam attingãt. Post manus administrationem momento salis in leuorẽ detriti loco iniecto, lanã ouo imbutam illigabimus. Ab huius solutione, muriam ipsis liberaliter instillabimus. Si inflã-matio subsecuta fuerit, ad eam inscriptis auxiliis succurremus.

*De staphylomate.*

C A P. XIX.

**S**taphyloma est tunicæ Ceratoidis, vnã cum rhagoidi, debilitatæ: aut vitio defluxionis, aut exulcerationis, eleuatio. Admo-uemus autẽ huic vitio manũ, non vt visum abolitum restituamus (nam id fieri nequit) verũ vt moderatũ agrotanti decorem conciliemus. Itaq; acu ab inferiore parte sursum per basim staphylomatis traiccta, deinde alteram acum duplex linum ducentem ab angulo qui ad manũ spectat, ad alterum per basim staphylomatis transmittere oportet, manenteq; prima acu, duplici lino amputato, staphylomatis aliam partem sursum, aliam deorsum filis deuincire: atque tunc acu detracta lanam oui liquore imbutam imponere. Post solutionem blandis infusionibus oculum lenire, donec fila simul cum staphylomate decidant.

*De oculis purulentis, qui hypopyi dicuntur.*

C A P. XX.

De



**D**E oculis purulētis Gal. verba apponere abūdē est, quā in eū modū habēt. Nostra ætate medicus quidā ocula-  
rius cognomēto Iustus, etiā cōcussione capitis plerosq; hy-  
popyos persanauit. collocās enim eos in sella rectos, ac capis-  
ta ipsorū vtrinq; à lateribus cōprehēdēs, mox quatiebat a-  
dēdō vt pus ipsīs descēdere palā videremus. mā sit autē deor-  
sum propter grauitatē substātiæ, tamen si hypochymata ne-  
quaquā manerēt nisi quis admodū diligēter ea infarxisset.  
Ac progressus iterū idē Galenus (inquit) frequēter autē mul-  
tū simul puris vacuauimus tunica ea diuisa quæ cornus spe-  
ciē refert, paulō supra locū quo vniuersæ inter se tunica cō-  
mittūtur. nomināt autē locū Græci nūc irim, nūc Stephanē  
hoc est coronā. Hoc quidē Galenus in cōmentario de mor-  
bis curādis prodidit. Cæterū post puris euacuationē, vlcus  
ex mulla aut fœnugræci succo, melle addito infusionibus re-  
purgātes, deinceps reliquā purgationē accommodabimus.

De suffusis.

CAP. XXI.

**S**uffusio, ocio si humoris in cornea mēbrana iuxta pupil-  
lā concretio est, que visum impedit, aut certē ne clarē  
oculus cernat, efficit. Accidit potissimū ex perfrictione ac  
imbecillitate spiritus visorij, eoq; senes magis & lōgo mor-  
bo cōfectos inuadit. fit etiā ex vomitu violētius cōcitato &  
ex ictu, alijsq; pluribus de causis. Verū de ijs suffusionibus  
quæ nondū radices egerūt, nullā manus administrationem  
requirētibus, tertio libro comprehensum est. In hoc autē  
tas quæ iam confirmatæ sunt & ex toto concreuerunt, no-  
tis suis describemus. Omnes igitur suffusione laborantes  
lucē vident aut multā aut paucā, cōque discrimine  
suffusiones ab hebetudine & glaucomate separamus, tum  
eo quod hebetudinem & glaucoma experti lucem omni-  
nō nullam cernunt. Rursus igitur Galenus docebit te suf-  
fusionum & concretionem & differentiam, item quomodo  
his manu mederi conueniet. Oculus suffusione tentatus  
concluditur, & palpebra magno digito ad oculum pre-  
mitur, eique adducitur, simulque hac illac exprimitur, de-  
inde oculo apertō & mente ei adhibita suffusionem con-  
spicimus. In ijs enim quibus humor nondum coalat, fu-  
sio quædam ex digiti impressione oboritur. ac pri-  
mū latior apparet, rursus in suam & figuram & magni-  
tudinē recurrit. At in confirmatis suffusionibus nulla

A 4



immutatio nec latitudinis nec figuræ ex impressura obuenit. Quoniam vero commune hoc est indicium & eorū in quibus modicè, & illorum in quibus supra modum humor concreuit, colore ipsos discernemus. Nam si ferri aut marinæ aquæ aut plumbi colorem suffusio habeat, moderatè coaluit, & ad eductionem idonea redditur: si verò gypso & grandini similis color suffusionis est, supra quàm par est concreuit. Sed quia hæc à Galeno didicimus, collocato ægrotante aduerso lumine citra solem, oculū sanum accuratè deligabimus, & diductis alterius palpebris recedemus ab iride appellata ad minorem angulum, quantum specilli cuspis spatij continet, atque tum punctoriij stili micro-ne locum designabis quem puncturus es: in sinistro quidem oculo dextra manu functionem obiens: in dextro autem sinistra. Atque inuersa punctoriij specilli acie quæ ad extremum rotunda est, valenter impingimus, & partem designatam vsque ad vacuum intus sinum penetramus: idque tam altè fiet, quàm pupilla ab iride nuncupata distat. Ex superiori igitur parte vertici suffusionis stilum punctorium adigentes, (videtur autem conspicuè ferrum, quod tunica cornea pelluceat) humoris colluuiem per ipsam in subiecta loca deriuabimus. Et si protinus educta fuerit, sistemus quiescentes paululum. Sin autem recurrerit, rursus ipsam deducemus. Euacuata suffusione, stilum tollemus, leniter circumuertendo. Post hoc oculo aqua eloto pauxillum salis cappadocici instillabimus, lanamque oui luteo cum rosaceo madescens impositā deligabimus, ita vt sanum quoque oculum comprehendamus, ne vnà commoueatur. Cæterum collocantes ægrū in domuncula subterranea iubebimus prorsus ipsum conquiescere, tenui vti victu, adusque septimum diem illigatum, nisi quid prohibeat. Post hunc solutis ligaminibus visum experiemur, ostendentes ei res quasdam visibiles, quod dum manu curamus, aut postea, fieri dissuademus, quod ex continuo nimium intuitu promptè rursus suffusio repleatur. Si inflammatio vrgeat, etiam ante septimum deligatura soluta, aduersus hanc pugnabimus.

De egilope.

CAP. XXII.

**A**Egilops, tumor est abscessorius inter maiorem angulum & nares proueniens. Vix curationem admittit, tum partium tenuitatis causa, tum periculi, ne oculus consortij lege



lege indoleseat. Si igitur per summā ruptus fuerit abscessus, totum id quod eminet vsq; ad os excidendum. Et si ad malas subluuies deciderit, totam ipsam explicabimus. os autem cariem nondum sentiens, rademus. Quod si iam carie vexatum est, ferro candenti acuto ac in cuspidem abeunte, aduremus, spongia frigida madente, oculo imposita. Sunt qui post carunculæ excisionem terebra vsi, humorē, aut pus in nares deriuarint. Nos autē satis habuimus eousq; solum ferramenti ad ægilopem accommodatis adurere, vt squama abscederet. Ab vstione lenticula melle adiecto quod phacomeli vocant, vel malicorio cū melle reliquisq; siccatis præsidiis vtemur. At si ægilops serpat ad angulū, summaq; inuadat, nequaquam tūc scalpello, quo aut pterygia, aut venas secamus, media anguli parte ad abscessum resoluta, carnes ex alto educemus, itē mediocriter desiccabimus. Vitri autem puluis tenuissimus ipsis insparfus, mirabiliter desiccet. Ad hæc aloë similiter cū fuligine thuris. Reliquam vero Aegilopum medicinam, tertio libro sumus executi.

*Si meatus auditorij non perforati sint.* CAP. XXI. II.

**H**ic affectus à prima natali die contrahitur, membrana quadam auditorium meatum obstruente, nunc per summa, nūc in alto. postea accidit præcedente in audiendi meatu exulceratione. siquidem caro supernascens ipsum occludit. Itaq; si membrana auditum impediens altē inhærescit, difficilis erit administratio. Tentandum tamen est, tenui quodam instrumento ipsam incidere. si in summo fuerit, scalpro quod Græci scolopomachærion appellant, hanc diuisam, vbi vsus exigit, etiam auferemus. At si caro supercreuerit, hanc pterygiis apto scalpello aut specillo polypis idoneo tollemus, deinde tortile linamentum ex viliore panniculo, spatiofo meatus sinui apratum aqua imbuemus, inuolutumq; chalciride leuigata, aut huiusmodi quodam arido in meatum demitemus, ne rursus caro enascatur. Si inflammatio male habeat, protinus id auferemus: Si fundat sanguinem meatus, spongiā aqua frigida imbutam imponemus. aliisque conuenientibus vtemur remediis.

*Ad ea quæ in meatum auditorium inciderunt extrahenda.*

CAP. XXIII.

**S**olet etiam in aurem incidere, non modò calculus, sed etiam vitrum, faba, & siliquarum grana. vitrum itaq; &

A 5



calculus suam seruant magnitudinem: fabæ autē, & filiquæ rû grana, aliâq; id genus, naturali corporis madore inflata, maximos cruciatus mouent. Conuenit igitur vel auriculario specillo, vel hamulo, vel vulsella hæc extrahere. Aut violenta capitis concussione, aure super circulum quendam imposita. Iâ verò calamo hæc subinde extraximus, exurgentes etiam aquam auribus illapsam similiter, cera calami ambitum, qui auri iniicitur, obstruentes ne spiritui vsquam sit exitus. Calculos, & eius generis corpuscula, eduximus specillo lana inuoluto & in resinam terebinthinam, aut aliud quoddam glutinans demisso, eoq; in meatum auditorium coniecto leniter. Sin ista nihil proficiunt, medicamēto quod sternutamentum prouocet, naribus indito, os & nares obturato. Si ne horum quidem nulli cesserit prius quā inflammatio, conuulsio, & omnino periculum fuerit subsecutum, manu, & ferramenti ipsa auferemus: figurabitur itaq; egrotus, vt auris auersa sit ad basim ipsius post appellatam fibræ, & lunata utemur diuisione exigua, auersaq; specilli parte corpusculum quod insidet, eximemus. Hoc ablato vulnus suturis commitemus, & medicaminibus ad cruenta inscriptis utemur.

## De polypo.

## CAP. XXV.

**P**olypus tumor est præter naturam in naribus oboriens, ex marini polypodis similitudine nomen sortitus, tum quod illius carnem repræsentet, tum quod suo complexu quemadmodum ille, captantes vlciscitur, nares ipsorum comprehendens, ita & vitium hoc laborantium nares obstruit, id efficiens vt & difficulter respirent, & sermonem agrè exprimant. Duri igitur polypi, tactui renitentes, liuidi, & maligni, ceu cancri naturam induentes, attingi nō debent. Molliores autem, laxos, stupidos, neq; maleficos scalpello curare tentabimus. Figurato homine in sedili aduersus solis radios, & narium meatu sinistra manu explicato dilatatoque, spatula ad id facta in myrtacei folij modum acuta orbiculatim polypum, aut carunculam dextra præcidemus. illic acie ferramenti imposita, vbi naribus coaluit: secundum hæc instrumento in oppositum cōuerso, manubriolo ipsius, succisam carunculam foras eximemus. Et si quidem purū naris meatum viderimus effectum, ad curationē descendemus. Sin reliquæ aliquæ polypi superfuerint, alterius cultelli rasorij acie



acie relictum corpus cum tensione, agitatione, & rasura valenti auferemus. Malignos & peruicaces polypos candentibus ferramentis adurere consilium est. inde remediis vstioni dicatis vti. Postquam ferro satis effectum, spongia detergemus, ac poscam, aut vinum in nares fundemus. Et si humor per palatum in fauces euaserit, bene se habent munia scalpello obita: sin minus permeet, nota est carunculam polypi ossibus à colando ethmoidibus dictis insidere, aut supremis narium partibus, quam instrumenta non comprehenderit. Linum igitur mediocriter crassum funiculi instar, ceu duorum triumve digitorum longitudinis in nodos constrictum, per specilli duplici cuspidè præditi foramen transmittemus, alterumq; extremum specillo per nares sursum ad meatus colatorios inferetur: idem per palatum, & os eicientes vtraque manu extrahemus, tanquam carunculas nodis defecantes. Deinde funiculari linamento meatum diductum habentes post triduum pastillo musæ, & consimilibus, reliquias absumemus simul & locum exiccabimus. Postea vero pastillis cicatricem ducentibus vtemur, plumbeos canaliculos naribus, si opus sit, per totam curationem accommodantes.

*Curta in auribus, & labris quomodo sarciri possint: Græci vocant colobomata.* CAP. XXVI.

**C**urta igitur in auribus aut labris, colobomata Græci vocant, hac ratione curantur. Primum cutis ab inferiori parte soluitur: mox oræ vulnerum contrahuntur, ac id quod in callum coaluit, aufertur. Dein futuræ illis iniici debent, & conglutinantia.

*De epulidibus, & parulidibus.*

CAP. XXVII.

**E**pulis carnis tuberculum est iuxta dentium aliquem in gingiuis oriens. Parulis exiguus abscessus est, gingiuas infestans. Epulidem itaque vulsella, aut hamulo eleuatam præcidemus. Parulidi in orbem exactæ linamenta inferimus. Vidi autem subinde scalpello, quo venas secamus, ipsam duntaxat punctam, & pure vacuato confanuisse. post ferrum, vino collui præcipimus. In sequenti die malsa, tertio Antheron, puluerem vulnere inducimus vsq; dum curatio finiatur. At putredo gingiuis oborta si cōgruis medicamentis non curetur: candenti ferro ipsam aduremus.

Quam



*Quomodo dentes eximantur.* CAP. XXVIII.

**D**ens qui eximetur vsq; ad receptaculum suum circumradi debet, inde forfice paulatim concussus, extrahitur. At si exesus est, id foramen tenui linamento primum replendum est, ne constrictus sub forfice confringatur. Eo exemplo, sale tenuissimo insparso relictas carunculas consumemus. Postea vino, aut posca os colluetur dum confanescat. Quoniam vero superflui nonnulli dentes enascuntur, eos qui receptaculo adnati coaluerunt, scalpbris excindemus: qui non coaluerunt, forfice tollemus. Sin autem dens aliquis excreuerit, aut etiam confractus fuerit, nonnunquam limula, id quod excedit, superfluūq; in eo est, deteremus, adiectasq; ipsis, vt verisimile est, squamas auerso scalpello, aut rasorio, aut lima perpurgabimus.

*De ligatione linguae quod ancylion dicitur.* CAP. XXIX.

**L**igatio linguae quae ancylloglosson Græcis appellatur, aliàs naturaliter accidit, membranis durioribus magisq; à prima origine minutis linguam cōtinentibus, aliàs ex acquisito ob cicatricem quampiam duriores sub ipsa ex vlcere contractam. Qui igitur ex natura hoc vitiij habent, eo quod tardè sermonem explicare incipiunt & vinculum sub lingua iusto magis appareat, exulceratione non præcedente, cognoscuntur. Qui vero ex acquisito, cicatricem manifestò conspicuam habent. Collocari igitur debet ægrotus in sedili ea figura vt linguam ad palatum suspendeat, & nerueum illud vinculum transuersa plaga incidetur. Quod si ex cicatrice aliqua ligatio prouenerit, ea hamulo transfixa callum sursum extrahemus, ac laterali facta diuisione ligationem soluimus, cura adhibita ne particulas altè latentes incidamus. Nam sanguinis profusio quæ sisti nequeat, frequenter inde secuta est. Post hæc aqua frigida aut posca vulnus debet elui. deinde medicina vtendum quæ relaxet & carnem inducat.

*De tonsillis.*

## CAP. XXX.

**Q**uemadmodum glandulae scirrhus induratae, strumae appellantur, ita etiam tonsillae inflammationem experitæ, & supra naturalem modū auctæ, & veluti desiccatae, deuorationi spirationiq; negotiū exhibētes, è regione vtrinq; sibi inuicem oppositæ, eodem partis vocabulo, tonsillæ, Græcè antiades vocantur. Quibus cum adest inflammatio,

scal



scalpellum ad mouere cautio est. vbi illa modicè conquie-  
rit, manum admoliamur, præsertim albis, contractis, angu-  
sta basi firmatis. Nam humiditate flaccescentes, rubicundæ,  
amplam basim habentes, facillimè sanguinem profundunt.  
Collocato igitur homine aduersus Solis lumen, iubebimus  
vt ore hiet, ministro caput continente, alteroq̃ue linguam  
spatha ad id facta quam Græci glossocatochon appellant,  
inferiori maxillæ apprimente, nos hamulo per tonsillam tra-  
iecto, etiam quantum licet ipsam attrahemus, ita vt non  
membranas simul euellamus. Deinde totam ipsam ex basi  
amputabimus scalpro ligationi dicato, ἀγνυλότομον nuncu-  
pant. Sunt enim duo eiusmodi instrumenta, aduersos acie  
inflexus habentia. Postquam vna fuerit succisa, ad alteram  
eodem modo vice conuersa veniendum est. Functione scal-  
pello obita, æger ex aqua frigida, aut posca gargarizabit.  
At si profluuium sanguinis eueniat, etiam rubi & rosarum,  
myrti; diluto egelido vtetur. Si vero copia sanguinis pro-  
rumpat, plantaginis & symphyti succo: item ex electro, pa-  
stillo & lemnia sphragide posca soluta os collui debet. Ces-  
sante autem profluuiio, proximo die, rosarum flore, croco &  
amylo cum lacte perungentur ex aqua, vel oui liquore can-  
dido, vel hydrososato. Si sordes vlceribus increuerint, etiã  
ex melle & collutiones, & illitus commodè adhibentur.

De vua.

CAP. XXXI.

**C**Urgulio tanquam aliquod vocis plectrum subinde de-  
stillationem à capite recipit: idemq̃; præter naturam  
auctus, si oblongior, tenuisq̃; fuerit, Columella nuncupa-  
tur: si vero crassior ab ima parte, & rotunda, Vua dicitur.  
vtrunque autem nomen à similitudine factum est. Si igitur  
vniuersalibus, nempe & per sanguinis dimissionem, & me-  
dicamento adhibitis vacuationibus non abigatur, neque  
etiam remediis loco admotis, quæ astringant, repellantq̃;  
vel etiam discutere possint, cesserit, ad scalpellum venie-  
mus: ne continuo irritatu, tussis, vigiliæ, interim etiã stran-  
gulatus subsequatur. Quæ igitur contractæ sunt, rotundæ,  
non oblongæ, cruentæ, vel subnigræ, non attingi scalpello  
debent. Tenuēs autem, oblongæ, per summa graciles muris  
caudæ modo, remissæ, sanguinolentæ non admodum, sed  
albicantes, ex curandæ sunt. hæ siquidem protinus inflam-  
matione liberantur. Id autem ex vua præciditur, quod præ-

100



ter naturæ modum eminet. Etenim si ad finem illa præcida-  
tur, extremam omnes thoracis regiones noxam percipiunt:  
& vox intermoritur. Itaque figuratur ægrotus in sedili con-  
tra Solis lumen, iubeturq; magnum hiare. deinde vulsella,  
aut forfice quod superuacuum est prehensum, inferiorique  
parti adductum scalpello vuïs aut suturis accommodato,  
præcidimus. inde quæ in vasorum sectione comprehensa  
sunt, agemus. Sæpe vero, aut propter laborantis timorem,  
sanguinis profluuij metum, medicamentive siccitatem fer-  
rum vitantes, adurente potius medicamento hanc absumi-  
mus. Conuenit igitur medicamento adurente quod in pal-  
pebrarum vstione dictum est, aut eius generis alio, vuæ vstæ  
sinus implere, ac homini magnum hiare iussu lingua per fa-  
mulum forfice constricta, instrumento adaperto tantam vu-  
uæ partem comprehendemus, quantam etiam sumus am-  
putaturi. Cæterum spissitudinem medicamentum habebit  
neque liquidam, ne diffuens ab vuâ deerret, subiectas au-  
tem partes adurat, ob quod ægro interdiciamus, ne per to-  
tum vstionis tempus deglutiat, neque omnino duram, quò  
facilius vuæ incidat, & si ex vno ipsius iniectu summa vuæ  
pars nigruerit, abundè est: sin minus, etiam bis vtemur, æ-  
gro per totum administrationis tempus inclinante ore, in  
terram, vt salua eliquescent simul cum medicamenti parti-  
culis extra os euadat, siquidem hora vna emoritur: excidit  
autem tertio, quartove die. Secundum vstionem, lana molli  
aut stuppa indice digito inuoluto quæ gurgulioni circum  
adhærescunt, extergemus, vel etiam aqua os collui iubebi-  
mus. At ceruicis regionem fomentis ex chamæmelino, tum  
in his, tum in illis quibus tonsillæ ademptæ sunt ex confor-  
tij lege adiutabimus. Ad hæc gargarizationibus, & perun-  
ctionibus similiter vtemur.

*Quomodo spinæ gutturi eximantur.*

CAP. XXXII.

**D**euorantur subinde inter edendum spinæ, aut piscium,  
aut aliorum quorundam, diuersis in partibus. Quæ igitur  
in conspectum veniunt, vulsella, quam Græci propriè  
appellant acanthobolon, eximemus: quæ inferius ad ipsas  
fauces peruenerint, alio modo. Sunt qui dicant maiores mo-  
les esse deuorandas, vt, caulem lactucarum, aut buccellam  
panis. Alij vero spongiam puram mollemq; exiguæ magni-  
tudinis lino illigatam deglutire iubent, linoq; apprehenso  
retrahi,



et trahi, idque frequenter efficere ut spina impacta spongiæ ducatur. Leonides autem iubet cataplasmatibus uti, quæ conquant, cuiusmodi ex cruda ordeï farina conficiuntur, quod spina in pus redacta sua sponte excidat. At si eadem hora aut etiam ante ventriculi concoctionem in ægrotum inciderimus, eo quod infixum est nobis non conspicuo, vomere iubebimus digitis aut pinnis in os dimissis. Nonnunquam enim, id quod est infixum una cum vomitu educetur.

*Quomodo aspera arteria incidi debeat.*

CAP. XXXIII.

Chirurgicorum præstantissimi hanc quoque administrationem literis prodiderunt. Antyllus itaque hunc in modum scribit. In synanchicis quidem, ut in ea parte dicitur quæ victus rationem tradit Chirurgiam improbamus, cum inutilis sit præcisio, in quibus omnes arteriæ & pulmo affectus est. In ore autem & mento inflammationem experiuntibus, aut etiam tonsillis, asperæ arteriæ os operientibus, incolumi sanè ipsa arteria, ratio est sectione uti, quod periculum strangulatus euitetur: deinde cum infra arteriæ caput spatium trium ipsius quatuorve circulorum manuum adegerimus, partem nonnullam ipsius arteriæ scalpello pertundemus, totam enim diuidere securum non est, tum quod hic locus excarnis sit, tum quod vasa procul à loco diuiso sint dissita. Itaque inclinato ægroti capite retrorsum, ut arteria reddatur conspicua, transversam lineam incidemus, inter duos circulos ipsam ducentes, ne cartilago, sed membrana cartilagine colligans, discindatur. At si meticulosior aliquis inter agendum fuerit, hamulo prius cutem eleuatam diuidet: deinde sic ipsi arteriæ incidens, vasis, si fortè occurrant, præteritis, lineam ducat. Hæc quidem Antyllus dixit: Coniiciens arteriam scalpello esse penetratam, inde quod spiritus per eam cum murmure quodam erumpat, tum quod vox intercisâ sit. ubi vero de strangulatu metus amplius non est, oras vulneris renouabimus, mox suturis commitemus, ita ut solam cutim citra cartilaginem suamus, utemurque medicamento quod cruentis facit. Sin minus conglutinetur, præsidio quod carnem inducat insistemus. Simili verò curatione utendum etiam si quis nobis obtigerit qui mortis desiderio iugulum sibi inciderit.

*De abscessu.*

CAP. XXXIII.

Quod



**Q**uod abscessus carniū, vel partium carnosarum cor-  
ruptela mutatioq; sit, quomodo generetur, quorq;  
eius sint differentiae, quarto libro abundè tractatum est.  
Nunc autem quemadmodum manu scalpelloq; ei meden-  
dum sit, exponemus: cum omnino in pus transierit. Hoc au-  
tem deprehendimus inde quòd dolores, febris, si præcesse-  
rit, rubor, pulsus & reliqua inflammationis signa minora  
tunc appareant. vbi iam tumor in acutum fastigiatus est, &  
pus digitis innixis occurrat, præsertim cum summa occupat  
abscessus, tunc ad scalpellum veniundum est. Si vero neque  
ad tactum occurrat, neque fastigietur, eo quòd in alto deli-  
tescat, aliis mutationis notis attendentes, manum admolie-  
mur. Sciendum vero est crudos interim ipsos priusquam ex  
toto in pus mutati sint, incidi, si aut articulis, aut principi-  
bus particulis vicini sint, ne ligamentum, aut aliquod eis  
necessarium assidua putredine pariter contabescat. Porro  
abscessus ano proximos crudos antequàm in totum ematu-  
ruerint, dissecari Hippocrates præcipit, veritus ne perfora-  
tionem experiantur. Inciduntur ergo non omnes simili li-  
nea, sed naturali quidè, vt in fronte: & pilosis locis, vt in ca-  
pite, cura decoris quantum licet, habita. Recta vero linea  
artus secamus, veluti in musculis, diligentia adhibentes ne  
& nervos & arterias & principales particulas attingamus:  
interim in rectū, interim trāsuerim abscessu prout cuius-  
que vsus exigit, diuiso. In minoribus vnam scalpello sectio-  
nem molimur, in magnis plures, iuxta amplitudinis rationē  
vbique ea quæ tenuiora sunt & effluxioni idonea, inciden-  
tes. Illos sanè abscessus quī plurimum fastigiantur, crudi,  
tenuēs, & emortui sunt, præcidimus trianguli, aut mirtacei  
folij, aut alterius anguli figura, cū circularis ad cicatricem  
recipiendā sit in idonea. Qui vero non in fastigiū attollun-  
tur, eos simplici dūtaxat linea dissecamus. At vbi magnum  
sinum inuenimus, si cutis superiniecta carnosā sit, & queat  
conglutinari, diuisione loci ea duntaxat vtemur, quæ hu-  
moris effluxui conueniat: Sin tenuis, admodumque excar-  
nis, totam in longitudinem simpliciter dissecabimus, & post  
simplicem diuisionem si corpora vtrinque sita gracilia val-  
de & non carnosā videantur, ipsa tollemus. Administrato  
iam scalpelli munere, spōgia locus abstergi debet: si paruus,  
est abscessus, vnaque diuisio, simplex linamentū inferemus:  
Si



Si magnus est & plures incisæ lineæ, implicitum aliquod in longitudinem linamentum lemnifcon Græci vocant, ipsis demittimus, ipsas similiter plagas linamentis replentes. Quod si erumpat sanguis, aqua frigida, aut posca vtendum. si ita non substiterit, chalcitidis pollinem inspergemus, eoq; frequenter ob flaccidam humore putredinem vtemur. Splenia si hyems est, & partes sint nervosæ, œnelæo imbuta deligabimus: si æstas, & partes carnosæ, aqua cum oleo, aut ipso quoque vino cum vino frigido tincta illigataq; sequenti die eisdem liquoribus superfundemus. Post tertium diem vbi soluerimus, spongiaque deterferimus tetrapharmaco quod in linteola illinitur, vtemur. Si inflammatione caret vomica, idem fomentum & medicamen linamentis illitum accommodabimus. Si inflammatio adest: cataplasma, quod concoquendi vim habeat, iniiciemus, superfusionibus antea vsi: vbi cessauerit inflammatio, medicina quæ pus maturet, & carnem inducat, medebimur. Cæterum sinus, glutinantibus remediis, vt quarto volumine de sinibus comprehensum est, curabimus.

## De strumis.

## CAP. XXXV.

Struma quæ græcè chœras dicitur, glandula est indurata, in ceruice, alis, & inguinibus potissimum enascens. Nomen habet à chœradis petris, aut suibus, quod numerosæ foliolis existât, aut quod colla habeant glandulosa. Oriuntur autē strumæ in priori ceruicis parte, aut in altera, aut vtrunque vna, aut duæ, aut plures. Omnes autem suis membranis includuntur, quemadmodū steatomata, atheromata, & melicerides. Quæ igitur indolent attractu, & medicamentis impositis deteriores redduntur, malignæ sunt, quas etiam Carcinodas aliqui dixerunt, notumque est omnibus ipsas curationi quæ manu fit, non cedere. Morigeræ autem ac blandæ tum tactui, tum congruo medicamentorum vsui, hoc modo tractandæ sunt. Superficialiæ igitur, & in cutem erumpentes, simplici linea diuisæ, ab incumbantibus dissoluuntur: orarum cute hamulis distenta, membranæ liberantur, vt in vasorum confectione, quam angiologiam vocauimus, expositum est, ac paulatim eximetur. Maiores autem strumas hamis transfixas suspendemus, & similiter excoriatæ corporibus eas cōtinentibus vndiquaq; liberabuntur, animo adhibito ubiq; ne arteriæ, quas carotidas vocant, & nerui re-

B



currentes violentur. At si vas aliquod diuisum, opus obscurer, funiculo id excipietur, vel per medium amputabitur, nisi magnum fuerit: ubi in arctum strumę basis venerit, dextrę ipsa præcidetur: ac indice demisso tentabimus num & alię sint strumę adiectę quę eodem modo auferentur. Quod si magnum aliquod vas aut etiam plura subinde iuxta strumę fundum esse suspicemur, nõ ex basi ipsam excindere, sed funiculo excipere cõuenit, quò particulatim citra periculum sua sponte excidat. quo tempore medicamento in linteola illito, curatio tentabitur. Si verò inde excindatur, oras commitemus. omnino autem rectas diuisiones adhibere oportet. Atq; si nihil superuacuum habuerint, inde futuris iungemus. Sin ex strumę tumore cutis redūdet, parte ipsius myrti instar ablata, futuris vtemur, & medicamen cruentis aptum iniiciemus.

*De steatomatis, atheromatibus & meliceridibus. CAP. XXXVII.*

**H**Aec quoque in abscessuum genere comprehenduntur: sed hoc discrimine ab illis variant, quòd abscessus proprię dicti inflammationem doloręque testentur, & acrem humorem, ac rodentem cõtineant, nulla peculiari membrana, aut tunica inclusi. Caterum illa inter se quoq; differunt, quòd humor in steatmate contentus, sicut appellatio ostendit, seuo sit persimilis. In atheromate, pulti frumentaceę. In meliceride, humor mel repręsentet. Agnosces ipsa hunc in modum. Steatoma aliis durius est, tactui renititur, & basim habet solidiorem. Meliceris laxi cuiusdam corporis modo subsidet, & tardę quidem funditur: cito autę rursus succrescit. Curantur hæc quemadmodum strumę, incisione, excoariatu, futuris & reliqua curatione, id solum cauendo, ne membrana vulneretur, vnde humor qui continebatur, profusus operationem impediat, & ne pars ipsius relinquatur, nam renascendi occasionem plerunque in brachiali, talo & articulamenti motui dicatis exhibet, quemadmodum etiam struma vel tota, vel portio ipsius relicta. quòd si huiusmodi quippiam fuerit deprehensum, satius est non suere, sed exedentibus medicaminibus reliquias absumere.

*De aneurysmate. CAP. XXXVIII.*

**A**neurysma tumor blandus tactu est, digitisque cedit, ex sanguine & spiritu contractus. Galenus de eo, hunc in modum scribit. Arterię apertę affectus, aneurysma vocatur.



catur. Fit autē eadē quoq; conuulnerata, quoties incūbens ei cutis cicatricem quidem contraxerit, maneat autem arteriē vulnus, dum nec coaluerit, nec carne fuerit obstruēta. Agnoscuntur huiusmodi affectus arteriarum pulsu, imō etiā premētibus nobis tumor omnis euanesceat, substantia quæ ipsum efficit, in arterias recurrente. Hęc quidem Galenus. Nos autem ipsa aneurysmata hoc modo inuicē discernimus. Quæ ad aperta arteria fiunt, prolixiora apparent, & in alto cōstituantur: digitisq; impressis ceu strepitus quidam exauditur, cū nullus sonus in iis quę rupturæ feruntur accepta percipiatur: illa verò rotunda magis sunt, & per summa occurrunt. Quæ igitur alas, inguina & ceruicem infestant, aliāq; loca, eximie magnitudinis aneurysmata, curare propter vasorum amplitudinem non tentabimus. Quæ verò summas partes, artus vel caput affligunt, hac ratione aggredi conuenit. Si quidē ex aneurysmate tumor obuenerit, cutem linea recta in longum incidemus, deinde hamis diductæ oræ sicut in vasorum dissectione dictū est, excoriabuntur, & scalpellis quibus membranæ auelluntur circumpurgata arteria nudabitur: acu traiecta duobus funiculis deligabitur, puncta prius arteria scalpello per medium: ubi cū ambienti membrana vnita fuerit, curatione pus maturante utemur vsq; dum funiculi exciderint. At si ex ruptura arteriæ creatum sit aneurysma, totum id quatenus fieri licet, cum cute digitis apprehendendum est, deinde acu duplex linum trahente, inferius eo quod exceptum est transsuendum. Et post acus traiectum ansulam forcice præcidere oportet, atque sic duobus filis hīc illic tumore deligare, veluti in staphylomate comprehensum est. At si metus sit ne fila circumuoluantur, altera etiam transmittenda est acus per totū quæ priorem premat similiter duo fila ducens: amputata ansula ex quatuor filis cōflata, ita tumorem ex lino deligabimus, vel tumore per medium ad aperto post excretionem, cutem adimemus, eam quæ ligata est relinquentes, ac splenium ex vino & oleo imponentes, remediis in linamenta illitis utemur.

*De aspera arteria tumore qui bronchocele dicitur.*

CAP. XXXVIII.

**G**Randis in ceruice, & rotundus tumor fit, nomē claturā ab internis partibus sortitus. Duplex eius tumoris differentia est. alius enim adipe tumet, alius partiū illarum di-

B 2



latione accidit. Atq; hunc notabimus veluti & aneurisma-  
ta, desperatūq; fugiemus, nō aliter ac vniuersa aneurisma-  
ta quæ periculosam habeant administrationem: præcipuè  
verò quæ circa ceruicem oriuntur, ob arteriarum magnitu-  
dinem. Qui adipe inturgescit, ita vt steatomata curari de-  
bet, discretis, præteritisq; vasis, eo nimirum modo quem in  
strumis exposuimus.

De ganglijs.

CAP.

XXXIX.

**G** Anglion, nerui est in nodum cōcretio, ex ictu, aut labo-  
re proficiens. plerunq; verò in manus iunctura, quā cū  
brachio cōmittitur, talo, & articulamentis absoluitur: quā-  
quam in aliis quoque partibus proueniat. Hæ comitēs sunt  
notæ, tumor, concolor, renitens, indolensq;. At si violenter  
premas, stupidum sensum experitur, non in alto, sed ipsa sub  
cute radices agens: & ad latera quidem transferri potest: sin  
autem vi adigas: tum antè, tum post, nequaquā potest. Quæ  
igitur in cruribus aut brachiis aut summis partibus oriun-  
tur, excindere tutum non est: periculum enim ne particula  
reddatur mutila. At quæ caput aut frontem inuadunt, cute  
scalpello diuisa curamus, & si quidem parua fuerint, vulsel-  
la comprehensa ex basi præciduntur: si maiora, hamis tran-  
sfixa excoriataque tolluntur: oras futuris commissas, medi-  
camento ad cruenta apto perfanamus.

De venæ sectione.

CAP.

XL.

**E**T si omnibus satis cōstet, quomodo vena incidi debeat,  
tamen ne parti chirurgicæ aliquid desit, & propter ar-  
tificiosas ipsius distinctiones, omittendum non est. Primum  
itaq; venæ sectionis cōsiliū est, vt sanguis qui redundat, eua-  
cuetur. Copia verò ipsius duplici modo capi demonstrata est,  
vno ad vires, venę licet plenæ nō appareant: in quo statu, ho-  
mo protinus imbecillis ac inualidus redditur: natura ceu ad  
graue aliquod onus ferendum impotente. Altero, vasa quæ  
id continent, in alia loca pondus transfundere spectantur:  
& si virtus haud cum molestia ipsum toleret: in quibus ru-  
ptis interdum venarum commerciis, sanguinis sputum, aut  
aliæ fluxiones accidunt. Copiæ igitur, quæ ex viribus æsti-  
matur, corporis grauitas, nota est. Venarum copia tum ex-  
tensione, tum quòd illæ plenæ tument, agnoscitur. vtraque  
autem, vacuationem necessariam indicat. Itaq; primo quo-  
que die sanguinem vsu id exigente demittes, sola in ventri-  
culo



culo ciborum concoctione, aut etiam perfecta in iocinore sanguinis elaboratione expectata. At si inter initia ob causam aliquam sanguinis detractio prætermittenda fuerit, vel ultra septimanam eum mittere alienum non est, si necessitas postulet, & vires non dissuadeant. Caterum qui venam incisurus est, id habet inspiciendum, num multa stercoris retentio intestina urgeat. Quod si ita deprehensum est, molli clystere alius antea vacuari debet: ne venæ putridam aliquam excrementorum colluuiem ab intestinis attrahant. Iis igitur qui ob morbi necessitatem, sanguinis detractioem requirunt, quouis tempore venam incidemus, si particularium duntaxat in febribus accessionum vigorem seu statum excipiamus. At si continens febris extiterit, matutinum omnino tempus magis idoneum est. Qui verò nullo morbo urgente, sed præcauendi illius gratia sanguinis vacuationem postulant, his verò opportunum est. Porro in ætatibus usque ad quartumdecimum annum sanguis mitti non debet, sicut etiam post sexagesimum, nisi necessitas quædam inuitabilis huc nos compellat. in summa, imbecillis viribus præditi, hanc vacuationem vitabunt. Caterum in particulis recens inflammatione tentatis, ex opposito inanitionem moliri conuenit: in vetustioribus, ex propinquo: siquidem ex multis corporis partibus sanguinem mittemus: frequentius autem ex interiori cubiti vena. Verum id considerandum venit, interiori & alariæ dictæ venæ, per totum, arteriam subiici: mediæ neruum: superior quæ & humeraria dicitur, periculi experta est. Ac in capitis morbis humerariâ incidimus. In his qui infra ceruicem affligunt, alariam: media vtrisque conuenit. Fascia igitur arcta partem aliquam circa brachij musculos deligare oportet, & frictione manuum alternante, repletam venam vsui commodam transversim per totam ipsius latitudinem solam diuidere. Etenim maiores hac plagâ, ægrè cicatricem admittunt. arctæ nimium inflammatio nem experiuntur, præterquam quod crassioris succi transitum impediunt. In quibus autem & secundo & tertio die, interim verò & quarto sanguinem detrahendum esse speramus, obliquius vena secari debet, quò manus inflexu dehiscens non protinus cicatrice obducatur, sic enim visum est Antyllo. At quantum euacuabitur, ex virium robore, & morbi magnitudine meriemur. Si humoris copia subest,



& materia efferuescit, vna vice vsq; dum anima deficiat extrahemus, virtute videlicet robusta, sic autem vt ager non ex humoris in ventriculum cōfluxu deficiat: ob quod etiam multi ante iustam vacuationem per initia statim animo destituuntur: verū eius deliquium his vacuati humoris ratione obuenire oportet. Iam verò si magnam vacuationem res postulet, vires autem sint inualidæ, distribuēda erit in initio: ac primum parcius detracto sanguine denuo idem auferetur: si res exigat etiam tertio. Ceterum vacuare solemus corpus vniuersum non modo in plethorica affectione, veluti & Galenus tradit, sed etiam propter affectus magnitudinē, quanquam totum corpus humoribus videas cōmoderatum, quemadmodum in sanguinis ex naribus, aut alia parte profuuiio, quod non copia excitauerit: ac vacuare reuulsorio modo ex oppositis conuenit. Quinetiam in valida inflammatione idem faciendum est, sicut in colicis & renibus calculosis, lippitudine, & iis quæ tam præcipiti modo vrgent. Nam dolor & partis inflammatae calor defluxioni præbent occasionē, licet vniuersum corpus superfluitatibus careat. Quapropter parcius id tunc faciendum est, vacuatione adhibita, quæ potissimum laborantis ætati, & naturæ competere videatur: consideratio etiā anni tempore, loco, & egrotantis consuetudine. Porro in quibus propè venam quæ diuidetur magna quædam est inflammatio, quemadmodum in pleuriticis & iocinorosis, optimū est expectare, dum color sanguinis, & substantia mutetur. Diuersus autem est in inflammatione sanguis, à naturali: quoniam largius incallescens, siquidem prius erat crudior, rubicundior, magisque flauus euadit: si autem talis prius extiterit, in nigrum adustus mutatur. Non tamen ex toto mutationem ipsius expectare consilium est: sed etiam ante illam nonnunquam cessare conuenit, idque duplici de causa, aut ob virium imbecillitatem, quas solui ex pulsuū tactu cognosces: sunt enim ipsi inæquales vehementia, & magnitudine, vel etiam languidi, & robur fluxionis inclinans imbecilles iam vires notat: vt propter inflammationis malignitatem: nonnunquam enim nihil remittit, sed vehementer impacta est. At si nihil horum obstiterit, ægérq; floridæ ætatis sit, expectanda est sanguinis mutatio, magisq; si ambiens aër temperatus fuerit. Si verò sanguis ante iustam vacuationem fuerit suppressus,



sus, id autē accidit aut propter timorē, & animi defectū aut sanguinis grumū, aut violentam constrictionem, contra singula pugnabimus: Animam deficientem, odoratis naribus admotis refocillantes: constrictionem, vinculo remisso soluentes: in grumum coactum sanguinem, vel olei infusione, vel digitorum fotu dissoluentes. Reliqua sanguinis dimittendi præparatio nulli non cognita est: verum hæc in cubiti venis fieri solent. At ex fronte sanguis detrahetur in capitis doloribus ita: capite fomentis adiuto, fascia cervicem vinciemus, digitis super guttur interpositis, ne suffocatus ægri intereant: repleta iam vena in fronte, acie scalpelli diuidetur. Eodem modo etiam circa guttur extantes venæ sphagitides appellatæ, ob vetustam lippitudinem aduersa scalpelli parte scinduntur, ita ut sanguis erumpat. Item venas linguæ subditas, veluti in anginis, transuersas incidimus, euitantes constrictionem. Nonnulli vero in maioribus oculorum angulis venas eminentes, sicut in longis capitis, vel oculorum morbis similem in modum diuidunt. In quibus internas quoque narium venas vel mucrone scapelli contundentes, vel quibusdam asperis irritantes disrumpunt. item post aures sitas ob capitis affectus feriunt. Quæ vero poplitem perreptant, in renum cruciatibus aperiuntur. Quæ extremas corporis partes intercurrunt, superiacentibus vinculo exceptis & manuum frictione, & pedum incessu repletæ diuiduntur. in sinistra quidem manu, cum lien malè habet, venam quæ inter paruum & anularem digitum porrigitur, præcipuè incidemus. cum iecur affligitur, in dextra. Nam extremarum partium inanitio, è longinquo magis facta efficacior molitur reuulsionem: in pede, veluti cum coxendicum dolores aut vteri vitia vrgent, eam quæ supra interiorem talem eminent, dissecabitur.

*De cucurbitularum usu.*

CAP. XLI.

**C**ucurbitulis neque per affectuū initia, neque cum corpora sunt plethorica, utemur: sed iis prius euacuatis, cumque nihil particulæ influit. Vfus eius est mouere aliquid, agitare, & foras extrahere. Levis itaque cucurbitula inflationes discutit, distillationes in stomachum suspendit, sanguinem attrahit, & profluētem rursus sistit, obiectis partibus admota: &



quod altè conditum est, in summa rursus educit. in totum humores traducit, spiritus euacuat. At quæ cum scarificatu adhibetur, efficacioris causis perspiratum præbet, sensibilibiter ex alto ea quæ nocent eliciens: quippe non modò sanguinem, sed alios quoq; humores vacuat, præsertim cum flamma ampliore adglutinata: verum si à carnosis particulis detractionem moliri statuimus, primùm cutis scapello exasperanda, deinde cucurbitula imponenda est. Sin excarnis magis pars fuerit, leuem prius cucurbitulam defigemus: vbi in tumore particula eleuata sit, scarificatu adhibito, rursus ipsam accommodabimus: & si paululum vacuare cogitamus, vna diuisio abundè est: sin amplius, plures adhibentur. Item si tenuiorem qui continetur sanguinè acceperimus, summa scarificari, si crassior, alta debent: quando etiam concretum ex ictu sanguinem educere animus est. Terminus autem moderatæ diuisionū altitudinis est, sola cutis crassitudo. Nonnulli instrumentum ad hoc excogitarunt tribus scapellis æqualibus simul iunctis, vt vnica iniectione tres fierent plagæ: verum hoc nos inutile putantes simplici scapello contenti sumus. Alij cucurbitulis vsi sunt vitreis, vt sanguinis qui vacuatur mēsurā in extractione pellucescat: verum æneæ cum maiorem sustineant flammam, multo sunt efficaciores vitreis, quæ faciliè dirumpuntur. Quinetiam quæ ex cornibus, ore sugentes trahunt, minus quidem inaniunt, non autem siccant, quemadmodum quæ cum flamma si opus fuerit, adhibentur. Cæterum cum admoturi sumus cucurbitulam, particulæ in rectum figuratæ ex latere hanc defigemus. Si enim iacentibus ipsis super, linamentum ex lucerna simul cum flamma inducamus, in cutem decidens illa, grauiter adurit, vsu hoc non postulante. Est cum cucurbitulæ magnitudo subiectæ parti adæquabitur, eaq; de causa permultum cucurbitulæ & paruitate & magnitudine differunt, quemadmodum etiam collo prolixiores & spatio inferiori latiores aliis efficacius extrahunt. Cauendum autem ne prope mamillas cucurbitula applicetur. nam illapsæ cucurbitulis nonnunquam mammæ & inturgescunt vehementer, haud faciliè ipsas relinquunt, atque tunc spongas ex calida cucurbitulis circumdare oportet, sic enim remittuntur: si minus hoc modo fuerint laxatæ, perforari ipsas ratio est.

Quæ



*Quomodo ala adurantur.*

## CAP. XLII.

**H**umeri articulo luxato in nonnullis caput frequenter & continuè excidit, vel humiditatis superantis vitio, el quod continuæ luxationi opportunus locus euaserit, quando aduersionem descendere oportet. Proinde ægro, aut upino, aut in sanum latus inclinato, interiorem alæ cutem quâ potissimum articulus excidit, duobus sinistræ manus digitis, vel hamulis tenuibus & oblongis eleuatam, candenti ferro adurare oportet, quousque ferramentum ex aduerso inflexum vno impressu duas crustas excitarit, & si magnum intercedens harum spatium fuerit, mucrone scalpelli per ipsas traiecto aliam in medio crustam faciemus, adurentes usque dum ferramentum vrens scalpello inciderit. Item alias duas Hippocrates iuxta vtriusque dictæ mediam fieri consulit, æquali illis spatio distantes quadrangulæ figuræ modo. Altius autem cute non penetrabimus, quòd nerui, glandulæ, ac aliæ particulæ quæ inflammationē difficultatemq; functionum, excitare possint, subiecta sint: curari vero adusta debent porro cum sale trito & imposito, tum aliis præfidiis ad crustas inscriptis, postea manu operandū cautè erit.

*De adnatis digitis & sexto digito.*

## CAP. XLIII.

**A**dnaſcuntur digiti in manu nunc propè maiores digitos, nunc propè exiguos, raro autè visi sunt iuxta aliorum aliquem. Eorum vero qui adnaſcuntur, alij per totum carnosum sunt, alij ossa in se continent, nonnunquā & vngues. Ossa habentium, hi ab articulo procedunt, cuius commissuram alteri digito communicant, illi ex naturalium digitorum fissura oriuntur: atque huiusmodi perpetuo sunt immobiles: reliqui mouentur nonnunquam. Carnosorum expedita est præcisio. nam scalpello quod superuacuum est in totum tollimus. Eorum qui ab articulo prodeunt, difficilior est tractatio illis qui à digitorum fissura originem traxerunt: primum caro orbiculatim usque ad os excinditur, ipsumq; os excisum aut erasum, aufertur. Cæterū inter curandum radimus ipsa, & cicatrice obducimus quemadmodum etiam in ossium vulneribus declaratum est.

*Quomodo purulentis adustio adhibenda.*

## CAP. XLIIII.

**V**stio efficacissimum purulentis præsidium inuentum est. Conuenit igitur ferro candenti crustas excitare: vnam inter clauiculæ compagem cute sursum educta. duas



autē exiguas iuxta mētū, sic vt ab arterijs quæ carotides ap-  
pellātur, recedatur. Duas itē sub mamillis ampliores inter  
tertiā quartāq; costā, alias duas inter quintā & sex-  
tā paulūm in posteriora spectantes: aliam, per medium pe-  
ctus: rursus aliam supra os ventriculi, tres posterior: per me-  
dium dorsum vnā, vtroq; spinæ latere duas, quæ in dorso  
factā crustā excedant non admodum extantes. Alii, vt  
tradit etiam Leonides, ferro mucronato candenti per me-  
dium costæ spatium vbi abscessus est, adacto, vsque ad pus  
vstionem moliti sunt. Nonnulli etiam hos curare ausi sunt,  
transuersa linea inter quintā & sextā costā ducta, &  
cute paululum obliquē diuisa, deinde sic scalpello membra-  
na quæ costas succingit perforata, pus excreuerunt. Atque  
hi cum illis qui ferro vsque ad imum adurant, aut statim  
mortem inferunt, vitali spiritu confertim vnā cum pure eua-  
cuato, aut fistulas reddunt insanabiles.

De cancro.

CAP. XLV.

**C**ancer, tumor est inæqualis, oris prætumidis, aspectu  
teter, liuidus, & indolens, interim sine vlcere, quē Hip-  
pocrates latentem nominauit: is si curetur, peior euadit: in-  
terim exulceratus: nam cum ex atra bile ducat originem,  
magna parte eroditur. Pluribus quidem corporis parti-  
bus accidit, præcipuē fœminarum locis, & mammis, quæ  
venas vndiquaque turgidas habent, quemadmodum can-  
cer animal pedes, vnde etiam nomen sortitus est. Quæ  
igitur per medicamenta curatio adhibetur, quarto volu-  
mine abundē explicata est: eius autem cancri qui vuluam  
infestat, tertio. Quoniam vero partes putrefactæ, aut quæ  
(vt simpliciter dicam) naturæ modum excesserunt, ab-  
lationem sui postulant: cancris autem vuluæ manus ope-  
ra nec potest, nec vtile est admoueri: eorum qui exteriora  
infestant, præcipuē māmās curandi administrationem tra-  
demus. Quidam enim totā partem vitiatā ferramen-  
tis candentibus absumunt: alij totā mammā præci-  
sam adurant. Galenus solā administrationem quæ per  
sectionem fit, recipiens, hoc modo scribit. Si quando can-  
crum scalpello curare audebis, incepisse vacuationem à me-  
lancholici humoris purgatione oportebit, vbi iam totum  
quod vitiatum est exactē præcideris, sic vt nulla radix su-  
per sit, sanguinem effluere finito, nec celerius eum cohibe-  
bis,



is, verum etiam premendo vicinas venas, crassiores ex  
his sanguinem exprimes: deinde aliorum vlcere modo  
curabis. Hæc quidem Galenus memoriæ prodidit. Reliqua  
vero maligna putridaque vlcera nempe phagedænas, gan-  
grænas & consimilia eodem tractare modo debes.

*De ijs quibus mammae fœminarum modo inturgescunt.*

## CAP. XLVI.

**Q**uemadmodum fœminis, ita masculis quoque pubertatis  
tempore, mamillæ modicè inflantur sed plerisque  
rursus subsidunt, in nonnullis sumpto initio crescunt pin-  
guedine subnascente. Cum itaque indecora hæc corporis figu-  
ra muliebris habitudinis notam repræsentet, digna est cui  
manus admoueat. Lunata per imam mamillæ partem  
linea ducitur cute detracta: ademptaque pinguedine, futu-  
ris committetur. At si fortè mamilla partibus ipsius ob ma-  
gnitudinem ad ima, ut in mulieribus, inclinauerit, lunatas  
ad duas plagas in extremis inuicè coeuntes inferemus, ut mi-  
nor à maiore comprehendatur. Cute quæ intercedit cum  
pinguedine adempta, similiter futuris vtemur. At si aber-  
rantes minus exciderimus, tunc eo quod superest rursus ad-  
empto, futuras iniiciemus, & medicamentum cruentis ido-  
neum accommodabimus.

*Quomodo iecur aduratur.*

## CAP. XLVII.

**S**i dolor cum grauitate iis oboriatur quibus iecur vomica  
laborat, carnea ipsa substantia vitata ostenditur. Si acu-  
tus dolor magis vrgeat, puris in tunica collectio: adurere  
hoc modo oportet. ferrum candens mucrone tenui, paulò  
supra inguen qua iecur desinit, iniicitur, ut crustam vnā  
excitet: Vbi vero totam cutem adusserit, & vsque ad tuni-  
cam penetrauerit, pus excernetur. Ab euacuatione phaco-  
melite, hoc est, lenticula melle addito vtemur, tum iis quæ  
mulsa & speciebus ad carnem creandam componuntur: post-  
ea vero etiam cicatricem ducentibus.

*Quomodo lien aduratur.*

## CAP. XLVIII.

**U**tis quæ lieni incumbit, hamo eleuata, oblongo ferro  
candenti per totum ipsa aduretur, ut vnico impressu  
duæ fiant crustæ idque faciemus ter, quò omnes crustas nu-  
mero sex habeas. Marcellus autem tridente quam triænam  
Græci dicunt, aut tridentis simili ferramento vtens, vno ad-  
actu crustas excitauit.

*Quæ*



*Quomodo stomachus aduratur.*

CAP. XLIX.

**I**N longis stomachi defluxionibus, recentiores vñ sunt aduritione. Alij ferramentis candentibus mucronatis trencruftas moliuntur, vnam iuxta cartilaginem quæ ab ensiformis figura Græcis vocatur xiphocides: alias duas inferius trianguli figura, altas vt cutem diuidant: Alij vnam duntaxat adhibent, ampliorem supra ipsum os ventriculi. Sunt, qui non ferro quidem vrant, sed ifcis appellatis: sunt autem hæ spongiosa quædam corpora in quercubus & corylis nascentia barbaris magis vñtata. permittunt autem vulnere sine cicatrice diu manere, imò etiam magis adhuc diuidunt, vt maioriore per ipsa difflatu os ventriculi ab influxionibus immunene permaneat.

*Quomodo aqua hydropicis emittatur.*

CAP. L.

**Q**uomodo aqua intercus contrahatur, quot sint ipsius differetia, quæ causa, quæ notæ, quodq; remedium tertio volumine sumus executi: vbi & demonstratum est. illud solum aquæ inter cutem genus quo veluti in vtrem aqua colligitur, asciten dicunt, manus operam postulare. Atque eam hoc loco explicabimus. Itaque rectus homo statuitur, sin minus, in sedili collocatur: si ne hoc quidem fieri potest, attingi non debet, cum adeò sit inualidus. Stante recto homine ministris retro assistentibus, iubebimus vt tuorem ad pubem digitis premat, depellatq;. Nos aculeo, aut scalpello quo vena inciditur, si ex partibus iuxta intestina sitis originem contraxerit, directè sub vmbilico tribus digitis interpositis immum abdomen adusque tenuem membranam quæ peritonæos vocatur, diuidemus. Sin autem primario iecoris affectui malum fertur acceptum, à sinistro vmbilici parte diffecabimus. si à liene vitium trahit originem, in dextra. non enim in illa parte sectionem mollemur, in quam decumbent. Ac cute quæ superiacet acie instrumenti excoriata, membranam quæ finit abdomen, peritonæos vocatur, diuidemus, quousque scalpellum ad vacuum vsque regionem penetrauerit. Deinde per foramen abdominis, & peritonæi, aneam fistulam scriptoriis calamis acie similem demitemus, & per hanc humor effundendus est pro cuiusque virium ratione, quam ex pulsus tactu deprehendemus. Deinde exempta fistula, humor fissi debet. Afferetur autem statim cum diuisio ipsa alternatim sit facta.

At A



nos securitatis gratia linamentum tortile per solam abdominis diuisionem dimittimus, ægro recumbente recreaque, per insequentem diem rursus momentum humoris tantum virtus exigit fistula euacuabimus, atque ita deinceps faciendum est, quousq; minimum humoris supersit, ita tamen, ut vbique subitam cumulatamq; vacuationem vitæ, multis siquidem imperitè manum admoliti vnà cum humore vitali etiam spiritu vacuato subito hominem iugurunt: qui vero securius rem agunt, modico humore educto, ut virtus magno leuaretur pondere, reliquum medicamentis aquam ducentibus arena, sole, siti, & cibis desiccantibus consumpserunt. Iam vero vstione super stomachum, iecur, lienem, imum ventrem & vmbilicum vsi sunt, quinque crustas adhibentes. Alij ferro tenui candenti: alij iscis nungupatis, aut aliquo ex alia huiusmodi materia, & plerique hac curandi ratione magis consanuerunt, interim nullam in totum compunctionem (quam paracentesis vocat) experti.

*De vmbilico prominente.*

CAP. LI.

**V**mbilicus indecorè prominere solet, quod vitium Græcè exomphalon dicitur, interim membrana quæ abdomen finit, peritonæum appellauit, illic dirupta, ac procidente, aut omento, aut intestino, interim colluie otiosi humoris sub vmbilico contracta, interim vero carne subnata, aliquando sanguine irrupente, propter venæ, aut arteriæ rupturam, ut in aneurysmatis, interdum non sanguine, verum spiritu solum irruente. Si igitur momentum prociderit, circa vmbilicam tumor concolor, mollis tactu, indolens & inæqualis apparet. Si intestinum prolapsum est, præter commemorata, etiam inæqualis magis tumor est, & digitis impressis cedit, euanescitq;: nonnunquam strepitum elidens, balneis, & distentionibus magis increscit. At si humor collectus est, mollis similiter tumor apparet: pressus autè non cedit, neque decrescit, neque tamen augetur. Quod si autem accedat superioribus signis, ut tumor sit liuidior, carneque subnata durior, etiam tactui renitetur, & eadem in magnitudine manet. Si ex inflatione eminet, tumor mollis ad tactum subsequetur, qui digitorum impulsu sonum quendam reddit, & pressus aboletur. Hunc in modum curabitur: erecto homini iubemas ut spiritum contineat, quò in omnem partem distendatur: deinde omnem vmbilici excre-

scent



scientiam orbiculatim atramento scriptorio notabimus, resupinatoq; homine scalpello tumorem, quā nota atramenti est exasperabimus: deinde mediū hamo eleuatum, lino aut neruo quā exasperatio est, circum astringemus (hoc enim pacto continebitur ne deuoluatur) anfulam supra deligaturam ponentes, postea tumore quem cōstrinximus iuxta verticem adaperto digitum indicem demittemus, tentabimusque diligenter num intestini implexus, aut pars omenti simul fuerit constricta. Ac siquidem intestinum fuerit relictum laxata funiculi anfula, id introrsum pellemus: si vero omentum sit, eo retracto, quod superuacuum est amputabimus, vase quod (vt verisimile est) coincidit, lino deligato: mox accipientes duas acus simplex linum ducentes, iuxta hiatum per incisionem cutis factam traiectamus, & anfulis linorū præcisis, quemadmodum in aneurysmate dictum est, ex quatuor initiis constrictionem moliemur. Vbi corpora lino deuincta computruerint exciderintq;, medicamentis in linteola illitis curatio absoluetur, si cauam magis cicatricem fieri semper cupiamus. Hæc quidem ad omenti, aut intestini affectum pertinet. At si caro, aut humor, aut sanguis vitium crearit, tumoris medio circulatim præciso: deinde eo quod incumbit extra peritonæum, sublato, curationem carni generandæ dicatam tentabimus. Porro si vmbilicus emineat, aut ex vasorum dilatatione, aut spiritu intercluso, attingi non debet, quemadmodum etiam aneurysmata.

*De peritonæo, hoc est, interiore abdominis membrana conuulnata, item de intestini, aut omenti procidentia. vbi etiam tractatur, quomodo ventris vulnera sarciantur ex commentarijs Galeni. CAP. LII.*

**Q**uomodo peritonæi, hoc est, interioris abdominis membranæ vulnera optimè queas manu curare, deinceps vni considerandum. Si igitur paruum adeò vulnus extiterit vt inflatum iam quod procidit intestinum remittere nō liceat: necessariū est, aut flatum elicere, aut vulnus ampliare. Satius autem fuerit meo iudicio quod prius dixi agere, si modo id consequi possis. At qua magis ratione id consequare, quā si causam vnde intestinum inflatur, è medio sustuleris? Quæ igitur ea est? nimirum, ambientis nos aëris refrigeratio: quare etiam remedium ex calore petetur. Itaq; spongia molli aqua calida madenti, mox expressa calefacere intestinum oportet. Præparetur autem interea vinum austerrum



com calidum. etenim hoc magis quàm aqua calefacit, ac  
bur intestino adiicit. At si per hæc intestini inflatio non  
asserit, tanta peritonæi pars incidi debet, quanta id quod  
cidit, opus habet. Idonea vero ad eiusmodi sectionem ha-  
entur scalpella recta quæ Græci syringotoma vocant, id  
pt, quæ ad fistulas incidendas sunt accommodata. Figura  
item laboranti apposita fuerit, cum in inferiori parte vul-  
is factum est, si sursum vergat: cum in superioribus, si de-  
rsum, & si in dextris vulnus sit, in contrariam partem cor-  
us incumbet, si in sinistris, in dextram, atque hoc tum ma-  
nis, tum exiguis vulneribus commune est. Caterum cum  
intestina in proprium reponi locum debent, ex magno vul-  
ere collapsa ministro dextro opus est: oportet enim ipsum,  
bi manibus suis totum vulnus à foris apprehenderit, intro  
epellere, constringere ac exiguum semper suenti denuda-  
pe: quinetiam id quod consutum est, mediocriter comprime-  
e, quoad totum exactè persuatur. Porro quæ idonea suen-  
si abdominis ratio existat, deinceps dicamus. Quoniã coi-  
e abdomen cum peritonæo conueniet, incipiendum qui-  
dem à cute est, atque ab externo introrsus acus demittitur:  
vbi iam & cutem, & rectum musculum totum transierit,  
præterito quod ei adiacet peritonæo, per reliquam huius  
partem eam ab interno extrorsum, atq; inde per reliquum  
abdomen traiectabis: vbi hoc penitus pertransierit, rursus  
ab externo introrsum, idem abdomen perforandum est: mox  
vbi peritonæum quod illi quoque adiacet præterieris, & ad  
oppositum perueneris, id quoq; ab interno extrorsum per-  
pungi, vnaq; eum eo totum ipsi cohærens abdomen debet.  
Deinde ab hoc rursus incipiendum, atq; id cum opposito pe-  
ritonæo consuendum. Ac rursus vicina etiam cute traiecta,  
iterum ab ea parte acus introrsum est inicienda, consu-  
dumq; id cum opposito peritonæo, inibi quoque vicina cute  
transmissa: atque hæc iterum iterumq; facienda sunt, quo-  
ad totum vulnus similiter consuerimus. Interuallum vero  
futurarum quod ad compescenda ea quæ subsunt, pertinet,  
breuissimum esse postulat. Quod autem ad firmitatem  
requiritur, inter futuras cutis ne alibi rumpatur, vtiliter  
breue non est. quare vitato vtriusq; excessu, eligēda medio-  
citas est. Iam hoc quoq; omnium vlcera commune quo-  
dammodo est, sicuti etiam ipsius quo suuntur, fili ratio.

Quod



Quod enim durius est, cutem rumpet: quod mollius, confestim ipsum rumpitur. pari modo si proximè oras summas acum transegerit, quod reliquum est cutis, quoniam minimum est, dum violenter adducitur, rumpi cogitur. Sin plurimum ab iis recesseris, non parum cutis inglutinatum relinquetur. Hæc licet omnium sint vlcera communia, maximè tamen seruanda in abdomine suendo arbitror. Porro ipsum abdomen, aut quemadmodum est expositum, consuetur, huc diligentia adhibita, vt peritonæum abdomini coalescere possit: quod vix sperare audeas, cum neruosum existat: aut sicuti quidam facit, qui quæ cognatæ naturæ sunt, ea committunt, vtpote peritonæum peritonæo, abdomen abdomini. Id autem fiet in eum modum. A' vicini nobis abdomine incipitur, atque ab externo introrsum per id solum acus traiectatur. post præteritis vtriusq; peritonæi labris, ex obiecta parte à foris introrsum per vtrunq; eius labrum acus reuocatur: dein hæc rursus reducitur, atq; ab interioribus foras per aduersum abdomen transmittitur. Hic modus à communi, & ex prompto, quo nimirum vno adactu per quatuor labra acus traiecitur, id differt, quòd peritonæum totum intra abdomen prorsus recondit. Cæterum medicamenta ad hæc idonea materiæ illius esse debent, cuius sunt ea quæ cruentis iniiciuntur. Vt autem nulla pars principalior consortij lege doleat, lanam conuenit mollem oleo mediocriter calido imbutam toti, quod inter inguina & axillas est, circumdare. Præstiterit autem si per clysterem intestinis aliud simile infundas. Si vero nonnihil in ipsis quoque intestinis conuulneratum sit: quod iniicietur, vinum nigrum, austerum & tepens erit, eoq;ue magis si totum vsque ad interiorem meatum peritum sit. Facile igitur curationem recipiunt intestina crassa: secus habent tenuia: ieiunum vero omnibus insanabile est, tum propter vasorum magnitudinem multitudinemq;, tum quòd tunica eius pretenuis neruosaq; existat. accedit huc quod etiam bilem synceram totam recipiat: adde quòd omnium maximè iecori vicinum habeatur. Ventriculi porrò imæ partes carnosæ vlcera curari cum fiducia debent, siquidem fieri potest vt res bene succedat, non solum quòd hæc crassiores sint, sed etiam quòd sedes medicamenti quæ illas curabunt, adhibendis in eo loco est accommoda. At vlcera quæ os & gulam infestant,



stant, solo transitu medicamenta attingunt: quæ autem orificium ipsius obsident, ij sensus quoq; in illo acutus sanationi aduersatur. Cum autem peritonæo rupto omentum prolapsum aut liuescat aut nigruerit, fune exceptum antequam nigrescat, ne sanguis profundatur, præcidere conuenit id quod post vinculum habetur, atque vt in extremo inferiori iam commemoratæ abdominis futuræ vinculi fines pendeant, curabimus, quò scilicet faciliè eos cū ex vulnere suppurante eructentur, eximamus.

*Ad tegendam glandem colis sinuda est.* CAP. LIII.

**I**n quibus glans colis penuria cutis non contegitur, aliqui indecori gratia duplicem administrationis modum excogitarunt, nunc in superiore colis initio cutem orbiculatim secantes, vt facto ipsius diuortio, inferior cutis attrahatur, donec glans occulteretur: nunc subtus interiorem cutem à glâdis radice scalpello excoriantes, inde inferiorem trahentes, mox linteo quodam molli ambiens præputium deligantes, ita vt linteolum aliquod quæ cutis excoriata est, interponatur, ne præputium cum glande coalescat. Hunc modum Antyllus magis recipit, lōgiore ipsum oratione exponens. Nos autem summam dixisse contenti sumus, quoniam raro inter artis opera huiusmodi administratio requiritur, tū quod affectus nullam muniis obeundis difficultatem pariat, tum quod neq; tantum indecori afferat, vt hac magis inquisitionem aliquam ex chirurgia deligas.

*Quomodo glans penis contacta aperiri possit, vitium dicitur hypospadiæon.* CAP. LIIII.

**P**lerisque glans ab origine non perforata est: verum sub cane appellato quæ glans suspensa est, foramen habetur: vnde neq; vrinam facere antequam possunt, nisi particulam versus imam ventris regionem, admodum inclinent, neq; liberis dare operam, cum semen ipsorum in vterum recta non possit eiaculari. Omnium itaq; simplicissimus tutissimūq; curationis modus est qui fit per præcisionem. Itaq; resupinato homine glans sinistræ manus digitis validè attolletur: deinde scalpelli acie ipsa iuxta coronam præcidetur, plaga non obliqua, sed sculpturæ simili, vt per medium eminentia quedam glandem repræsentans appareat. Quoniā verò sepe sanguis profundus solet, si fieri potest medicamentis ei retinendo dicatis sistemus, sin minus, tenuibus ferramentis aduremus.

C



**D**Vplex phymi causa est: aliquando enim sic glandem præputium tegit ne nudari possit: aliquando retrorsum deducta reduci nō potest. Hæc species propriè periphymosis dicitur. Prior itaq; differētia, aut ex cicatrice quæ in præputio concreuerit, aut ex carnis incremento quæ illic coaluerit. Altera genitalium inflammationibus fertur accepta, quoties abducta cuti retrorsum glans intumuerit, nec vltra præputiū receperit. Si igitur prima phymi causa fuerit, curationem hoc pacto tētabimur: figurato homine, vt par est, præputium in anteriorem partem attrahemus, demissisq; in summū ipsum hamulis tribus, quaternisve, ministris continendum exhibebimus, iubentes, ipsum quantum fieri potest, diducant aperiantq;: deinde si ex cicatrice exterior collectio fuerit creata, scalpello ab interiore parte præputium in tribus quatuorve locis incidemus lineis directis & æquali inuicem spatio distantibus, idq; intrinsecus: est autem duplex in glande præputium: os igitur ipsius ab interiori parte diuidemus, sic enim contractione quæ ex cicatrice coaluit, dissoluta, præputium superinducemus. At si caro ab interioribus adnata phymum produxerit, carne tota ferro scarificata, præputium abstrahemus: carnem inter lineas eminentem rademus, postea plumbeū canalem glandi vniuersæ circundabimus, inuoluta ipsi papyro sicca. Habeat autem canalis foramen vndique æquale. sic enim huius circumpositu præputium adductum rursus coalescere prohibebitur, dum & à plumbo & papyro inuoluta distentū seruatur: intumescens enim ex deligatura magis adhuc cutem diducet. Hoc igitur faciundum est, siue ob cicatricē, siue carnis excrescentiam phymo generato manū adhibuerimus. Sin autē periphymosis appellata creetur, vetustate tēporis coalescit, & curationē nō recipit, nisi quis eo modo velit tractare quem ad tegendā glandem vsurpamus. Sin autem nondū coaluerit, vibicibus super ipsum rectis tribus, aut quatuor, aut etiā pluribus circularim excitatis, oleo copiosiore tepido superfuso, extrorsum attrahemus.

*Si præputium glandi adhærescit.*

C A P. L V I.

**G**Lans & præputiū inuicē cōmittuntur exulceratiōe præcedente. Cōuenit igitur subtus cute, quantū licet, excoriata;



riata, acie scalpelli, aut spathula polypo accommodata, ea que resistunt dissolvere, id potissimum conantes, ut glandem pure à præputio adhærescente discernamus: quod si non fuerit expeditum, glandis potius nonnihil ad præputium assumere, quam e contrario: cum enim præputium tenue sit, facile perforatur. Vbi commissuram dissolueris linteum tenue aqua frigida madens, glandi & præputio interponendum, ne rursus coalescant, vino astringente cicatricem ipsis obducemus.

*De circumcisis.*

CAP. LVII.

**N**on de iis qui religioso gentium more circumciduntur, nunc verba faciemus: sed de iis quibus affectu naturalium oborto, præputium nigrescit. Itaque in iis totum quod nigruerit, orbiculatim præcidi debet, deinde squama cum melle utendum, vel etiam malicorio, & eruo medicamenti instar quod linteolis illinitur. Si verò sanguis quandoque profuat, ferramentis lunatis candentibus utendum, quæ utrisque simul iniiciantur, & ipsi sanguinis profluuium, & vulnere depascenti. At si tota interim glans absumpta fuerit, exiguum è plumbo canaliculum imponentes meatui, per ipsum ægroto urinam reddere iubebimus.

*De thymis naturalium.*

CAP. LVIII.

**T**hymi carnosæ sunt tubercula, nunc in glande, nunc in præputio proveniunt. Ex his, alij maligni, alij non sunt. Mitiores itaque scalpelli acie deradere convenit, & chalcitide ipsis inspergere: in malignis, eo quod vitiatum est, exciso, adustione utendum. At si ex opposito aduersoque sibi inuicem in præputio fiant thymi, hi, intra ipsum, illi, extra, non oportet omnibus ipsis confestim manum admolari, ne præputium structura tenue, imprudenter pertundamus. Sed primum interiores auferre consilium est, iisque cicatrice obductis, tunc quoque exteriores aggredi. Nonnulli verò recentiorum forfice ipsos auellentes equino pilo deligatos, curare solent, quemadmodum alij refrigerato ferro candenti eosdem deurant.

*De catheterismo, & clystere vesicæ.*

CAP. LIX.

**C**um urina non redditur, quod iter ipsius obstructum sit, aut concreto intus sanguine, aut calculo, aut alia quadam causa, catheterismo id quod superfluum est eximemus. Sumpto igitur cathetere, ætati & sexui conuenienti, probe ipsum dirigemus, quod hoc modo fiet: lana exigua lino deli-

C 2



gata per mediū, linoq; ex acuto iunco per catheteris fistulā traducto lanā foramini adaptabimus, quod iuxta catheteris mucronem est, ac forfice præciso eo quod ex lana eminet, catheterem in oleum demitemus, egro in subsellium collocato, & fomentis si nihil prohibet, irrorato: catheterē in rectū inferemus vsq; ad colis basim: deinde naturalia ad umbilicum inclinabimus. etenim ab hac parte obliquus vesicæ meatus existit, deinde sic cathetera adigemus. Quum verò iuxta regionē inter scrotum, & anum, propè sedem fuerit, rursus genitalia imposito instrumento deflectemus, in naturalem reducentes figuram, nā à peritonæo vesicæ meatus sursum tendit, propellemusque catheterem vsq; dum vesicæ sinum penetrauerit: secundum hoc, linum catheteri iniectū retrahemus, quò vrina simul cū lana attracta subsequatur, quemadmodum in syphonibus accidit: atq; talis demittendi catheteris modus est. At quia subinde exulcerata vesica colui desiderat, siquidem auricularij clysteres, id quod iniiciendum est possint transmittere, illis in prædictum modū utemur, in vesicam demissis: si fieri nequit, catheteri pelle, aut vesica bubula adaptata, eoq; indito, vesicam colluemus.

*Quæ curatio calculosis adhibeatur.*

C A P. L X.

**C**Um alibi demonstratum sit qua ex causa calculi generentur, tum, quòd pueris in vesica magis: prouectioribus, in renibus crescant, nunc rationem exponemus, qua excindi possint, ubi notas prius eorum qui vesica habentur, designauerimus. Vrina igitur aquosa est, quòd in eis subsidet, arenosum: pundendum continuo vexatur pruritu, laxatur sine ratione, rursusq; arrigitur, crebro id contrectant irritati ægri, & maxime pueri cum calculus in ceruicem vesicæ incidit, etiā repente vrina supprimitur. Porro inter eos quibus calculus excinditur, pueri quidem vsq; ad quatuordecim annos propter corporum mollitudinē, facile curationē recipiunt: senes, quòd corpus ipsorum contumax sit, vix cōsanescunt: mediæ horū ætates etiam in hoc, medio quodam modo habent. ac rursus facile sanantur qui maiores calculos habent, quòd inflammationibus assuerunt: qui minores, difficulter sanantur, cōtrarias ob causas. Hac cū ita se habeāt, ad chirurgiā profecti, cōcussione utemur prius, interim per famulos, interim ipso ægroto ex alto quodā loco desiliēti, quò calculus ad vesicæ ceruicē propellatur, deinde figurari æger



æger debet, cœu rectus in sedili, manibus subter femora por-  
rectis, quò in angustum vesica compellatur. Si igitur cõtìn-  
gentibus nobis calculus in regionem scroti & ani interme-  
diam procidat cõcussione exturbatus, inde ad sectionē con-  
uertemur. Sin minus occurrat, indicem sinistrae manus digi-  
tum, si puer sit qui ægrotat, vel etiam medium, si ætatis sit  
prouectioris, oleo perunctum, in anum demitemus, & su-  
pinis digitis perquirentes, calculūq; occurrentem paula-  
tim traducētes, in vesicæ ceruicem coarctabimus: & digito  
vno, pluribûsq; propellentes ipsum in exteriora, impactum,  
ministro altero manibus vesicam premere iussu, alteri præ-  
cipiemus dextra manu testiculos sursum teneat, sinistra re-  
gionem inter scrotum & anum mediā extendat in alteram  
partē, ab ea qua sectionē moliemur: ipsi assumpto scalpello  
ad calculos aptato, inter anū & testiculos, nō per mediū lo-  
cū inter scrotū & anū, sed in alteram partē iuxta sinistriorē  
clunem obliquā super lapidem qui subiicitur incidendis, du-  
cēmus lineā, quæ extrinsecus latum habeat spatium, intus  
non amplius, quā vt calculus per id queat excidere. Inte-  
rim siquidem digitis super anum innixis, aut digito vnā cū  
sectione sine euulsione calculus leniter exilit. sin minus exi-  
lerit, vncō huic rei accommodo iniecto eximemus: Calcu-  
lo iam ablato, medicamentis sanguinē coërcētib; ex fu-  
ligine thuris, aloë, symphito, vel etiam misy, & consimilibus  
sanguinis profusionem sistentes, lanas, aut linamenta impli-  
cita, vinō & oleo madentia imponemus, & ligaminibus sex  
processuum ad calculos accommodatis vtēmur. At si proflu-  
uij sanguinis metus, sit linamentum implicitū ex posca, aut  
rosaceo aqua admixta iniiciendū est, & egro decubente cre-  
brius locum perfundemus. Postquam tertio die solueris, &  
hydrelæo copioso irroraueris, tetrapharmaco linteolis illi-  
to vtendū, ita vt frequentius ipsos soluas, curēsque propter  
vrinē acrimoniā. At si inflāmatiō quæpiam superuenerit, ca-  
taplasmatibus & superfusionibus ad eam inscriptis adiuuabi-  
mus, ac in vesicam rosaceum, aut chamæmelinum, aut buty-  
rum nisi aliquā nos inflammatio impediāt, demitemus si-  
militer etiam si vlcus pascendo, aut alio quodā modo serpat,  
aut maleficū fuerit, singulis congruētia adaptabimus. cum  
vlcus inflammatione caret, lauacrum adhibetur, inde em-  
plastrum dia chylon, tum lumbis tum imo ventri super ac-



commodatur. Per totum vero curationis curriculum, femora inter se conuenit deligare, & cum remediis requiescere. Sin exiguus calculus coli inciderit & per vrinam reddi nequeat, præputium validè in anteriora attractum deligabimus iuxta glandis summitatem, item posteriore parte pudendi colem vinciemus, iuxta terminum ad vesicam spectantem constrictione adhibita: deinde infra colem diuidemus, super lapidem ipsum qui excidendis subiicitur, flexo autem cole calculum eiiciemus, solutisq; vinculis vlcus sanguine concreto vacuabimus. Posterius itaq; vinculum iniectum est, ne calculus retrorsum recurrat: anterius, ne post calculum exemptum præputij soluti cutis in oppositum recurrens diuisionem contegat.

*De testiculorum partibus.*

CAP. LXI.

**P**Articularum quæ circa testes habentur, finitiones cum ad ramicum incidendorum doctrinam conferant prius describemus, quàm ad illam veniamus. Igitur testiculus substantia quædam est glandulosa, fragilis, ad genitricem seminis effecta. At nerui testiu, quos Græci parastatas & cremasteras ab eo appellant, quod ex illis genitales partes dependent, spinalis medullæ ex cerebri membrana propagines sunt, cum venis arteriosis ad testiculos pertinentes, per quos semen in naturalia permeat. Seminaria autem vasa, venæ sunt à caua vena in testiculos sinuosis anfractibus pertinentes, unde testiculi alimentum capiunt. item tunica erythroïdes naturæ neruosa, in gibba quidem parte, atque anteriori, à testiculo libera est: in concaua & posteriore, ipsi adhærescit, ex peritonæo originem trahens. Vocant autem partem hanc qua testiculo adnata est, posteriorem prosphyfin, quasi dicas adnexam. Darti vero membranæ sunt, quæ exteriorem testiculum conglutinant, iuxta tunicam erythroïdem dictam ei adhærentes: quibus partibus & illa post testiculos tunica adunitur. Hæc autem ipsa cutis exterior rugosa testibus circumdata, scrotum nobis Græcis oscheon dicitur.

*De aquoso ramice, hydrocele dicitur.*

CAP. LXII.

**H**vmoris ociosi in particulis scrotum implicantibus colluies, tumorem excitans sensibilem, hoc nomen sortita est. Itaq; humor magna ex parte, in tunica erythroïde appellata, testiculum ambiente, in partē anteriore colligitur,



tur, quā potissimum membrana illa à testiculo separatur. Raro extra membranam hanc erythroïdem vitium contrahitur. Subinde peculiari tunica humor comprehenditur: vocantq; hoc malum chirurgici in superadnata ortū. Quare si ob causam præcedentē, exempli gratia, particularum imbecillitatem vitium oboriatur, sanguis alimenti ratione adductus, in aquosam serosāve, & inurilem substantiam mutatur: si ex ictu, sanguinea, aut fæculenta substantia comprehenditur. Communis igitur nota est, tumor indolens, firmus, ac stabilis in scroto, quacunq; tandem occasione non evanescens, sed in iis qui modicū continēt humorē, cedēs: in illis qui copiosum habent, non item. Ac quibus in erythroïde tunica humor comprehensus est, tumor rotundus paululum, & ovi modo longiusculus apparet. His testiculus in conspectum non venit, vt qui vndiquaque sit implicitus. Sin autem extra erythroïdem membranā sub dartis habeatur, propter paucitatem particularum occurrit. At si humor in membrana superadnata coierit propter contractionem ex omni parte, & rotunditatem, tumor alterius testiculi imaginem exhibet: & cum aquosus humor extiterit, tumor concolor pellucet: cum autē fæculentus fuerit, aut sanguineus, aut rubicundus, aut liuidus apparet. At cū in vtraq; scroti parte hæ notæ apparuerint, duplicem ibi ramicē esse cognoscēs. hoc modo scalpello curantur: derafa pube & scroto, nī si puer fuerit, agrum super sedile resupinabimus, podici pāniculo multiplici subiecto, scroto autem spongia iustæ magnitudinis, ac sedentes à sinistra ægrotantis, ministro qui ad dextram sedebit, iubebimus vt genitale in alteram partem protendat, & cutem scroti ad abdomen eleuet, nos scalpello scrotum à medio iuxta longitudinem vsq; ad pubem ferè recta linea incidemus, quæ vicina sit lineæ scrotum per mediū secanti, diuidemúsq; tunc tunicam erythroïdem. Porro si humor in adnata membrana hæreat, quā vertex eiusdem tunicæ eminet, illac diuisionem moliemur. Hamulo autem oræ vulneris diducentur, & cultro ad hydrocelicos aptato scalpelloq; dartos detegemus, crudata vero erythroïdi, scalpello quo venæ incidi solent, mediā ipsam diuidemus, per illas potissimū partes, in quibus à testiculo recedit. Humore iam toto, aut maiore ipsius portione in vase aliquo excreto, erythroïdē membranā hamulis eximemus,



quàm fieri licet tenuissimam ipsius partem. Inde verò Antyllus suturis & medicina cruentis accommodata vtitur: recentiores ea, quæ quòd carnem inducat, sarcotice appellatur. At si testiculus putredinem expertus aliòve modo vitiatu deprehendatur, vasa cum neruo, qui ab inguinibus dependet, cremastere dicto, fune excipiemus, ipsoq; cremastere præciso, testiculus eximetur. Item in iis qui duplici laborant ramice, similiter bifariam curationem moliemur, vtrinq; per scroti partes ad inguina lineas incidentes. mox specilli mucrone per diuisionē deorsum ad scroti extremū demisso, ipsoq; scrotū attollentes, acuto scalp pro lineam qua humoris est emissarium, incidemus, vt & sanguinem concretum & pus per eā excernamus, ipso verò scalpelli mucrone linamētū in longitudinem implicitū superiori diuisioni inseremus, & vibicibus per spongiā deterfis lanam oleo madentem per sectionem infra ad testiculum, insinuabimus, extrinsecus alias lanas vino & oleo imbutas scroto, imo vētri, inguinibus, regioni inter scrotum & anum & lumbis superiniiciebus, ac vbi linamētum triplex super hęc implicitū deligauerimus vinculo in sex processus exporrecto, congruisq; fasciis, homo decumbet lanis scroto subiectis, vt cōquiescat, pellēq; super ipsas molli explicata, quo fomenta excipiantur. Superfundemus autem oleo calēte, vsq; ad triduū. post hoc vbi solueris, tetrapharmaco linteolis illito in vulnere, vteris, linamētū in longitudinē implicitū ex farinaceo polline superaccommodans, extrinsecus fomenta rursus propter inflammationē vsq; ad diem septimum iniiciuntur: inde medicamento quod linteolo seruetur vtemur. Vulnere expurgato, & carne iam mediocri obducta, deinceps etiam lauacris adhibitis linamentum in longitudinem implicitum auferri debet, & reliqua curationis parte subsequente, quemadmodum prius explicatum est, vtemur. At si inflammatio quæpiam fuerit, aut sanguinis profluuium, aut aliquid eiusmodi interea superuenerit, conuenienter vnicuiq; occurrere conuenit, ne semel dicta iterum repetā. Si vero vstionem potius in aquoso ramice, sicut recentioribus visum est, adhibeamus, omnia quæ ante chirurgiam, & post eā dicta sunt, exequemur, ipsum vero chirurgiæ opus sine ferro tantū & diuisione per humoris emissarium fieri debet. Decem itaq; aut duodecim ferramētis literā græcorum



im r imitantibus, & duobus gladiolis primum scrotum  
 orro r referenti per medium aduremus, cultello autem,  
 ut cæco hamo membranas excoriantes ferramento enfi  
 simili, has ceu præcidentes, aduremus. Nudata vero tunica  
 erythroïde, facile autem cum alba & tenuis existat, cogno  
 scitur, acie ferramenti instar r literæ facti perurentes hu  
 morem excernemus, postea totam ipsam detectam hamulis  
 tollentes, ferramento gladiolo simili auferemus.

*De carnosò ramice & tophaceo.*

CAP. LXIII.

**C**aro in particulis quæ scrotum implicant alibi succe  
 scens carnosum ramicem producit. Nascitur autem ea,  
 ex causa latente, testiculo fluxionem scirrhumq; experto, aut  
 ex ictu, aut imperita post ramicis succissionem curatione:  
 subsequitur autem hos color vbique sui similis cum duri  
 tia. Si autem tumor in scirrhum coaluerit, nullus nec color,  
 nec sensus adest: si malignus sit, dolor vrget punctorius. Ita  
 que manum admoventes ægro, figurabimus ipsum, sicut &  
 prius, diuidemusque similiter, & siquidem ex generata car  
 ne, vitium testiculi creatum sit, & darton membranam &  
 erythroïdem consimiliter discindemus, deinde testiculo ele  
 uato, eoque extra erythroïdem exempto, cremastere segre  
 gato à vasis, hæc quidem constringemus, illum vero nem  
 pe cremasterem amputabimus: testiculum autem qui cum  
 adnata carne coaluerit, ceu alienum eiiciemus. Sin hæc car  
 nis generatio in tunica aliqua, aut, vase fiat, scroto diuiso  
 subiectisq; carni membranis, totum quod in carnem con  
 creuit auferemus. quod si posterior commissura carne fue  
 rit obducta, iis quæ ambiunt ipsam ademptis testiculum si  
 mul cum ea excipiemus: quippe fieri nequit, vt testiculus si  
 ne hac permaneat. Caterum topi & in testiculo & in mem  
 brana erythroïde occalescunt, renixu multo, duritie, & in  
 æqualitate à carnosò ramice & aquasò discreti. His igitur  
 manum sicut etiam carnosò ramici admolieremur.

*De varicosò ramice & ventoso.*

CAP. LXIII.

**V**asa in scroto, aut dartis mēbranis, dilatata, varices sim  
 plici vocabulo nominant. Alia vero quæ testiculum  
 nutriunt, si varicum more dilatentur, varicosum ramicem,  
 Græci cirrocelen vitium nuncupant. Notæ horum eviden  
 tes sunt, quippe pars affecta tumidior, obliqua modicè vix  
 in modū, & testiculi relaxatio antea apparet, tū aliæ nonnul



læ in agendo difficultates maximè in cursu, exercitio, & itinere. Hoc modo curamus: vbi commodè ægrum figuraueris, scrotum manu permulcetur, neruus cremaster in partem inferiorem repellitur. Facile autem is dinoscitur, vt qui tenuior vasis sit, solidior, renitensq; ceu potens validusque: æger quoq; ad depressionem ipsius indolet, & iuxta colem turbatur: vasa autem digitis nostris & ministri excepta in scroto, validèq; distenta, acie scalpelli obliqua adacta supra instrumentum quod vasis cedendis supponitur secabimus. deinde per hamulos ea quæ cuti subiacent eleuata excoriatur. vasis vt in capite de angiologia & aneurysmatis disputatum est, denudatis, acus duplex linum trahens transmittitur: ansaq; lini abscisa, vasa & in primâ ipsorû dilatatione & inferiori extremo fune deligabimus, & per medium recta incisa linea, & sanguine qui coërat euacuato, medicina ipsos curabimus quæ pus moueat, vt etiam funiculi cum vasis sua sponte excidant. Leonides autem præcipit, quòd si aliqua ex vasis testiculû nutrientibus dilatata fuerint, hoc modo esse faciendum: sin autem omnia, testiculum cum ipsis capi oportere, ne vasis alentibus destitutus contabescat. Porro ventosus ramex, quum genere aneurysma existat, Leonidi quidè non attingendus videtur, propter periculum quod in varicibus ab incessabili sanguinis profluuiò accidit. Recetiores autem quum duplex ipsius sit generatio, alia ex quatuor vasis testiculum alentibus, alia ab arteriis darton membranam & scrotû intercurrentibus: hunc quidem ceu desperatæ salutis, repudiant: illum priorem scalpello curât. discernimus autem ipsos, quòd qui ab arteriis enascitur, facile ad digitorum constrictionem euanescat, qui à venis testiculum nutrientibus, aut neutiquam, aut cum multo metu. Caterum curamus ipsos, vt in varicosis ramicibus comprehensum est, singulas venas fune excipiètes deligantesq;.

*De intestinorum ramice.*

CAP. LXV.

**I**ntestinorum ramex, quem Græci enterocelen dicunt, est cum intestina sunt in scrotum deuoluta: id quod sit aut peritonæo circa ilia dirupto, aut eodem extenso. vtraq; igitur, ruptura (dico) & extensio ex violenta quadam occasione præcedente proueniunt, nempe ictu, aut saltu, aut clamore. At qui laxationi fertur acceptus, propriè & propter resolutionem, & alias corporis imbecillitates, accidit. Notè vtriq; com



communes sunt: conspicuus in scroto tumor: item quòd in  
 intercitiis, itinere, spiritus retentione, aliisque occasionibus,  
 tumor maior quàm prius euadat: compressus, tardè quidè re-  
 trahatur, celeriter autem rursus deuoluatur, supernè intesti-  
 num resupinatis in loco permaneat, donec erigantur. Ster-  
 nus autem in scrotum receptum periculum subinde ipsis in-  
 obilit: dolent enim, nonnunquam etiam impressis digitis so-  
 lutum elidunt. Peculiariora ramicis ad relaxationē relati indi-  
 ca sunt, quòd non vna vice, sed particulatim temporis spa-  
 cio, & quod ob causas quaslibet, nonnunquam intestinum  
 deuoluatur, tumor æquabilis & profundus appareat, inte-  
 stino quod deuolutum est, peritonæo constricto. Ex ruptu-  
 ra facti ramicis signum est propriū, quòd vna vice ac subito  
 initio intestinum deuoluatur, idq; ob causas violentas  
 duntaxat: quòd tumor immensæ magnitudinis, inæqualis,  
 per summa protinus in cute emineat, quoniam intestina  
 extra peritonæum elabuntur. Si igitur rupto peritonæo o-  
 mentum duntaxat in scrotum inciderit, vitium omenti ra-  
 mæ, Græcis epiplocele appellatur: si intestinum quoq; de-  
 labatur, omenti intestiniq; ramex, Græcè epiploënterocele  
 dicitur: si vero & aqua in tunica erythroïde apparuerit, com-  
 posita ex tribus quoq; appellatio sumitur. Caterum neque  
 ex hæc, neq; ex ruptura intestinorum ramicem chirurgiæ sub-  
 icimus, solum vero ex relaxatione ramicem intestini manu  
 curamus, hunc in modum. homine resupinato & cute iuxta  
 inguina per ministrum eleuata, transuersam lineam incidi-  
 mus, vt in angiologia explicum est. Nonnulli verò non  
 transuersam, sed rectam lineam ducunt, hamuloq; defixo di-  
 uisionem explicant, quæ testiculum retractum mensura ad-  
 æquet, deinde rursus tot hamulis per quartam cutem trans-  
 missis quot vulneris magnitudini sufficiant, cæco hamo, aut  
 cultro membranas & pinguedinem subtus excoriâtes, scal-  
 pello præcidimus. detecto autem vndequa; peritonæo, de-  
 missoq; indice digito ad posteriorem scroti partem inter pe-  
 ritonæum & dattum membranam, posteriorem connexum  
 soluemus, deinde dextra manu extremum implicâtes ad in-  
 teriora scroti, simulq; sinistra peritonæum retrahentes ad di-  
 uisionem retrahemus testiculum vnà cum membrana ery-  
 throïde, ac ministro vni iubebimus testiculum eleuet, ipsi ve-  
 rò posteriorem adnexum ex toto simul cum membrana  
 erythr



erythroïde dissoluentes, explorabimus digitis num intesti-  
ni inuolutio quædam in tunica erythroïde relicta sit, & in-  
fra hanc ad aluum propellemus, deinde acu bonæ magnitu-  
dinis linum ducente duplex, decies implicitum ad peritonæi  
terminum qui diuisionem respicit per medium transuemus.  
† Succis autem linis quatuor faciemus initia, atque his per  
vinculum rursus implicatis, vtrobiq; peritonæum valenter  
destringemus, iterumq; initiis circumuolutis, astringemus  
quidem strenuè, vt nullum ex vasis nutrientibus adhuc pos-  
sit cedere ne inflammatio inde conciteretur, item secundum  
extrinsecus vinculum iniiciemus minus quàm duos digitos  
à priori distans. Post hæc vincula digiti instar ex peritonæo  
relinquentes, totum ipsum orbiculatim præcidemus, aufe-  
rentes simul nimirum & testiculum: rursus diuisione iuxta  
emissarium scroti adhibita, linamentum in longitudinem  
implicitum iniicitur, & fomentis oleo imbutis vinculisq;  
vt in aquosò ramice iniectis, omnia quæ restant, quemadmo-  
dum illic expositum est, perficiemus. Nonnullos autem non  
imperitos chirurgos noui, qui membrana erythroïde exci-  
sa, ferramentis candentibus extremum ipsius adurerent san-  
guinis profluuij metu, vt est verisimile. Hi autem ipsi post  
scalpelli administrationem agros protinus in folio oblongo  
ligneo, cui aqua inesset calida ad septimum diem vsq; laua-  
bant, quinquies per diem noctemq; id facientes, præsertim  
in pueris, & mirificè res processit: nam citra inflammatio-  
nem ipsi secabant, & funiculi vnà cum corporibus protinus  
decidebant. Interea vero dum agri lauabant, prædictæ su-  
perfusiones iniiciebantur. Alius quispiam præter comme-  
morata etiam pipere trito cum oleo ceruicem ipsorum eo-  
dem tempore infricabat.

† Hic locus sic legitur in veteri codice, κόψαντες δὲ τὸν διπλόου  
τίσας αὐτὸς ἀρχὰς ποιήσωμεν, καὶ ταύτας κατὰ χασμὸν ἀντεμπλέ-  
ξαντες β' ἀμφοτέρων, id est, postquam sciderimus duplicatum linum  
quatuor capita faciamus, & his decussatim implicatis ex vtraque parte  
peritonæum validè constringamus.

De inguinum ramice, bubonocèle vocatur. CAP. LXVI.

**I**ntestini ramicem ex relaxatione creatum, inguinum her-  
nia præcedit: primum enim peritonæo nimis intenso, in-  
testinum laxatum tunc quidem in inguina abscedit, facitq;  
ramicem, quem Græci bubonocelen dicunt. Hunc vetustio-  
res



in eum modum scalpello curant, linea transversa per in-  
 terna intumescencia, tres digitos longa inciditur. Hinc  
 membrana & pinguedo eximuntur, aduerso autem specil-  
 lito peritono per medium detecto qua fastigiatur adigi de-  
 bet, id enim intestina in altum repellit. Itaque peritonæum  
 restitutum utrobique aduerso specillo, futuris inui-  
 son commitemur, deinde specillum extrahemus, neq; pe-  
 ritonæum præcidetes, neq; testiculum, neq; aliud quippiam  
 inientes, sed præsidio cruentis idoneo persanantes. Quo-  
 m vero recentiores vstionem potius in inguinum rami-  
 bus probarunt, hanc quoque non præter institutum tra-  
 mps. Homo mediocriter moueatur, tussi violenta, inten-  
 one, spirituq; retento. vbi tumor in inguinibus apparue-  
 rit, locum qui vri debet, atramento scriptorio aut collyrio,  
 figura triangula circumscribemus, transversam lineam per  
 inguina sursum ducentes, iniiciemusq; signum per triangu-  
 lum medium. postquam æger decubuerit, candens ferrum per  
 mediam notam imprimemus, primum clauatum, inde per  
 anguli costas Græce r literæ figuram repræsentans, ter  
 lo laterculari aut lenticulato totum triangulum adæqua-  
 mus, ministro per totam vstionem saniem panniculo ex-  
 mergente: tam altè vero aduremus quousque pinguedinem  
 vertingamus, idq; in habitu corporis moderato, neq; enim  
 gracilibus ob siccitatem ferrum altius admouendum est,  
 me imprudentes peritonæum aduramus, neq; tamen in cras-  
 sioribus pinguioribusq;, in quibus vel ante iustam vstionem  
 pinguedo apparet: sed quantum vri conueniat artificiosa  
 prehendemus coniectura. Secundum vstionem sal vnà  
 porro tritus crustæ insinuabitur, & inguinario in lite-  
 ræ x similitudinem ligamento vtemur, per insequentes dies  
 remediis crustam adumunt, nempe phacomelite & similibus  
 curabimus.

*De scroto attenuato, laxoq; attritorum panniculorum modo.*

## CAP. LXVII.

**L**Axata scroti cute sine interioribus ipsius particulis vi-  
 tium maximè indecorum gignitur, quod Græci racosin  
 appellant. Leonides igitur resupinato homine, quod in ea su-  
 perfluum erat scalpello super asserem, aut durum corium,  
 quod incidendis subiicitur excidebat, orasq; vulneris futu-  
 ris committebat. Antyllus autem tribus etiam quatuorve  
 futuris



futuris superfluam cutem prius punctam forfice acuta aut scalpello post futuras auferebat, futurisque adunitam ut cruenta curabat.

*Quomodo fiant eunuchi.*

CAP. LXVIII.

**C**um ars nostra huc tendat, ut corpora à statu qui præter naturam est in naturalem deducat, eunuchos faciendi ratio, quam Græci eunuchismum dicunt, contraria promittit. verum quia & inuiti subinde à præpotentibus quibusdam eunuchos facere cogimur, explicandus compendiosè modus est, quo illis satisfaciamus. duplex itaque est, alter contusione, alter excisione perficitur, & prior quidè in hunc modum. Pueri adhuc infantes in aquæ calidæ solium collocantur: deinde ubi corpora eodè solio fuerint relaxata, digitis testiculi premuntur, usque dum aboleantur & euanescant, dissoluti non amplius ad tactum occurrant, Excisione hac ratione efficitur: Resupinatur in sedili qui eunuchus fieri debet, & scrotum cum testiculis sinistra manus digitis premitur: quo facto duas lineas rectas unam per alterum testiculum scalpello incidit: ubi exilierint testiculi cute detracta excabuntur, ita ut tenuissimum solum naturale vasorum commercium relinquatur, atque hic modus, eo qui per contusionem fit magis probatur. Nam qui contusionem testiculorum sunt experti, nonnunquam venerem appetunt, parte aliqua ut verisimile est testiculorum inter contundendum delitescente.

*De hermaphroditis.*

CAP. LXIX.

**H**ermaphroditon vitium ex compositione Mercurij, & Veneris appellatum est, multum utrique sexui adferens indecori. Cum enim quatuor Leonide autore differentiæ existant, tres quidem in viris, una in mulieribus constituitur. In viris siquidem aliàs iuxta regionem inter scrotum, & anum, aliàs in medio scroto muliebris pudendi pilis obfusi forma apparet. Tertia vero ad hæc accedit in qua nonnulli veluti ex pudendo quod in scroto est urinam profundunt. In mulieribus supra pudendum iuxta pubem virile frequenter genitale inuenitur tribus quibusdam extantibus corporibus uno tanquam cole, duobus autem veluti testiculis. Tertia itaque virorum deformitas qua urina per scrotum excernitur, curationem non recipit, reliquæ tres curantur corporibus superuacuis è medio sublatis & vlcera modo tractatis.

*Ques*



*Quomodo nympha excidenda sit, & cercosis emendanda.*

CAP. LXX.

**A** Aruncula in sinu muliebris pudendi subsultans Græcorum lingua nymphe dicitur: quibusdam immensa magnitudinis efficitur, & non decentis inuerecundiae notā præfert. Quemadmodum vero nonnulli memoriae produnt, aut quæ hanc partem arrigunt, viris similiter, & in venem ruunt. Quapropter resupinata muliere vulsellâ nymphae superfluum prehensum scalpello excindimus: diligenter adhibita ne altè ipsam penetremus: vnde fluidus affusus, rhyada vocant, excitetur. Porro cercosim, cum sit carnis ab utero ore propago quæ muliebri pudendum repleat, interim foras caudæ modo procidat, nymphae consimiliter auferemus.

*De muliebrium locorum thymis condylomatis & hæmorrhoidibus.*

CAP. LXXI.

**T** Hymus eminentia quædam est, nunc rubens, nunc alba, plurima parte sine dolore, thymi corymbis similis: condylomata vero, excrecentiæ sunt rugosæ, quemadmodum hæmorrhoides iis quæ in ano sunt respondentes, interrim & sanguinem profundunt. omnes itaq; eiusmodi in mulieribus excrecentias, quæ in conspectum veniunt, inter delegendum vulsellâ comprehensas, ferramenti quod ex dimidio spatham refert, acie excindemus, utemurq; galla læuigata, aut scisso alumine. Nam è lino deligaturam in his maiores chirurgi non admittunt.

*De non perforatis & phymo.*

CAP. LXXII.

**G** Enitales mulierum partes clauduntur, interim ex natura, interim ex accessorio, morbo quodam præcedente, aliàs in imo, aliàs in alis, sæpe etiam in medio spatio, idque aut secundum naturam aut ex obstructione. Quod autem foramen intersepit intercluditque, vel caro vel membrana est. Cæterum hoc mali graue sit impedimentum, modo in coitu, modo in conceptu vel puerperio, aliquando mensium purgatione, si quæ loca obstruit caro totum spatium occupauerit, in quibusdam enim medium foramine patescit. Causa igitur inuenta, vel ex promptu, vel etiam demisso speculo, si quidem commissura solum fuerit, hanc recta linea scalpello fistulis accommodato dissoluemus: sin autem distentio, hamulis per medium corpus siue id membrana, siue



siue caro existat transfixis eleuatum, scalpello diuidemus, ac sanguinis fluore medicamentis sine rosione siccantibus suppresso, iis quæ cicatricem ducunt vtemur, pessarium aliquo cicatricem inducente vinctam subiicientes, in quibus potissimum non altè admodum administratio est adhibita, quod ea de causa fiet, ne particulæ rursus coalescant. Iam phymus in ostio vuluæ succrescens pari modo curatur.

*De abscessu vuluæ.*

CAP. LXXIII.

**V**Bi abscessus circa os vuluæ prouenerit qui manu tractari queat, non promptè ad sectionem properare consilium est, sed cum affectio fuerit absoluta, inflammatio plurima parte increuerit, corpora quæ humoribus incumbunt, attenuata, idq; propter vteri excellentiam. Inter agendum vero mulier in sella resupinabitur cruribus ad abdomen, & femina contractis, inuicem diuaticis: cubiti ipsius sub poplitibus subiicientur, & funiculis congruentibus ad ceruicem deligabuntur, medicus autem ex dextra sedens tentabit speculo, quod dioptram dicunt ætati accommodato. conuenit autem specillo sinus muliebris altitudinem metiri, ne maiori speculi tridente, vterum premi contingat, & si amplior ille sinu reperiatur, linamenta implicita alis imponuntur, vt super ipsa speculum firmetur. Caterum conuenit speculi tridentem qui testulam habeat, in superiore parte intro demittere, & specillum à medico contineri, testulam à ministro conuerti, vt laminis tridentis diductus sinus aperiat. Iam vero si abscessus occurrens mollis & tenuis existat, qui digiti tactu subsidet, iuxta verticem diuidetur spatula, aut specillo: ori vuluæ pure vacuato, linamentum in longitudinem implicitum, lemniscon dicunt, tenerimum ex oleo rosaceo imponetur, vel potius extra diuisionem sinui muliebri sine compulso inferetur. Extra vero summas oras & super pectinem lumbosq; lanæ succidæ aut puræ, oleo madentes accommodabuntur. Tertio die insidebit mulier in hydrelæum calidum, aut maluæ decoctum: absterfis sudoribus linamentum in longitudinem implicitum in fissuram tetrapharmaco per se, vel cum discocto melle inunctum leniter insinuabis: erit autem solutum butyro aut rosaceo, exterior regio cataplasmatibus obducetur dum inflammatio cessauerit, & vulua abscessu purgata fuerit. Sin autem difficulter expurgetur, collui debet auriculario clyster

re ex



ex iridis decocto, aut aristolochie, aut melle. Cicatrix duci debet emplastro ex cadmia, soluto vino, per linamentum madidum. At si intra os vuluæ abscessus fuerit, attingi non debet.

*Qua ratione partus ex utero excutiat excidaturq;.*

CAP. LXXIIII.

**Q**uomodo agrè parienti succurratur tertio volumine tradidimus: si autem eo nihil proficiatur, ad chirurgiam merito diuertimus, id primū notantes, mulier superstes ne futura sit, an minus: & si quidem salus speratur tunc manū admoliamur: si contrā, attingi non debet. Quæ igitur perniciem sui portendunt, inexpugnabili dormiendi necessitate ut in lethargo sopiuntur, resolutæ sunt, & vix possunt excitari, ac si excitentur, imbecilliter respondentes, rursus graui sopore premuntur. Nonnullæ conuulsionis modo contrahuntur, aut neruis commouentur, aut alimentum nō sentiunt, pulsus validè inturgescens deprehenditur, sed languidus & imbecillis: quæ incolumes futuræ sunt, nihil eiusmodi patiuntur. Oportet igitur resupinam mulierē in lecto sic collocare, ut figura ipsius magis sit decliuis, crura ipsius elata mulieres utrinq; contineant, aut quædam ministræ. Si verò non adfuerint, mulieris thoracem vinculis quibusdam lectulo adfirmabunt, ut ne corpus, attrahentes sequens, tractionis vim dissoluat, ac alis vuluæ diductis, per ministrum + sinistram manum contractam cū valentibus digitis extenuatis, in ostiolū inferemus, idēq; pertentabimus, & oleo infuso relaxabimus, disquirentes ubi vncum quo fœtus extrahetur, desigi conueniat. Idonei verò loci sunt quibus iniicietur, si in caput conuersus infans descendit, oculi, occiput, os iuxta palatum, mentum, clauiculæ, & sub costis sitæ regiones, adhæc præcordia, quæ Græci hypochondria appellant: si in pedes conuertitur, ossa super pubem extantia, intercostalia, clauiculæ rursus & deinde vncus dextra manu continebitur, flexu ipsius digitis occultato, sinistra manu leniter inferemus, & particulæ cuiuspiam ex prædictis vsque ad vacua transmittemus. huic alter opponetur, quo attractio recta procedat, neq; alterā in partem inclinet, deinde æqualiter trahetur non solum recta, sed etiam in latera, quemadmodum in dentibus eximendis fieri solet, & tensionem interea remittere iterum non cōuenit, postea verò indicem

D



digitum vinctum, aut etiam plures demissos inter os vuluæ & corpus impactum, orbiculatim circumagere, veluti ex-  
coriando: si autem iuxta rationem vncus subsequatur, in  
superiora transferre conueniet, atq; sic agere dum perfe-  
cta foetus sit extractio. Si autem manus obiecta fuerit, nec  
propter obstructionem queat conuerti, circumposito pan-  
ticulo, ne reuoluatur, modicè attrahere oportet, ac pro-  
lapsam totam ab humero abscindere, idemq; facere etiam si  
duæ manus prociderint. similiter etiam pedes procidentes,  
corpore reliquo non subsequente, ab inguinibus amputari  
oportet: deinde reliquum corpus dirigere conandum. At  
si caput iusto maius obstructionem pariat, & hydrocephalo  
sit, id est, aquam in capite infans collegerit, spatula po-  
lypys dicata, aut scalpro, aut cultro quod scolopomachæ-  
rion dicitur, inter digitos occultato, caluariam diuidemus  
vt vacuata concidat. quod si naturaliter amplum sit caput,  
similiter diuisam caluariam forcipe qua dentes aut ossa ex-  
trahuntur, comprimemus. Si ossa emineant, hæc quoq;  
auferre ratio est. At si capite ad thoracem adacto, obstru-  
ctio prouenerit, eodem instrumento clauicularum compa-  
ges vsq; ad interiora spatia diuidentur, vt humore vacuato  
thorax concidat & collabatur: quod si non concidat, diui-  
sas etiam clauiculas ipsas auferemus, tunc enim collabe-  
tur. Porro si imus venter mortuo foetu sit inflatus, aut a-  
quam subter cutem collegerit, eadem ratione ac via eum  
vacuare cum ipsis interaneis aggrediemur. Caterum si in pe-  
des deferuntur, foetus declinati facile ad vteri os dirigun-  
tur: quod si iuxta thoracem aut abdomen fuerit impactus,  
linamento ipsum attrahemus, eodemq; modo ea quæ am-  
biunt, diuidemus. At si reliquis ablatis caput ad superiora  
reuersum inhæserit firmiter, sinistra manus demitteretur in  
vterum, & si os ipsius pateat, manum in ima transferemus,  
ac caput inuestigatum digitis ad os deuoluemus: deinde vn-  
cum vnum aut alterum defigentes, propter orificij inflam-  
mationem non propellemus, sed infusionibus pinguibus co-  
piofisq; vtemur: item insensibus, fomentis, & cataplasma-  
tis, vt diducto ore auferatur, quemadmodum superius com-  
prehensum est. Porro latera foetus, si quidem in rectum  
diriguntur, prædictis vtemur rationibus: sin minus, to-  
tum ipsum intus dissectum particulatim eximemus, cura  
adhibita,



didhibita, ne particula quæpiam ipsius nobis nescijs intus  
relinquatur. Postquam manu scalpelloque administratio-  
nem obierimus, remedijs ad inflammationem inscriptis  
tendum est. quod si profluuium sanguinis oboriatur, huius  
quoque curationem accepisti.

† Huius loci multò verior est scriptura in veteri codice, *πλὴν ἐν ὄντι-  
νον χεῖρα συνωρμηθῆναι μετ' ἐν ὁσίων ἀκρίβειαν ἀλιπαρομένην*, id  
est, dextram manum contractam cum fortibus digitis pingui aliquo  
unctam &c.

*Si secunda fuerint relicta.*

CAP. LXXV.

**F**œtu excusso frequenter accidit, vt velamentum il-  
lius in vtero firmiter adhærescat, quod nostri secun-  
das, Græci chorion, & deuterion appellant. Diducto igitur  
vulvæ ostio, secundæ quæ inibi relictae sunt, & in partem  
aliquam orbiculatim conuersæ, facile educuntur. Manu  
siquidem sinistra calida, inuncta quoque in fundum demissa, se-  
cundas sublabentes oportet eiicere. Si autem fundo vteri  
fuerint adnatæ, demissa similiter manu comprehendentes  
tendemus, neque in rectum, ne vulua procidat, neque vio-  
lenter admodum, sed leniter primum deducemus, huc il-  
luc circumagentes, deinde paulo valentius. hoc enim pa-  
cto obsequuntur & à connexu dissoluuntur. Quod si vulvæ  
os conuiere fuerit deprehensum, remedijs ad hoc com-  
memoratis vtendum est. Si vires non fuerint inualidæ, etiam  
ijs quæ sternutamenta prouocant, & aromatum halitu ex-  
festili vaporari conueniet: & si os vteri diductum sit, manu  
inserta, secundas vt dictum est extrahere conabimur. At si  
ne sic quidem exemptæ fuerint, terrere nos non debet, se-  
cundum paucos enim dies putrefactæ & in saniam resolutæ  
excidunt. Quia verò grauitate odoris & caput opplent &  
stomachum peruertunt, suffitus conuenientes excitabuntur:  
ad eos autem cardamomum & ficus aridæ commendantur.

*Quomodo coxendices adurantur.*

CAP. LXXVI.

**Q**uemadmodum humerus, ita etiam coxa propter hu-  
miditatis copiam nonnullis excidens, vstionē postu-  
lat, quod Hippocrates his verbis testatur. Quibus coxa ex  
diuturno ipsius cruciatu loco suo mouetur, crus contabe-  
scit & claudi fiunt, nisi vstionem experiantur. Conuenit

D 2



igitur tunc illud praesertim locum adurere, è quo articulus excidit: sic enim humor redundans desiccabitur, & locus cicatrice densatus non amplius os suscipiet, quare etiam penitus illic vitionem moliri conuenit. Recentiores autem tres crustas adhibent, vnam retro vrentes in acetabuli sinu, alteram supra genu extrinsecus, & tertiam supra exteriorem talum, quæ est carnosior.

*De fistulis & favis.*

CAP. LXXVII.

**C**um locus postulet de ani fistulis differere, nihil mali fuerit prius generatim de omnibus fistulis verba facere. Itaque fistula sinus est callo obductus, aliquatenus indolens, in pluribus nascens particulis, magna verò parte ex abscessibus oritur parum dextrè curatis. Callus autem continua quædam caro est, albida, madoris expers eoque etiam doloris, neq; vena, neq; neruo ad ipsum pertinente. Interim sinus siccus, interim humidus est, nunc humor incōtinenter fluit, nunc certis quibusdam temporibus remittit, ore ipsius oppleto iterumq; adaperito. Aliàs fistulæ in os desinunt, aliàs in neruum, aut aliam quampiam principem particulam, vel rectè intus tendentes, vel oblique, item vel vno ore, vel pluribus peruiæ. Quæ igitur in grandes arterias aut neruos, aut tendines notatu dignos, aut membranam costas succingentem, aut aliquam principalem particulam deueniunt, vel nequaquam, vel certe, cum artificiosaq; diligentia attingere debemus reliquis hunc in modum manum admoliemur. primum tentabimus, si quidem rectè intus tendant, cultro excisorio: si oblique, specillo duplici cuspede, flexili. Huiusmodi autem sunt quæ ex stagno fiunt, item ex ære tenuissima. In quibus autem duæ pluresve oræ habentur, notationi per specillum non obtemperantes, sinu per vnum ipsius orificiū adusto, ex clysteris in reliquas oras transitu deprehendemus, num vna fistula sit pluribus oris dehiscens, an plures: ac vbi tentatum est, siquidē per summa habeatur sinus, artusq; sit, demisso specillo explicantes, scalpello figura cōmodiore callum tollemus, aut vnguibus, aut acie scalpri de radentes: at si latitudinem habeat, corpora superflua, tolli debent: sin autem non summa occupauerit, sed penitus rectè tendat, eo quatenus licet in alto diuiso, orbiculatim totum callum auferemus: quod si reliquæ ipsius aliqua remanserint, medicamento adurente eas consumemus, quod si amp



amplius quam sit medicamento non cedat, ferro candente  
 crustas ei inducimus. Cæterum si fistula in os terminatur,  
 hoc idem quod integrum est, duntaxat rademus: ubi verò  
 cariem aliamve quandā corruptionem experitur, quod vi-  
 tiatum est, totum excisoriis, aciem inter sese oppositam ha-  
 bentibus tollemus, si opus sit, prius terebra perforatū, siue  
 ad perspiratum duntaxat, siue ad medullam vsque fuerit vi-  
 tiatum. At si os quoq; emineat, caulis modo porrectum, ser-  
 ra ipsum adimemus. Sumptis itaq; duobus loris, vnus quidē  
 medium ossi eminenti subiiciemus, ipsumq; per ministrum  
 attollemus: alterius autē quod crassius est, vel ex lana quo-  
 que factum, similiter medium carni quæ ossi subiaceret ada-  
 ptantes, initiaq; infra prehendentes, per ipsum lorum carnē  
 deorsum iubebimus detrahi, ne ipsa serræ dentibus perra-  
 datur, atque hoc pacto nos excretionem molimur. Vbi verò  
 particula quæpiam princeps subiecta est, exempli gratia,  
 membrana costas inuoluens aut spinalis medulla aut eius-  
 modi aliqua, inter excidendum aut serra concutiendum os,  
 laminam, quæ quòd membranā cerebri custodit meningo-  
 philax græcè dicitur, subiiciemus: non vitiatò autem ossē,  
 totum orbiculatim carne nudum serra eodem modo dera-  
 detur. Fieri nianque haud potest, vt ossa circulatim implici-  
 ta carne obducantur. Simili ratione si ossis terminus prope  
 articulum fuerit vitiatu, idā serra auferri debet. At si totū  
 subinde os, nempe cubitus aut radius aut tibia aut eiusmodi  
 aliquod contabuerit, totum adimetur. Femoris autē ca-  
 put, aut coxa, aut spinalis medullæ vertebra affecta, attingi  
 nō debet, periculi quod ex arteriis adiacentibus accidit eui-  
 tandi gratia. Hoc igitur modo ac via faciendum est, in sin-  
 gulis vbique particularum vitiatarum situ, vicinitate, & na-  
 turæ consortio inspecto, item morbi magnitudine, & labo-  
 rantis viriū robore considerato. Cerion autem, hoc est fauē  
 quum sinus sit fistulosus, mellea diffuens humiditate, ean-  
 dem administrationem curationemq; cum fistulis & aliis fi-  
 nibus requirit.

De ani fistulis.

CAP.

LXXVII.

**A**Ni fistulæ latentes quidē notantur inde quòd ore non  
 apparente dolor ipsis oboritur, & purulenta humidi-  
 tas per anū profundatur. Plurimis abscessus quoque indicia  
 præcesserunt: manifestæ autē cultro excisorio, aut seta por-

D 3



cina demissa noscuntur. Nam instrumentū ad ima penetrat, & digito indice in sedem transmissio occurrit, fistula nimirū ad interiora perforata. At in iis quæ perforatæ non sunt, instrumentum digito, nō statim occurrit, sed obstat in medio corpus nō perforatum. Tortuosas autem & labyrinthi modo flexuosas agnosces inde, quod instrumentum paululum procedat, pus autē ad illarum portionē copiosum efferatur. At quæ prope intestinum oriuntur fistulæ, agnitionem sui præbent, quod nonnunquā & lumbrici & stercus per orificiū erumpat. In omnibus autem ferē callus aliquis in orificio prominet. Itaq; fistula insanabilis est, quæ vesicæ ceruicem perforauerit, aut quæ ad femoris articulū sit, aut quæ ad ipsum longanone tēdat. Aegrē verō cōsanescit, quæ orificio caret, tū quæ delitescit & in os terminatur, multifariāmq; fissa est: reliquæ in vniuersum faciliē curantur, administratione hunc in modū adhibita: resupinato homine, ut cruribus sursum porrectis femora ad ventrē inclinet, quemadmodū fit in iis quibus clyster in aluum mittitur, si fistulæ extremū in summo occurrit, culter, aut auricularū specillum per orificiū demittitur, subiectaq; cutis simplici linea exciditur: si autem altē intra sedem fistulæ terminus finiat, demisso per orificium cultello, siquidē perforatam ipsam inuenerimus, demisso iuxta oppositam affecto ano manum indice digito, eiusdem cultelli initium adigētes & deflectentes, ipsum foras reducemus, ac corpora quæ incumbunt cultello, simplici diuisione liberabimus. At si nondum fistula perforata reperiatur, in altum vero ani dūtaxat terminetur, & tentantibus nobis indici digito occurrat, corpus intercedens cum squamosum membraneumq; sit, vehementius mucrone cultelli perforabimus, traductoq; per sedem cultro, rursus scalpello corpora quæ ei incumbunt dissoluemus, quemadmodum prius explicatum est. Si igitur terebræ aut scalpelli ad fistulas accomodati acie sinus fundum iuxta sedem perforauerimus, ipsum instrumentum per anum inserentes, illinc totum quod interiacet acie terebelli pertundemus, & post excisionem vulsella aut forfice corpora diuisionem ambientia (calli autem sunt) prehensa ex toto adimemus, musculum qui anum constringit, sphincter dicitur, ubiq; vitantes. Nonnulli siquidem rudius dum in alto sectionem mollerentur, ipsum conuulnerarunt, atq; inde inuoluntaria sterco-  
ris



is excretio homini accidit. At si qui timidiusculi chirurgiam fugiant, Hippocratica uti debent è lino deligatura. Iubet siquidem Hippocrates, linum quintuplex crudum cultro forato vel specillo per fistulam demittere, & lini principia coniungi, ac quotidie constringi donec corpus totum quod duabus oris intercedit, dissectum, linum eructet. Si vetustate malum contraxerit, quum dissolues, etiam psaro aut eiusmodi quodam arido illito linum oportet pertrahere. Sunt qui foramini terebræ fistulis dicata insertum linum iuxta prædictam rationem propellunt, quod meo iudicio non conuenit. Dum enim chirurgiam vitant, præter quod hanc requirunt, etiam curationem remorantur. de latentibus autem fistulis Leonides hunc in modum tradit. Cum autem alta pars stringentis anum musculi in fistulam dehiscit, quæ vel à sede incipiat, vel longius procedat, post notas indicatas, disquiretur instrumento quod ad sedem diducendam sit aptatum. dico autem exiguo perspecillo quod Græci dioprion appellant, anum ut muliebrem sinum, distendi. At cum fistulæ os clarè apparuerit, per ipsum specilli mucro demittetur, propelleturq; in anum: lamina vero subiecta tota fistula super eam diuidetur semispathula aut spatha fistulis incidendis peculiari. Nos autem cum in talem incidissemus affectum, hoc administrationis modo uti non potuimus, quod ductus fistulæ in conspectum non veniret. Nam inter anum & eius fibulam dextra parte fixa erat, instrumentum verò quod ei diducendæ erat impositum, magis operationem adumbrabat: at per digitos distendentibus anum nobis, rima quædam inter vnam quandam ani rugam ceu fistulæ emissarium apparebat, etenim pus per ipsam emanabat, per eandem vero cultelli mucronem in fistulam demittebamus ceu manu ab ea ducti, deinde dextræ manus indice digito, ani fibulæ inserto, cum inuenissemus quoddam inter digitum & instrumentum, tenue corpus, cumque violentius cultellum digito adegissemus, fundum fistulæ sursum conuersum perforauimus, vbi iam digito mucronem instrumenti foras traiectissemus, conspicuum nobis factum totum corpus quod inter fistulæ orificia habebatur, dico autem ea quæ initio ad humoris emissarium fixa erant, & ea quæ nunc à nobis facta sunt scalpello præcidentes dissoluimus.



*De hæmorrhoidibus.*

CAP. LXXIX.

**C**VM hæmorrhoidum notæ ex ipso quod vacuatur innotuerint, antequam manum admoliamur, clystere utemur copiosissimo, simul intestini superuacua inanientes, simul & anum, ut promptius interuertatur & extrema ipsius pars exeat, irritantes. Resupinato igitur ægrotate aduersus lumen clarum, siquidē constrictione usi fuerimus, linum quintuplex ferramento quo ora venarum in ano extantia aduruntur, vel quo vuæ, labris hæmorrhoidum circumponentes vnamquamq; hoc fune astringemus, vna duntaxat relicta, qua sanguis superfluus emanet, quod etiā Hippocrates præcipit. Post astrictionem linamēto implicito oleo madente, & ad sedem accommodato ligamine, usi, ægro quietem indicemus, oleo tepido, aut mulsa ventri medicantes, deinde postea cataplasmate ex micis panis & croco utemur. Vbi hæmorrhoides exciderint vino cicatrix ducitur. Leonides autem nō è lino deligat, sed forcipe prehensas ampliter hæmorrhoidas scalpello excindit. A chirurgia, fuligine thuris utendum & amylo, chalcitide, vel eo medicamento quod vsta spongia simul & pice constat, item pastillo faustino ad absolutam adustionem. Alij vero instrumenti quo vuæ vruntur, concauo, medicamine quod adurat repleto, quemadmodum vuam, sic etiam hæmorrhoidas vsserunt.

*De condylomatis, tuberculis, & rimis.*

CAP. LXXX.

**A**NI condyloma loco solum ab eo quod muliebres locos infestat, differt, rugosa & ipsa sedis excresecia, aut inflammatione, aut rima quæ dicitur rhagas præcedente. Per initia itaq; tuberculum appellatur: cum occalescit autem, condyloma: quare cōuenit, hæc quoq;, quæadmodū illa, vulsella apprehensa excindere, & medicamentis crustam ducentibus curationem absolueret. rimas autem à stercore potissimum indurescentes, & quia dum cicatrix generatur, occalescunt, inueterascuntq; recentibus, faciemus, vel vnguib; vel scalpello radentes & cicatricē ut par est, inducemus.

*De ano non perforato.*

CAP. LXXXI.

**P**VERIS recens natis, anus ex natura non perforatus interim inuenitur, mēbrana videlicet obstructus. hæc igitur si fieri potest, digitis ipsis dirumpetur: sin minus, acie scalpelli eam excindentes, vino curabimus. Quoniam vero & prouectis subinde ob vlcus non dextrè curatum anus committitur,



entur, conuenit hanc vnitionem instrumento conuenienti  
irruptam curare, fistula plumbea, aut obturamine quodam  
vno vsq; dum in totum confanescat, commodè imposito, ne  
rursus coalescat. Porro obturamentum medicamine quo-  
dam cicatricem ducente oblini debet.

*Quomodo varices excindantur.*

CAP. LXXXII.

**V**arix venæ dilatatio est, aliquando in temporibus, al-  
quando in ima ventris parte sub vmbilico, nonnunquā  
etiam circa testiculos, sed maximè in cruribus. Hic igitur  
originem plurima parte ex materia melancholica trahit. eo  
rum autem qui testiculis oboriuntur curationem per scal-  
pellum iam in capite de varicum ramice tradidimus, atq;  
his similiter crura infestantes aggrediemur, ab interiori fe-  
moris parte incipientes, vbi etiam origo ipsorum magna ex  
parte inuenitur. inferius enim, in plures distributi propagi-  
nes difficilius tractantur. Loto igitur homine, funiculum su-  
periori femoris regioni circundamus, iubemusq; vt inam-  
bulet. inde repletam venam atramento scriptorio aut colly-  
rio notabimus iuxta varicis sitū trium digitorum, aut pau-  
lò ampliori spatio interposito, decumbente ægro cruribus  
extentis, alterum funiculum supra genu iniiciemus. Elata  
autem in tumorem vena, scalpellum adigimus, quā atramē-  
ti nota est, tam altè, vt cutē duntaxat scalpellū penetret, ne  
venam diuidamus. vbi oras vulneris hamulis diduxerimus  
& membranas cultro inflexo ad ramicem aquosum accom-  
modo excorauerimus, vena detecta & vndiquaq; explicata  
femoris ligamēta soluemus, vase per cæcū hamum suspēso,  
acum duplex linum trahentem subiiciemus, plexumq; lini  
amputabimus, & diuisa scalpello per medium vena, detra-  
hemus sanguinis quantum vsus postulat: deinde funiculo  
superiorem vasīs partem constringentes, erectūque crus  
elevantes manuum expressu, sanguinem qui in crure est  
euacuabimus: deinde infrā rursus vas deuincientes, vel id ve-  
næ quod inter vincula est, abscisum tollemus, aut manere  
id finemus vsque dum sua sponte cum funibus excidat, &  
vulnere siccis linamentis oppleto, splenium vino & oleo  
madens, iniectum deligabimus, medicamentoque ad pus  
faciendum apto quod linteolis illinatur per sanabimus. No-  
ui autem veteres nonnullos, funibus non vsos: alios inde  
vas denudatum excindere: alios altè ipsum eleuatū cum



violentia extrahere abruptentes. Verum omnium tutissimus chirurgiae modus est, quem supra diximus. Porro varices in imo ventris suborientes consimiliter tractabimus: item eos qui tempora infestant, quemadmodum in angio-logia comprehensum est.

*De dracunculo.*

CAP. LXXXIII.

**D**E dracunculo quomodo medicamentis potissimum emendetur, quarto libro peregrimus.

*De extremarum partium praecisione, acroterias non appellant.*

CAP. LXXXIII.

**S**ummis partibus nonnunquam putredine consumptis, nempe manu aut pede, ut etiam ossa ipsa contabuerint, vel ex causa exterius adueniente, fracta, vel etiam ex interiore causa putredinem experta, & ferrula praecidi postulent, ante hanc necesse est corpora ossibus circumdata primum diuidere. Verum quia dum hoc primum fit, deinde longiore temporis spatio ferrae administratio peragitur, sanguinis profluuij metus subsequitur, recte Leonides non omnia primum corpora praescindit, nisi ex toto putredine contabuerint, sed partem, ubi non plures neque grandiores esse venas aut arterias existimet principio celeriter usque ad os resecat, deinde os protinus ferra praescindet, panniculum lineum partibus sectis circumponens, ne ferra per ipsa tracta dolores pariat. Atque tunc reliqua parte excisa, ferramenta candentia vasis iniicito, & sanguinis fluore suppresso linamentis insertis & conuenienti deligatura adhibita, remedio utitor quod pus moueat.

*De vnguium pterigys.*

CAP. LXXXV.

**P**terygium in vnguibus carnis incrementum est partem vnguis operiens. Fit autem in pedis manusque potissimum pollicibus: in pedibus quidem, ex offensione plerumque; in manibus autem, ex neglecta reduuia, inflammata, & in pus mutata. Siquidem hoc, pus dico, spatio temporis vnguis radicem exedit, ipsumque corrumpit, subinde totum abolet, saepe medium vnguis admodum infestat. Iuxta vnguis autem radicem ipsam, nonnullam ipsius partem putrefactam, aliquando totam radicem a rosione immunem relinquit. Est quum & os corrumpat, odor aëdatur grauis, digitus per summa dilatetur magisque lineat. his igitur manus debet admo-neri, ita ut totam vnguis partem relictam acie scalpelli rese-  
cemus



mus auferamusq; , deinde exulceratam incisamq; partem  
 ramentis aduramus. Etenim pterygium genere depastio  
 pt, quæ nome Græcè dicitur, neq; subsidet, nisi adustum, a-  
 ptoq; si negligitur, digitum corrumpit. At si osse & vngui  
 otio immunibus, exterior vnguis angulus qui delitescit, &  
 neni ipsi agnatam pungit, & inflammationem excitat,  
 onuenit pungentem vnguis particulam tenui cultro aut  
 omni smodi quodam subiecto sublimen eleuatam, acie scal-  
 pelli adimere, & quod eminet medicamento crustis faciun-  
 nobis idoneo consumere. Plerique hoc modo administrationis  
 onsanuerunt. Si amplius fuerit vitium primum scalpello  
 arcum adimemus, mox remedium ex medicamentis pe-  
 nemus.

## De vngue contuso.

## CAP. LXXXVI.

**Q**Uoniam vero subinde ex ictu vnguibus contusis dolo-  
 res subsequuntur, qui ad manus operationem nos  
 ertrahant, satis est Galeni verba hic apposuisse, quæ sonant  
 hunc modum. Vnguibus contusis præsens planè reme-  
 dium ad dolorem auferendum sanguinis detractionem ex-  
 erti sumus, quum pulsus doloresq; vehementissimi obo-  
 niuntur. Ceterum linea obliqua, non recta in imum, supernè  
 deorsum scalpello acuto debet incidi, vt sanie excreta, secta  
 hæc vnguis particula veluti operculum quoddam subiacen-  
 mium efficiatur. At si in rectum supernè deorsum lineam du-  
 xeris carnis excrescentia quam Græci *ὑπερσθένια* vocant,  
 diuersum nimirum corpus à carne quæ vngui subiicitur per  
 mediam diuisionem suppullulante, gignitur, inde rursus do-  
 loresprehendūt, quos in reduiis nominauimus, carne quæ  
 sub vngue succreuit, compressa. Quia igitur ex huiusmodi  
 sectione dolorem protinus agro adimi videre licet, per dies  
 insequentes commodū est, nobis subsectam vnguis carnem  
 leuiter attollentibus, vnguis saniem excernere, ac rursus  
 subiectæ carni quemadmodum dixi, vnguem operculi mo-  
 do imponere: reliqua vero digiti totius medicina vti conue-  
 nit quæ leniat, discutiâtq;.

## De clauis, myrmeciji, &amp; verrucis.

## CAP. LXXXVII.

**C**LAUUS rotundus callus est, coloris cædidi, clauorū capi-  
 tibus similis: toto corpore, sed pedū solo digitisq; præci-  
 pue nascitur, dolor sequitur, & incessus impedimentū. Ita-  
 que circumscribitur vulsellaq; apprehensus, scalpro acutæ  
 aciei



aciei, aut quo venæ scinduntur, radicitus eximetur. Nonnulli, ne rursus succrescat, candenti ferro vtuntur. Myrmecia verò cutis tuberculum est exiguum, callosum, rotundum, & crassum, ad basim insidens, & ad frigora sensum formicarum moribus similem excitat. Hæc quoque totum corpus, præsertim autem manus infestat. nonnulli igitur, inter quos & Galenus est, præcipiunt scarificata extrema parte, fistula pennæ durioris, quales sunt veterum galorum, anserum, & aquilarum, in imum adacta, ex basi myrmeciâ auferre. Alij ærea aut ferrea fistula, idem faciunt. Recentioribus satis est, scarificatam vulsellâq; apprehensam, scalpro, clauorum modo excindere. At verruca, quæ acrochordon græcè dicitur, exigua cutis eminentia est, doloris expers, callosa, rotunda, plurima parte basim habet angustam, vt suspensa esse videatur. Nominata vero sic est, quòd chordæ nexui respondeat. Extendentes igitur, eminentiam excindimus: sin autem hoc non fiat, lino saltem aut pilo deligabimus. Noui plerosque & has & prædictas omnes excrescentias ferramento extincto, vt dicunt, consumpsisse.

*De telis è corpore extrahendis.*

CAP. LXXXVIII.

**C**hirurgicæ partem telis extrahendis dicatam maxime necessariam esse poëta Homerus his versibus innuit.

*Vir medicus multis alijs præstantior, vt quî*

*Corpore tela trahens, medicamine vulnera curet.*

PRIMUM itaq; telorum differentia enumerari debent. differunt autem tela materia, figura, magnitudine, numero, habitu, viribus. Materia quidē quatenus hastilia aut lignea sint, aut arundinea. Ipsa vero tela aut ferrea sunt, aut ærea, aut stannea, aut plumbea, aut cornea, aut vitrea, aut ossea: aut arundinea, vel etiâ eadem linea, tot enim differentiæ potissimum apud Aegyptios reperiuntur. figura autem, quatenus alia sunt rotunda, talia vngulosa, nepe triangula, alia sulcata quæ & gonchota dicuntur, alia trifulca, atq; alia cuspidata, alia cuspidibus carent. ac cuspidatorū, hæc cuspides posteriora spectantes habent, vt dum extrahuntur contra defigantur: illa in anteriora, vt propulsata idem faciunt: quædam obuersas cuspides habent, fulminis instar, vt dum ipsa trahuntur propellunturq; in obiecta infigantur. Sunt quæ mota cardine cuspides habent, contractas, quæ dum

in



in trahendo explicantur, telum extrahi prohibent. Magnitudine variant tela, quatenus alia magna sunt, ut trium digitorum longitudinem expleant: alia parua, ut vnum digitum æquent, quæ sanè & myiata apud Aegyptios vocantur, alia medium inter hæc locum occupant. Numero autem quatenus nonnulla simplicia sunt, nonnulla composita. tenuia siquidem ferramenta ipsis imponuntur, quæ in teli extractione in imo delitescunt. Habitu, quatenus alia ferrum acutum ligno habent insitum, alia concavum: ac quædam firmiter ligno infixæ sunt, quædam negligentius, ut in extractione separata intus remaneant. Viribus differunt, quatenus veneno quædam sunt oblita, quædam non. Atque hæc sunt telorum discrimina. Nunc dicamus quomodo extrahantur in conuulseratis, & in bello, & extra bellum, sponte, & inuito, quacunque occasione, ac qualibet ex materia confecta. Cæterum dupliciter tela in carne extrahuntur, tum euulsione, tum propulsatu. In quibus enim per summa telum impactum est, euulsione eximi debet. similiter etiam quæ altè inhaerent, obiectæ vero partes si conuulnerentur, sanguinis profluvio aut dolore ex consortij lege periclitantur. At propulsatu utimur in quibus altè telum infixum est, & partes obiectæ breue spatium continent, neque nervus, neque os, neque eiusmodi aliquod diuisionem impedit: ossæ autè conuulserato euulsorium modum assumit. Si igitur telum conspicuum fuerit, inde extractionem moliamur: si occultatum est, conuenit autore Hippocrate, modò vulneratus possit, in ea figura constitutum notare, in qua etiam vulneratus est: si non possit, iacentis certè quatenus licet modo figurantes specillo tentabimus. & si quidem in carne fixum est telum, manibus extrahemus, aut eius hastili quod etiam attracton appellant, nisi exciderit, ligneumq; id potissimum sit: si excidat forcipe qua dentes radicésve, euelluntur, aut ferramento quod à telo extrahendo belulcum Græci vocant, aut alio quopiam instrumento accommodo, extractionem moliamur, nonnunquam etiam carnem prius incidentes, si vulnus instrumentum non recipiat. At si etiam in opposita telum processerit, nec illac ipsum possit extrahi quæ infixum est, diuisis iis quæ opposita sunt, per illa ipsum eximemus, vel euellentes ut dictum est, vel per eam partem in quam tetendit propellentes, vel si hastile exciderit, demisso instru-

ment



mento propulsorio ita ut neruum, aut tendinem aut arteriam, aut eiusmodi aliquod necessarium vitemus, protrudere oportet. turpe siquidem est, dum telum extrahimus, peius eo malum efficere. Et siquidem caudatū telum sit ( hoc autē specillo deprehendemus) fœmina propulsorii instrumenti demissa accommodataq; telum propellemus: si concauitatem, marem. Telum vero exemptum si sculpturas quasdam habere, ceu aliorum tenuium ferramentorum quæ ipsis imposita esse possint, appareat, specillo rursus vsi, si illa inueniamus, eadem ratione & via auferemus: si oppositas cuspides, ut verisimile est, telum habens non exilierit, vicinus ei locus diffecari debet, si nulla pars necessaria contigua sit, detectumq; telum eleuantes, modeste extrahemus. Nonnulli vero exigua arundine cuspidibus ipsis circumposita sic telum euellunt, ne carnes à cuspe radantur. & si vulnus inflammatione vacauerit, futuris vsi cruentorum modo curabimus: si inflammationē experiatur, fomentis, cataplasmatibus, & consimilibus medebimur. Porro si venenato telo quis ictus est, totam carnem quæ veneno iam mutata est, si quidem fieri potest, præcidemus. Agnosces autem eam quod è sana carne differat. pallida enim, subliuida, & veluti emortua apparet. Aiunt autem Dacos & Dalmatas cuspidibus elenium & ninum dictum oblinere, idq; vbi sanguini vulneratorum obuenerit, hominem occidere: comestum vero ipsis innocuum esse, & nihil mali efficere. At si telum ossi inhererit, rursus instrumento experiemur, & si quidē caro impediatur, hanc adimemus aut diducemus: si vero etiam altē in osse lapsum est, quod cognoscimus si firmiter id infixum nulla vi commoueatur, excisorio cultro osse quod iuxta est exempto, aut etiam terebra prius perforato, si crassum sit, telum liberabimus. Porro si in principem aliquam particulam telum defigitur, exempli gratia, cerebrum, aut cor, aut guttur, aut pulmonem, aut iecur, aut ventriculum, aut intestina, aut renes, aut vuluam, aut vesicam, quum iam notæ lethales apparuerint, & euulsio præsertim multum cruciatū vexationemq; accersitura est, nihil tentabimus, ne præterquam quod nihil sumus profecturi, etiam conuitiandi occasionem idiotis præbeamus. Si vero exitus fuerit obscurus nec in cōspectum veniat, præfati periculum, opus aggrediemur. Multi siquidem abscessu quoq; in aliqua vitæ necessa-

ria



ria parte oborto, præter opinionem conſanuerunt, quum &  
 iecoris fibram, & omenti partem, peritonæiq; & totam vul-  
 uam ſubinde ademptam fuiſſe, nec mortem inde ſubſequu-  
 ram, memoriæ prodatur. Eſt quum guttur de induſtria ſub-  
 inde in anginis diuidamus, vt in capite de ipſius incifione  
 dicebamus. Telum itaq; ſi in his relinquatur, in præſenta-  
 neam mortem præcipitat, præterquam quòd artem etiam  
 inhumanam oſtendat: ſi eximatur, fortè etiam ſalus ſubſe-  
 quitur. Porro principalium particularum vulneratarum agni-  
 tio non eſt difficilis, vt quæ ex accidentium proprietate, ex-  
 crementis, & particularum ſitu, inueniatur. Si enim cerebri  
 membrana vulnus accepit, dolor capitis validus ſubſequi-  
 tur, oculi feruent, rubentq; lingua agitur, mens deſipit. Si  
 cerebrum percuſſum eſt, ægri concidunt, vox nihil ſonat, fa-  
 cies peruertitur, bilis vomitus ſequitur, ſanguis per nares  
 erumpit, per aurem humor albus pulticulæ ſimilis emanat,  
 ſanies per vulnus exit. At ſi in vacuam thoracis regionem  
 telum deſigatur, foramine ſpatioſo permanente ſpiritus e-  
 rumpit. Corde vulnerato iuxta mamillam ſiniſteriorem, te-  
 lum apparet non penetrans, ſed ceu alteri impactum, ac nõ-  
 nunquam pulſatilem motum ædit, ſanguisq; niger effertur,  
 ſi tranſitus pateat: extrema frigescunt, ſudor emanat, animus  
 deficit, & ſine mora exitium ſubſequitur. Pulmone icto, ſi  
 ſpatioſa laxitas eſt, ſanguis ex plaga ſpumās vacuatur: quum  
 non eſt, ore magis per vomitum redditur, ceruicis vaſa at-  
 tolluntur, lingua alium colorem aſſumit, multum ſpiritus  
 attrahunt ægri, frigidi appetentes. In ſeptro tranſuerſo vulne-  
 rato, telum quidem iuxta ſpurias coſtas deſixum apparet,  
 inſpiratio autem magna oritur, cum gemitu & dolore per  
 totam humeri partium compagem. Quòd ſi abdomen vul-  
 nus acceperit, id ex recrementis innotefcet, quum latum in-  
 tus ſpatium exiſtat, vel etiam telo exempto, vel haſtili intus  
 fracto, ſuccus ex ventriculo euacuatur, ex inteſtinis ſtercus,  
 interim & omentum, vel inteſtinum procidit. Veſica autem  
 vulnerata, vrina excernitur. Itaque in cerebro cuiusq; mem-  
 branis ictis, caluaria perforata telum eximimus, quæadmo-  
 dum in capitis fracturis mox dicetur. in thorace autem, niſi  
 telum ſubſequutum fuerit, per mediocrem intercoſtaliū  
 incifionem, vel etiam vna exciſa coſta, lamina quæ mēbra-  
 nam cuſtodiat ſubiecta, euellemus. Similiter in vētre, veſica,

cate



cæterisq; in alto particulis, si quidem telum subsequatur, citra negotium eximemus: sin minus, rursus diuisione adhibita medicina vtemur, quæ cruentis conueniat. In ventre, si res postulet, etiam suendi eius ratio, quæ gastroraphia dicitur, accommodabitur, quem in modum comprehensum est. At si in grandiore quodam vase, exempli gratia, in iugularibus venis quæ in imo latent, aut arteriis quas carotidas appellant, aut etiam magnis arteriis quæ alas vel inguina intercurrunt, telum defixum, copiosius sanguinis profluium propter exemptionem minetur, ratio est hæc funibus antea ex vtraque parte constringere, deinde teli euulsionem moli-ri. At si particulæ plures confixæ fuerint, verbi causa, brachio cum thorace coniuncto, vel cubito cum aliis corporis particulis, vel pedibus inuicem, siquidem non per totas vtrasque partes telum penetrauerit aut hasta, apprehensa hæc extrinsecus, veluti etiam in vna euellemus: sin ambas penetrauerit, dimidia ligni parte serra rescata, particulatim singula faciliore figura extrahimus. Quoniam vero & lapides subinde vel buccina, vel plumbum, vel simile quippiam ex funda mittitur, tum vi, tum quòd angulosa sunt defiguntur. Agnosces igitur ea, quòd moles aspera & inæqualis illabatur, item quòd non omnino in rectum tendit diuisione, sed amplior, & caro veluti contusa liuidaq; appareat, adhæc, quòd cum grauitate dolor affligat. Hæc igitur conuenit agitata instrumento quo quid attollimus, aut aduersa scalpelli parte, aut vulnerario specillo recipere. si autem fieri potest, etiam forfice extrahemus. Multis autem infixæ tela integra intus infederunt, quæ vulneribus cicatrice obductis, deinde longiore temporis spatio partem eam abscessu occupatæ & dirupto exiliere.

†Hic locus sic descriptus est in vet. Cod. τὰ δὲ γωνιωτὰ καὶ τοῦτων τὰ μὴν διχλώχινα, τὰ δὲ γλωχινωτὰ καὶ λόγχωτα καλούμενα, τὰ δὲ τριγλώχινα, id est, alia angulis habentia, & horum quidem alia duos angulos habent, alia verò angulum habentia, quæ lonchota, id est, longa vt hasta, alia tres habent angulos &c.

De fracturis, & quot ipsarum sint differentie. CAP. LXXXIX.

**P**roximum fuerit tradita carnis vitiorum manu scalpellioue curandorum ratione, etiam de ossium fracturis, dico sanè etiam luxationibus, sermonem instituere, quoniam & ipsæ chirurgiæ generi subiiciuntur. & primum de fractu



fracturis agam, iisq; prius quæ in capite fiunt, tum quod inter carnis & ossium chirurgiam medium locum obtinent, tum quod omnibus partibus caluaria præcellit. In vniuersum igitur fractura ossis est diuisio, aut ruptura, aut præcisio, à violentia quadam extrinsecus accidens. Cæterum plures fracturarum sunt differentiæ, alia siquidem dicitur fieri raphanidon, hoc est, ad raphani speciem, alia schidacidon, alia es onycha, alia alphitidon, alia cata apothrausis, id est, iuxta refractionem. Raphanidon igitur ruptura ossis est transuersim per crassitudinem facta, quæ etiam sicyedon & cauledon nonnullis appellatur, ex cucumerum & caulium fracturæ similitudine. Schidacidon autem, quasi assulæ modo, est oblonga ossis fissura. es onycha, quasi dicas in vnguem, iuxta partem aliquam recta est fissura, in extremo lunata: quæ etiam calamidon appellatur. Alphitidon, ad farinæ similitudinem dicta, est quum os in multas tenuis partes finditur, quæ & ipsa caryedon à quibusdam vocatur. Refractio autem, quæ apothrausis dicitur vel etiam præcisio, est quum pars ossis per summitatis rupturam auferretur, vt ablata superinnatet. Atque tot fracturæ constant differentiis.

## De fracturis capitis.

## CAP. XC.

**F**ractura in capite peculiariter caluariæ est diuisio, nunc simplex, nunc multifida, à vi quadam exteriore facta. Porro differentiæ capitis fracturarum hæc numerantur. Rhogme, id est fissio, Eccope, hoc est excisio, Ecpiesma, quod est effractio, Engisoma, id est corporum appropinquatio, Camarosis, hoc est testudinatio, in infantibus etiam Thlasis quod est contusio. Rhogme igitur caluariæ per summa est diuisio, aut rima profundior, in qua nequaquam os viciatum foras emouetur. Eccope caluariæ fissura est cum ossis offensi ruptura. At si à reliquo osse pars offensa discesserit, apoplepsimon nonnulli vitium appellat. Ecpiesma in multas partes caluariæ effractio est, in qua profundius ossa descenderint, & cerebri membranam contactu suo premant. Engisoma caluæ ictus est, in quo os viciatum ad interiorem cerebri membranam descenderit. Camarosis diuisio caluariæ est, in qua pars affecta cameræ modo exaltata relinquitur, vt Galenus tradit, ac intro à sanis fracturæ partibus ossa magis recedunt, membranaq; innituntur, quemadmodum

E



in ecpiemate. sic enim ille existimat. Alij etiam trichismou, quasi dicas capillationem, his adnumerarunt. Est autem trichismus arctissima rhogme, sensum plerunq; fallens, eoque latens: quæ quia non facile se ostendit, mortis causam sæpe adfert. Thlasis caluariæ diuisio nō est, eoque nec fracturam rectè dixeris eiusmodi affectionem, verum est ossis caluæ in interiorē partem impulsio, aut inflexio, concauitatem integræ caluæ continuitate tantum efficiens, vt licet in plumbeis ex crudoq; corio cōfectis vasculis, si foris percutiantur illidanturve, conspiciari. Porro contusionis huius duæ existunt differentie: vel enim calua per totam ipsius crassitiem contunditur, vt frequenter etiam cerebri membrana abscessu occupetur: vel omnino à caluaria hæc per totum aut non per totum premitur, sed iuxta exteriorē duntaxat superficiem vsq; ad laminam secundam deprimitur. Sunt qui his differentiis apechema, quasi dicas ab Echo responsionem, addiderint. Ea est, à contraria ictus parte facta caluariæ fractura. At falluntur hi, quoniam nō sit in hominis calua quæ admodum in vitreis quibusdam vasculis fieri illi docent. illa siquidem vacua sunt, ideoq; id patiuntur: calua autē hominis vndiq; plena & alioquin solida est, ac rhogme seu fissura caluariæ, quæ aliarum complurium capitis partium icturum lapsu, vel citra cutis continui solutionem generatur: quæq; postea abscessu in ea facto, eodemq; secto, apparuerit, in opposita ictus parte factam esse ipsis videtur. atq; hoc vitium quemadmodum prima dicta rhogme curatur. Si igitur fractura capitis facta fuerit, speciem ipsius ex corpore quod percussit, deprehendes, si acutum fuerit, aut graue, aut durum, aut violenter impactum. Item ex symptomatis quæ icto superueniunt, exempli gratia, vertiginibus, voce amissa, aut subito collapsu, præsertim in engismate, aut contusione, aut ecpiemate, aut interiori camarosi cerebro compressio: itē ex notis quæ à sensu capiuntur. Si enim ampla cutis fuerit diuisio, per ipsam promptè cognoscemus: sin autem diuisio non per totum ierit, aut angusta sit, fracturam tamen esse suspicemur, cute diuisa, & oculis, & specillo demisso eam pernoscemus. Si enim ex aliis quæpiam fracturis fuerit, inde manifestum euadet: at si rhogme solum angusta & pilosa sensum fugiens, medicamento aliquo nigro, liquido, vel etiā ipso atramento scriptorio infuso, os rademus, ipsa nanque rhogme



rhogme nigra ostenditur, conuenitq; rasuræ tam diu insisteret, quousq; signum rhogmes aboleatur. Si ad cerebri membranam vsq; peruenerit fractura, non rademus, sed agnoscere conabimur utrū mēbrana ab osse recesserit, an affixa permaneat. Si enim ipsa manet, inflammatio nulla vulnus infestat, æger paulatim febris liberatur, & pus coctum apparet: si recesserit membrana, augentur dolores, & febris similiter, os alium sumit colorem, pus tenue & crudum effertur, & si medicus rem negligentius tractet, nec perforatione utatur, hoc grauiora oboriuntur symptomata, nempe bilis vomitus, conuulsio, mentis delirium, febris acuta, in quibus manum admolari nō oportet. Quod si his absentibus membrana cerebri non abscesserit, rhogme autem duntaxat fuerit, etiam solo rasorio curatur, vel si vsq; in altum penetret. Sin autem tantum vsq; ad laminam secundam, quæ diploë dicitur, fractura peruenerit, eousq; radendum est, vel etiam con fractū os eximēdū, quemadmodū docebitur. At si in tenuia frustra os fuerit comminutum, hæc quoq; diligenter instrumento idoneo auferentur, etiam si membrana non abscesserit. Ab initio autē quum vulneratum susceperis, hyeme quidem ante diem quartum decimum omnino os auferre tentato: æstate, ante septimum priusquā commemorata oboriātur symptomata. Cæterum manum hoc modo admolieris.

*Caluariæ fracturæ curatio.*

DERASO super vulnus capite, duas lineas iuxta rectos angulos mutuò se secanteis, quæ literæ X figuram accipiant, incidemus. harum autem alteram esse conuenit, quæ iam antea erat, deinde quatuor in vertice angulos excoriantes, ut totum os, quod perforabitur nudum existat: si quidem sanguis fertur, linamentis ex posca obiectis cohibebimus: sin minus, siccis. deinde implicito linamento ex vino & oleo iniecto, conuenienti vinculo utemur. sequenti die, nisi recentius aliquod symptoma prohibeat, perforare os vitiatum aggrediemur. Collocato igitur in sedili agroto, aut recumbente prout vulnere conuenit, auribusq; ipsius lana obturatis, propter sonitum qui ex appulsu redditur, vinculum aliquod vulneris soluemus. linamentis omnibus exemptis, & spongia deterfis sordibus, iubebimus ministris duobus, ut tenuibus fasciis circūpositis, quatuor angulos corporum quæ fracturæ incumbunt, attollant, & si quidem



os fuerit imbecillum, aut natura, aut fracturæ vitio, id scalp-  
 pris excisoriis acie inter se aduersis, auferemus, primum ca-  
 uis excisoriis scalp-  
 pris, quos Græci cycliscos vocant, à latioribus  
 incipientes, mox angustioribus, deinde specilli modo angus-  
 tis, malleolo sensim adactis, ad capitis concussionem vte-  
 mur. Si autem validum os fuerit, prius eo terebellis quæ  
 mergi non possint, quas ab argumento abaptismos dicunt  
 perforato, (eiusmodi vero sunt quæ paulo interiorius quàm  
 cuspis acuta est, eminentias habent, quæ ipsas ad cerebrum  
 membranam demergi prohibeant) per scalp-  
 pra circuncisio-  
 ne vsi, id quod vitiatum est, auferemus, non subito, sed par-  
 ticulatim, si quidem fieri potest, digitis: si non, forcipe, aut  
 vulsella qua vel ossa vel pili apprehenduntur, aut eiusmodi  
 quodam instrumento. Locus autem qui inter foramenta est  
 tantum spatium cōtinebit, quantum maximi mucronis spe-  
 cilli longitudo, tam altè verò descendet, vt interiorē ossis  
 superficiem accedat, cura adhibita, ne membranam cerebrum  
 terebra attingat. Quare etiam terebram ossis crassitudinem  
 respondere conuenit, compluribus id genus ad hoc prepara-  
 tis. At si fractura caluariæ vsq; ad secundam laminam dun-  
 taxat peruenerit, ad hanc etiam vsq; solum foranda est. Osse  
 iam ablato, asperitudinem quæ ab excisione caluariæ pro-  
 uenit, rasorio aut quodā scalpello excisorio adæquabimus,  
 laminam quæ membranæ custos est, subiicientes, ac ossicu-  
 lis quæ remanserant, vt verisimile est, aut spiculis ingeniosè  
 ablatis, linamenta inferemus, quem modum diamotosi ap-  
 pellant. Hæc ratio chirurgiæ cōmunior simul & promptior  
 est, & periculo vacat. Item modus qui per lenticulatum ex-  
 cisorium scalp-  
 prum fit, mirum in modum Galeno commen-  
 datur, sine foratione, post insculptionem cycliscis scalp-  
 pris factam, ipsum adhibenti. Scribit itaque hunc in modum.  
 Si verò vnā semel partem nudaueris, ac scalp-  
 prum quod  
 in cuspide præfixam habet retusam leuēque lenticu-  
 læ speciem, aciem verò per longitudinem erectam, sub-  
 miseris, vbi latam partem lenticulæ super membranam  
 defixeris, malleolo feries, diuidēsque sic caluariam, ita  
 si quidem agentibus, omnia quæ requiruntur, euenient.  
 Nam membrana, ne si dormitans quidem, agas, latæ tan-  
 tum lenticulæ parti occurrens violari non potest. Quod  
 si  
 sicubi adhæreat caluariæ membrana, huius quoque adhæ-  
 reat



rentiam innoxie dirimit rotundum lenticulae extremum, subsequitur autem praeventem eam à tergo ipse scalper caluariam secans. Quare nec qui minore cum periculo, nec qui celerius perficiatur, forandi modum inuenias. At quae administratio ferris & modiolis, quem choenicion siue choenocida Graeci vocant, peragitur, recentioribus, ceu noxia, improbata est, sed administrationem quā in rhogme exposuimus, probat. Idem vero modus ossium excindendorū conueniet in reliquis etiā caluariæ fracturis. Quantum vero excidere cōueniat. Galenus nos docebit, hunc in modum manifestò scribens. Quod vehemēter est confractum id totum auferri debet: si vero ab eo fragmenta quaedam longius excurrant, quēadmodum aliquando cernitur accidere, hæc persequi ad extremum non oportet, illud probè scientes, nullam inde noxam sequuturam, modò reliqua omnia ritè sint confecta. Post chirurgiam panniculo simplici lineo vulnere æquali, rosaceo madenti, cerebri membranam operiemus, exiguaq; lanæ stuppam similiter rosaceo imbutē prædicto panniculo imponemus, deinde linamentum impli citum duplex in vino & oleo aut ipso rosaceo tinctum, toti vulnere circumponemus, diligentia adhibita ne cerebri membrana grauetur, postea latiore utemur ligamento, neq; hoc astringentes, verum ut linamenta solū retineat. Viçtus adhibebitur qui inflammationem arceat, & febribus peculiaris est, membrana cerebri crebrius interea rosaceo superfusa. Post tertium diem, ubi vincula dissolueris, & sordes spongia deterferis, remedium induces quod cruentis iniicitur, & inflammationem repellit, superaccommodas membranae ali quod ex cephalicis dictis aridis, vsq; dum carne oppleatur. Nonnunquam os radetur, si hoc res postulet, propter quasdam summitates extantes, aut etiam propter ipsius carnis productionem. Reliqua medicamentorum materies, ut in vulneribus comprehendimus, admoventi debet.

*De cerebri membranae inflammatione.*

QVONIAM frequenter cerebri quoq; membrana post chirurgiā inflammationē experitur, ut non solum caluariæ crassitudinem, sed etiā cutem ipsius excedat cum renixu, & ut naturalis ipsius motus pulsatilis impediatur, quæ potissimum & cōuulsio aliq; graui symptomata vel ipsa mors subsequitur. Origo inflammationis aut ex acuta quadā ossis



eminentia pungente ducitur, aut ex linamentorum grauitate, aut perfrictione, aut multo esu, aut vini potione, aut alia quadam occasione latente. Si quidem ex manifesta occasione inflammationem contraxerit membrana, ea protinus amputanda est: si ex latenti, magis pugnare conuenit, † ut pote sanguinis dimissione, si causa non obstiterit, victu qui inflammationi congruat. Item loco induci remedia debent, calentis rosacei fots & superfusio ex althææ decocto, aut foenugræci, seminis lini, chamæmelorum, similibumq; cataplasmata verò ex cruda ordeï farina, aut lini semine, cum prædicto decocto & gallinarum adipe, adhæc fomentum ex lana adhibebitur. Capiti & occipitio meatuique auditorio oleum aliquod inflammationem prohibens instillabitur. Viscerum quoq; cura habenda est, cataplasmatibus adhibitis, item toti corpori prospicere, consilium est, in calidam id aquam, ut par est, collocantes inungentesq;. Si perseverat inflammatio, & nihil aliud prohibet, medicamento quod bili ducendæ est, purgare ipsos Hippocrates præcipit.

† Rectior est scriptura veteris libri. πλέον ἀγωνίζεσθαι προσύκειν φλεβοτομία χρωμένως εἰ μὴ δὲ κολύοι, ἢ ἀσπίς, ἢ τῇ πρὸς φλεγμονὴν ἀρμόζουσαν διαίτη. Id est magis pugnare oportet, vel venam secantes, si nihil prohibet, vel inedia, vel victu inflammationi conuenienti.

*Si membrana cerebri nigruerit.*

CEREBRI membrana si quidem per summa ex medicamentis in id efficacibus nigruerit, † mel triplum rosaceo miscentes & per linamenta id applicantes, curabimus, deinceps & reliqua admouentes. At si nigrities sua sponte prouenerit, idq; in imo potissimum, cum aliis grauib; indicibus, attingi tunc nō debet, ut quæ natium calorem emortuum innuat. Noui quendam qui post annum quàm affectu conflictaretur, caluaria perforata superuixerit. erat enim fractura in sincipite ex telo facta, emissariūque habens per quod etiam membrana ab offensa immunis conseruata est.

† Græcus codex antiquus μέλιτι τριπλὸν ρόσας ῥοδίν. Id est. melli triplum rosacei miscentes.

De nari



*De naribus fractis contusisque.*

CAP. XCI.

**N**arium pars ima, quum sit cartilaginosa, frangi non solet, sed contundi, si ma fieri & perueriti: superior quæ ossa est, nonnunquam frangitur. In his autem deligaturam damnat Hippocrates, ut quæ magis resimas efficiat & distorqueat, præterquam in his quæ ex ictu per medias naris emineant. in his enim convenientem fasciam, cum medicamento imposito assumit, ut compressæ nares naturalem figuram recipiant. Fractis igitur naribus, in ima quidem parte, indice aut paruo digito demisso in exteriora diriguntur: in interiore, etiam scalpelli nucleo id faciendum est, primo statim die, aut non multo post. Quum veto decimo die naris ossa continentur, extrinsecus indice magnoq; digito hæc efformare congruit. Ut autem figura quam fingis non coneidat, duo obturamina tortilia ex panniculo inuoluta, naso impones, vnum singulis nasi foraminibus, & si altera duntaxat naris pars sit peruersa: eaq; sinere conuenit, donec os aut cartilago contineat. Nonnulli fistulas ex anserum peninis panniculis replentes, naribus insinuarunt, quod figura custodiatur, & respiratio non impediatur. quod non necessarium puto, quum spiritus per os trahatur. At si inflammationem nares sentiant, medicamentum aliquod quod eam arceat indemus, exempli gratia, ex succis inscriptum, aut quod oxelæo constat, aut eiusmodi aliquod. vel ex triticea simila & thuris fuligine seu gummi vnâ incoctis cataplasma iniiciemus, tum propter inflammationem, tum ut nares contineantur. Quod si in alteram partem nares distortæ, Hippocrates postquam commodè eas figuraueris, oblongam habenulam digitali latitudine iubet circundari; alteram ipsius extremum taurino glutine, aut gummi illitum summæ narium parti agglutinari, ex latere quod inclinant. vbi illa exaruerint, habenam transferre per aurem oppositam versus occiput, & frontem oportet, deinde ipsi sub altero habenæ principio affirmabitur, ut nares in latera retractæ ad mediâ dirigantur figurâ. quod non admodum recentioribus placuit. Porro minutim cōfractis narium ossibus, diuidere ipsas, aut superiorē ipsarū partē cōuenit, ac fragmenta ossiculorū vulsella auferemus, futuris diductas partes committētes ac commodantēsq; ipsis remedium quod cruetis aptum est, & cōglutinat. Sin autem extra nares vlcus fuerit excitatum,

E 4



linamentis in longitudinem implicitis curabimus. Sunt qui plumbeis canalibus, quas solenas Græci dicunt, vsque dum cicatrix fuerit obducta vsi sunt, ne caro ex vlceribus supercreseat.

*De maxilla confracta, & aure contusa.*

CAP. XCII.

**D**E aure contusa tertio libro tractatum est, tanquam huiusmodi affectio ad fracturas non pertineat. Maxilla multas ob causas frangitur. Si igitur extrinsecus solum offensa, non per transversum fissa, introrsus cauata fuerit, promptum sanè est cognoscere. Opus autem est altera manu, siquidem dextra maxilla fracta fuerit, dextra: si altera, sinistra. indice igitur & medio digito in affecti os demissis, interiorē fracturæ extantiam, probe foras compellere conuenit: altera manu foris eam excipiente. Restitudinem verò maxillæ ex eiusdē dentiū æqualitate deprehendemus. Quòd si fractura per trāsuersum facta fuerit, primū tēsiōne, deinde retractione, quā antitafin vocant, partis in cōtrarium, vsus, ministro eam continente, vt dictum est, dirigere aggredieris: porrò denteis in parte confracta diductos, inter se, vt Hippocrates præcipit, auro deligare, nēpe lino ab auro chrysolino dicto aut chrysonemate: quoniā vero huius facultas non omnibus conceditur, lino valido, aut bysso, aut pilo equino, aut id genus aliquo. Verūm si quidem cū vlcere fractura euenerit, specillo tentandū, num tandem etiam refractio ossis facta sit. atq; si exigua diuisione facta, os vnum refractum aut plura remanserint, idoneo instrumento auferentes, futuris oras vlceris commitemus, & medicamento cruentis apto vsi deligabimus: sin autem citra vlcus contigerit, ceratum simplex maxillæ impositum cōuenienter deuinciemus. fasciæ medium per occiput dispensabitur. habenulæ vtrinq; per aureis ad summam maxillam, inde rursus ad occiput, mox ad mentum, inde per genas ad sinciput, inde rursus sub imam occipitijs partem, distribuentur, vbi & fasciam desinere oportet. Super hæc rursus vinculum aliud fronti circumdatum, quod epialema Græci dicunt, post caput coniungetur, omnes prædictæ fasciolaræ id circum astringēt. Alij vero tenuem ferulam, quēadmodum alij corium, quod æquē sit longum impositum maxillæ, deligāt, vt commemoratum est: reliqui deligatura, quam Græci dicunt phorbiam, quasi dicas capistrum, vtuntur. At si

vera



utraque maxilla in summo mento auellatur, qua etiam par  
te coeunt, ambabus manibus parum inuicem distantibus,  
rursus adaptato, & denteis adunitos, quomodo diximus,  
ligato: fac congrua vsus ligatione, tenui ac sorbili alimē  
to ægrotantem nutrirī iubeto. Nam mandere ipsi inimicum  
est. Si aliquid emotum à figura conuenienti putaueris, ter-  
tio die soluens, iterum illigato, quod tam diu facies, quàm  
callus fracturam firmarit. firmatur autem maxilla intra  
treis potissimum septimanas, quoniam laxa & medullæ ple-  
na est. Quòd si inflammatio aliqua superuenerit, ne aduer-  
sus hanc quidem tum fomenta, tum cataplasmata negligē-  
re oportet. Quod in omnibus ex æquo obseruatum abs te  
cupierim.

† *Antiq. codex. καὶ τῇ προσήκοντι τροφῇ αὐτὸν ἐπιδοῦναι κίλυσον ἢ γε-  
μῆν λεπτὰς καὶ ῥοφιατῶδες τροφὰς χωρμένους, & congrua vsus  
ligatione, iubet ut quiescat & tenui ac sorbili victu utatur.*

## De iugulo confracto.

## CAP. XCIII.

Iugulum, quod etiam clauicula dicitur, quum naturali-  
ter figuratum est, interiore ipsius extremo, cum pectore  
committitur: exteriorē, cum summi humeri compage, seu  
articulamento adunitur. eoq; si humerum, aut ipsum susti-  
nens brachium, fracturam quacūq; tandē parte experiatur,  
quā humerum suum spectat, plerunque infra interius ex-  
tremum fertur, vna cum brachio detractum. Præstiterit au-  
tem per transversum potius quàm assulatim, aut arundinis  
modo, hoc est, in longitudinem clauiculam frangi, quod  
vulgo receptum est. Nam transversim confractū, extēsiōne  
compressioneq; digitorum promptē in naturalem figuram  
revertitur: cætera vero eminentias habent, quæ ægrè pos-  
sint coaptari. Si igitur per totam ipsius crassitudinem quo-  
cunq; modo, iugulum fractū fuerit, duo ministri, vnus ad hu-  
merum eiusdem lateris fractæ clauiculæ manibus circum-  
infectis, brachium ad exteriora simul & sursum trahens, al-  
ter oppositū humerum, aut certē cervicē attrahens, retra-  
ctionem à se, quam Græci vocant antitafin, molientur: me-  
dicus suis digitis fracturam diriget, prominentiora pellen-  
do, ima foras attrahendo. Quòd si maiorem retractionē à se  
desideret, orbiculum bonæ magnitudinis ex panniculo, aut  
lanis, aut eiusmodi aliquod corpus alæ subiiciēs, cubitum



lateri indidem adiget, ac reliqua sicut dictum est, exequetur: si autem id nequeat, extremum clauiculæ iuxta humerum in alto situm ad superiora, ægrotante resupinato, educet cervicali quodam mediocri, dorso subiecto, ministro humeros duos ad ima deprimente, ut os clauiculæ quod in imo est, reuocetur, rursus digitis suis fracturam conformabit. Porro si partem aliquā iuguli refractam, instabilem, aut etiam pungentem percipiamus, scalpello in rectum diuisam eadem auferemus, ac reliqua scalpri excisoriis, lamina quæ à tuendis cerebri membranis menynghophylax dicitur, aut alia quæ excidendis supponitur propter firmitatem clauiculæ subiecta, exæquabimus & si quidem inflammatione careat, futuris: si aliter est, linamētis utemur. & splenis diuersis præparatis ad ossis eminentis inclinationem, maiora ex eis & crassiora superaccommodabimus, si inflammatio infestat, oleo imbuta: si minus, sicca, ac mediocri ex lana orbe propter alam subiecto, conuenientem inducemus deligaturam, per axillas, affectam clauiculam, scapulas quæ, prout res exigit, deligantes. & si quidem ad ima retenderit pars clauiculæ humero proxima, latioris habenulæ dimidiū, eiusdem cubito subiicientes, totum brachium ex collo suspendemus: altero autem vinculi dimidio, manum, quemadmodum in iis fit quibus ex cubito sanguis detractus est. At si versus superius extremum inclinauerit, quod rariū est, brachium suspendi non debet, verum resupinus æger decubebit, & tenui nutrietur victu. si verò opus est, etiam fomentis adiuuabitur, sed pro ratione, usque dum callus eam firmarit. id quod fit plurima ex parte diebus viginti.

*De scapulis.*

C A P. X C I I I.

**S**capulæ quæ latæ sunt & mensæ figuram repræsentant, non franguntur: iuxta spinam vero fracturam sustinent, nunc compressæ, nunc rupturam simplicem expertæ, interrim etiam refractæ. Compressionem itaq; tactu cognoscimus, si caua occurrat, stuporē proximi brachij, & dolorem pulsatilem inducat. Ruptura ex tactus asperitudine & loci doloreprehenditur: ambo autem ratione qua inflammationem arcemus, curantur. Refractio & ipsa tactu agnoscitur: leuis ac modica fascia conuenienti adaptatur: aucta vero & pungens ablatione per scalpellum adhibita & futuris, ut prius dictum est. Fasciæ autem & hic similiter ut in clauicula



ula iniiciuntur: incubitus oppositi lateris conueniet.

*De pectore.*

CAP. XCV.

**M**edium pectus, diuiditur imprimaturq; : summum, re-  
fringitur. Rupturam itaq; per medium factam dolor  
loci & inæqualitas sequitur, & strepitus digitis innixis elidi-  
tur: impressionem vero dolor vehemens, spirandi difficul-  
tas, tussis, mēbrana quæ costas incingit dispuncta, nonnun-  
quam etiam sanguinis eruptio, partis cōfractæ cavitās, & in-  
cedēdo facilitas. Curationem eam adhibere oportet, quam  
in scapulis prodidimus. In impressione autē adaptatio Hip-  
pocratis adhibebitur, quam ille in clauicula quæ foras pro-  
fesserit, vsurpat, per incubitum supinū cervicali dorso sub-  
iecto, scapulisq; constrictis, ita ut costæ vtrinq; manibus si-  
mul contrahantur. Iam vero costis lana obiectis circularem  
adhibebis deligaturam, lorīs prius in rectum subditis, post-  
ea duorum initia inuicem excipiuntur, quæ orbiculares fa-  
scias decidere prohibeant.

*De costis.*

CAP. XCVI.

**E**X costis quæ pleuræ & spathæ Græcis dicuntur, ossæ  
quidem omni in parte rupturam sustinent: spuria au-  
tem, in ea tātum quæ spinæ adiacet. nam hīc solum ossæam  
habent naturam: in exteriorē parte in cartilaginē dege-  
nerantes, contunduntur, nullam fracturam percipiunt. No-  
tæ ipsarum non sunt difficiles, etenim inæqualitas digitis  
explorantibus occurrit, strepitusq; & ad cōfractum addu-  
ctio. Quod si intrò spectauerint, dolor vehemēs punctorius  
sequitur, eo qui in costis prouenit grauior, quod aculei mo-  
do membranā costas integentem conuulueret, item ægra  
respiratio, tussis, eruptio sanguinis, subinde comitatur. &  
reliquas vtiq; declinationes digitis licet conformare, eam  
vero quæ intrò spectat, nequaquam, quod tendi nequeat. vñ  
de alii cibum flatulentum vberemq; assumi iubent, vt fra-  
ctura ex inflatione & tēsiōe foras propellatur, quod neces-  
sarium nō esse puto. Nihil enim cōmune adhuc inter se ha-  
bēt, tū thorax, tū viscera nutritoria, præterquā quod inflā-  
matio etiā ex repletionē augeatur. Alii cucurbitulā adgluti-  
nāt, q̃ à ratione & via curādi alienū nō esset, nisi particularū  
ex attractu, collectione, fracturā amplius ad interiora pro-  
pellerent. Quapropter Soranus hūc in modū scribit. Lanis  
oleo calido madentibus partes conteguntur, & linamentis  
impl



implicitis intercostale replebitur, vt deligatura æqualis iuxta orbicularem cirunductum veluti in pectore fiat. Omnia vero vt in pleuriticis fieri debent, ad magnitudinis proportionem. Porro si magna quædam necessitas compellat, quod membrana costas cingens vehementer compungatur, cutem diuidere conuenit, & fractam costæ partem detegere. deinde lamina, ne tunica costas tegens cõuulneretur, prius subiecta, ossicula quæ pungunt ingeniosè excindere ac eiicere oportet. postquam hoc feceris, ea sanè quæ inflammatione carent coniunges, & cruentorum modo curabis: quæ autem illa affliguntur, linamentis oleo madidis operies vitum curationemq; adhibens inflammationi dicatâ. Decumbent ægri ea figura quam facilius tulerint.

*De coxarum & pectinis ossibus.*

CAP. XCVII.

**C**Oxarum aut ilium ossa rarò quidem franguntur, sed easdem cum scapulis differentias sustinent. Franguntur enim in extremis, rumpunturq; in longitudinem, & per medium comprimuntur. Comites notæ ipsorum sunt, dolor partem affectam affligens, punctiōis pulsusq; sensus, cruris in eodem latere subitus stupor propter compressionem. adaptationem vero scapulis similem postulant, auersantur autem solam ex chirurgia eius quod fractum est, exemptionem per externas partes. nam si opus sit, digitis conformantur. deinceps autem etiam aliam curationē moliri oportet, fomentis vtendo, & concaua ilium linamentis adimplendo, quò deligatura ceu fasciis circularibus superiniectis, æqualis efficiatur. Eadem etiam dicenda sunt, de pectinis ossibus, nihil enim peculiarius de ipsis dicere habemus.

*De vertebris, spina dorsii & sacro osse.*

CAP. XCVIII.

**V**ertebrarum complexus interim sanè contusionem, rarò vero & fracturam experiuntur. propter quæ contusis spinalis medullæ membranis, vel ipsa etiam medulla, nerui in doloris consortium adducuntur, & mors præceps subsequitur, magisq; si ceruicis vertebra affectus infestarit, vnde præfatus periculum, siquidem fieri potest, audebis etiam sectione ossiculum quod premit eximere: si minus, ratione saltem qua inflammatio propulsatur, ipsas lenies. At si processus vertebrarum aliquis vnde spina constat, fuerit refractus, digitis tentantibus promptè occurret, dum refractione mouetur, rursusq; in locum transponitur. Conuenit autem

tem



rem id quod refractum est auferre, cute extrinsecus incisa: futurisq; commissa, remedio cruentis idoneo vti. Ceterum osse sacro confracto, index sinistrae manus digitus in anum remittendus est, dextra manu quod confractum est, quatenus licet, in naturalem figuram reducere oportet. Si autem nihil quid refractum sentiamus, hoc quoq; diuiso, deligaturam curationemq; congruam adhibebimus.

*De brachio.*

CAP. XCIX.

**I**N brachio confracto Hippocrates quidem intentionem hoc pacto molitus est. Lignum, inquit, oblongum manubrij ligonis modo, per summa fune deligatum, obliquum ex trabe quadam suspēdere oportet: collocato autem homine in sublimi quodam erectius, quā iuxta figuram qua recta ceruice dormimus, orthocathendon dicitur, manum ipsius super commemoratum lignum traducere, vt medium ligni alae eius transuersim adaptetur. manum autem inflexo iuxta rectum angulum cubito, minister procumbens continebit, deinde graue aliquid, exempli gratia, lapidem aut pondus plumbeum veleiusmodi quippiam ex cubito suspendens, sinensq; pendere sublime, ita fracturam conformabis: vel loco ponderis, famulus ad ima brachium detrahat. Nonnulli verò loco manubrij ligonis gradu scalae vti sunt. Soranus hunc in modum tradit: ægro in sedili collocato, vel, quod satius est, resupinato quò minus molestiae sentiat, manu fune ligata iuxta compagem qua ipsa cum brachio coniungitur, & ex ceruice suspensa, vt angulosa ipsius figura seruetur, ministris duobus iubeamus, huic, supra fracturam, illi, infra digitos circumponant, atque sic tensionem perficiant. Quòd si valentiore opus sit tractione, duos funeis æqualeis brachio circundamus, vnum, supra fracturam: alterum, infra. atq; vni famulo super ægrotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes, capita funium tradentes, iubeamus in diuersa brachium distendere. At si summus humerus fracturam senserit, dimidio vinculi, quod ciria dicitur, alae subiecto, reliquam partem iuxta caput teneri iubentes, alio quod oppositum est retrahēte, antitasin, hoc est à se retractionem vti dictum est, moliemur. quemadmodum sanè si cubitus confractus fuerit, illi vel iuncturae manus cum brachio funis iniicietur. Osibus iam fracturae probè coaptatis, distentio quidem remittetur, sed iuxta Hippocraticam consuetudinem



dinem deligabitur. Porro si fractura inflammatione vacet, recensq; sit, lineis utendum fasciis oblongis abunde, circa treis quatuorve digitos latis, aqua madetibus, aut etiam posca: si inflammatio adest, lanis tenuibus mollibusq;, oleo imbutis: & si quidem in medio brachij fuerit fractura, initium fasciae super fracturam iniicietur: ubi bis terve illigaueris, sursum fasciam ducere conuenit, ut (quemadmodum inquit) sanguinis influxiones excipiantur, atq; illic finiatur. Iam vero & secunda fascia uti oportet, initium eius similiter supra fracturam iniiciendo, atque alia eo modo quo in priori: rursus autem supernè deorsum, atq; iterum sursum reuocare, illic etiam sic terminabitur. Porro constrictio mediocris esto, tum nostri sensus, tum ipsius aegrotantis iudicio. At si iuxta summam humeri compagem contigerit, priore fascia illam & scapulas, & pectus comprehendens, ut deligatura fiat quam Graeci geranida appellant, perque secundam usq; ad cubitum dispensabis, ac inde ad supraposita recurre, cum summo humero scapulas pectusq; comprehendens, primae fasciolae similiter. Quod si iuxta cubiti flexum fractura obuenerit, etiam cubitum colligare expedit, ita ut angularis figura conseruetur. similiter in aliis quoque artubus, nimirum cubito, femore, tibia, cum fractura in parte, aut etiam iuxta articulum & non in medio membro existit, post articulum fasciam iniicere expedit. Recentiores itaque secundum deligaturam protinus ferulas etiam iniiciunt, ut adaptationis figura contineatur, constringentes ipsas prout sensus & tumor ex inflammatione postulat: veteres autem, à die septimo ferulas accommodant. nam intra hunc inflammatione declinante membrum redditur tenuius. At Hippocrates tertio quoque die ligamenta solui iubet, ne tensio quæpiam, aut motus præter solitum contactæ particulæ obueniat, aut eius quod iam infixum fracturae est, perspiratus prohibeantur, propter quos non solum noxius pruritus quibusdam accidit, sed etiam erosa à saniei acrimonia nonnunquam cute, exulceratio concitatur. Itaq; aquae temperatae tantum superfundere ratio est, quantum saniem discutere sufficit. Post septimum diem, ex maiore interuallo soluere conuenit, ceu partes non amplius saniem excernere desiderent. imò etiam calli obfirmatio hoc modo felicius prouenit. Cæterum ferulae iuxta sequentem rationem

nem



nem debet iniici. Splenia triplicia oleo imbuta super fascias circundantur. Si igitur membrum crassitudine fuerit æquale, similiter: si inæquale, partibus magis concavis per splenia repletis, æquale ipsum crassitie ferulis accommodandis efficiemus. deinde lana aut stuppa ferula mediocriter inuolutas, in orbem fracturæ circundamus, non minore quàm digiti spatio inuicem distantes, easq; moderatè constringemus: ita tamen, ut quatenus fieri licet, ferulas propius accedere articulum prohibeamus, præsertim iuxta anteriorem flexus partem. vlcera siquidem in ipsis nonnunquam & neruorum inflammationes pariunt, verum illic laxiores ipsas esse oportet, quemadmodum valentiores, ubi fractura curuatur. Præstiterit autem thoraci etiam brachiū mediocriter colligare, ne ipsum loco motum, figuram peruerat. At si quandoque inflammatio fuerit, (eam verò agnosces ex ambiente tumore, ac rubore, & quòd membrum nūc multò magis quàm prius stringatur) vel si confractum membrum, distortum sit, & nihil horum appareat, sed ligamenta laxa, vel econtrario strictiora, quàm par est, inueniantur solutis ipsis deligatura instauranda est. Resupinari igitur ægrotus debet, ita ut super stomachum manum contineat: brachio subiicietur molle quiddam pellem super se habens, ut superfusionum influxus excipiat. Superfundetur autem quotidie oleo calido, præsertim quum vrget inflammatio, quādo etiam cibus tenuis exhiberi debet: postea mediocris, ad calli generationem quies indicitur vsq; dum fracta occalluerint. occalescunt autem brachium & tibia, diebus circiter quadraginta, post quos ubi solueris fascias, & lauacro vsus fueris, emplastris ad fracturas factis persanare conuenit. hæc tractandi ratio omnibus aliis propemodum confractis artubus conuenit.

*De cubito, & radio.*

CAP. C.

**C**ubitus radiusq;, interim uterq; iuxta eundē locum frangitur, interim alter duntaxat, vel in medio, vel in parte iuxta flexuram, aut brachiale. Omnium itaq; deterrimum est quum ambo eadem parte franguntur, deinde etiam cubitus solus. At radius fractus, aliis facilius curatur. siquidem maior cubito non est, sed illum ipsum subiectum habet, ut veluti infideat. Porro si ipsorum alter duntaxat fractus fuerit, in illo maxime intentionem validiorem molie-

RMF:



mur: si vterq; , similiter intendemus , manu anguli modo figurata, vt pollex omnium digitorum altissimus, exiguus digitus humillimus habeatur. sic enim cubitum radio subiici continget. At si valentiore opus sit intentione, ambobus potissimum confractis, non solum manibus, sed etiam funibus intendere aggrediemur, vt in capite de brachio comprehensum est. Ceterum omnis deligatura, & reliqua præsidia, vnâ cum ferularum iniectione, hic adhibenda sunt, dum callus eos firmarit. Firmatur autem cubitus diebus plurimum triginta. Ac repositio ipsius similis erit ei, quam brachium fractum vendicat, præter ea quæ ipsi subiiciuntur.

*De summa manu, & ipsius digitis.*

C A P. C I.

**B**Rachialis & aduersæ eius partis, & in digitis articulo-  
rum ossa, quum laxa fistulosaq; natura sint, contunduntur quidem plerunque, raro autem franguntur. Aegro igitur in alto sedili collocato, medicus in altero quodam æquali aduersus sedebit, priusquam manum imponat: ac tensis per ministrum iis quæ fracta sunt, duobus digitis ipsa conformabit, pollice & indice digito prius compressa. deligatura vtetur, quo tempore vrget inflammatio. Nam propter laxitatem faciliè in ipsis callus amplior concreuit. At si acies digitorum, aut digitus simpliciter confractus est, siquidem magnus & pollex appellatus, fuerit, post commodam deligationem ab inferiore parte, ipsum utiq; cum manu ligabis, ne dimoueat: si ex aliis quispiam, vel index, vel paruus digitus, proximo colligabitur: sin aliquis ex mediis, iis qui vtrinque habentur, vel etiam omnes deinceps ligari vnâ debent, melius enim conquiescunt. quemadmodum si confracti ferulis quoq; colligentur.

*De femore.*

C A P. C I I.

**E**Adem de femore dicenda sunt, quæ de brachio prodidimus. peculiariter autem magis femur fractum, in anteriorem partem & exteriorem promouetur. etenim in his naturaliter dilatatum est. instauratur autem manibus, funiculis, & antennis æquivalentibus, vnâ, supra fracturam posita: altera, subter. Quod si in parte fractura euenerit, idq; iuxta femoris caput, dimidio fasciæ lana circumdato, ne corpora incidat, iuxta inguina disponemus, & initia ad caput reducta, famulo vt partem contineat, trademus: infra autem fracturam fune circumposito initia ad intentionem alteri ministro.



nistro exhibebimus. Quòd si ad genu fractura habeatur, funem sanè supra fracturam iniicimus, initia eius ad extensionem dispensamus, genu etiam ipsum implicito quodam fune continemus. hanc autem partem restituimus ægro decumbente, & crurè exporrecto: quæ pungunt ossa ut subinde dictum est, eleuata, superius tollemus. reliquam curationem in capite de brachio exposuimus. cæterum callo firmatur femur quinquaginta circà diebus. At quomodo reponi debeat, post totius cruris disciplinam, comprehensum est.

*De patella.*

CAP. CIII.

**P**atella os laxum est ac molle, validè corporibus superiore & ima parte comprehensum. frequenter sanè contunditur, rarò autem frangi solet. sustinet autem rupturam per crassitudinem, & in tenuia fragmenta finditur, cum vulnere, vel sine vulnere. Nota vero conspicua (motus enim continuitatis intercidit) & cauitas & sonitus. Instauratur autem pars cruris extensa, nam quæ bifariam fissa est digitis eousq; committitur, donec fracturæ labra suprà sese contingant, & inuicem iungantur: quæ vero in tenuia fragmenta fissa est, manu conformatur. etenim callo non generato, eò quòd pars utraq; per musculos cognatos & neruos, à femore & tibia in contrarium non retrahatur, tamen multitudo distentionis contrahet, & functionis difficultatem affectis inducet, neq; enim laborantibus ipsi diutius genu sustinet, & obambulando illi impediuntur, præsertim ascensuri: siquidem in æquabili per planiciem motu actionis difficultas occultatur: in ascensu autem, eo quòd genu, in crucis eleuatione & positu non inflectatur, deprehenditur. Iam vero osiculum si quod pungit, eleuatum prius eximito, ac curationem consentaneam adhibeto.

*De tibia.*

CAP. CIIII.

**T**ibia cubito respondens, eandem curationem recipit. etenim illa duobus ofsibus fulta, altero crassiore & cognomini, altero tenui, quod ex similitudine perone Græcis, quasi fibula, latinis sura dictum easdem fracturarum differentias recipit in omnè enim partē distorquetur, quū ambo ossa cōfracta fuerint: in treis autem, quū alterū, intra & extrà: tibia quidē, retro: sura, antè. quapropter etiā ipsa similiter restituitur manibus, aut funiculis superioribus, quæ fracturæ funes sunt, interim ipsi tibiæ circumdatis, interim

F



femori. Nam quum genu sit validius, articulum integrum per tentionem seruabimus. Similiter & inferiore fracturæ funiculo, vt in cubito dictum est: reliquavt in capite de brachio tradidimus.

*De pede summo.*

CAP. CV.

**T**alus nequaquam frangi solet, eo quòd vndequa; tibia, sura, & osse quod ob tessaræ similitudinē vocatur cyboïdes custodiatur muniaturq;. At os quod à cymbæ figura dicitur scaphoïdes, & supernæ pedis regionis, item pedis digitorum ossa, ipsumq; cyboïdes, similiter iis quæ in brachiali & opposita eius parte, manûsq; digitis sunt, franguntur. quare etiam quæ de illis diximus, ne eadem reperantur, illinc huc transferre consilium est.

*Quomodo crus reponi debeat.*

CAP. CVI.

**F**emore fracto, aut tibia, non minori cura repositionem ipsius, quàm reliquam curationem obibis. Nam partiū cōfractarum æqualitas, hac potissimum probè administrata, cōseruatur. Nonnulli igitur canali, quam solenam Græci dicunt, nunc lignea, nūc fictili, membrum fractum, aut etiā crus ipsum reposuerunt: alij verò sola ea quæ cum vulnere fracta sunt, eo quòd hæc ferulis nequeant constringi. in totum verò solenarum vsum posteriores damnarunt, multis sanè de causis, sed præcipuè, quòd ipsarum duritia partibus negotium facesseret. Neque tamen alienum est, artus cum vulnere fractos ferulis excipere, vt ostendemus. Aeger itaque resupinabitur, ac indumentum aliquod crassum crurī æquale, in longitudinem vtrobique contractum & inuolutum, vt canali per mediam cōcauitatem oblongam proportionē respondeat, subiicietur: pellis super ipsam molliuscula explicabitur, quæ superfusiones excipiat, deinde in longū crus cōcauitati huic canalem referenti, insinuabitur. à lateribus alia vestimenta lanæ' ve apponentur, ne membrum in latera declinet, pedis autem ima pars asserculum rectum panniculo circumdatum, propter mollitiem, assumet. ac maioris securitatis gratia, media fasciarum duarum triūmve, vestimento canalīs modo preparato subiicientes fractum membrum ipsi leuiter deligabimus. At si æger nō tolerans conetur pedem totum contrahere, conuenit id facere quod in superiore pedis parte dictum est, deinde blandè cū asserculo deligare, ne inuiti inter dormiendum, vt verisimile est, pedem



pedem contrahant. Aliqui verò etiam stragula lecti per medium pertundunt, vt ipsi sint immobiles, & per foramē vrina & sterqus reddatur, vsq; dum callus coalescat.

*De fracturis quæ cum vulnere incidunt.* CAP. CVII.

**F**Ractura cum vulnere facta, siquidem sanguis profundatur, hunc prius sistemus: si inflammatio fuerit, præsidii in eam efficacibus vtremur. Carnibus contusis, partem affectam scarificabimus, metu, ne in gangrænam incidat, sublato: at si illa quoq; accesserit, aut alia quæpiã serpens putredo, conuenienter occurremus. habes autem horum singulorum curationem quarto volumine explicitam. At si nihil horum adfuerit, neque ossa largiter denudata sint, hamulis futurisque vsq; remedio cruentis apto, his medebimur, sic, vt ossicula refracta, vt verisimile est, & pungētia innatantiaq; primum auferamus. Quòd si magnum aliquod os emineat non commissum propter magnitudinem, in inrensione huic prospicies. Siquidem Hippocrates femore & brachio contractis ossa excedentia statim eiicere dehortatur, periculū his futurum prædicens ex inflammatione, quam tensio crearit, vel etiam conuulsione, vt credibile est, musculorū neruorumq;. Tempus verò nonnunquā administrationem commodam inuenit. In quocunque igitur osse quod ex sede sua excidit, manum ad mouere volumus, nequaquam in inflammatione aggrediemur, sed primo statim die, antequam inflammatione occupetur: aut nono, inflammatione iam finita. Adaptamus verò ossa veste quam Græci mochliscon vocant, est autem ea instrumentum ferreum septem octo ve digitos longum mediocriter crassum, ne inter commouendum inflectatur, acutum in summo latumque, & leuiter inflexum, cuius acutum extremum superposito ossis tuberculo subiicientes, ex altero in oppositum tendentes simul, & mediocri intensione membri facta, inter se sineis fracturæ committemus. quod si facere nequeamus, scalpris excisoriis obuertas acies habentibus quod eminet auferemus, aut ferra subsecabimus, quemadmodum in fistulis docuimus: ossiūque asperitudine adæquata, & membro directo, medicamentis quæ in linteolis illinantur, curabimus. Maxime autem animum adhibere oportet in membris conugalibus, aut à iugis appellatis, altero autē in ipsis osse particulatim ferra abscisso, vt membrum in contractū maneat, etiā

F 2



intensione accurata vtemur. deligatura verò hoc modo adhibenda est. Circulares itaq; fasciæ, partibus vulneris vtrobiq; iniici debent: obliquæ verò, per vlceris longitudinem, vt in literæ Græcæ X similitudinem conclusio omnium fiat. Si sordidum adhuc vlcus est, purgantia adhibebimus: si purum, quæ carnem inducunt, linteolis illita, aliâmq; comprobata vfu materiâ. Hippocrates pissera emplastro in linteolis vtitur, id autem esse dicunt tetrapharmacum basilicum. Vbi caro increuerit, ferulæ iniicientur. aliqui verò per initia ipsas accommodant, vlceris locū vitantes, & pro vfu urgente ipsas cōstringentes, vel rursus remittentes. In quibus autem squama ab osse recedet, notabimus quidem hoc, inde quòd copiosus humor & tenuis excernatur, caro autem vlceribus vacua inanísq; facta attollatur: deligatura quidem laxiore ad curationem vtemur, hamulo autem, aut eiusmodi quopiam squamam euellentes, iterum validiore deligatura vtemur, porrò per totum vlceris tempus medicamentum aliquod ex iis quæ inflammationē arcent linamento illitum, vulnere incumbet, ac simplices fasciæ iniicientur, quæ singulis curationibus solui debent, quū aliæ suprâ dictæ maneant, vt in capite de brachio expositum est.

*Si prater modum fracturis callus obducatur.*

C A P. C V I I I.

**I**Mmodici fracturarum calli indecoram omnino speciem efficiunt, nonnunquā etiā functiones impediunt, si prope articulum coaluerint. Si igitur recens adhuc callus coierit, remediis admodum astringentibus vtemur deligatura ipsa accommodantes. Nonnunquam vero & plumbea imposita lamina, id quod requiritur, effecimus. At si lapidosus solidusque fuerit, incidentes ipsum rademus, id quod eminet, scalpris auferentes: si res exigat, etiam terebris vsi.

*Si distortum membrum callus firmarit.*

C A P. C I X.

**Q**Vibus membrum distortum callus firmauerit, difficultate functionum obeundarum haud exigua subsequente, præsertim si in pedibus fuerit, repositionis quidem modus non recipiendus est, vt qui extrema inferat discrimina. verum si callus nondum radices egerit, laxantibus superfusionibus, & cataplasmatibus ex ficis pinguibus & columbarum stercore, aliisque medicamentis quæ à callo soluen



uendo porolytica dicuntur, utimur. Insuper per manus frictione, & confractione hunc dissoluemus. Quod si lapidus euaserit, scalpello superficie diuisa, excisoriis scalpris consortium ab ossē liberabimus, deinde fracturæ medebimur, ut superius à me dictum est.

*Si fracturæ callo non firmentur.*

CAP. CX.

**F**Racturæ nonnullæ sine callo permanent, suprâ definitū naturæ tempus, aut ob continuas resolutiones, aut immodicas superfusiones, aut motum intempestiuum, aut fasciarum copiam, aut quia totum corpus alimentum nō percipit, in quibus etiā tenuius fieri membrū contingit. Itaq; cum alias occasiones, tum maxime corporis incediam tollere conandum est, partim per calidiora alimenta materiam particulæ distribuendo, partim cibum subministrando sufficientem, item lauacra, & reliquas animi voluptates. Porro notæ eos qui callo iam firmanantur comitantes, hæ inter alias sunt præcipuæ, si fasciolarum cruorem referant, etiā non oborto vulnere, quod forsan accidit, calli substantia quādo coalescit fistulis ossium insperfas sanguinis guttas extundente.

*De ossibus luxatis.*

CAP. CXI.

**Q**Uum luxationes fracturis proximæ sint, de iis verba facere aggrediemur. Luxatio igitur est, ut summum dicam, quum articulus à proprio sinu, ad insolitum excidit, in qua motus arbitrarius impeditur. differētiās ipsius alias dicere non habemus, nisi eam duntaxat quæ ex maioris minorisque ratione sumitur. quum enim articulus in totum exciderit, communi generis vocabulo affectus Græcis exarthrema, latinis luxatio dicitur: quum autem aliquatenus duntaxat emotus est, aut vsque ad superficiem ē sinu elapsus, pararthrema.

*De maxilla.*

CAP. CXII.

**R**Ufus à superioribus incipientes de maxilla dicamus. Nam quum malæ sint immobiles, luxatione non periclitantur. maxilla autem toto loco non mouetur, quod capita ipsius malis firmiter ac tuto insinuata sint: modicā verò peruersionem quam pararthrema vocauimus, subinde experitur, quod ob musculos qui ipsam continent ex cōtinuo mandendi loquendiq; exercitio in mollitiem elanguescentis, qualibet de causa facile laxetur, quod verbū apud Hip-



pocratem οχᾶται dicitur, in quibus sine aliqua difficultate articulus sponte in proprium locum reuertitur. verum de maxilla in totum luxata, satis est illius verba exponere, quæ compendiosa, integra, & perspicua existunt. Scribit itaque hunc in modum. Excidit quidem maxilla rarò, laxatur autem subinde oris hiatu, quomodo etiam aliæ plures musculorum neruorumq; peruersiones, id efficiunt. Clarum itaq; hinc potissimum est, quandoq; exciderit. Nam maxilla in anteriora propellitur, & ad contraria eius vnde prolapsa est, peruenit, os isq; tuberculū iuxta malas tumidius apparet, difficulter ægri maxillā committunt. Qualis autē repositio ipsis congruat, manifestò liquet. alium enim continere caput oportet, alium comprehendentem ab interiore parte & exteriori digitis iuxta mentum hiantem hominem quàm mediocriter potest, primum quidem maxillam commouere aliquandiu, & huc, illuc manu diducere, ipsiq; homini iubere, vt laxam maxillam habeat, simulq; remittat, & cōcedat, vt repentē potissimum laxetur, tribus pariter figuris, mente adhibita. Ratio siquidē est illam ex peruersione in naturalem statum reducere. Oportet autem maxillam in posteriora propellere, item cōsequenter his committere, neq; hīare. Insertio igitur hæc etiam in aliis figuris fieri non poterit. medicina autem modica sufficiet, splenium appositū ceratū fascia laxiore deligare. Sed tutius est, resupinato homine firmare caput ipsius puluinis subiectis quàm plenissimis, vt quàm minime cedat. Cæterum vlnuerati caput aliquis continēbit. Sin autem vtraque eadem maxilla eluxata fuerit, curatio quidem adhibebitur: verum committere minushios possunt, vt quibus prominentiores maxillæ sint. rectitudinem autem indeflexam maximè cognosces. dentium & superiorum & inferiorum terminis, secundum horum directam aciem confert illas quā citissimè inserere. quomodo autē inserentur, expositū est. Quod si locis suis non insinuētur, periculū de anima subsequetur ex febribus continentibus, & torpido Caro. Nam muscoli hi dum alterantur, & præter naturam intenduntur, Carum inducunt. venter solet his biliosa deicere, vel syncera pauca, & si etiā vomat indiscreta eiiciunt. hi igitur decimo die potissimū moriuntur. ac hoc modo iniectionis nos subinde vti sumus, fomentis prius ex hydrelæo calido per spongiā super luxatam maxil



maxillam adhibitis, quando potissimum agrè potest restitui, hominèque humi collocato, post ipsum nos sedentes, quemadmodum ab Hippocrate traditum est, operamur.

*De clauicula & summo humero.*

CAP. CXIII.

**C**lauicula interiori quidem extremo nō excidit, vt quopectori committatur. vnde ne mouetur quidem in ipso. At si violentia cuiusdam acuti extrinsecus ferientis auellatur, quemadmodum fractura ipsius instaurari debet. Extremum autem, ipsius quod humeri articulamento inseritur, non admodum sanè excidit, à bicipiti musculo summoque humeri tuberculo prohibitum. imò neque violento quodam motu clauicula priuatim agitur, propter solam thoracis factam separationem. Vnde homo solus inter animātia clauiculam obtinet: quam si in palestra, vt verisimile est perueri contingat, conformatione per manus dirigitur, & splenis multiplicibus accommodatis vnà cum deligatura decenti: eadem curatione etiam summus humerus peruersus in propriam sedem reuertitur. Est autem ossiculum cartilagineum quod clauiculam scapulis colligat, in resiccatissimis mortuorum cadaueribus occultatum, quod loco motum, imaginem imperitis exhibet, brachij caput excidisse, etenim in hoc exterior humeri pars acutior apparet: concavum autem, id vnde excidit. verum notis quas deinceps subiungam ipsa discernentur.

*De humero luxato.*

CAP. CXIIII.

**B**rachij caput scapularum sinui insertum, excidit quidem frequenter, verum neq; in superiorem partem, vt quod scapularum processus ancoræ similis impediat: neq; in posteriorem, propter ipsas scapulas: neq; tamen in anteriorem, ob muscoli bicipitis tendinem, ipsumq; humeri fastigium. Sed rarò quidem in interiorem exterioremq; prolabitur, continuè verò, præsertim macilētioribus, ad ima atq; his sanè facillè & excidit & rursus inseritur: multa autē carne præditis contra, rarò quidem elabitur, sed agrè in sedem suam compellitur. Quibusdam itaq; etiam non luxatis, ex ictu frequenter elapsi loco membri suspicio oritur, eo quod valida inflammatio subsequatur. Porro quibus in imam partem luxatus humerus est, hoc modo agnosces: affectus humerus si cum sano conferatur, multum differt, quum exterior eius pars vnde excidit, cōcaua appareat, vt in summo

F 4



humero eluxato diximus, quod acutius quàm naturaliter esse debet, apparet, & brachij caput elapsum in ala manifestò occurrit, ac manus huius cubitus à costis magis recessit, quibus quidem costis si ipsum adigas, cum dolore admo- uetur, neq; ægri manum extenso cubito ad aurem possunt reducere, neque alium motum multiplicem per eam mo- liri. In pueris itaque vel in quibus recens nec ampla facta est eluxatio, etiam nodo mediij digiti flexi eminente medici manus, vel ipsius affecti, sanæ manus, si non puer sit, fre- quenter restituta est, ut inquit Hippocrates. valētius autem hoc modo luxata inseruntur. Homo lotus & superfusioni- bus laxandi virtute præditis vsus, resupinari humi debet, & pila mediocris vel coriacea, ver alia quæpiam non admo- dum mollis alæ accommodabitur, ac sedens medicus aduer- sus ægrum, iuxta latus affectum, si quidem dexter humerus luxatus sit, dextri pedis calcem superponet pilæ alæ suppo- sitæ, si sinister, sinistri. ac affectam manum prehensam ad pe- des trahet, simulq; calcaneo alam in diuersum propellet, ita ut aliquis post caput ad alterum humerum resistat, ne cor- pus circum diuellatur. Est & alia ratio immittendi, quæ hu- mero subnixo perficitur, quod Græci *καταμίσσην* dicunt. Ado- lescens, aut longior ægrotante, aut altius consistens iuxta affectum latus, ægri indidem collocati alæ suum ipsius hu- merum subiiciet, & manum eleuatam ad ventrē suum attra- het, ut reliquū ægri corpus post eū qui humerum suum alæ subiecit sublime pendeat. At si æger leuior fuerit, alius quis- piam puer leuis ex ipso suspendetur. Nani manu ac reliquo corpore in contraria detractis ad ima, subiectus alæ hume- rus facilè elapsum articulum reponit. atq; hoc etiam ligno quod Græci hyperon dicūt, efficiamus. Est autem id lignum oblongum, rectū, quod in pauimento super aliud quoddam solidum ponitur. huius igitur summum extremum rotun- dum, quod non admodum crassum neq; tamen tenue est, alæ ægri aut stantis, aut sedentis, subiicietur, iuxta totam ipsius longitudinem. Ac manu per lignum istud porrecta & detra- cta, reliquo autem corpore contrā inferius vergente, vel sua spōte, vel alio quodam trahente, restitutio fiet. atq; hoc in scalæ gradu fieri debet, quemadmodum in confracto bra- chio per tensionem fieri dicebamus. hīc autem rotundum quoddam corpus super gradum deligatur, quod ægrotantis  
alæ



alæ possit adaptari & brachij caput propellere. Porro si ob  
vetustatem affectus, aut corporis duritiem, repositio nobis  
faceat negotium, utemur etiam ratione quæ per spatham  
ligneam, amben appellatam fit. Est autem ambe lignum  
quod longitudinem duorum cubitorum habet, latitudi-  
nem quatuor digitorum, crassitudinem instar digiti, alte-  
rum extremum rotundum, quod etiam promptè in alæ si-  
num ingreditur, perinde ut ligni quod hyperon vocatur, ex-  
tremum. hoc itaq; extremum panniculo circumdatum, quò  
lenius existat, capitulo brachij iuxta alam accommodabi-  
mus, totam vero manum ad lignum intensam cum eo deli-  
gabimus, iuxta brachium, cubitum, & eius extremum. dein-  
de ligno obliquo inter duas columnulas rectas adaptato,  
vel rursus supra scalæ gradum manu traiecta cum ligno, ut  
ala per transversum gradui accommodetur, manum infra  
trahentes, sinemus in alteram partem reliquū corpus in sub-  
limi pendere. tunc enim articulus ingreditur. Vbi fuerit  
repositus, mediocris ex lana pila si quidem inflammationem  
pars non sentiat, sicca: si sentiat, oleo madens alæ iniecta, de-  
ligabitur. per hanc autē alam & humerum & alteram alam  
vinculi deligationes literæ X figuram potissimum appare-  
bunt. ita ut in hūc modum facta deligatura super affectum  
humerum accommodetur, brachium autem costis collige-  
tur, ipseque cubitus & summa manus, ex ceruice deuincian-  
tur, ne rursus de integro articulus excidat. Post septimum  
diem vel tardius ubi fascias dissolueris, mediocri uti frictio-  
ne præstat, eo quòd corpore solidiore facto, articulus ita fir-  
metur, ut non facile prolabatur. Quod si autem crebro pro-  
labatur, aut humiditatis vitio, aut ob aliam quampiam iam  
diu factam elabendi viam, ad vñtionem veniendum est, si-  
cut supra comprehendimus. Quum autem vel infantibus  
in utero aut æditis quidem in lucem, sed adhuc incrementi-  
bus, particula fuerit luxata, necdum reposita, in humero  
quidem carnes nihil à naturali figura deficiunt, neq; enim  
manus quodcūq; opus perficere impeditur, os autem bra-  
chij brevius permanet, non augescens, ac tales nominantur  
galiancones. In femore etiam os incrementum non sentit, &  
rotum crus contabescit, quum enim pondus corporis ferre  
nequeat, non exercetur, ac in aliis membris luxatis manēti-  
bus quæ subiiciuntur partes, omniū iniuriis expositæ sunt.



**Q**uanto cubiti articulus humero magis varius creatus est, tanto plus negotij prolapsus exhibet, & tardius quidem excidit, sed difficilior reponitur, propter tuberculorum sinuumq; frequentiam. Nonnunquam igitur solum aliquatenus detorquetur, quē casum parathrema dixi, sæpe vero etiam ex toto in omnem partem prolabitur, præcipue in priorem & posteriorem, quod facile dignoscitur, eo quod excidit oculis & tactui obiecto, in quodcunq; prolapsus sit, & sinu vnde excidit apparente. Hæc verò potissimum sani cubiti inspectio coarguit. Cōuenit autē protinus membrū reponere priusquam inflammatione occupetur: si quidem eam expertum, difficulter curatur. Quædam etiam nullam prorsus curationem recipiunt, maximè si in posteriora prolapsa sint. Hæc enim luxatio omnium quæ in cubito fiunt maximè dolorifica est & periculosa. Quod si modicè articulus inuersus sit, moderata etiam intensiōe restituitur. sic vt ministri manū exporrectam iuxta brachium cubitumq; contineant, & in aduersa retrahant, medicus autem suæ manus palma quod excessit in suam sedem compellat. Hippocrates in priora luxationē subito manus inflexu instaurat: vt palma ipsius humerum iuxta rectum pulset: in posteriora verò, subita rursus & diutius facta extensione, quoniam luxatio in priorem partem, violenta potissimum extensione efficitur: quæ in posteriora, flexu similiter vehementi. Quod si luxatio perseueret, etiam validam magis intensiōem vsurpabimus, eiusmodi vero est potissimum quā Hippocrates in brachio confraçto exposuit, vbi ligonis manubrium adhibebat. Porro recetiorum aliqui hunc in modum adaptant. ministris duobus manum vt dictum est, interdentibus, ita vt alter sursum ad alam contineat, alter deorsum iuxta brachiale, medicus aduersus ægrotanti consistēs, duabus palmis iuxta articulum, brachium circundat, ac vbi iusserit vestimentum contractum in oblongum vel latam fasciam manibus ipsius simul & ægrotantis brachio circumdare, & in exteriora imāque propter summam manum retrahere, ipse deinceps cum tensiōe constrictas ipsas trahit, donec cubiti articulum excedant. Cæterū manus prius oleo illini debet, vt lubrica fiat & facile medici palmis deducatur. Sic enim prolapsa, si pertrahentiū manū vi prematur,



tur, in propriam sedem reuertuntur. Postquam sunt reposita, in anguli modū figurata manu, ex spleniis & conuenienti deligatura curationem petemus.

*De brachiali & digitis luxatis.*

CAP. CXVI.

**B**Rachialis digitorumq; luxatio nullum facessit negotium per se, nisi cum vlcere facta fuerit. de hac igitur in capite de luxationibus quæ cum vlcere fiunt tractabitur. At sine vlcere luxatis, mediocri intensione, & remediis quæ inflammationem pellunt, medebimur.

*De vertebri spinæ.*

CAP. CXVII.

**V**ertebrae spinæ si ex toto prolabantur exciduntq; præsentaneam mortem inferunt. Medulla siquidem ipsius spinæ vel quamlibet compressionem non sustinet, quum & solus ex ipsa neruorum processus si contundatur, hominem in periculum perducere sufficit. Peruersionibus autem subinde affligitur, nunc in priorem partem distorta, ac vitium lordosin Græci appellant: nunc in posteriorem, & cyphosin à loco gibbato vocant: interim vero in latera, quod scoliosin nuncupant. Quum igitur multæ simul vertebrae paululum adeo peruersæ fuerint, plurium simul peruersio ex circulari flexus rotunditate fieri apparet, ac putant nonnulli decepti, ab vna vertebra ampliter peruersa id fieri. Nam magna distortio non rotundum, sed angularem spinæ flexum molitur, quando etiam magis periculum subsequitur. Si igitur introrsum spina est peruersa, restitutionis spes nulla est, eo quod per ventrem, antè oppositio fieri nequeat. qui enim in scala sic affectos intendunt, aut cucurbitulas admovent, aut sternutamenta aut tussim, aut flatum excitant, quid tandem promouere putati sint, Hippocrates abundè ostendit. Quoniã vero subinde cuiusdam ossiculi spinæ fractio facta, cauum locum repræsentat, quemadmodum in capite de fracturis comprehensum est, aliqui vitium lordosin esse crediderunt, deinde hoc celerius persanato (promptè enim callo firmatur) lordosin curatu facilem existere pronuntiarunt, & si nullam curationem, aut certè difficilem recipiat. his etenim vrina supprimitur, alius non respondet, corpus inhorrescit, postea etiam sine voluntate excrementa prorumpunt. Hæc autem eueniunt, neruis & musculis consortij lege lacessitis, ac celeriter ægri moriuntur: præsertim si superiores & ceruicis vertebrae affectum fuerint expertæ. Cui vero iana



rò iam inde à paruulo potissimum vertebræ gibbatæ præ-  
 tuberant, vitium longum esse neq; celeriter mortē sed mor-  
 bum accerfire, & insanabile Hippocrates prodidit. At qui-  
 bus recens hic gibber ex casu prouenerit, machinæ quidem  
 per scalam, & rectam ægri suspensionem ac vteri inflatio-  
 nem adhibitæ, ridiculæ sunt. sola autem Hippocratis ada-  
 ptatio sufficiet. Conuenit enim, inquit, lignum magnū quod  
 tantam longitudinem ac latitudinem habeat, vt hominem  
 excipiat, aut scamnum huic æquale, prope parietem depone-  
 re, ac iuxta hunc ita extendere, vt in longitudinem pede non  
 amplius absit, & vestimenta quædam super ipsum explica-  
 re, ne hominis corpus infringatur, (erit autem hic lotus an-  
 tequàm super lignum scamnumve insideat,) deinde loro  
 pectus ipsius bis circumdatum, per alas iuxta dorsum vinci-  
 re, initia lori ligno oblongo pistillo simili deligare, atque  
 hoc super pauimentum iuxta ligni aut scamni subiecti ex-  
 tremum constituere, & ministro post ægri caput stanti ex  
 superiore parte continendum tradere, vt imo quidem extre-  
 mo contra fixo, altiore supra caput tracto, opportuna fiat  
 intensio: altero autem loro pedes simul & superiores talo-  
 rum partes deligantes, & rursus alio, superiora ilium & lum-  
 bos ita vt huius in lumbis fiat connexio, iterum extrema  
 horum ligamentorum coniungemus: alij autem ligno pi-  
 stillo respondentem, similiter prædicto illigantes, statuemus  
 in ligni aut scamni extremo quod iuxta pedes est, lignum  
 pistillum repræsentans, ad prioris similitudinem, deinde fa-  
 mulis iubebimus vt per ligna retractionem in diuersa mo-  
 liantur. Quidam vero asellis dictis hanc efficiunt. sunt au-  
 tem hi axes qui contra rectum lignum vertuntur: vtroq; hu-  
 ius magni ligni aut scamni latere iuxta extrema ad pedes,  
 caputq; sita, lora inuoluantur. Quum autem sic intensio  
 ipsa administratur, manus palma gibberum constringemus:  
 si autem vsus postulat, etiam super ipsum insidebimus, nul-  
 lum veriti periculum. At si ne sic quidem spina instauretur,  
 & æger pressionem ferat, vtile est parietem adiacentem in  
 longum canalis modo exculpere è regione gibberi, vt scul-  
 ptura cubiti longitudinem habeat, neq; altior sit ægrotatis  
 spina, neq; multo humilior, imò sculpturam prius præpara-  
 tam esse oportet. huius enim causa etiam lignum ab initio  
 prope parietem poni maluimus. deinde asseris mediocris al-  
 terum



terum finem ad ima comprimemus, donec sensibilibiter spina dirigatur. verum, vt inquit Hippocrates, sola intensio citra asserem, rursusq; per asserem sola curatio, id quod requiritur potest efficere. Quod si hoc verum est, non alienum etiam in lordosi & scoliosi per initia intensiorem prædictam, sine cōstrictione videlicet, moliri: post adaptationem vero, lamina lignea quæ latitudine treis digitos æquet, longitudine gibbero respondeat & aliquam ex sanis vertebriis comprehendat, loro lineo aut stuppa propter duritiem inuoluta, vertebriis ipsis imponi & conuenienter deligari debet. victus adhibebitur tenuis. At si post hæc quædam gibberi reliquæ remanserint, laxantibus emollientibusq; remediis cum laminæ appressu, per diu vtendum est. aliqui vero plumbeam laminam vsurparunt.

*De coxa luxata.*

## CAP. CXVIII.

**Q**Uum alia corporis ossa interim paulum excedant, interim toto loco excidant, coxæ humeriq; articulus soli luxationi opportunus est, qua tota sede promouetur, atque ex his, magis coxæ articulus. quoniam sinum & rotundum, & profundum possidet, ad hæc, quod elatioribus marginibus munitus sit. At si quandoq; articulus ob vim quandam vehementem sinu suo exciderit, etiam multæ luxationis secundum minoris, maiorisq; rationem differentie, proueniunt, quatuorq; modis, imò locis coxa luxatur, vel enim in interiorem partem, vel exteriorem, vel priorem, vel posteriorem, prolabitur: verum intrò quidem & extrà continuè, & multo frequentius intrò: in anteriora autem & posteriora, rarius. Quibus itaq; in interiorem partem coxa prolapsa est, iis crus affectum, si cum sano conferas, longius spectatur, & genu prominentius, & ad inguina crus inflectere nequeunt, & in regione scroti & ani intermedia tumor manifestus occurrit, tanquam femoris capite illic desidente. Quibus autem in exteriora promota est, iis contrariæ notæ eueniunt. siquidem crus breuius apparet, & inter scrotum & anum in sinum dehiscit, iuxta clunes in tumorem attollitur, & genu interius demergitur, crus inflectere ægri possunt. Si in priorem partem prolapsa est, crus sine dolore genu extendunt, non autem ad interiorem partem inclinare possunt, incedere conantes. Vrina his supprimitur, inguina intumescunt, nates rugosæ excarnesq; apparent, calci inter ambulan



bulandum innituntur. Porro quibus in posteriora excidit, non aut poplitem, aut genu extendunt, neq; inflectere possunt prius quàm inguina flexerint, atque his crus breuius, inguina laxiora apparent, & per nates femoris caput eminet. Quibus sanè iam inde à pueritia, aut certè longiore temporis spatio articulus prolapsus curæ non fuit, etià præsidium nihil promouerit, mēbro iam in orbem coacto. Quibus autem continenter excidit, hi curationem Hippocratis assument, quapropter statim reponi luxata debent. vetustæ siquidem coxæ luxationes, nullo modo confanescunt. Communiter itaq; in quatuor luxationibus instauratio cōgruet, tum quæ conuersione articuli & circumductu fit, tum quæ intensiōe. Si enim affectus recens fuerit, & æger iuuenis, nonnunquam femur continentes circumagentesq; huc illuc, articulum reposuimus. Quòd si in interiorem partem luxatio declinauerit, etiam crure tantum subito & valenter ad inguina quàm intimè flexo, id quod requiritur effecimus: sin autem his non cesserit, intensiōe vtendum, primū per manus adhibita, quæ crus ab inferiore parte trahant ac per femur tibiamq; constringant, ex superiore autem parte, sub alis corpus circudent. Quòd si etiam valentior desideretur intensiō, funibus contextis aut implicitis, vel loris crus deligare, omnino quidem supra talum: vt autem genu nihil patiatur, hoc quoq; superius, oportet: at pectoris regionem vincire necesse non est, verum, vt dictum est, manibus subter alas comprehendatur, loriq; mollis & validi medium iuxta regionem inter scrotum & anum adaptatum in humeros reducemus antè per inguina & clauiculam: posterius, per summas partes, duoq; lori initia ministro trademus, deinde omnes simul trahentes, vt ægrotantis corpus eleuetur, intensiōem molientur. hic quidem intendendi modus communis est quatuor femoris luxationum differentiis, priuatim autem in singulis modus quo ossa vecte in sedem suam compelluntur, Græci mocliam dicunt, euariat. Intensiō enim homine si quidem in interiorem partem articulus exciderit, lori per regionē quæ scrotum & anum interioret, traiectioni medium inter femoris caput ipsamque regionem à scroto ad anum tendentem dispensari conuenit, referri autem lorum per inguina adiacentia & clauiculam expedit. At adolescens quidā duabus vlnis affectum femur, quā crassius



sius est, circumdatum, in exteriora valenter extrahet. Atque  
 hic modus inferendi aliis expeditior est, cui si articulus non  
 cesserit, aliis quoque utendū, variis quidem magis, sed hoc  
 efficacioribus. intendi etenim hominem super lignum gran-  
 dius aut scamnum oportet, in quo etiā spinæ gibbero vitia-  
 tos intendimus. Insculpentur autem per torum ferè oblon-  
 ga quadam ceu fossæ, quæ latitudinē altitudinēque tri-  
 um digitorum, non maiorem habeant, dissidentes inuicem  
 non magis quā digitos quaternos, ut vecte iuxta extremum  
 in ipsis resistente, in quācunque partē conueniat restituatur  
 membrum. Per medium autem lignum aut scamnum, aliud  
 impingatur lignum pedalis longitudinis, ligonis manubrij  
 modo crassum, ut sub hoc intenso homine, lignum medium  
 inter regionem à scroto ad anum porrectam & femoris ca-  
 put consistat. Simul enim corpus iis qui à pedibus trahunt  
 porrigi prohibebit, eoque ne vsu quidem sæpe venit in con-  
 traria ex superiore parte intensio: simul autem intenso quo-  
 que homine ipsum lignum femoris caput foras propellet.  
 Itaque intensio ad superius dictum modū administrabitur, præ-  
 fertim pedis. Quod si ne sic quidem in sedem suam redierit,  
 impactum lignum rectū auferri debet, ex latere autem hu-  
 ius sitis utrinque singula ligna infigentur, tanquam postes,  
 non minus quā pedalis longitudinis. his aliud lignū ada-  
 prabitur gradus scalæ modo, ut trium lignorum figura H  
 literam repræsentet, nam paulò inferius summis, medium li-  
 gnū accommodabitur. Deinde in sanum latus iacēte homine  
 unum sanum quidē crus inter hos postes subter gradum quodam-  
 modo ducemus, affectum autem crus ex superiore parte su-  
 per hunc ponemus, ut ipsi femoris capiti accommodetur,  
 substrato prius ei multiplici vestimento, ne femur cōtunda-  
 tur. aliud autem lignum mediocriter latum tantam habens  
 longitudinē ut à femoris capite vsque ad talum subiectum  
 pertineat, intrinsecus cruri alligabitur. Vbi iam facta est  
 hæc intensio, aut per pistillum, ut in gibbero prius diximus,  
 detrachere ad ima crus cum alligato ligno oportet, ut vio-  
 lentia hac femoris caput in propriam sedem reuertatur. Cæ-  
 terum est & alius reponendi modus sine intensione per li-  
 gnū, ab Hippocrate commendatus. Manus enim, inquit,  
 agrotātis molliter costis alligare oportet, & pedes utroq;  
 valido loro molli per talos & super genu deuincire, ut qua-

tuor



tuor digitorum spatio inuicem distent: intenso autem affecto crure duobus digitis magis quàm alterum, hominem suspendere, vt caput cubitos duos à terra ab sit. Adolescens vero aliquis peritus vlnis suis femur affectum comprehendens quàm crassissimum est, vbi & caput femoris, subito pendere ex homine cogetur. facile nanque articulus ingreditur. Hic reponendi modus aliis quidem simplicior est, vt qui non multo apparatu peragatur, sed veluti miserabilē ipsum, pleriq; medici auersantur. Porro si in exteriora membrum fuerit luxatum, homo superius intendi debet, lorum autem iuxta regionem inter scrotum & anum per oppositas partes ferri conuenit, inguina dico & clauiculam, medicum autem ab exteriori parte introrsum agitare iuxta conuenientem foueam ex iis quæ insculptæ sunt, ministro quodam vectem ad sanum clunem ne cedat, obiciēte. Sin autem in priora promotus est articulus, homine intenso vir quidam validus dextræ manus palmam affectis inguinibus imponens, altera comprimet, simul ad ima, genu versus constringet. At si in posteriora prolapsus est articulamentum, non opus est quidem hominem in sublime vsque intendi, sed in solido iacere, quemadmodum etiam si in exteriora articulus exciderit. Sicuti autem in gibbero dicebatur, super lignum aut scamnum homo pronus intenderetur, vinculis non per ilia, sed in crure, vt nuper dictum est, porrectis. Iam verò vti conuenit constrictione per asserem adhibita, iuxta clunium regionem, vbi & articulus excidit. atq; hæc sanè de coxendice ex causa foris adueniente luxata, dicta sint. quoniā vero propter copiam humiditatis, veluti humerus, sic etiam coxa prolabitur, vitione vtendum est, quemadmodum in capite ipsius comprehendimus.

*De Genu articulo.*

CAP. CXIX.

**G**enu in treis parteis promouetur, interiorem nimirum, exteriorem, & iuxta poplitē. in priorem enim prolabi opposita patella prohibetur. Eiusdē igitur intentionis vten-tes modis, interim per manus solas, interim etiam funibus, decenter deligabimus, reliquamq; adferemus curationem, hoc spectantes vt particula diutius immobilis conseruetur.

*De tali articulo, vbi etiam de pedis digitis agitur.* CAP. CXX.

**T**ali articulus si paulum excessit, modica etiam intentione curatur: si toto loco mutatus est, vehementiore indi



indiget auxilio. Tentandum itaque & hic per manus validiore intensione uti. Quod si non reponitur, homine humi resupinato extensoque longum aliquem & validum palum inter duo femora iuxta regionem scroto & ano interiectam humi per ima rectum defigemus, ut corpus aduersus eum renitens, ad pedis intentionem non cedat, imò prius defigetur, quàm homo decumbat. Quod si magnum illud lignum adest, quod pedale aliud lignum per medium habere defixum diximus, super hoc intensiorem moliemur, ministro vno femur continente retrahenteque, alter manibus aut loro pedem trahet, medicus luxatum manibus dirigit, alterumque pedem alius ad ima continebit. A repositione deligari tutò pes debet fasciis ad superiorem pedis partem, aliis ad talum distributis, cura adhibita ne posterior tendo iuxta calcem constringatur. In hoc casu usque ad dies quadraginta in quiete homini perseverandum est. nam incedere ante absolutam curationem tentantes, particulam reddunt inutilem. At si quis ex saltu, ut fieri solet, calcis os peruerterit, vel etiam aliam quampiam inflammationis affectionem excitarit, blanda quadam intensiōe, conformatione, fomentis inflammationi contrariis, & fasciis firmis id dirigendum est, homine similiter usque dum consanuerit, in lectulo perseverante. Caterum digitorum peruersio, ut in manibus dicebamus, non difficulter moderata tensione emendatur. In omnibus autem luxatis peruersisque, postquam instaurata sunt & coquerint, inflammationem in articulis, ut verisimile est, remanentem, aut tumorem, quæ etiam diu membra à functionibus impediunt, mollientibus remediis persanabimus, quorum materiem nullus qui in artis operibus versatur, ignorat.

*De luxatis cum ulcere.*

CAP. CXXI.

**I**N luxatis cum ulcere multa requiritur prudentia. Dum enim hæc inferuntur, extrema pericula, nonnunquam & mortem inferunt. inflammationis enim extensione iis qui adiacent nervis & musculis, dolores validi, conuulsiones, & febres acutæ oboriuntur, præsertim in cubiti gibbero, genu, & superpositis partibus. Nam quò principalibus sunt vicina, hoc maius periculum concitant. Hippocrates itaque horum repositionem, valentiorémque deligaturam omnino auersatur. solis autem quæ inflammationem abigunt leniuntque præsidis, per initia uti præcipit. Sic enim ipsis super-

G



esse forsan licebit. Quod autem ipse in solis digitis confu-  
lit, id nos reliquis etiam articulis facere tentabimus, ac in-  
ter initia statim quum pars adhuc inflammatione caret, pro-  
lapsum articulum mediocri intensione reponemus. quod si  
secundum animi institutum euenerit, persistemus, sola ra-  
tione quæ inflammationem arcet, vtentes: si inflammatio  
quæpiam, aut conuulsio, aut aliquid prædictorum contige-  
rit, rursus eiicere ipsos necessariū est, siquidē citra vim por-  
rigatur. at si hoc quoq; discriminē metuamus, (nō enim por-  
rigentur forsan inflammata) satius est per initia in maiori-  
bus quidem articulis repositione supersedere. vbi verò in-  
flammatio declinauerit, (id autem fit post septimū nonūm-  
ve diem) præfati etiam periculum, quod ex repositione fu-  
turum sit, tum quod si non repositum fuerit, claudi omni-  
no superuiuent, conabimur tutò, administrationem obire,  
vtentes, propter commoditatem, etiam vecte. Porro vlceris  
curationem vt in fracturis cum vlcere dictum est, admini-  
strabimus.

*De luxatione cum fractura facta.*

CAP. CXXII.

**A**T si luxatio sine vlcere cum fractura euenerit, cōmu-  
ni intensione & per manus conformatione vtendū est,  
vt in simplicibus fracturis docuimus: cum vlcere autem rur-  
sus, ex fracturis cum exulceratione & luxationibus priua-  
tim expositis, congruam administrationem petemus.

FINIS LIBRI SEXTI, IOAN-

NE GVINTERIO ANDER-

NACO MEDICO IN-

TERPRETE.

\*\*\*

PAV



# PAULI AEGI- NETAE LIBER VII.

IOANNE GVINTERIO

ANDERNACO IN-

TERPRETE,

\*

*De temperamentis, quæ per gustatus qualita-  
tes deprehenduntur.*

CAPVT I.



**D**E SENSILIVM corporum temperamen-  
to, coniecturâ ex odoratu aliquam sume-  
re, haud est securum. Nā inodora, substan-  
tiis crassa quidem sunt, sed quanto sint ca-  
lore, & frigiditate prædita non ita constat:  
odora verò, & tenuia quodammodo sunt  
& calida, sed quatenus id sint, neutiquam  
ostenditur, eo quòd substantiam habeant inæqualem. Mul-  
to adhuc minus ex coloribus exactè quid licet colligere,  
cum in singulis calida, frigida, humida & sicca reperiuntur.  
Verum in gustatu omnes similiter particulae corporum gu-  
stabiliū, vt hoc vocabuli vsurpem, linguæ obiciuntur,  
sensumque mouent: vt manifestò ex ipso quoque tempera-  
mentorum vires deprehendamus. Quod igitur astringit,  
cogere, obturare, densare, repellere, incrassare, atque ante  
hæc omnia, refrigerare, siccareque est idoneum. Acidum  
incidere, diuidere, extenuare, aperire, & perpurgare citra  
calefactionem potest. Acre, similem acido effectum præstat,  
extenuando purgandoque, sed acidum refrigerando eua-  
riat: acre, calefaciendo: præterea illud repellit, hoc attrahit,  
dissipat, rumpit, crustas inducit. Pari modo etiam amarum,  
meatus expurgat, abstergit, extenuat, incidit succorum  
spissitudinem, sine calore manifesto. Aquosum frigidum,

G 2



incrassat, cogit, cōtrahit, obturat, sensum aufert, stuporēque inducit. Salsum contrahit, stringit, condit, siccatur, citra insignem caliditatem frigiditatemve. Dulce laxat, cōcoquit, emollit, rarefacit: oleosum humectat, emollit & laxat.

*De ordine & intervallo temperamentorum.*

C A P. I I.

**M**Oderatum sanè medicamentum ita ut temperatura ei respōdeat cui admouetur, inde quod nec siccet, nec humectet, nec refrigeret, nec calefaciat, ipsum neque siccum, neque humidum, neque frigidum, neque calidum nominare convenit. Quod autē siccius est, aut humidius, aut calidius, aut frigidius, à præpollente appellatur facultate. Præstat autem in vnoquoque excessu, quatuor, quantum ad usum spectat, ordines statuisse: calidum quidem nominantes in primo ordine quod utique nos calefacit, sed non euidenter, ut illius rationali quadam demonstratione indigeat. Simili ratione, frigidum, & siccum, & humidum quodcumque demonstrationem requirat, nondum actionem validam neque euidentem sortitum. At quæ manifestò iam siccare vel humectare vel calefacere vel refrigerare possunt, ad secundum huiusmodi ordinem referentur. quæ vehementer iam sed non summè id faciunt, tertio annumerantur. quæ verò sic calefaciunt ut crustas inducant, quarti sunt ordinis. similiter quæ refrigerant, ut iam sensu priuent, hæc quoque ad quartum relegantur. Porro siccius medicamentum nullum est inuenire quarti ordinis, si non vratur. Nam si quod summè exiccat, id planè vrit: huius notæ sunt, chalcitis, misy & calx. Tertij verò ordinis siccantium potest aliquod esse etiam non vrens, quemadmodum quæ vehementer astringunt omnia, è quorum numero est omphacium, rhus, & alumen.

*De particularium simplicium medicamentorum facultatibus.*

C A P. I I I.

*Abrotanum.*

**A**Brotanum & calefacit & siccatur in tertio abscessu, discutiendi incidendi que facultate præditum, modicè verò astringit, totique corpori cum oleo infricatum, rigores circuitu remeantes persanat, stomacho minus amicum est. crematum maiores in siccando vires acquirit, quam quod ignem non est expertum. Capillorum defluuia quas alopecias vocant cum tenui quodam oleo inunctum explet.

*Age*



*Agallochum.*

**AGALLOCHVM** lignū est Indicum Thuię ligno simile, odoratum. Mansum animę suauitatem commendat. Item in suffitum adhibetur. Radix eius pota drachmę pondere, flaccidū ex superflua humiditate stomachū resolutūq; cōfir-  
mat. Ad hęc iocinorosis, dysentericis, pleuriticisq; opitulat.

*Agaricum.*

**AGARICVM** radix est, in arboris trunco prognata, corpore fungoso, quę ex aëria terrestriq; substantia coaluerit, vis eius est discutere & crassos humores incidere. Viscerum maximē obstructionibus purgando medetur.

*Ageraton.*

**AGERATON** vim habet discutiendi, & leniter etiam inflammationem quodammodo arceat.

*Agnus, qui vitex dicitur.*

**VITEX** qui gręcę agnus vel lygos appellatur, in tertio ordinatum calefacit tum siccāt, substantia tenuis est, eoq; flatu abolet, castitati conseruandę facere creditur, nō modō commanducatus potūsq;, verū etiam in cubitum substratus. Semen ipsius etiam iocinoris & lienis infarctus liberat epotum. Frixum autem minus est flatulentum, & facile in membra distribuitur.

*Agrestis, gramen.*

**GRAMEN** Parnasi admodum vtile est. Siccāt & modicē refrigerat: tenuiūmq; partium & subacerbum existit. eoq; cruenta vulnera glutinat: Decoctum eius calculos con-  
fringit.

*Anchuse quatuor.*

**QUATVOR** sunt anchusę, non eiusdē omnes facultatis. Nā onoclęę appellatę radix astringēdi vim habet & quidam subamarū, ad lienis renūmq; dolores efficax, cataplas-  
matis autē modo cū polentis applicata erysipelatis succur-  
rit: folia minus radice refrigerant desiccantq; hinc ad alui profluuiū bibuntur. Quę dicitur lycopsis, astringens quodā-  
modo efficacius, similiter erysipelatis conuenit. Onochelos  
verō seu Alcibiadios nūcupata medicatior quodammodo,  
viperarū moribus succurrit forma cataplasmati adhibita,  
alligata, & comesta. Quarta omnibus aliis breuior, sine nō-  
mine propemodū, maiore quā Alcibiadios, amaritudine  
donata: latis alui lumbricis instar acetabuli pota benefacit.



*Adarce.*

ADARCE veluti spuma quædam est aquæ falsæ in cre-  
miis & arundinibus concreta, tantum verò acrimoniæ ha-  
bet & caloris, vt extrinsecus cum aliis imposita ferè vrât:  
intrò eam assumere nulli licet.

*Adiantum.*

ADIANTVM ficit, extenuat, & modicè discutit, calore  
ac frigiditate medium quodammodo est: Alopeciis igitur  
medetur, tumores discutit, calculos potu confringit, è pul-  
mone reiectiones deficcat, alui profluuium sistit.

*Aizoon, semperuium.*

SEMPERVIVVM duplex, refrigerat quidè ex tertio ab-  
scessu, deficcat autem astringitq; mediocriter. Hac ratione  
igitur valet erysipelatis, & ad herpetas inflammationesque  
ex fluxione concitatas conuenit.

*Aetonychon.*

De Aëtonycho in capite de lapidibus pertractabitur.

*Athera.*

ATHERA pulicula est sorbilis è zea molita, aut è fru-  
mento confecta infantibus accommodatur. Item cataplas-  
matis vice illinitur.

*Aegilops.*

AEGILOPS discutiendi facultate prædita est, vnde etiã  
indurescentibus inflammationibus & ægilopi quæ oculo-  
rum fistula est, opitulatur.

*Aegiros, populus nigra.*

POPVLVS nigra in primo ordine calefacit, modicè ficit,  
& tenuis est substantiæ, cuius folia cum aceto cataplasmatibus  
instar applicata, podagricos dolores sopiunt. Quæ verò ex  
ea distillat resina, floribus calidior miscetur acopis: & mala-  
gmatis, fructus cum aceto potus comitiales auxiliatur.

*Aedæon, hoc est, pudendum masculi cerui.*

PVDENDVM cerui masculi ficitur tritumq; ex vino po-  
tum, viperarum moribus subuenit, miscetur autem com-  
positis remediis.

*Aethale, fuligo.*

AETHALE & lygnys in litera L, exponetur.

*Aethiopsis.*

AETHIOPIS similia verbasco habet folia, radicis deco-  
ctum, potu datur ischiadicis, pleuriticis & sanguinè reiciē-  
tibus,



tibus, & arteriæ asperitates cum melle lenit.

*Sima sanguis.*

SANGVIS frigidus nullus est, verum suillus, humidus est, & minus calet, humano maximè temperamento similis. Columbarum vero, palumbi & turturis, temperatus quodammodo, oculorum liuores ex ictu, hyposphagmata dicunt, medicatur, si calidus instilletur. Item crassiori cerebri membranae infusus, in his quorum calua perforata est, inflammationem arcet. Noctuae sanguis cum vino aut aqua potus, spirandi difficultatem adiuuat. Vespertilionum, virginum mamillas tuetur, & pilorum incrementa illitum prohibere dicunt. Similiter sanguis ranarum, chamelaontis, & ricinorum qui in canibus hærentes inueniuntur, sanguis facit. Galenus autem hæc facto rei experimēto falsa esse pronuntiat. Caprarum vero siccitatis nomine aquas cutem subeunt cum melle potus iuuat, renumq; calculos conterit. Gallinarum cohortaliū sanguinis è cerebri membrana profuua coërcet. Agnus comitalibus prodest: hædinus nuper coagulatus circa hemina dimidium cum pari aceto contra cruentas pectoris excreationes bibitur. Vrsorum, sylvestrium caprarum, hyrcorum, & taurorum, abscessus maturare fertur. Terrestris crocodili, oculorum claritatem efficit. Equarum quæ sunt expertæ admissuram, remediis exedentibus, *συντιμὴ* Græci vocant, admiscetur. Antidotum ex sanguinibus quod in lethalia medicamenta efficax est, anaris, hædi, & anseris, sanguinem recipit.

*Aera, lolium.*

LOLIUM calore & siccitate ad tertium ferè ordinem pertingit, iridi facultate simile.

*Acacalis.*

ACACALIS fruticis, in Aegypto nascentis fructus est, cuius dilutum collyriis claritati oculorū efficacibus miscetur.

*Acacia.*

ACACIA tertij quidem desiccantium ordinis est, primi vero refrigerantium, at si elota fuerit, secundi. Est autem acerba & terrestris.

*Acalyphe, vrtica.*

VRTICAE & fructus & folia tenuè habet substantiā, citra quæ rosionē siccāt, tumores discutiūt, abstergūt, ventrē subducunt, mediocriter flatulenta, quare etiā ad venerē incitāt.



*Acanthus.*

**A C A N T H V M** alij à nigro colore foliorū melamphillā appellant, alij pæderoten, vis eius est discutere & siccare.

*Acanthium.*

**A C A N T H I V M** tenui calidaq; natura præditum, convulsis auxiliatur.

*Acantha leuce, spina alba.*

**S P I N A** alba radicem siccantem & modicè astringentem obtinet, eoq; & stomachicis, & sanguinem expuentibus, dentiumque doloribus succurrit: semen tenue calidumque est, qua vi convulsioni quoque medetur.

*Acantha, id est, spina Aegyptia, vel Arabica.*

**S P I N A** Aegyptia, secundū alios Arabica, astringit siccaturque impensè, unde & sanguinè, & alias defluxiones retinet.

*Acinos.*

**A C I N O S** cymo similis, mediocres astringendi vires habet, ideoque aluum & menses pota sistit, applicata vero panos & sacros ignes perfanat.

*Aconitum.*

**A C O N I T V M**, quod quidē pardalianches dicitur, exedentem lethalemq; vim habet, quā ob causam intrò non assumitur: extrinsecus tamē in carnibus quas exedi oporteat, uti licet. quod vero à lupis lycoctinō dicitur, similes priori vires sortitum, priuatim lupos, ut illud pantheras enecat.

*Acoron.*

**A C O R O N** in tertio abscessu calefacit & desiccatur, radice ipsius ad ciendam vrinam, lienisque scirrhum utimur: cæterum membranae oculorum, ob cornus similitudinem ceratoidis dictæ, crassitiem extenuat.

*Acrides, locustæ.*

**L O C V S T A E** vrinae angustis præsertimque mulierum, odoris suffitu profunt. At quæ alis caret, contra scorpionis morsus cum vino salutariter bibitur.

*Acte, hoc est, sambucus. & chamaecte, id est, ebulus.*

**S A M B V C V S**, & ebulus qui chamaecte dicitur, quasi humilis sambucus, uterque desiccandi facultatem obtinet: modicè discutit & conglutinat, potus autem & manducatus, aquam per aluum educit.

*Al, sal.*

**S A L** quilibet vim habet vehementer siccam & astringentem



metem: unde quicquid in corporibus humidum est, id omne  
 repascit, reliquum astrictione leuiter contrahit, qua ratio-  
 ne ad condimenta omnia adhibetur, putredinemque arcet:  
 rematus vero sal magis discutit.

*Althæa.*

**ALTHÆA** seu ebiscus species est maluæ syluestris, vis  
 eius discutiit, laxat, inflammationem abigit, lenit, & phy-  
 sionata concoquit, radix autem & semen reliqua sanè intensa  
 abiget, verum exerit etiam vitilignes abstergitque præci-  
 pue autem semen calculos quoque confringit.

*Alimon.*

**ALIMON** dissimilarium partium est, falsum gustu &  
 leuiter astringens, maxima ipsius pars calore temperata  
 cum humiditate insuperabili est, lactis itaq; & seminis vber  
 moratorem conciliat.

*Alcea.*

**ALCEA** syluestris maluæ & hæc genus est, in vino pota  
 intestinorum torminibus & erosionibus medetur, multo  
 magis ipsius radix.

*Alcyonium.*

**ALCYONII** genera omnia quidem abstergunt discu-  
 tiuntque, acri qualitate prædita, sed milesium (est autem ver-  
 miculum purpureumq;) cæteris præstat: quare combustum,  
 pilorum defluuia, quæ alopecie dicuntur, impetigines, vi-  
 tiliginésque abstergit. Porro, quod in superficie læuorem  
 habet & vehementer acris est, non modò abstergit, verum  
 etiam excoriat. Postremò, quod lanis succidis respondet,  
 omnium est imbecillimum.

*Alme, quæ muria dicitur.*

**MURIA** nulli alteri mixta substantiæ, similes habet sa-  
 li vires, sed imbecilliores aqua temperata: at salforum  
 piscium oliuarumque colymbadum muria valentius abster-  
 git, contra intestinorum tormina & coxendicum dolores  
 clystere iniicitur.

*Aloë.*

**ALOË** calefacit in primo, siccit in tertio ordine, stoma-  
 cho etiam amica est, abstergit dissipatq;, aluum subducit,  
 lota vero minus detergit, sed stomacho gratior est, inflam-  
 mationem prohibet, & vlceribus cicatricem inducit, præ-  
 fertim sedem & naturalia infestantibus,



*Alos Anthos, id est, salis flos.*

**FLO S** salis liquidum est medicamentum sale concremato tenuius, acre, & abundè discutiens.

*Alos achne, id est, salis spuma.*

**SALIS** spuma lanugo salis spumosa est, tenuior quidem illo magisque discutiens, sed minus contrahit.

*Alsine, auricula maris.*

**ALSINE**, quam alij muris auriculam vocant, vim habet helxinæ similem quæ refrigerat humectâtque, quapropter ad feruentes inflammationes conuenit.

*Alypon.*

**ALYPI** semen bilem atram per inferiora purgat pari epithymo mensura sumptum cum sale & aceto, veruntamen intestina leuiter exulcerat.

*Alysson.*

**ALYSSON** quod à cane rabido morfos iuuet, sic appellatum est, cæterum siccatoria, discussoria, absterforiaque vi præditum, renum meatus aperit, ephelidem, quæ aspera discolorque cutis est, exterit.

*Alopex, vulpes.*

**VULPES** viua aut mortua, tota in oleo decocta, discutiendi vim oleo conciliat, adeò vt humores altè fixos in cutem extrahat, hinc articularij in folio eo repleto diutius immorati, incipientem quidem affectum finierunt, inueteratum verò moderatiorem reddidere.

*Amaracus.*

**AMARACVS** tertio in ordine calefacit, secundo desiccât.

*Amarantus.*

**AMARANTVS** extenuat, incidit, menseis cum vino potus educit, sanguinis grumos dissoluit cum mulso omneisque fluxiones desiccât, stomacho inimicus.

*Ambrosia.*

**AMBROSIA** cataplasmatismodo imposita vim habet astringendi repellendique.

*Ami.*

**AMI** ad tertium calefacientium siccantiumque ordinem refertur, tenue, discutiens, & vrinæ mouendæ efficax, semen ipsius longè utilissimum est.

*Amiantum.*

**AMIA NTVM** in Cypro nascitur alumini scisso simile, quod



quod in ignem coniectū accenditur quidem inflammaturq̃;  
sed non comburitur, vtuntur eo nonnulli in desiccantibus  
psilothris. *Ammos, arena.*

**A R E N A** littorum maris affatim desiccatur, seruata Sole  
est quas subter cutem exhaurit, corporibus hydropicorum in  
coopertis: torrefacta autem ad sicca fomenta in salis, &  
nilij vicem adhibetur.

*Ammoniacum thymiana, quod latinis ammoniacum suffimen, &  
ammoniaci gutta dicitur.*

**A M M O N I A C U M** thymiana liquor est tanta molliendi  
virtute præditus, vt scirrhos & tophos discutiat.

*Amurca.*

**A M V R C A** secundi calefacientium siccantiumq̃; ordinis  
est, eiusq̃; intensi, hac etenim ratione vlcera in siccis quidem  
corporibus curat: in aliis autem intendit, irritatq̃;

*Ampeloprasum, agreste porrum.*

**A M P E L O P R A S U M**, seu porrū sylvestre acerrimū est ca-  
lidissimumq̃; in summo ordine, quamobrē etiā exulcerat,  
inciditq̃; viscerum meatus recludit, stomacho inimicum.

*Ampelos agria, vitis sylvestris.*

**V I T I S** sylvestris racemi & germina ipsa abstergendi fa-  
cultate pollent, item nonnihil astringens obtinent.

*Ampelos hemeros, vitis sativa.*

**V I T I S** sativæ facultas respōdet sylvestri, sed imbecillior est.

*Ampelos leuce, vitis alba, quæ & bryonia dicitur.*

**V I T I S** albæ, quam & bryoniam & psilothron appellāt,  
germina sanè ceu stomacho grata eduntur, urinæq̃; ciendæ  
sunt, radix abstergit, tenuis natura & mediocriter calida,  
unde fit vt lienes etiam potu consumat, extrinsecus autem  
cum ficis applicata scabiei & lepræ medetur.

*Ampelos melena, vitis nigra.*

**V I T I S** nigra, quæ & ipsa bryonia nuncupatur, superiori  
confimilis est, nisi quod inefficacior. *Amygdala.*

**A M Y G D A L A** quæ quidem amara sunt extenuant, visco-  
sos crassosq̃; humores altius hærentes euellunt, tum cutis  
vitia abstergunt: arbor eandem vim repræsentat: dulcia ve-  
ro amygdala moderato calore donata sunt.

*Amylon.*

**A M Y L O N** ex puro tritico aqua sub caniculæ æstu macerato  
conficitur, quæ (aquâ dico) quinquies in die mutatur: quum  
autem



autem tenerrimum euaserit, colo traiecta aqua quam superfuderis, furfures secernere siccaréque ad solem oportet protinus antequam ace scat. Cæterum vis eius est refrigerare mediocriter, & ficcare, & actia lenire.

*Amomum.*

AMOMVM acoro virtute, respondet, sed hoc quidem siccat magis: illud autem expeditius concoquit.

*Anagallis.*

ANAGALLIS vtraque vim habet abunde abstergentem subcalidam quoque nonnullam & attractricem, vt etiã aculeos euellat, item succus ipsius naribus instillatus caput purgat.

*Anagyris.*

ANAGYRVS frutex est grauis odoris, acrisque, calefacit & discutit, semen tenuius, & vomitui ciendo est.

*Andrachne, portulaca.*

PORTULACA tertio quidem abscessu refrigerat, secundo autem humectat, qua de re etiam causone laborantes ventriculo imposita, iuuat, & fluxiones repellit, lentore suodentium stuporem ex acidis contractum corrigit: ob astrictionem vero, & intestinorum tormina & sanguinis profluvia coërcet.

*Androsamon.*

ANDROSAEMI duplex genus est, alterum ascyrrhon vel ascyrrhoïdes nominatur specie hyperici, alterum dionysias. semen ipforum purgat, folia autem magis desiccant.

*Androsarces.*

ANDROSARCES amara acrisque herba est vis eius est discutere & desiccare potum tum ipsa, tum semen ipsius vrinam promouet.

*Anemone.*

ANEMONAE omnes vim habent acrem abstersoriamq; item extrahendi, & oris vasorum recludendis, idoneam quæ pituitam illiciunt, lepras tollunt appositu, & lacinias mammas suggerunt.

*Anethum.*

ANETHVM calefacit in secundo ordine intenso siccat paulo remissius, quod in oleo excoctum discutit, dolorem sopit, somnum conciliat, & crudos tumores maturat, vsum tertij calefacientium siccantiumq; ordinis efficitur, ex humidi



humiditate nimia flaccidis vlceribus applicatum confert: viri-  
de autem humidius minuſq; calidum eſt, & concoquit.

*Anthyllis.*

**ANTHYLLIS** duplex quidem eſt, ſed vtraque vlcera  
deſiccant, quæ chamæpityi reſpondet, tenuior eſt, quare  
etiam comitialibus competit, cæterum efficacius eadem  
abſtergit.

*Aniſum.*

**ANISI** ſemen acrius eſt, in tertio abſceſſu calefaciens,  
deſiccantſq; hinc utiq; & vrinam mouet, & flatus diſcutit.

*Antirrhinon, vel anarrhinon.*

**ANTIRRHINON** ſiue anarrhinon perſimilem ingui-  
narię vim obtinet ſed minus efficacem, atq; ex illo hoc quo-  
que cognosces.

*Anonis, vel ononis.*

**ANONIS** ſiue ononis calida facultate eſt, præſertimque  
eius radix, cuius ſuccus cum vino potus vrinam ducit, calcu-  
los conterit, cruſtas rumpit & dentes mitigat.

*Aparine.*

**A PARINE**, quam alij philantropon, alij omphacocar-  
pon appellant, modicè abſtergit & deſiccant, item tenue quip-  
piam in ſe continet.

*Apios, pirus.*

**A PIOS** temperatura inæqualis eſt, terreſtre aliud forti-  
ta, aliud aquoſum ob quod manducata ſtomachum iuuat ſi-  
timq; arcet, admota vero forma cataplaſmatis, ſiccant refri-  
geratq; mediocriter.

*Apocynon, aut cynocrambe, canina braſſica.*

**APOCYNON** aut cynocrambe, dicitur autem & cyno-  
moron quod celerrimè canes enecet, eademq; vi maleficiũ  
& lethalis homini eſt, foedi admodum odoris, & calida ci-  
tra ſiccitatem, vnde etiam diſcutiendi facultatem applicata  
repræſentat.

*Apochyma.*

**APOCHYMA** pix eſt vetus quæ à nauigiis deraditur, tu-  
mores diffundit, ſiccant & diſcutit.

*Arachne, araneus.*

**ARANEVS** cum emplaſtro ſubactus, impoſitusq; fron-  
ti, & temporibus tertianarum febrium circuitus finit, vt  
Dioſcorides memoriæ mandauit, tela ipſius applicata ſan-  
guinis



guinis fluores sistit, & vlcerà in summa cute ab inflammationibus tuetur.

*Argemone.*

ARGEMONAE facultas est abstergere simul & discutere.

*Arisarum.*

ARISARVM multo breuius est aro, acriusq; , radicem oliuæ magnitudine obtinet.

*Aristolochia, malum terra.*

ARISTOLOCHIA omnis calida, tenuis, abstergens, amara, & subacris, ad medicinas vtilissima. At Rotunda, tenuior, & in omnibus efficacior est. Clematitis hoc est farinacea, odorata quidē sed imbecillior. Longa verò præter alia, media harum est, sed non minus calida, quàm rotunda.

*Arcentos, Iuniperus.*

IUNIPERVS calefacit & siccatur in tertio ordine, fructus autem calefacit quidē similiter, sed in primo gradu siccatur.

*Arction.*

ARCTION, prosopites, folia habet cucurbitæ similia, maiora autem & duriora, discutit quidē siccatur, & astringit, quapropter & folia ipsius vetusta vlcerà persanant.

*Arction.*

ARCTION verbasco simile est, radicem habet teneram, candidam, & dulcem, vis eius est tenuis, siccans, & mediocriter astringens.

*Armeniacum.*

ARMENIACVM, vim habet absterforiam simul cum modica acrimonia & minore astrictione, hinc etiam oculariis medicinis miscetur, & augendis palpebrarum pilis vsum habet.

*Arnabo.*

ARNABO, odoramentis adnumeratur, ob quod vnguentis potissimum expetitur, calida siccaq; potentia præditum in tertio ordine, cassiæ & carpesio simile, vnde Posidonius vbi cinamomi copia non datur, hoc vtendum esse censet.

*Arnoglossum, plantago.*

PLANTAGO refrigerat pariter & desiccatur in abscessu secundo, temperata ex aquea & terrestri substantia, cui etiam astrictionis nonnihil adsit, quare ad maligna vlcerà, fluxiones, putredinesq; , temperamenti moderatione accommodata est, sanguinis quoq; profluvia cohibet & plurimis congruit,



ruit, etenim siccitatis quæ nequaquam rodit compos est, & frigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

*Aron.*

**ARON** calore & siccitate primi est ordinis, ex terrestri calida & absterforia substantia & hoc generatū, radices ipsius probabiliores sunt, dracunculus autem efficacior.

*Arsenicum, auripigmentum.*

**ARSENICI** vis est caustica, vtuntur eo & in pilis abominabilibus, quod si diutius adhæserit, etiam cutim ipsam attingit,ustum verò tenuius redditur.

*Artemisia.*

**ARTEMISIA** utraq; secundo in ordine calefacit, siccatur in primo, tenui substantia prædita, eoq; renum calculos comminuit, & vteri fomentis accommodatur.

*Artos, panis.*

**PANIS** illitus magis discutit quàm triticum, ceu & salis & fermenti particeps. Nam ad extrahendum ea quæ altè hærent, fermentum idoneum est.

*Asarum.*

**ASARUM** similè acoro virtutē habet, sed magis intēsam.

*Asbole, fuligo pictorum.*

**FVLIGO** qua pictores vtuntur, ex vitrariis officinis sumitur, vim habet discutientem, adeoq; acrem, vt & vrat, & exedat, cæterum fracta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

*Ascalabotes, stellio transmarinus.*

**ASCALABOTES** animal ad reliqua sanè inutile est, sed scorpionum ictibus impositum opitulari ipsum tradunt: expetitur etiam naturalia intendentibus medicinis.

*Asclepias.*

**ASCLEPIAS** calida, sicca, & tenuis substantiæ, torsionibus cum vino pota competit, venenatorum autem moribus & maleficis mammarum muliebrumq; locorum vitiis applicatur.

*Ascyr rhon.*

**ASCYRRHON** in androsæmo expositum est.

*Aspalathus.*

**ASPALATHVS** dissimili cōstat virtute, acri & astringente, & ob utramq; siccatur, idcirco & putredini, & fluxionibus utilis est.

*Aspa*



*Asparagus.*

ASPARAGVS petræus, aut myacanthinus abstergit vtrique, sed calore, & frigiditate medius est, renes & iecur obstructa recludit, præsertimq; radices & semen. Item dētium doloribus medetur.

*Asplenon.*

ASPLENON tenue quidem est virtute, non tamen calidum, hac vtrique ratione, & calculos confringit, & lienes consumit.

*Astaphis, vna passa.*

ASTAPHIS domestica sanè concoquit simul & astringit, & leuiter discutit, syluestris autem acris adeò est, vt pituitam per os educat, & vehementer abstergat.

*Aster atticus, siue inguinalis herba.*

ASTER atticus, quam alij herbam inguinalem vocant, ob hoc ipsum quòd non tantum emplastri modo imposita, verum adalligata etiam bubonibus prodesse creditur, mixta est virtutis, discutientis, & refrigeratoriæ.

*Astragalus.*

ASTRAGALVS frutex est exiguus cuius radices astringunt, ipse non ignauiter deficcet: vlcera itaq; vetusta ad cicatricem perducit, & aluum fluentem radix in vino pota sistit: plurimus in Phæneo Arcadiæ nascitur.

*Asphaltus, bitumen.*

BITUMEN ficcet, calefacitq; in ordine secundo, quare vlcera cruenta glutinat.

*Asphodelus, hastula regia.*

ASPHODELI radix vim habet detergentem discutientemq; concrementa autem ipsius cinis calidior, siccior, & tenuior euadit, quo fit vt alopeciis medeatur.

*Atractylis.*

ATRACTYLIS seu enicum syluestre ex spinosorum genere habetur, vi ficcante, & mediocriter calida.

*Atriplex.*

ATRIPLEX humectat sanè in secundo, refrigerat in primo ordine, qua de causa etiam ventrem celeriter permeat: semen ipsius vi pollet absterforia, vnde ictericis ex iocinoris obstructione accommodatum est.

*Aphace.*

APHACE lenticulae modo astringit, sed manducata ægrius



gregius concoquitur, valentius siccatur, mediocriter calefaciens.

*Aphronitrum.*

APHRONITRI vis est discutere & abstergere, ut non solum sordida exterat, sed etiam pruritu, quippe sanem discipat, medeatur, potum verò stomacho nocet.

*Aphros, spuma nitri.*

SPUMA nitri proximam nitro facultatem obtinet, sed tenuior substantia, ob quod & lævis, farinæ, modo existit.

*Achras, pirum agreste.*

PIRUM agreste eandem piro domestico virtutem habet, sed magis intensam, quapropter magnis vulneribus glutinandis est.

*Absinthium.*

ABSINTHIUM calidum primo abscessu est, siccum teretio, astringenti, amara, & acri simul donatum qualitate: quæ biliosos in ventriculo humores per aluum & urinas inanit: quibus autem pituita redundat, hos propter astringentiam nihil iuuat: succus ipsius, herba multo calidior est.

ENUMERATIO EORVM QVAE

AB INCIPIUNT.

*Balanus myrepfica, glans vnguentaria.*

QVOD intra vnguentariam glandem veluti carnosum est, abstergendi incidendiq; cum astringente vim habet, eamq; ob causam drachmæ unius pondere cum multa pota, facile vomitiones ciat, & inferiorem ventrem subducit, cum pota verò ad viscerum obstructions conuenit: item cutis vitia cum aceto perunctum abstergit. Cortex verò ipsius valde astringit.

*Baccharis.*

BACCHARIS odorata est herba similis cinamomo, coronaria & acris: huius radicis decoctum meatus obstructos aperit, urinam & menseis citat, folia ipsius quum sint astringentia, fluxionibus opitulatur.

*Balanstium.*

BALAVSTIUM, sylvestris punice flos est, valide astringens, sicca & frigida facultate præditum, itaq; summæ cutis vlcera ad cicatricem perducit, & fluxiones cohibet.

H



*Balsamum.*

BALSAMI, quod veluti lignum est, siccat & calefacit in secundo ordine, subtilémque habet substantiam, liquor autem multo tenuior est, fructus proximè hunc virtute accedit, sed minus tenuis est.

*Ballote, marrubium nigrum.*

BALLOTE quod alij marrubium nigrum dicunt, acris est & absterforiæ facultatis, impositum cum sale rabidi canis moribus medetur.

*Batus, rubus.*

BATI fruticosum, abundè astringit & siccat, qua de causa & vulnera committit, & defluxiones sistit, radix autè præter astringentem, non parum etiam subtilis est, unde renum calculos confringere est idonea. fructus si maturus est, magis calefacit, simulq; mediocriter astringit, ac ideo cibo idoneus est, immaturus autem & acerbus est & validè siccat, præsertim retorridus. Eadem etiam flos efficit.

*Batrachion, ranunculus herba.*

RANUNCULI quatuor sunt genera, omnia excellenter calida, sicca, acria, vrentia, adeò ut vlcus cum dolore excitent: quibus si modicè utaris, cutis vitia tantùm exterunt, radix autè arida sternutamentis ciendis est medicamentum.

*Batrachi, rana.*

RANAE aduersus virulentorum morsus in iusculo eduntur. Crematarum ranarum cinis maximè siccans redditus, sanguinis eruptiones sistit & alopeciis cum pice liquida medetur.

*Bdellium.*

BDELLIUM tum Scythicum tum Arabicum scirrhus emollit, præsertimq; recentes, Arabicum verò vrinæ ciendæ est, calculos comminuit, & cruda concoquit.

*Betonica.*

BETONICA herba est ramulis exilibus pulegio similibus sed tenuioribus, & propemodum si gustes, nullam qualitatem referentibus. Nascitur potissimum locis petrosis, qua & in renum medicinis vtuntur. Est autem apud Romanos alia quædam betonica dicta, quâ Dioscorides nominat cefiron, alij verò psychotrophon, eò quod frigidis locis gaudeat, nihil simile cum prædicta habet, præter actionem: at vltra quod vrinam ciet, etiam aliis multis benefacit, potissimumque radix ipsius, cum hydromelite pota vomitionem mouet,



mouet, folia autem aluum subducunt.

*Bechium, tuſſilago.*

**TVSSILAGO**, quæ Græcis bechion ſiue bechicon inde dicitur, quòd ruſſes & recta ceruice ſpirantes, ſuffitu iuuat, conſtat ex calida aquoſaq; ſubſtantia.

*Blitum.*

**BLITVM** eſculentum olus eſt, humidum frigidumq; in abſceſſu ſecundo.

*Bulbus.*

**BVLBV** eſculentus amari ſimul & aſtringentis modicè compos eſt, ſiccatur glutinatq; vulnera, & abſtergit. Qui autem vomitum cit, calidiorẽ quàm alter repræſentat.

*Botrys.*

**BOTRYS**, quam alij ambroſiam, alij artemiſiam dicunt, planta eſt inſigniter odorata, hæc cum vino pota, ſubrecta ceruice ſpirantibus quos orthopnoicos appellant, ſuccurrit.

*Bubonium, inguinalis herba.*

**BVBONIUM** in attico aſtere dictum eſt.

*Bugloſſum, lingua bubula.*

**BVGLOSSVM** humidum calidumq; temperamento eſt, eamq; ob cauſam vino iniectum lætitiã animi conciliare dicitur.

*Bunium.*

**BVNIUM** quod alij arction appellant, calidum eſt, vrinæ & menſibus educendis accommodatum, huic reſpondet & pseudobunium.

*Bupreſtis.*

**BVPRESTIS** animalculum eſt cantharidi ſimile, reponitur itaq; ſicut & illa.

*Butyrum.*

**BVTYRVM** concoquit & modicè diſcutit, in teneris corporibus, bubones igitur & parotides iuuat, gingiuas extenuat, & præſertim in infantibus dentientibus, item humores in pectore fixos, linctum concoquit.

*Buphthalmon.*

**BVPHTHALMON** ſimilem habet chamæmelo florem, ſed multo maiorem acriorẽmq; ideo & diſcutientem, adeo vt cerato mixtum duritias remolliat.

*Brathy, herba Sabina.*

**SABINA**, cupreſſo ſimilis calefacit ſiccaturq; in tertio ordine, tenuiſſimaq; eſt, extenuat & diſcutit pota, tũ in putredines



cupresso similiter efficax est.

*Britannica.*

BRITANNICA astringit & conglutinat, sylvestri lapathio specie similis, succus ipsius putredines os infestates per-  
sanat.

*Bromus, auena.*

AVENA similem hordeo obtinet facultatem, siccatur autem & modicè citra corrosionem discutit, iam & nonnullius astrictionis compos est, unde & alui profluuiis subuenit.

*Bryon thalassion, muscus marinus.*

MUSCUS marinus, refrigerat simul & astringit, eoq; feruientes inflammationes cataplasmate admotus, iuuat.

*Bryon, muscus.*

BRYON, quod alij splanchnon dicunt, in quercubus & populis albis, piceisq; inuenitur, discutiendi simul & molliendi vim moderatam obtinet potissimum quod cedris adheret.

*Bryonia.*

BRYONIA dicta est vitis alba.

### Initium literæ G.

*Gala, lac.*

LAC omne tribus constat substantiis, caseosa, serosa, & pingui, quam copiosissimam bubulum obtinet, unde etiam butyrum efficitur. Serum ipsius vim habet abstergendi, unde & aluum subducit, si ipsum per decoctionem secernas. id verò quod caseum refert & crassum est, magis obstruit, atq; ideo acrimoniam obtundit: coctū verò lac aut marinis calculis ignitis in ipsum iniectis, aut alio quodam modo, praesens sit remedium dysenteriae, & acrium in ventrem defluxionum. Ceterum lac totum ad acres oculorum fluores, aliâsq; acrimonias conducit. At temperatissimum lac, muliebri est, mox caprillum, hinc asininum, ouillumq; postremo vaccinum.

*Gale, mustela.*

MUSTELAE concremata cinis abundè discutit, ex aceto igitur illitus podagricos, & articulares dolores iuuat: inarefacta aut inueterataq; mustela comitialibus auxiliatur.

*Galion.*

GALION à coagulando lacte dictū est, a parinē simile, sic-  
candi



candi vim, mediocremque acrimoniam habet: flos eius ad sanguinis eruptiones & ambusta, congruit.

*Galopsis, vel galiopsis.*

**GALOPSIS**, quam alij galibdolon appellant, vrticæ similis herba est, lævior autem, & fœdi odoris, scirrhosos tumores dissipat & emollit, item ad vlcera serpentina facit in cataplasmate imposita.

*Garum.*

**GARVM** calefacit exiccatque efficaciter, ac ideo aduersus vlcera putrida extrinsecus eo vtuntur, præterea contra intestinorum tormina & coxendicis dolores ex partibus inferioribus iniiciunt.

*Gentiana.*

**GENTIANA** radix efficax admodum est extenuare, purgare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

*Geranium.*

**GERANIVM** id quod foliis respondet anemonæ, radicem habet esculentam, quæ cum vino drachmæ modo pota vteri inflationes dissolvit. altera geranij species ad medicinam inutilis est.

*Ge, terra.*

**OMNIS** terra desiccatur, quæ vero alterius substantiæ expers est, etiam sine morfu id facit. at si ignea quædam ipsi qualitas admixta sit lotione hanc quoque deponit. Inter cultas igitur terras quælibet pinguis omnium particularum quæ siccari postulat curationi accommodata est, Aegyptio igitur luto vtuntur cõtra aquas cutem subeuntes, & lienosos affectus, ite ad fungosos laxosque tumores euidenter proficit. Ex terris medicatis lemnii minium, quæ sphragis dicitur, siccatur pariter & astringit mediocriter, contra lethalia medicamenta præsentis antidoti vires habet, vlceribus malignis cum aceto aut vino medetur, sanguinis profusionem quamlibet sistit, & depascentem dysenteriam intestino mulsâ prius, deinde muria per clysterem eloto, coercet. Minium rubricum vehementius, quàm lemnium obstruentibus quæ emplastica dicuntur, miscetur medicinis, & pota lombricos interimit, sed multo lenior est Samia quàm Lemnia terra, ceu glutinans & viscosa, quare vtendum ea est in his quæ leniri oporteat. & sanguinis reiectiones, quacunque ex parte fiant, compescit. Selenusia & Chia maiore abstergendi



virtute pollent, idéoq; mulieribus ad nitorem cutis & leuorem in facie utilis est, vlceribus carnem & cicatricem inducit, præsertim ambustis. Cimolia mixta facultatis est, refrigerantis discutientisq; idq; illota. lota verò magis refrigerat, & ambustis ex posca medetur. Ampelitis, est autē ea quæ vitibus inungitur, quòd innascentes ipsis vermes enecet, siccet & discutit egregiè citra erosionem. Cretica, aëria est, & sine rosione abstergit. Erethrias euidenter astringit, concreta verò & elota sine rosione desiccet, præstantior verò est cinerea. Pnigitis similes cimolix vires repræsentat, sed colore nigrescit. Armenia, quam etiam bolum nominant, summè desiccet, vnde dysentericis, alui fluxionibus, sputo cruento, tabi, spiritus difficultati ex humiditate, vlceribus humidis, & pestilentialibus vitiis strenuè opitulatur. Cæterum cum vino tenui diluto bibitur: si febris adsit, cū aqua. Alana autem gleba Armeniæ vim obtinet. Ochra vim habet discutiendi exedendiq; reprimi igitur supercrescentia vlcera, & caua cum cerato mixta replet.

*Geras, senecta, anguis.*

**SENECTA** anguis affatim siccet: aceto igitur subferuifaceta, dentium doloribus medetur. Aspidis exuium cum melle tritum delitumq; oculorum aciem maximè iuuat.

*Ges entera, terra intestina, seu vermes terreni.*

**LUMBRI**CI terræ detriti neruorum vulneribus impositi, repente euestigio mirabile adferunt præsidium.

*Gigarta, nuclei acinorum vix.*

**NVCL**BI acinorum vix, desiccant ordine secundo, refrigerant primo. quum itaq; abundè sint acerbi omnibus alui vitiis fluidis, conueniunt.

*Gingidium.*

**GINGIDIUM** calorem non aded manifestum sortitum est, cæterū siccet in abscessu tertio, & astringit, qua de causa & stomacho vtile est.

*Glaucium.*

**GLAUCIUM** astringit, sed ita vt etiam nonnihil gustati sit ingratum, manifestè refrigerat, eaq; vi erysipelatis non tamen validis succurit.

*Glaux.*

**GLAUX** herba calida & humida temperamento est, vnde ad lac generandum efficax est.

*Gle*



*Glecon, pulegium.*

**PVLEGIUM** calefacit, & extenuat vehementer, unde si cataplasmate applicetur ruborem excitat, & crassos viscososque humores e thorace & pulmone emolitur.

*Glaeos, sordes balnearum.*

**SORDES** balnearum calefaciunt modicè, emolliunt, discutiunt, rhagadibus ani & condylomatis accommodata.

*Glycyriza, dulcis radícula.*

**GLYCYRIZA** tepidi humidique temperamenti est, alius cuius etiam astrictiois particeps, unde, & asperitates laxigat, non arteriæ tantum, sed etiam vesicæ scabiei medetur: eadem sitim arcet.

*Glycysside, pæonia.*

**GLYCYSIDE** quam alij pentameron, nonnulli pæoniam vocant, radicem habet acrem & leuiter subamaram & siccantem, cui etiam astrictiois nonnihil inest, quapropter mensis ciet, renes & iecur purgat, iostar amygdalæ pota cum vino: at si hoc austerum fuerit, alui quoque fluores coercet, adalligata verò puero, morbum comitalem abigit.

*Gnaphalium, centunculus.*

**CENTUNCULUS** dictus est gnaphalium quod foliis ipsius teneris loco tomenti, gnaphalon dicitur, utamur. sunt autem calida & modicè astringentia, atque hinc ad dysenterias cum vino austero bibuntur.

*Gongylis, rapum.*

**RAPI** & radix & semen flatulenta & semini creando sunt, veneremque excitant.

*Gordilion.*

**GORDYLION** alij seseli appellant, calidum est, urinæ & mensibus educendis habile, radix ipsius cum melle linctæ, quæ in thorace hærent, educit.

*Gyris, pollen, farinaceus.*

**POLLEN** virtute respondet amylo, sed calidior est.

*Gypsum.*

**GYPNUM** vim habet siccantem opplentemque, propter quam ad sanguinis eruptionem conuenit temperatum cum polline candido oui liquore, vitum vim opplendi non similiter retinet, verum magis siccatur & repellit, præsertim cum posca.



## Quæ à D incipiunt.

*Dades, tede.*

TEDAE acere quiddam habent, item vim concoquendi, & abstergendi nonnullam, unde aceto incocta dentium doloribus si hoc aceto colluantur, succurrunt: at si mel adiectum fuerit, pituitam per os educunt, mixta etiam eclegmatis faciles è thorace excreatus reddunt.

*Damascena.*

DAMASCENA, quum ad pruna ventum erit, exponam.

*Damasonium.*

DAMASONIUM absterforiam quandam vim obtinet, qua calculos conterit, & quæ per aluum diffluunt, ad urinas deriuat.

*Daucus.*

DAUCUS, quod & staphylinus dicitur, duplex est, cuius radix flatulenta est, & venerem mouet. Syluestris dauci semen minimè flatus creat, sed urinam & menſeis citat, quem admodum & herba ipsa.

*Daphne, laurus arbor.*

LAVRI arboris folia siccant & calefaciunt insigniter, magis quoque fructus: radice cortex amarus & leuiter astringens calculos comminuit, & iocinorosis opitulatur cum vino odorato triobolari pondere potus.

*Daphne herba, laurus alexandrina.*

DAPHNE herba, quæ & Alexadrina dicitur, calida, acris, & subamara est, idcirco menſeis & urinas commouet: laureola vero, quæ daphnoïdes græcè nuncupatur, eiusdem facultatis est: tum chamædaphne, quasi dicas humilem laurum, quæ & ipsa commanducatur.

*Derma, pellis.*

PELLIS ouina recens detracta, calens adhuc iis qui flagris cæsi sunt circumposita, mirificè auxiliatur. At hippopotami pellis combusta & cum aqua læuis imposita phymata discutit. At viperæ pellis detricta impositaque, alopeciis mirabiliter pilos reficit.

*Dermata, hoc est, pelles seu coria veterum calceamentorum.*

CORIA veterum calceamentorum crematorum cinerem reddunt siccatorium, unde ex calceis pedum attritis nondum inflammatis, ambusis, intertriginibus, & tuberculis medentur.

*Dicta*



*Dictamnion.*

DICTAMNVM tenuius est virtute pulegio, cetera simi-  
le bonum, quod autem vocatur pseudodictamnion imbecillius est.

*Dionysias.*

DIONYSIAS dicta est in androsæmo.

*Diphryges.*

DIPHRYGES mixta est facultatis: habet enim quip-  
piam astringens & mediocriter acre, ideoque malignis vl-  
ceribus præsens est remedium.

*Dipsacos, quod labrum veneris dicitur.*

DIPSACI spinæ radix in secundo ordine deficcet, non-  
nullam vero abstergendi vim simul obtinet.

*Dorycnion.*

DORYCNION simile temperamento est papaveri &  
mandragoræ, immodicè refrigerans: siquidem modicum,  
stuporem inducit: copiosius assumptum, interimit.

*Dracuntium, dracunculus.*

DRACUNCVLVS simile quidam aro habet, sed eo acrius,  
umariius, calidius, tenuiusque est. Item astrictionis nonnihil ha-  
bet coniunctum. Radix ipsius pota viscera purgat, & perui-  
cacium seu malignorum vlcerum excellentissimum est re-  
medium: folia respondent: semen valentius est.

*Dryopteris, filicula.*

FILICVLA dulcis, acris, & leuiter amara est: radix acer-  
ba est, ceterum vim habet exedentem, qua & pilos abolet.

*Drys, quercus.*

QVERCVS & folia & fructus siccante & tepida vi pol-  
lent, quamobrem vulnera recentia glutinant, inflammatio-  
nibus incipientibus medentur: at quod sub glandis corio mē-  
branosum, fructus carnem ambit, cum valentius astringat,  
ad fluxum muliebrem, aliosque fluidos morbos exhibetur.

## Quæ ab E incipiunt.

*Ebenus.*

EBENI ligni vis est excafactoria, deterforia, & subtilis:  
vnde etiam caliginem oculorum abstergere creditur, aliis-  
que oculariis miscetur medicinis.

*Encephalos, cerebrum.*

CEREBRVM leporis coctum detritum, comestumque: in-  
fantium dentitionibus vtile esse fertur: nonnulli vero tre-



moribus succurrere manducatum, literis prodiderunt. Atque  
li cerebrum cum vino potum ad venenatos morsus efficax  
esse Dioscorides pronuntiat, & sanguinis e cerebri membra  
nisi eruptionem cohibere. Cameli cerebrum Galeno autem  
siccum cum aceto potum, comitiales persanat. Idem facit  
mustelæ cerebrum. Hirundinum cum melle in oculorum  
suffusiones efficax est. Cerebrum ouillum similiter præparatum,  
infantium dentitionibus exactè opitulatur.

*Elea, olea.*

**O L E A E** ramusculi quantum astringunt, tantum etiam  
refrigerant, fructus qui exactè ematuruit, moderatè calidus  
est, immaturus maiorem tum astringendi tum refrigerandi  
vim repræsentat.

*Elea, hoc est olea, Aethiopica.*

**O L E A E** aethiopica lachryma ammoniaco tenui simili  
vires habet extensorias, quare ad cicatrices, albugines, heretudinesque  
oculorum ea utuntur, & ad dentium dolorem  
si cauis ipsorum iniiciatur, efficax est: nonnulli vero syluaticam  
esse hanc oleam asserunt.

*Eleon, oleum.*

**O L E U M** ex oliuis drupis dulce calidumque; mediocriter  
est magis humectans: at quod ex immaturis oliuis exprimitur,  
Græci omotribes appellant, tantæ astringentis particeps  
est, quantæ etiam frigiditatis. Eorum vero oleum morsu  
acrosione caret. vetus quato diutius reseruaturn, tanto magis  
calefacit, discutitque; præsertim si iam inde ab initio re  
nue extitetit: iudicatur autem id, si purum sit, pellucidum, si  
paucum magnam corporis partem inungat, & ex facili cutem  
penetret combibaturque. huiusmodi nimirum est Sabinum:  
quod autem ex agresti olea funditur, abstergit simul & astringit,  
squalidissimumque; id est, pro oleorum ratione. ricininum  
verò æquales veteri vires obtinet: reliqua verò nempe sesaminum  
aut raphaninum & quæ eius sunt generis pro substantiis ex quibus  
constant, vires quoque diuersas præ se ferunt.

*Eleomeli.*

**O L E U M** in Syria ex trunco quodam arboris emanat crassius  
melle & dulcius, quod instar duorum cyathorum potum cum aqua  
hemina, crudos humores biliososque ex aluo educit: qui verò id  
bibunt, torpescunt, quod extimescendum non est, sed excitari ipsi  
debent.

*Ela*



*Elaterium.*

**ELATERIVM** succus sylvestris cucumeris fructus appellatur, in secundo ordine calefaciens: quod mensis procat, foetus appositum propter summam amaritudinem ne euacuationem etiam ex naribus cum lacte instillatum litur: ab inferioribus partibus inditum, pituitam, nonquam etiam sanguinem extrahit.

*Elate, abies.*

**ABIES** arbor calefacit siccaturque ut nigra populus similis: de resina ipsius in resinarum sermone agemus.

*Elatine.*

**ELATINE** herba est parietariae similis, mediocri frigida & astringente donata.

*Elaphoboscus.*

**ELAPHOBOSCUS** virtutis est calefactoriae & siccae in profundo abscessu, substantia tenuis.

*Elelisuacus, salvia.*

**SALVIA** euidenter calefacit & leuiter astringit.

*Helenium, inula campana.*

**HELENIUM** calidum est & siccum cum excrementitia humiditate, quare & eclegmatis temperatum infarctos thoracis mores educit, ac ex eo in particulis ruborem excitant.

*Eleoselinon, palustre apium.*

**ELEOSELINON** in aquosis natum locis idem potest modum hortense apium, licet maius ipso existat.

*Ebur.*

**EBORIS** ex vngue ramenta si obducantur, reduuiis prominent: item ossium dentiumque ipsius quum sint siccae facultatis & absterforiae, huiusmodi miscentur medicamentis.

*Helcysma, argenti excrementum.*

**HELCYSMA**, argenti est excrementum, viribus plumbae ini respondens: quippe astringit, simul atque extrahit, quod ut emplastris quas pharas appellant & iis quae cicatricem faciunt, admisceatur.

*Helleborus, veratrum.*

**VERATRUM** utrumque calefacit & desiccatur in tertio abscessu, item acre est & absterforium, unde etiam ad leprosa cutis vitia conuenit: nigrum vero si fistulis inseratur tribus diebus callum exerit.

*Helechryson.*

**HELECHRYSON** alij chrysanthion, alij amaranthum appellant,



lant, coronarius est frutex, coma aurum referente, quæ cum vino pota urinæ angustis, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis accommodata est, ex mulso pota mensi educit, sanguinemq; concretum dissolvit, & destillationibus auxiliatur.

*Helxine, parietaria.*

HELXINEM alij perdicium, alij parthenium, quidam sideritim, quidam heracliam nuncupant, vis eius est abstergere, ac leuiter astringere, cum humiditate subfrigida.

*Helxine.*

HELXINE quæ & cisampelus dicitur, vim habet discutendi.

*Elymus, quæ & meline dicitur, panicum.*

PANICVM simile est milio, siccans refrigeransq; extrinsecus inductum, cæterum & alui fluores desiccant.

*Empetron.*

EMPETRON, quod ab aliis prasoïdes nominatur, pituitam & bilem purgat. est etiam salsum, quare abstersionibus accommodatur.

*Epithymum.*

EPITHYMVM in tertio abscessu siccant & calefacit, thymo efficacius.

*Epimedium.*

EPIMEDII virtus est mediocriter frigida cum humiditate aquosa, quod si obducatur, mammas erectas conseruat, dicitur etiam sterilitatem potu facere.

*Epimelis.*

EPIMELIS, quæ etiam ab Italicis rusticis vocatur vnedon, malus est sylvestris, cuius fructus acerbus & stomacho inimicus est, capitiq; dolorem mouet.

*Epipactis.*

EPIPACTIS, quæ & elleborine appellatur, aduersus venena & iocinoris affectus bibitur.

*Erebinthus, cicer.*

CICER quod quidem consuetum legumen est, flatum creat, valentis materiæ, aluum facilem reddit, urinam mouet, lacti seminiq; generando accommodatum, idem menseis elicit: at crios appellatum, hoc est, arietinum, aliis magis urinæ cienda est, decoctum ipsius præsertim nigri calculos quoque in renibus conterit: quod autem orobizum ab eruo vocatur,



ur, calidius his est & subamarum. Syluestria quouis modis domesticis sunt validiora.

*Eria, lane.*

ANAE quidem sordidæ fomentis vtiles sunt, nam pingui obitudo ipsarum, quæ æsypon Græci appellant, butyri modo concoquit: at quæ sordibus carent, materiæ rationem contaxat obtinent: concremata vero vim habent acrem, calidam, siccam simul & tenuem, vt etiam flaccidas ex vligine verum carnes protinus absumant.

*Erice.*

ERICE vi pollet discutiente citra rosionem, sed flores potissimum, & foliis vtendum est.

*Erinon.*

ERINON aquatica herba est, cuius seminis drachmæ duæ cum mellis drachmis quatuor illiti, oculorum fluxiones sanant, succus aurium doloribus benefacit.

*Hermodactylus.*

HERMODACTYL RADIX & per se, & ipsius decoctum habet purgandi, priuatim etiam arthriticis tunc quum humores defluunt exhibetur, verum stomacho nimis quàm luerfatur.

*Herpyllum, serpillum.*

SERPILLVM calefacit, vt & urinam, & menstrua commoueat.

*Erythrodanon, rubia.*

ERYTHRODANON rubra tinctorum radix est, acerbamaraq; lienem, iecur & renes ita purgat, vt cruenta quoque per urinam & menses euocet: ac cutis vitia quæ absterfionem postulant, exterit.

*Erysimon.*

ERYSIMI semen igneum calefactoriumq; est, vti naturtium, quare in fermento tostum, thoracem purgat in clegmatis assumptum, duritiasq; emollit, & cæcos caneros conductum adiuuat.

*Eruca, eruca.*

ERVCA, & ipsa priori similis temperamento, flatulenta est, ob quod ad venerem instigat, semen ipsius urinam quoque mouet. Cæterum syluestris domestica valentior est.

*Eupatorium.*

EUPATORIUM tenuem vim & incidentem sine conspicuo



spicuo calore habet, qua iecur obstructum expurgat, est & nonnullius astrictionis parriceps.

*Euphorbium.*

**EUPHORBIVM** adurentem vim sortitum est subtilemque, aliis liquoribus similiter.

*Ephemeron.*

**EPHEMERON**, non venenum illud sed quod iris sylvarum nominatur, mistæ potestatis est, & repellentis, & discutientis.

*Echidna, id est, vipera.*

**VIPERAE** carnes calidæ & siccæ temperatura evidenter existunt, quæ corpus totum per cutem expurgant, hinc multi quos elephantia malè habebat, esu potuue ipsarum comederunt: quæ in maritimis, aliique locis aridis degunt, magis ad sitim faciundam sunt efficaces.

*Echinus herba.*

**ECHINVS** herba quidem, acerba est, quæ repellat, & siccet.

*Echinus, erinacius.*

**ERINACEI** autem terrestres, caro inueterata siccataque, validè discutit exiccatque: pota igitur elephantibus, malo habitu præditis, & aliis plurimis auxiliatur: pellis ipsius concremata vehementius siccet & discutit, alopecias cum pice liquida peruncta sanat. Marini erinacei quod esui idoneum est, urinam citat, & aluum reddit facilem: testa cremata, terrestri respondet.

*Echion.*

**ECHION**, alij doriada, nonnulli alcibiadion vocant, spinosa herba est, quæ non modò à serpente commorlis cum vino pota auxiliatur, sed præsumentes quoque percuti non patitur.

*Hepsema, sapa.*

**HEPSEMA** mustum decoctum, quod alij siræon appellant, calefacit modicè & concoquit, est autem medicamentum & emplasticum, & rosionis expers.

Quæ à Z incipiunt.

*Zea.*

**ZEAE** tritico viribus respondet, medium inter calorem, & siccitatem obtinens, leuiter exiccat. necnon vim opplendi quam



nam vocant emplasticen, obtinet.

*Zingiber.*

**ZINGIBERIS** radix impensè quidem calefacit, sed non  
tamen statim occurru, quòd ineuicta cuiusdam & crassioris  
humiditatis particeps sit, propter quam etiam facile perfora  
tur, firmam autem conseruat caliditatem.

*Zythus.*

**ZYTHVS** composita est substantia, etenim acris est, ceu  
putredine procreatus, & frigidus, ex qualitate acida, eoq;  
trahi succi habetur.

*Zyme, fermentum.*

**FERMENTVM** & ipsum contrariis constat qualitatibus,  
quippe acoris cuiusdam frigidi, ac è putredine nati caloris,  
eius qui ex salis & farinae natura contrahitur, compos  
it: quare non mediocriter calefacit atq; discutit.

*Zomos, Piscium ius.*

**RECENTIVM** piscium ius esculentum alium per se, &  
cum vino potum deicit, priuatim verò in hunc usum confici  
tur ex phycidibus, scorpionibus, iulidibus, percis, & saxati  
bus aliis teneris simpliciter cum aqua, oleo, anetho, & sale.  
et eorum quæ testacea cute integuntur, tellinarum, hiatularum,  
ostreularum, & veteris galli cum sale diutissimè excocti iuscu  
tum, ventrem subducit, e contrario gallinae ius comprimit.

Quæ ab H incipiunt, quod Latini in E  
longum vertunt.

*Hedysmus, Menta.*

**MENTA** in tertio ordine calida, tenuis, acris cum humidi  
tate semicocta existit, cuius causa etiam in venerem incitat:  
sed amari quoq; nonnihil obtinet, quo lumbricos enecat.  
Quæ verò acerba est, recetes sanguinis reiectiones coërcet.

*Hedysarum.*

**HEDYSARVM** aut pelecinos amarum est, leuiterq; a  
stringit, vnde potum stomacho gratum redditur, cæterum vi  
scera obstruata repurgat.

*Heliotropium.*

**HELIOTROPIVM** maius, quod & scorpiurum vo  
cant, calidam, siccam, & abstergentem vim præ se fert, cuius  
decoctum potu educit pituitam, bilemque: applicatum ve  
rò semen ipsius myrmecias & huius notæ vitia persiccant.  
Minus autem heliotropium, & hæc abolet & latas tineas in  
terimit,



terimit, si eum semine suo adiecto, nitro, hyssopo, & nasturtio bibatur.

*Electrum, Succinum.*

ELECTRUM populi albae lacrymam dicunt, quae iuxta amnem Eridanum destillat, & in spissitudinem coit, aureo colore, quod si laeuigatum bibatur, stomachi & alui fluxiones, & sanguinem compescit.

*Hemerocalles.*

HEMEROCALLIS radix viribus lilio responderet, perinde ac illud ambustus opitulatur.

*Hemionitis.*

HEMIONITIS astringens simul & amara est, idcirco lienosis cum aceto pota succurrit.

*Hepar, Iecur.*

IECUR rabidi canis tostum comestumque, iis qui ab eo commossi sunt subuenire fertur. Caprilli iecoris inflati fanies lusciosos iuuare instillata: vaporemque eius decocti oculis recipi iubent: idem quoque iecur esse: manducatum vero comitiales coarguere. Idem praestare & hircinum ferunt. Adhuc lacertae iecur dentibus corrosis impositum, dolorem sopit. Item lupinum, medicamini hepatico quod constat eupatorio iniicitur. Asininum tostum comitiales, si ieiuni id manducet, adiuuat. Apri iecur recens inarefactum tritumque cum vino, ad serpentium morsus bibitur. At mergi iecur siccum epotum, calculos eiicit.

*Erigerum, Senecio herba.*

SENECIO mixtas habet vires, refrigerat & modice discutit.

*Eryngium.*

ERYNGIUM calefacit quidem non manifestò, siccitatis autem haud obscurae, nec modice parriceps.

Quae à TH incipiunt.

*Thalassion hydor, marina aqua.*

AQUA marina acris, calfactoria mediocriter, desiccans, & pota stomacho quidem contraria est, ventrem autem turbabat, pituitamque educit: si calida superfundatur, extrahit, & discutit.

*Thaliethrum.*

THAL



THALIETRV M siccandi vim sine rosione habet, hinc  
ulcera inueterata cicatrice obducit.

*Thapsia.*

THAPSIA acris est, & valenter cum humiditate cale-  
facit: ex alto igitur trahit insigniter, attractumque eadem  
disscutit.

*Theion, sulphur.*

SVLPVR trahendi & ipsum vini obtinet, calidū & sub-  
stantia tenue, vt aduersus pleraque virulenta animalia resi-  
stat, præsertim turturem marinum, draconemq; , vel siccum  
inspersum, vel saluæ quoque mistum, vel vrinæ pueri, vel  
oleo, vel melli: item scabiosa corporis vitia mirificè perfa-  
ciunt.

*Thermos, lupinum.*

LVPINVM, esculentum quidem opplendi viribus pollet:  
amarum verò, abstergit, dissipat, & sine rosione desiccatur, ti-  
neas occidit inductum, & potum, item viscera purgat cum  
rutæ & pipere potum. nam cutis vitia extergit, tumores dis-  
sipat, cum oxymelite applicatum: sylvestre autem amarius  
est & omni ex parte satiuo valentius.

*Thelypteris.*

THELYPTERON, quam nonnulli nympheam vel pre-  
lin appellant, filici similis facultate, quæ cum vino pota latus  
& teretes ventris tineas interimit, foetum in utero corrup-  
pit: folia ipsius manducata aluum emolliunt.

*Thlaspi.*

THLASPI semen est viribus acre, vt intestinos absces-  
sus potu rumpat, mensis prouocet: ab inferioribus parti-  
bus iniectum coxarum dolores finit, cruenta vacuans, ac  
alioquin supra infraque biliosa instar acetabuli potum, ex-  
purgat.

*Thridax, lactuca.*

LACTVCA olus est non summè frigidum humidumve,  
sed pro fontanæ aquæ temperamento, quapropter calidis  
inflammationibus cōuenit, præterea sitim potu restinguit,  
& genituræ fluorem venerisq; insomnia cohibet: Sylvestris  
lactuca hac minus & refrigerat & humectat, verum succu-  
lentior existit.

*Thymus.*

THYMVS in tertio ordine calefacit & desiccatur, glutino-



fos crassosq; humores incidit.

*Thymbra, satureia.*

SATVREIA agrestis quidem eadem quæ thymus præstat, hortensis autem in omnibus quidem imbecillior, sed ad cibum laudatior.

*Thymelea.*

THYME LAEA, unde granum cvidium fit, simileis ei vires obtinet.

### Quæ ab I incipiunt.

*Idea radix.*

IDAEA radix gustu acerba & viribus, sanguinis eruptionibus & rheumaticis affectibus, tum pota, tum extrinsecus imposita accommodatur.

*Hidros, sudor.*

SVDOR per se contrahere efficax est, miscetur autem in palæstris exercitantiū sordibus, quibus astringendi vis duntaxat inest, ac redditur totū discussorium. Mammis igitur inflammatione tētatis efficax est remediū, & feruori ipsarū restinguendo: benefacit etiam bubonibus: at si fuerint sicciores, cum cyprino, aut rosaceo emolliri debent.

*Ixos, viscum.*

VISCVM calefacit cū acrimonia, humores ex alto validè elicit, & thapsiæ modo discutit, hac tamē multo est ignauius.

*Ion, viola.*

VIO LAE folia aquea frigidaq; substantia præpollēti cōstāt.

*Ios, erugo.*

AERVGO acrem gustu qualitātē præ se fert, item discutit, consumit, inciditq; non teneram modō, sed duram quoque carnē: at si momentū ipsius cerato copiosiori misceas, medicamentum fiet quod citra rosionem abstergat.

*Hippocampus.*

HIPPOCAMPVS marinum animal est, cuius concremationicinis cum liquida pice alopecias explet.

*Hippolapathum, grandis rumex.*

HIPPOLAPATHVM in palustribus locis nascitur, lapathum cōsimile.

*Hippomarathron, grande fœniculum.*

HIPPOMARATHRV M cachryi proximū, magis quàm fœniculum desiccatur, unde & aluum fluentem sistit, & calculos confringit, mensesq; mouet semen ipsius coriandro simile,



onile, respondet quidem ei viribus, sed imbecillius est.

*Hippopotamus.*

**HIPPOTAMI**, quod est equi fluuiatilis, testiculus ar-  
lus potus ad serpentium morsus efficax est.

*Hipposelinon, grande apium.*

**HIPPOSELINON** cum apio domestico virtute conue-  
nit, nisi esset imbecillius.

*Hippuris, cauda equina.*

**HIPPURIS** astringentem cum amaritudine qualitatē  
possidet, eoq; valenter simul & sine rosione deficcet, ac vul-  
nēra maxima committit, intestinorū ramicibus opitulatur,  
& vitiiis fluidis cum vino pota medetur.

*Hippophaës, lappago.*

**HIPPOPHAES**, quod alij hypophyes vocant, quo ve-  
stis expoliunt surculosus frutex est, è cuius radice thapsiæ  
modo liquor colligitur, qui cum erui farina instar drachmę  
datus, bilem ac pituitam purgat: item totus ipse frutex sic  
catus ad purgationes accommodatur.

*Iris.*

**IRIS** affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis sub-  
stantia, tussi utilis, humores in pectore contumaces faciles  
ad excretionem facit, torsionibus ventris medetur, sordida  
vulnera purgat, cum mulsā pota aluum inanit.

*Isatis, glastum.*

**ISATIS** domestica qua tinctorēs vtuntur, siccandi vireis  
& astringendi habet. his etiam magna vulnera in duris glu-  
tinat corporibus, sanguinem erumpentem compescit, laxos  
cedentēsq; tumores discutit, ac omnibus malignis vlcēribus  
resistit. Sylvestris autem quum magis rodat, magisque ideo  
ficcet, valentius aduersus humidās putredines pugnat, ad  
cetera deterior, vt quæ mordeat: ceterum ob virium vehe-  
mentiam lienosis quoq; vtiliter adhibetur.

*Isopyron, aut phasiolum.*

**ISOPYRVM** phasiolumve semen amarū ac modicē acer-  
bum occupat, ob quod crassos glutinososq; humores & ab-  
stergit & incidit, sic vt corpora contrahat stringatque, hinc  
etiam quæ altē desidēt expurgat, excreationibus sanguinis  
non aduersatur.

*Itea, salix.*

**SALICIS** & folia & flos facultate cōstāt quę citra rosionē  
ficcet, habent etiam nonnullam astringentem, cortex autem



paulò ficior est, cuius perusti cinis ex iis habetur quæ vehementer exiccent, quippe clauos & myrmecias, cum aceto exerit.

*Ichthyocolla, gluten piscium.*

**I C H T H Y O C O L L A E** vis est opplere & ficcare. rectè miscetur emplastris capitis & glutinantibus, & iis quæ ad lepras tollendas & erugationem faciei conficiuntur.

*Que à C incipiunt.*

*Cancanus.*

**C A N C A N I** radix modicè ficit, & sine rosione ad opplendum infarciendumque accommodata, quare ex vino linctamansaque tragacanthæ & dulcis radiculae modo, arteriæ scabriciem iuuat.

*Cancamum.*

**C A N C A M V M** lachryma est arboris in Arabia, myrrhæ similis, odore grato, qua etiam ad suffitum vtuntur. vis eius est obesos extenuare, abstergere, & aperire obstructa.

*Cadmia.*

**C A D M I A** vtraque ficit, sed quæ botryitis quasi acinosa appellatur, tenuioris est substantiæ, placitis autè dicta crassioris. Ceterum concremata cadmia sine morfu deficit, abstergit, caua vlcera tum in oculis tum in toto corpore explent, & præsertim humidiora in naturis mollioribus, in durioribus efficacium magis vsus est.

*Cacalia.*

**C A C A L I A** viribus & vsu cum cancano conuenit.

*Calamagrostis, gramen arundinaceum.*

**C A L A M A G R O S T I S** ficit, hinc succus decoctumque radicum ipsius oculariis miscetur medicinis, semen vrinam cit, & stomacho benefacit.

*Calamintha, nepita.*

**N E P I T A** tertio ordine calida & sicca temperamēto, est tenuis acrisq; , menta longè valentior, siquidē est veluti syluestris mēta: facile igitur quæ altè hærent ad se trahit, eoq; sudores mouet, totum corpus digerit, ac rigores febriū qui circuitu remeant, finit, extrinsecus cum oleo infricata strenuè. quinetiā ad coxarum dolores ab inferioribus iniicitur, & vitiosos humores in cutem erumpentes abstergit.

*Calamus.*

**C A L A M V S** odoratus in secundo ordine calefacit, & ficit,



at, inest ei quippiā & subtile & astringens, vrinā itaq; citat, stomachicis, tū quē vtero & iocinori faciūt medicinis tēpe matur. Calamus autem phragmites extergit, folia ipsius virilia mediocriter refrigerant, cortex crematus calefacit sic patque in tertio ferē abscessu: radicem cum bulbis applicatam spicula & aculeos extrahere prædicant.

*Campe, eruce olerum.*

ERVCAE olerum cum oleo inuncta, tutos à virulentorū animalium moribus conseruare dicuntur.

*Cantharides.*

CANTHARIDES quæ in tritico reperiuntur luteis trāsuerim cingulis inuolutæ, aceti feruescentis vapore suffocata, ad plurima vtilis redduntur, quippe vngues scabros cum cerato eiiciunt, clauis scabiosisq; affectibus opitulantur, iam verò & exedentem vrentemq; vim habent: nonnulli verò etiam medicamentis vrinam prouocantibus momentum ex ipsis admistum exhibuerunt.

*Cannabis.*

CANNABIS semen flatus discutit, & siccat, vt & genituram exarefaciat, succus ipsius viridis ad aurium dolores ex obstructione creatos efficax est.

*Canopon.*

CANOPON sambuci flos est, de quo prius dictum est.

*Capnion, secundum alios capnos, fumaria.*

FUMARIA inde nomen sortita est, quòd succus ipsius copiosas lachrymas eliciat, etenim oculorum facit claritatem: acris amaraque est, vnde vrinas biliosas liberaliter prouocat, iocinoris obstructioni languoriq; medetur, stomachum confirmat & aluum emollit.

*Capparis.*

CAPPARIS radix extergit, probè purgat, incidit, discutitq; tum amaritudine, tum acrimonia: at acerbitate cōtrahit, stringit & densat, quapropter lienes induratos & pota & extrinsecus imposita, iuuat, menſeis promouet, pituitā per os educit, maligna vlcera sanat, dentium dolores sopit, tumores discutit, & vitilignes, quas alphos dicunt, aurium vermes enecat: folia autem & fructus similem quidem, sed imbecillio rem vim possident.

*Cardamum, nasturtium.*

NASTURTII semen sinapis modo vrit, vnde etiam indu-



Etum ruborem in cute excitat: cæterum crassos humores, cum aliis potum incidit, herba verò arida viribus respōdet, humida moderatior, ideòque crudam ipsam assument.

*Cardamomum.*

C A R D A M O M V M acre quidem & ipsum est, verum nasturtio inualidius: compos est etiam nonnullius amaritudinis, qua tineas alui interimit, & scabiem cum aceto exterit.

*Caris.*

C A R I S in pollinem detrita & cum radice bryoniæ pota tineas occidit.

*Canceri.*

C A N C R O R V M concrematorum cinis, fluuiatilium sanè ficit, erinaceorum & cochlearum modo, at totius substantiæ proprietate, canis rabidi moribus potu mirabiliter efficax est: vt in aliis dictum est, marinorum cinis eximia donatus siccitate his quidem non conuenit, sed iis qui magis ficcari desiderant, proficit. fluuiatilis cancer tritus si inducatur, spicula & aculeos eiicit.

*Caros.*

C A R I semen & ficit & calefacit in tertio ferè gradu, flatus discutit, vrinam mouet, idque non semen duntaxat, sed etiam tota planta.

*Carpesium.*

C A R P E S I V M odoratū est tenue, viscera obstructionibus liberat, vrinas mouet, & renes calculo laborantes purgat.

*Carya, nuces.*

N V X arbor tum in coliculis tum in foliis aliquid habet astringens, plurimum autem in nucum coriis existit. succus itaq; eorum decoctus cum melle, stomaticum fit medicamentum: interius inde putamen carinatum vsum extenuandi vim acquirit, & sine rosione ficit, quod in eo clauditur edēdo aptum, natura oleosum, facile in bilem conuertitur, confectumq; ex eo oleum extenuandi tumores, & putredines, quas sepedonas dicunt, discutiendi vim obtinet. Flaccescentes autem vetustate nuces, cutis vitia abstergunt. At auellanæ, quas & ponticas vocant & leptocarya, frigidiores sunt & austeræ, in cæteris, iuglandibus æquales.

*Caryophyllon.*

C A R Y O P Y L L O N, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam quæ nomine prætenditur, sed ex India veluti flo



ti flores cuiusdam arboris festuacei & nigri sunt, longitudine ferè digitali, odorati, acres, subamari, calidi & sicci in tertio propemodum ordine: qui multiplicis vsus sunt, tum ad obsonia, tum ad alia multa medicamenta.

*Cassamum.*

CASSAMVM hoc nonnulli balsami fructum esse dicunt, de quò suprà egimus.

*Cassia.*

CASSIA calefacit & siccāt in tertio ferè abscessu, tenuis abunde, acris & modicè astringens: incidit igitur simul & discutit, roburque instrumentis adiicit, postremo & mensis euocat.

*Castorium.*

CASTORIVM calefacit siccātque cum extenuandi viribus eximiis, quibus præter alias actiones, etiam neruorum qui ex copia humorum malè habent, affectibus, congruit, & refrigeratos faciliè recalfacit, & extrinsecus applicatum & potui datum, idq; ita, vt nullam aliam offendat particulam etiam si mediocriter febris affligat, quemadmodum in veternis & lethargis, sed & mensibus retentis proficit, & secundas expellit. at in cerebri & pulmonis vitiis etiam suffitus castorij inspiratu haustus, præclarè opitulatur.

*Caulis.*

CAVCALIN alij daucū syluestrem appellant, nam dauci modo calefacit, siccāt, vrinam mouet, & salsamento ad repositionem conditur.

*Cenchros, milium.*

MILIVM refrigerat in primo abscessu, siccāt, in secundo habet etiam modicam extenuandi facultatem: extrinsecus igitur in facculis ad fouendum & cataplasmatibus modo adhibendum, desiccare consuevit.

*Cedrus.*

CEDRVS & quæ fruticosa est iuniperò similis, & quæ arbor, calefaciunt, siccantq; in tertio ordine. confectum ex eis oleum quod cedream appellant, etiam quartum attingit, subtilis admodum substantiæ. hinc teneras carnes expedit & citra dolorem exedit, duras autem præsertimq; demortuas siccāt & à putredine asserit, pediculos, pulices, ascaridas, & aurium vermeis interficit, aliâque plura facit.

*Centaurium.*

CENTAVRII maioris radix acris, calida, & terræ astri-



ctionis compos est, mensēis itaq; promouet, foetus corrumpit, eiicitq; , vulnera glutinat, sanguinem spuentibus, & reliquis pectoris vitiis præsens est remedium. Minoris centaurij radix inefficax, est, coliculi validè & citra morsum siccant, vnde non solum ad quæ maius centaurium valet, sed etiam coxendice laborantibus, ipsius decoctum inferius iniectum, biliosa vacuat, nonnunquam & cruenta, ac valde proficit.

*Ceras, cornu.*

**CORNV** caprillum hircinūque concrematum denteis nitidos reddit, gingiuas nimia humiditate flaccidas compescit. Cerui autem cornu cum vino maceratum tritūque, deinde circumlitum mobileis sistit dēteis. Crematum, mox lotum, dysentericis, celiacis, sanguinem expuentibus, & arquaticis, duorum cochlearium instar auxiliatur: miscetur etiam oculariis medicinis. Taurinum cornu cum aqua potum, sanguinis eruptiones cohibet.

*Cerasia.*

**CERASIA** dulcia quidem citius per aluum descendunt, austera stomacho vtiliora sunt, acida verò ob incidendi vim quam habent pituitosis excrementosisque stomachis profunt, gummi verò cerasi arboris arteriam exasperatam laeuigat, & calculo laborantibus cum vino potum, succurrit.

*Ceratonia arbor.*

**CERATONIAE** fructus quæ ceratia dicuntur, siccandi & astringendi virtutis, nonnullius etiam dulcedinis particeps est.

*Cephale capita.*

**MENARVM** sale conditarum capita cremata, vim siccandi nō admodum acrem acquirunt, hinc sedis rimas & guttur diu induratum Scyrro sanāt. Smaridis caput totum combustum ad alopecias cum adipe vrsino proficit. Idem præstat etiam muris caput crematum cū melle. Milui aridum sine plumis, modo qui tribus digitis comprehendi queat, cū aqua potū ani dolores finit. Lacertæ verò caput aculeos educere tradunt, myrmecias, verrucas, & clauos exterere.

*Cecis, Galla.*

**GALLA**, omphacitis, quidem medicamentum est affatim astringens, eamq; ob causam siccatur, fluxiones repellit contrahitq; , laxa stringit, & partes imbecillas firmat, fluidisque omnibus affectibus accommodata est: ponitur autem in tertio siccantium ordine, secundo refrigerantium. Altera quæ

flauo



quo colore, inanis magnaque est, non tantam in siccando astringendo habet efficaciam, sedis inflammationes & haemorrhoidias excocta iuuat: gallæ verò combustæ & aceto distinctæ, sanguini supprimendo sunt.

*Cepæa.*

**C E P A E A** portulacæ similis est, folia ipsius contra vesicæ scabies vtiliter bibuntur, radix cum asparago, quem myanthinum, hoc est, corrudam appellant, pota, vrinæ stillididia, quæ ex obstructione fiunt, abigit.

*Cera.*

**C E R A** quum temperata sit, reliquorū medicamentorum materia efficitur, ipsa verò per se ex iis est, quæ læuiter abstergunt, nam & discutientē & calidā vim exiguam obtinet.

*Ceryces, buccina.*

**B V C C I N O R V M** testa concremata excellēter desiccatur contra rosionem, vnde vlceribus maleficis accommodatur, at in quibus quæ putredinem experiuntur, cum aceto, aut vino, aut xymelite ipsis vtendum est. oleum in quo veluti caro ipso adhuc viuentiū excocta sit, aurium dolores si instilletur, discutit.

*Cici, ricinum.*

**R I C I N I** fructus quemadmodum purgat, abstergit, discutit, sic etiam folium, sed imbecillius: de oleo tractatum est.

*Cinnabaris.*

**C I N N A B A R I S** acreis mediocriter vires habet, item nonnihil etiam astrictionis.

*Cinnamomum.*

**C I N N A M O M I** vis est summè tenuis, non item æquè calida, sed tertij ordinis, nihil autem ex iis quæ parem ipsi caliditatem referunt adeò siccatur, propter substantiæ tenuitatem. Cinnamomis autem veluti inualidum quoddam cinnamomum est, quod nonnulli pseudocinnamomum vocant.

*Circea.*

**C I R C A E A E** radix calida est & odorata, quæ cum vino pota foeminarum locos purgat: semen in sorbitione sumptum lac generat.

*Cisseris, pumex.*

**P V M E X** absterforius est præsertim dentium, non modò viribus, sed etiam scabritie, coniicitur autem in medicamentis quæ carni vlceribus inducendæ sunt, item in ea quæ cutis labes exterunt. Crematus tenuior quidem, sed mordax redditur: lotus, id quod mordet, deponit.



*Cisthos.*

CISTHOS aut Cissaros frutex est astringens & modicè frigidus virtute, folia ipsius & germina adeò siccāt, vt etiam vulnera conglutinent: at flores quum in secundo ferè gradu ficciores sint, dysenteriiis, aliisque fluidis vitiiis accommodati sunt: extrinsecus illiti, putrida vlcera compescunt.

*Cissos hederæ.*

HEDERA contrariis constat viribus, vt quæ astringat & refrigeret. Item acris est & calida, aqueæ substantiæ & tepida quū viridis est, particeps: cuius folia vino incocta vulneribus glutinandis, ambustis, & lienosis salutariter adhibentur, succus ipforū naribus ad pituitā educēdam infunditur: item diuturnis aurium defluxionibus succurrit: lachryma hederæ, vt quæ acrior sit, pediculos enecat, & pilos abolet.

*Citrium, quod & malum medicum dicitur.*

CITRII medium acidum aut qualitatis expers est, in quo semen tertij refrigerantium siccantiumq; ordinis habetur, cortex siccatur in secundo quidem abscessu, sed non item refrigerat, acri virtute præditus, caro ipsius crassi succi est pituitæ generandæ apta, & frigida: semen discutit, & in secundo ordine desiccatur, folia arboris siccandi discutiendiq; vim repræsentant.

*Cichorium, intybus sylvestris.*

CICHORIVM picrisve tanquam syluatica feris est, refrigerans siccansque in primo abscessu: habet etiam vim astringendi, qua ad hepaticas dysenterias conuenit.

*Clematis.*

CLEMATIS quibusdam daphnoïdes, aliis myrsinoïdes, nonnullis polygonoïdes, sarmenta habet oblonga, crassitudine iunci quem holoschoenum dicunt, folium verò lauri, siccandi virtute pollet, qua alui fluores, quam diarrhiam dicunt, dysenteriam, & dentium dolores finit: contra venenatorum morsus rectè imponitur.

*Clematis altera.*

CLEMATIS altera arboribus similacis modo circumuoluitur, acri & caustica facultate donata, huius semen cum aqua potum, pituitam & bilem per inferiora educit, folia autem ad lepras arcendas inducuntur.

*Clinopodion.*

CLINOPODII vis est calida siccaque, nondum vero adurens, sed tertij ferè ordinis.

Cni



*Cnicus.*

CNICI semine ad purgandam aluum duntaxat vtimur, quis extrinsecus eo vtatur, tertij siccantium ordinis erit.

*Conchylia.*

CONCHYLIA buccinis facultate proxima sunt.

*Cœlia, venter.*

VENTER mergi, aut recens coctus, aut inarefactus, esu stomacho utilis esse dicitur: similiter etiam gallinarum interior alui membrana sicca potui data: verum Galenus experimento falsum vtrunq; se inuenisse scribit. Palumbi ventrem paulatim potum calculos per vrinam elice, testis est Dioscorides. Mustelæ aluus pota contra quæli et venenata amuletum dicitur.

*Coccus cnidios, granum gnidium.*

GRANVM gnidium semen est thymelææ, non chameæ, vt quidam opinati sunt, acri & adurente facultate præditum, hoc epotum, per inferna aquas detrahit.

*Coccus baphicos, granum tinctorium.*

GRANVM tinctorium leniter siccatur, vnde magnis & neruorum vulneribus, cum aceto aut oxymelite læuigatum, commodè imponitur.

*Coccymelæa, prunus.*

PRUNI fructus ventrem subducit, recens magis, aridus minus: decocto ipsius, gutturis inflammationes utiliter colliguntur. Gummi quod ex arbore destillat, incidendi vim exsequendiq; testatur, ob quod nonnulli frangendis vesicæ calculis esse cum vino potum affirmant: ex aceto, puerorum convulsiones per sanare. Syluestrium prunorum baccae euiusmodi astringunt, ventremq; reprimunt. Nominatur hæc melanta in Asia prunum. Domestica verò pruna sicca, quæ nunc Damascena appellantur, quemadmodum Galenus memoriæ mandauit.

*Colla, glutinum.*

GLUTEN quod ex simila & polline conficitur, emplastrum vim & concoctricem repræsentat.

*Colocynthis, cucurbita.*

CUCURBITA humidi, frigidiq; in secundo abscessu temperamenti est, vnde tota si applicetur, calidas refrigerat inflammationes.

*Colocynthis, cucurbita sylvestris.*

CUCURBITA sylvestris validâ purgandi vim obtinet: viridis



ridis ipsius succus infricatus, coxendicum doloribus auxiliatur.

*Comaros, arbutus.*

ARBUTVS, & arbor, & fructus acerbæ qualitatis est, vocant eum memyrcoelon: cæterum stomacho aduersatur, & capitis dolorem facit.

*Commī, gummi.*

GUMMI siccante vi & emplastica pollet, & nimirum asperitatibus medetur.

*Conia, lixiuium.*

LIXIUIVM veluti cineris lotium nominatur: omnium maximè abstersorium & siccās est, quod ex fici & tithymalli cinere præparatur, ac ferè iam exedens: quod si calx etiam cineri addatur lixiuium redditur adurens: quod iam etiam protofacton nuncupant, clysterium potissimum medicinis miscetur. Vehementissimum vero omnium est, quod ex sola calce conficitur.

*Conyza.*

CONYZA vtraq; siccatur & calefacit in tertio ordine, hinc etiam oleum in quo decoquitur rigores febriū circuitu remeantes discutit: flores idem præstant, quorum decoctum mēseis citat, & foetus extrahit: quæ vero in humidis regionibus nascitur, odore grauior & inefficacior est.

*Copros, stercus.*

STERCVS quodlibet calefacit, maximè siccatur & discutit: variat autem pro animantis quod ipsum reddit temperamento, & victus ratione. itaque canum quum ossa vorauerint simus inarefactus, dysenterias cum scisso lacte, quod Græci schiston vocant, potus, sanat: idem verusta vlcera reficit, si medicamentis in ea efficacibus misceatur. Hoc angina, tonsillarumq; inflammationes cum melle inunguntur. At puerorum qui victu non superfluo educati sunt stercus, huic malo magis prodest. Luporum quod & ipsum cādidius in fruticibus reperitur, coli doloribus strenuè succurrit, non potum modò, sed corpori etiam adalligatum: alligetur autem ex lana ouis à lupo enectæ, aut pelle ceruina. † Caprillum stercus acrius, magisq; discutiens, scirrosos tumores applicatum dissipat, præsertim in duris corporibus: crematum verò valentius abstergit, extenuatq;. Bubulum extrahendi quandam vim obtrinet, ideoq; vesparum & apium ictibus



tribus medetur: quinetiam toti corpori in sole oblitum  
 quas inter cutem præclare iuuat. Ouium verò cum aceto  
 yrmecias, acrochordonas, furunculos & clauos, persanar.  
 olumbarum syluestrium, quas palumbes latini dicunt, a-  
 os longè acrius cum nasturtij semine cutem exulcerat. Gal-  
 minarum ex oxymelite, aut aceto, aut mulso potum, vom-  
 one strangulantes fungos educit, præsensq; est remedium:  
 poc quoq; colico dolore conflistantibus potui quidam ex-  
 andibebant. Nonnulli verò & ciconiarum fimum orthopnoi-  
 potum auxiliari affirmant. Murium fimus reliquis ab-  
 igit efficacius, eoq; alopecias curat, & infantium sedi ap-  
 ositus, ad excretionem proritat. Sturnorum qui oryza pa-  
 i fuerint, abstergendi vim præ se fert, qua cutis asperita-  
 pes, quas ephelidas Græci vocant, exterit. Terrestrium cro-  
 odilorum fimus vitiligines, quas alphos dicunt, extergit:  
 uemadmodum fluuiatilium, oculorum albugines exte-  
 uare creditur.

† In Cod. antiquis, hæc verba ita leguntur. κόπος αἰγῶν, σπύραθι  
 ἰδίως ὀνομάζονται, ἀριμῆας καὶ διαφορῆμῆας ὅτι διωάμεως τοῖς  
 μίρρα, μέλιναις ὄγκοις ἀρμότιστα, οὐ σπληνὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆ ἀλ-  
 γου μέρει. Ἐγὼ γὰρ ἐπὶ γόνατος ἔχοντος ὄγκον χρόνιον, δύσολυτον,  
 χρυσάμην αὐτῇ δι' ὄξυνδάτῃ καταπλάττειν καὶ κελύσαι ἀλστρον  
 ῥιθινον ἐμβαλλομένης καὶ κόπος. Quæ verba quoniam conuersa sunt  
 in latinum sermonem ab interprete Actij, ex quo huc tralata, tu apud  
 auctorem lege.

*Corallium.*

CORALLIUM veluti arborea planta est in lapidis du-  
 ritiam coalescens, crescit non in terra, sed in alto maris, co-  
 lore rubrum, lapidi simile, siccandi validam, astringendi  
 mediocrem vim possidet, ideoq; cruentis sputis, & dysente-  
 ricis vtile.

*Coris animal, cimex.*

CIMEX acri virtute pollet. Scribunt igitur quidam cum  
 aceto potum hirudines eiicere.

*Coris herba.*

CORIS herba, quam alij vocant hypericon, acris est, &  
 odorata, semen eius ad vrinam & menses ciendos bibitur:  
 succurrit & phalangiorum moribus, item ad opisthotonon  
 cum oleo inungitur.

*Corianum seu corium, coriandrum.*

CORI



C O R I A N D R V M ex contrariis viribus compositum est, tenuis substantiæ, terrenæ, amaræ, aquosæ autem humiditatis tepidæ particeps, habetq; modicā vim astringendi, quapropter inflammationibus, erysipelatis non admodum frequentibus conuenit, tumores molliusculos cum quodā in id efficaci discutit. Semen modicè quidem cum passō bibitum, tineas pellit: liberalius autem sumptum, mentem tentat.

*Corydos, aut corydallus, Galerita siue alauda.*

A L A V D A auis simplici iure elixa, coli cruciatibus opitulatur: assumi autem cōtinuè & sæpe cum ipso iure debet.

*Coronopus, pes cornicis.*

C O R O N O P O D I S radix & ipsa ad colicos cruciatus proficere manducata creditur.

*Costus.*

C O S T V S modicum quidem amaritudinis, plurimum verò acris & calidæ qualitatis habet, vnde in quibus vel calefacere particulam quampiam cogites, vel ex alto in summa humorem aliquem elicere, ad costum confugiendum est: urinam igitur & menseis ducit, tineas enecat. Quum verò & flatulenti cuiusdam particeps sit, venerem cum mulso potus stimulat, coxendicum doloribus, resolutis, febriū rigoribus ante accessiones, cum oleo infricatus, conducit.

*Cotyledon, acetabulum.*

A C E T A B V L V M refrigerat, repellit, abstergit, & dissipat: folia ipsius cum radice manducata calculos comminueret, & urinam ciere creduntur.

*Cochlea.*

C O C H L E A E concremata impensè ficcant, & mediocriter calefaciunt, conferunt dysenteriiis, quas nondum putrelago obsedit, si misceantur harum partes quatuor, piperis albi pars vna, gallarum partes duæ. At quæ ignem non sunt expertæ, si cum tegumentis in pollinem coactæ ventri imponentur, aquam subter cutem exinaniunt, prosunt item articulariis doloribus applicatæ, quoad sua spōte deciderint: in vniuersum humorem altè insertum validè desiccant.

*Crania, cornus.*

C O R N I arboris fructus acerbus, si edatur, validè ventrem astringit. folia autem & germina acerbitate vehementer ficcant, adeò vt etiam maxima durorum corporum vulnera conglutinent.

*Cram*



*Crambe, brassica.*

**BRASSICA** quæ edendo est siccata, & manducata, & à  
 ris imposita, non tamen acrem conspicuè vim ostendit,  
 q̃; vulnera glutinat, & dolosa malignaq̃; vlcera, ac tumo-  
 res solui contumaces persanat: habet etiam nonnihil abster-  
 gium, quo lepras extergit. Semen ipsius potum tineas occi-  
 dit, præsertim Aegyptiæ: caulium crematorum cinis aduren-  
 ti vi constat, cum adipe longis laterum doloribus utilis. Syl-  
 vestris autem brassica, sativa in omnibus validior est, unde  
 nec intra corpus citra noxam sumitur. Marina, subsalsa le-  
 viter, interq̃; amara, aluum solvit.

*Crataegonos.*

**CRATAEOGONI** herbæ semen & acre gustanti depre-  
 ssibenditur & frigidum, milio simile.

*Crethmon.*

**CRETHMON** falsum est simul & amarum, sed modicè,  
 suare & vis ipsius est abstersoria & desiccans.

*Crithe, hordeum.*

**HORDEVM** refrigerat siccataq̃; in primo abscessu, verù  
 nonnihil etiam extergit: cæterum fabarum lomento sicci-  
 tate præcellit, minus flatulentum est, polenta hordeo multo  
 magis siccata, pitisana præterquàm quod largius humectat,  
 etiam † abstergit vehementius.

† In altero manu scripto his verbis hæc sunt adscripta, οἱ δὲ ἐν τῶν  
 ἀγῶν γινόμενοι ἀγῶν ἀγῶν τῶν ἐν τῶν πύγων ἀγῶν, id  
 est, panes qui ex hordeo conficiuntur, minus alunt quàm qui ex tritico.  
 Quæ hæc traducta sunt ex Aëtio.

*Crimnon.*

**QVOD** in tritici & zeæ farina crassius est, crimnon ap-  
 pellatur, validius nutriendum quàm polenta: ægrius autem  
 conficitur.

*Crinon, liliū.*

**LILII** flos temperamento mixtus est, ex tenui substan-  
 tia, terrestri & nonnulla aquosa temperata: quapropter o-  
 leum quoque ex eo confectum discutiendi vireis, mollien-  
 diq̃; repræsentat, vulgæ inflammationibus accommodatum.  
 Radix ac folia siccant, absterunt, discutiuntq̃; mediocri-  
 ter, quò sit vt ambustis conferant: succus ipsorum, & ner-  
 uorum



uorum vulneribus cum oxymelite prodest.

*Crocodilion.*

CROCODILII semen & succus calidam, siccam & discutientem vim præ se fert, vrinas itaque & menses mouet, radix excreationes è pectore iuuat, item sanguinem per nares ducit.

*Crocus.*

CROCVS ad secundum calefacientium ordinē, primum siccantium refertur, astringit & concoquit.

*Crommyon, cepa.*

CEPA ex quarto calefacientium ordine habetur, substantiæ crassioris, quam obrem hæmorrhoidas appositu aperit, item abstergit: vitilignes, alphas dictas, cum aceto exterit, & alopecias ocus alcyonio pilos restituit, succus oculis suffus aut crassi humoris vitio hebetibus auxiliatur.

*Cyamos, faba.*

FABA non multum à medio temperamento recedit, siue refrigerando, siue siccando: caro ipsius nonnullius etiam absterforiæ qualitatē est, excreationibus è thorace & pulmonibus utilis: quum autem cortex fabæ nonnihil quoque astringat, tota ipsa faba in posca decocta celiacis, & dysentericis conducit, inducta vero cataplasmatē modo inflammationibus & tumoribus medetur, lac in mammis extinguit.

*Cyanos.*

CYANOS acrem habet vim detrahendi, & discutiendi maiorem quàm cinnabaris: astrictionis quoque particeps est.

*Cyclaminus.*

CYCLAMINVS varias vireis habet: etenim extergit, incidit, aperit, attrahit, & dissipat: succus itaque ipsius hæmorrhoidas sedi admotus aperit, duritias cum aliis discutit: cum melle, suffusis proficit, per nareis purgat, abdomini inunctus aluum subducit, foetus corrumpit: radix autem tota succo quidem est imbecillior, sed & ipsa vehemens adeo est, ut cum mulsā instar trium drachmarum pota, interanea expurget: cæterum cutis vitia exterit. Altera cyclaminus, quam etiam cissanthemon vocant, radice donata inutili, semen habet efficax, ut potum priori similia faciat.

*Cuminum, cuminum.*

GYMINVM in tertio ordine calefacit, vrinam mouet, & flatu



darus discutit.

*Cynobatos, rubus caninus.*

**R V B I** canini fructus non instrenuè astringit: folia id præstant mediocriter. at quod in fructu lanæ speciē præ se fert, ceu arteriæ inimicum caueri debet.

*Cyparissus, cupressus.*

**C V P R E S S I** galbuli & turiones siccandi viribus pollent, nullo calore conspicuo: quapropter vulnera magna in duris corporibus conglutinant, & superfluis putridinibus in alto fixas humiditates, citra noxam depascuntur, intestinorumq; ramicibus opitulantur.

*Cyperus, iuncus angulosus.*

**I V N C V S** angulosus calefacit siccâtq; citra morsum, hinc etiam humidioribus vlceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris vlcera persanat: habet & vim quandam incisoriâ, qua calculos cōminuit, urinâ & menstrua promouet.

*Cypros.*

**C Y P R I** folia & furculi mixtis constant viribus, discutiēte & astrictoria, tum ea quæ sine offendiculo & morfu siccet: idéoq; decoctum ipsorum ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Itē oris eruptiones, quas aphthas vocant, commanducata, persanat: item medicinis lieni dicatis miscetur.

*Cytisus.*

**C Y T I S I** folia discutientis leniter, & tepidæ naturæ sunt. quemadmodum & maluæ.

*Conium, cicuta.*

**C I C V T A E** vires summè refrigeratorias esse, omnibus constat.

*Conos.*

**C O N I** cortex & folia, pinum viribus repræsentant, sed acriora efficacioraque sunt: fructus, quem etiam strobilon appellant, viridis, amarum quiddam & acre, cum humiditate possidet, quare thoracis affectibus ad facilem excreatum accommodatur: esculentus in aqua maceratus vt acrimoniâ exuat, temperatus redditur, rosionis experts, opplens obstruensq; vt etiam asperitates læuiget.

Quæ ab L ordiuntur.

*Lagopus.*

**L A G O P V S** siccæ facultatis est, quæ alui fluores desiccet.

K



*Ladanon.*

LADANON à cistho ladone dicta gignitur, quam depascentes capellæ barbis suis & villosis cruribus succulentū & pinguius ex herba deferunt, quod congestum ladanon est medicamen præstantissimum, in secundo ferè abscessu calidum, natura tenue, emolliens mediocriter, discutiens & co-coquens, eoq; vteri affectibus peculiariter conuenit: habet præterea nonnullas astringendi vires, quibus defluos capillos confirmet.

*Lathyrus.*

LATHYRIN & ipsam tithymali speciem esse dicunt, quòd eius succus, illius modo purget, semen autem huius præcipuam purgandi vim habet.

*Lapsana.*

LAPSANA manducata stomacho nocet, inducta verò cataplasmate nonnihil abstergit discutitq;.

*Lapathum, rumex.*

RUMEX mediocriter discutit: acuta rumex, quæ oxylapathum dicitur, præter id etiam pauxillum repellit: semen autè præsertim oxylapathi, astringens, alui profluuia, diarrheas dicunt, & dysenterias per sanat, folia verò semini contraria faciunt: hæc etenim comesta aluum mouent, illud potum ipsam comprimit.

*Lemonium.*

LEMONII fructus austerus cum vino celiacis, dysentericis, & sanguinem spuentibus datur, item ad fluorem muliebrem acetabuli mensura.

*Lichen herba.*

LICHEN herba in petris nascens muscum representat, vis ei est exterendo purgare, mediocriter siccare, & refrigerare: impetigines sanat, inflammationes arcet, & vt Dioscoridis verbis utar, sanguinis eruptiones sistit.

*Lichenes equorum.*

LICHENES equorum triti cum aceto, comitialibus, & omnium venenatorum moribus mederi feruntur.

*Leontopetalon.*

LEONTOPETALI radix & sicca & calfacientis in tertio ordine facultatis est, nec non discussoria.

*Lepidon.*

LEPIDION, quam & hiberiada vocant ex quarto calefacien



ientium gradu est, nasturtio proximum viribus, minus autem eo deficcet.

*Lepis, squama.*

**SQUAMA** omnis validè siccatur, astringit, nec ignauiter mordet. Sed æris amplius siccatur, extenuaturque, cui nonnihil ruginis adest, magisque ea quæ ex Cypriis clavis raditur, quæ propterea etiam helitim quasi claualem appellant. At ferri squama liberalius astringit, atque hac magis stomomatis, quæ propter ad contumacia maligna ve vlcera præstantior est, sed æris, carnem magis purgat & consumit.

*Leucacanthum.*

**LEVACANTHI**, quod alij polygonatū, alij ischiada vocant radix incidit quidē, & in tertio ordine siccatur, in primo autem calefacit.

*Leucas.*

**LEVCA** s calfacit siccaturque in tertio ordine, acrimonia ve- ro præpoller.

*Leucoion, viola alba.*

**ALBAE** violæ totus frutex abstergerendi extenuandique vires possidet, magis autē flores, & ex eis, sicciore: idcirco & mensis stimulant, fœtus corrumpunt expelluntque, ac si quis aquæ mistura vim ipsorum obtundat, etiā inflammatio- nibus conducent, præsertim vteri: radices eadem præstant, crassiore magisque terrestri natura præditæ: ex aceto inflam- mationibus in scirrhum indurescentibus imponuntur.

*Leuce, populus alba.*

**POPVLVS** alba aquosa, tepida, terrestriq; constat substā- tia, viribus absterforiis.

*Libanotides, rosmarinus.*

**LIBANOTIDES** tres numerantur, una sterilis, duæ fru- ctum ferentes, vires illis extergendi, incidendi, discutiendi, & emolliendi, succus earū oculis ex humorū crassitie hebe- ditibus salutariter ex melle imponitur: coronariæ verò liba- notidis decoctæ ius regio morbo laborantibus rectè bibitur.

*Libanotos, thus.*

**THVS** in secundo ordine calefacit, in primo siccatur, habet & modicam quandā vim leuiter astringentem: cortex ipsius manifestò astringit, siccaturque in secundo abscessu absolute, crassior thure & minus acris, hinc sanguinem spuētibus, dydentericis, celiacis, & stomachicis, tum foris imposi-



tus, tum intrò assumptus, salutaris est. Surculus ipsius calefacit siccátq; tertio in abscessu, atq; nonnihil extergit: quo circa oculorum vlcera, & purgat & explet.

*Lygnis, fuligo.*

FULIGO specierum quorundam cōcrematarum, nempe thuris, myrrhæ, terebinthi, styracis, picis liquidæ, cedri, veluti tenuissimus quidam pulvis est, qui Græcis æthale dicitur, cū fumo ascendēs. obtinet quidē siccantem & terrestrem tenuémque substantiam particulares autem ipsius differentia secundum materiæ combustæ rationem fiunt. Utuntur ea potissimū in medicinis oculariis, & ad honestandas palpebras accōmodatis. at thuris fuligo omniū est vtilissima; ut quæ mitior: contrà pini, coni, & piceæ valentior est, quo fit ut ad glabrescentes palpebras, destillantes & erosos oculorum angulos, illachrymantésq;, rectē adhibeatur.

*Ligysticum, ligusticum.*

LIGYSTICI & radix & semen adeò calefaciunt ut mensis citent, flatúsq; probè discutiant.

*Lithargyros, argenti spuma.*

ARGENTI spuma mediij inter metallica ordinis est, eoq; ceu materie ipsa aliis medicinis mista subinde utimur, siccet tamen mediocriter, abstergit & astringit: inde femorum attritus persanat.

*Litthi, lapides.*

LAPIDES omnes terræ modo desiccant, sed hæmatites astringit & abundē siccet. quare etiam oculorum asperitates exerit, quum quidem inflammatione carēt, ex aqua: quum verò illa tentantur, ex ouo: cæterum ad sputa cruenta bibitur vtiliter, vlcera supercrescētia compescit. Schistos lapis superiori quidem consimilis est, sed imbecillior, mox galactites, id est, lactarius sequitur. Melitites cuiusdam etiā caloris compos est. Moroxus, quem etiam, leucographida vocant, quò prædictis omnibus mitior est (nullas enim habet vireis efficaciores) eò moderatior, magisq; dolorem lenit, eamq; ob causam in teneris corporibus cum cerato ad cicatricem vlceribus obducendam, illo utuntur. Iaspis qui subviridi colore est, quum efficacior sit, oculorum cicatrices & pterygia extenuat: viridis autem Iaspis ad alligatus & in anulo gestatus stomachum adiuuat. Iudaicus dictus, rennum calculos conterit, unde etiam recentiores recolithon appellant. Pyrites ex eorum numero est, qui validē discutiunt



tiunt tumores, sanguinemque in grumos concretum: cuius quum facultas non est, molari vtuntur. Phrygius præter quã quod valenter desiccatur, non nihil etiam astringit roditque, vnde & repellere & discutere potest, eoq; oculariis miscetur remediis. Ageratus astringendi discutiendiq; virtutis compos, gutturis inflammationẽ iuuat. Asiæ petræ flos tam subtilem naturam habet, vt carnes humiditate flaccidas citra rofionem absumat. Gagates affatim siccans inflationibus præsertim diuturnis expedit. Magnes, quem & Heraclium lapidem vocant, æquales hæmatiti vireis repræsentat. Arabicus ebori similis, siccandi detergendiq; vireis habet. Alabastrite combusti cinerem stomachicis nonnulli bibendum exhibent. Smyris extergit, dentibus purgandis accommodatus. Qui in spongiis inueniuntur lapilli, renum calculos frangunt. Similes his vireis habent qui in Argæo Cappadociæ monte nascuntur. Similiter & ophites dictus, qui ad alligatus contra viperarum morsus confert. Ostracites, hoc est, crustaceus, & geodes à terra quam intra se complectitur appellatus, abundè siccare feruntur, idèoq; inflammatis tumoribus mederi. Naxiæ cotis detrimentum refrigeratorium esse dicunt, vt & virginum mammas & puerorum testiculos ne crescant, reprimat. Quod verò ex olearia cote detritum fuerit, absterforia vi donatum alopecias explet. Hieracitin & Indicum lapidem alligatum contra hæmorrhoidas valere perhibent. Sapphyrus potus, scorpionũ ictibus aduersatur. Aphroselenes, comitalibus potui datur. Armeniacus, inferiorem ventrem purgat, sed stomacho nocet.

*Lithospermon.*

LITHOSPERMON, quod alij Liosporon, alij heraclion vocant, herbæ ætonychi dictæ, semen est lapidosum, albũ, quod cũ vino albo potum calculos frangit, & vrinas eiicit.

*Linospermon, lini semen.*

LINI semen ex primo gradu calidum est, inter humectantia siccantiaq; medium. manducatum flatibus creandis est, etiam si frictum fuerit.

*Linozostis, herba mercurialis.*

HERBA mercurialis aluum liberaliter subducit, inducta cataplasmatismodo discutit. Sciendumq; est eius semen in fricatum corporis excrescentias præter naturam, quas vulgus vocat naphia, abolere, sicut experientia comprobatum



est. Sed viride semē esse oportet, & frequenter ipsum tuberculis illis infricare.

*Litrum, nitrum.*

LITRUM medium inter aphronitrum & salem virtute est, crematum magis extenuat discutitque, & si intro sumatur, crassos viscososque humores plus ceteris incidit & extenuat. Chalastrum verò (est autem Chalastra Thessaliae locus) acrius ficcantiūsq; est, quare ad capitis destillationes & articulares cruciatus eo vtuntur.

*Lonchitis.*

LONGCHITIDIS, cui semen triangulū est, cuspidis modo, radix dauco æqualis urinam mouet: eius verò quæ scolopendrio respondet, folia viridia, vulnera glutinant, sicca verò cum aceto pota lienibus scyrrho induratis, medentur.

*Lycopsis.*

LYCOPSIS radix quum sit astrictoria, cum polenta admota in cataplasmate, Erysipelatis auctore Dioscoride cōuenit: si læuis cum oleo inungatur, sudores elicit.

*Lycium.*

LYCIUM ex diuersis genere substantiis constat, calida, tenui, & discutiente, terrestri verò frigida & leuiter astringente, vt in secundo abscessu deficcet, calefaciendo refrigerandoque; medium est, hac de causa ceu absterforio, in oculis obscuratis eo vtuntur: tanquam astringenti, in cœliacis, dysentericis, & maleficis vlceribus: at contra inflammationes, vt discutienti: ceterum primas obtinet Indicum.

*Lysimachium.*

LYSIMACHIVM vim habet excellenter astrictoriam, qua & vulnera glutinat & sanguinem cōpescit, tum ipsum, tum ipsius succus, dysentericos & potum & ab inferioribus partibus iniectum, sanat.

*Lychnis.*

LYCHNIDOS coronaria semen calidum est & siccum in secundo abscessu, eoque absoluto.

*Lotus herba.*

LOTUS domestica, quam nonnulli triphyllon appellant, absterforias vireis obtinet & modicè ficcanteis, calore temperata est. At syluestris loti semen ad secundum calefacientium ordinem referrur, habet autem nonnihil etiam absterfo



sterforium. Aegyptiæ semen in panes quoque effingitur.

*Lotus arbor.*

LOTUS arbor extenuat, siccat, & mediocriter astringit, quæ de causa ad fluxum muliebrem, alui fluores pota cum vino aut aqua, aut etiam in aluum data, salutaris est, pilos de fluos confirmat.

Quæ ab M auspiciantur.

*Macer.*

MACER cortex est qui ex India importatur, tertio ordine siccat, inter calorem & frigiditatem medium obtinet: est etiam astringens tenuisque, unde cœliacis & dysentericis auxiliaris habetur.

*Malobathron.*

MALOBATHRI folium æquales spicæ nardi vireis representat.

*Malache, malua.*

† MALVA sylvestris mediocriter discutit & emollit: hortensis autem, ceu humidior, etiam imbecillior est: semen tantò viribus præstat, quanto & siccus est.

† Huic capiti addita sunt quedam in veteribus manuscriptis de dendromalache, quæ quia totidem verbis apud Aëtium leguntur, adscribenda non putavi.

*Mamiras.*

MAMIRAS veluti radícula herbæ cuiusdam est ceu geniculis frequentibus nodosis, quæ cicatrices & albugines extenuare creditur, exterendi nimirum facultate prædita.

*Mandragoras, mandragora.*

MANDRAGORA tertij refrigerantium ordinis est: mala ipsius caliditatem quampiam & humiditatem referunt, unde soporem grauem homini possunt accersire: at radice cortex vehementissimus, non refrigerat modò sed etiam siccat: interior eius pars imbecillior est.

*Manna thuris.*

MANNA thuris simile isthuri vircis habet, sed remissas & sensim astringentes.

*Marathron, fœniculum.*

FœNICVLVM calefacit in tertio ordine, in primo siccat, hinc etiam lacti generando est, & suffusis auxiliatur.

K 4



*Mastiche.*

**MASTICHE**, Chia quidem calefacit siccaturq; in secundo abscessu, ceterum composita est facultatis, astrictoria simul & emollientis: hanc ob rationem stomachi, ventris, intestinorum & iocinoris inflammationibus conuenit. Aegyptia, nigriore colore quodammodo, siccatur magis & discutit, minus astringit, hinc furunculos quoque dissipat.

*Melan, atramentum Indicum.*

**ATRAMENTUM** Indicum auctore Dioscoride in genere leniter astringentium est, quae inflammationes laxosq; tumores, oedemata vocant, rumpunt, vlceraque purgant.

*Melantheria, creta sutoria.*

**CRET A** sutoria impense astringit extenuatque.

*Melan, atramentum scriptorium.*

**ATRAMENTUM** quo scribimus abunde & ipsum desiccatur, solutum vero posca ambustis si illinatur, praesenti est remedio.

*Melanthion.*

**MELANTHION** in tertio ordine calefacit & desiccatur, est etiam tenui natura praeditum: unde destillationibus in fauces, olfactu prodest, intus assumptum discutiendis flatibus singulare: est etiam amarum, unde tineas interficit: abstergit & incidit, hinc orthopnoeis quoque conuenit, item lepras exterit, myrmecias eiicit, & menstrua incitat.

*Meli, mel.*

**MEL** calefacit & siccatur ordine secundo, abstergitque insigniter: coctum vero minus quidem acre redditur, deterforium, & ventri subducendo accommodum, sed magis nutrit. Amarum mel, sicut & id quod in Sardinia fit, mistas habet vires, terrestrem & calidam. At mel, sacchar quod ex felici Arabia conuehitur, minus dulce nostro est, sed aequaleis vires obtinet, praeter quam quod nec stomacho noceat, nec sitim faciat, quemadmodum hoc Nostras.

*Melia, fraxinus.*

**FRAXINUS** nota arbor est, folia eius pota viperarum moribus succurrunt: cortex crematus, illitusque ex aqua lepras separat, ligni vero ramenta si bibantur, lethalia esse ferunt.

*Melilotos, fertula Campana.*

**SERTULA** campana mixtis facultatibus pollet: astringendi, discutiendi & concoquendi.

*Melis*



*Melissophyllum, apiastron.*

**APIASTRUM** viribus marrubio per omnia respondet.

*Memaculos.*

**MEMACYLOS** arbuti fructus, in litera C comprehensus est.

*Mespila.*

**MESPILA**, alij tricocca quasi trigrania vocant, fructus affatim acerbus, & vix esculentus, aluumque continens: nigra minima foliaque mespili impensè acerba sunt.

*Medion.*

**MEDII** radix vireis semini contrarias præse fert, quip-  
austera est & fluxiones comprimit, ideòque muliebrem  
mixturem sistit: semen quum tenuis incidentis que sit faculta-  
tis, mensis quoque proritat.

*Mecon, papaver.*

**PAPAVER** multiplex est: hortensis quidem, quod etiam  
hylacitin ceu vtricularium vocant, semen est esculentum,  
cum pane assumatur, mediocriter somnum concilians. At  
ceas appellatum, inde quòd semē ipsius celeriter defluat,  
validius hortensi est: manducatur itaq; non per se, sed mo-  
mentum copiosiori melli mixtum. Quod veluti decidenti,  
depresso calyce est, nigrum semen habet & medicatum,  
minus quàm frigidum. Quod prolixiore & proceriore con-  
stat calyce, medicatius quàm cætera omnia existit, vt etiam  
tuporem inducat, quousque interimat. Nam & ipsum &  
lachryma, quam per excellentiam opion nuncupant,  
quarto refrigerantium abscessui ascribuntur. Cornicu-  
papaver abstergerendi vireis sortitur, ideoque radicis  
decoctum potu iocinorosis auxiliatur: folia autem &  
dolos perquàm sordida vlcera expurgant, crustasque tol-  
lunt. Heraclion & aphrodes id est spumofum papaver di-  
ctum, semen habet pituitæ purgandæ accommodatum.

*Mela, mala.*

**MALIS** omnibus frigida & excrementitia inest humidi-  
tas: & quæ in eorū censu resoluta & aquosa sunt, frigiditate  
cæteris & humiditate præstant: dulcia, aquosa quidem, non  
tamen manifestè frigida sunt austera dulcibus quidem fri-  
gidiora, sed minus humida: acida frigida quidē & ipsa, ve-  
rum incidendi humores ventriculo inhaerentes vim restan-  
tur: acerba, cuiusmodi cotonea & struthia sunt, frigido &  
terrestri donata temperamento, ventrem supprimunt, vul-



nera glutinant pari modo folia, succi, & cortices arborum inter se differunt.

*Melea, malus, persica.*

M A L I persicæ surculi & folia euidenter amara sunt, eoq; concisa tritaq; vmbilico imposita, tineas enecant: fructus autem ipsius, nempe persicum hoc esculentum, in secundo ordine frigidum humidumque existit.

*Melea, malus, Armeniaca.*

M A L I armeniæ fructus, quæ nunc vocant mala præcocia, consimiles persicis vireis refert.

*Meon.*

M E I radices in tertio ordine calefaciunt, in secundo siccant, ideóque vrinam & menseis cient: liberalius meon assumptum, capitis facit dolores.

*Milax.*

M I L A X tam læuis, quàm aspera, arbores amplexa, calidam acremque facultatem possidet.

*Misy.*

M I S Y medicamentum est ex iis quæ crustam faciunt & adurunt, valenterq; astringunt, minus autem quàm chalcitis erodit, quoniam tenuius ea est: cæterum chalcitis & fori vetustate in misy mutantur, vt ait Galenus: à superficie incipiente statim mutatione.

*Molybdæna, plumbago.*

P L V M B A G O argenti spumæ vireis habet à medio temperamento ad frigidius digressa.

*Molybdos, plumbum.*

P L V M B V M refrigeratoriæ virtutis est, habet & humidæ substantiæ plurimum, quod ex frigore coaluerit. Quod si id perfundatur teratúrque; aut vino, aut immaturo oleo, aut quodam succo refrigerante, ad naturalium & sedis vlcerosas inflammationes excellentissimum erit remedium: lamina vero plumbea super lumbos gestata, veneris insomnia cohibet. Item bractea tenuis ganglio imposita, ipsum dissipat. Concrematum plumbum validius quidem siccet, sed & acrimoniæ nonnihil obtinet: si eluatur, tum sine rosione siccet, tum maleficis vlceribus præsentaneum est remedium.

*Morea, morus.*

M O R I fructus maturus quidem aluum subducit, & medicamentis stomaticis aliis quæ moderatam requirunt astringentem vtiliter miscetur. immaturus vbi exaruerit, perquam



mām obstruens sit medicamentum: cortex autem radice  
arboris etiam amaritudinis cuiusdam particeps, purgare  
potest, eoque latus ventris tinea occidit: foliorum autem  
circulorumque vis, subducentium & comprimentium me-  
dicina quodammodo existit.

*Myagros.*

MYAGRI semen pingue est. quod in eo oleosum habet  
ur, opplendi vireis repræsentat.

*Myaces, mituli.*

MYTVLI combusti, eundem cum buccinis effectum  
præstant, propriè verò eloti palpebrarum asperitatem & al-  
bugines cum melle exterūt, caro ipsorum canum moribus  
utiliter imponitur.

*Myaron.*

MYARON, quam alij melampycnon appellant, herba fe-  
culacea est & pinguis, videtur autem ipsius pinguitudo cor-  
poris asperitates læuigare.

*Myelos, medulla.*

MEDVLLA facultatis est quæ indurata ac in scirrhum  
non crescentia corpora emollit. Laudatissima est ceruina,  
onox vitulina: taurina vero hircinaque acrior est, magis-  
que siccatur, & quæ in artubus continetur, pinguior est ma-  
gisque emollit: quæ de spina elicitur, durior squalidior-  
que est.

*Mycetes, fungi.*

FVNGI frigidi & humidum admodum temperamento sunt:  
nonnulli ipsorum manducati, etiam exitium adferunt, præ-  
sertim qui inter ipsos natura cōstant putridæ qualitatis par-  
ticipi.

*Myosote, muris auricula.*

MVRIS auricula dicta est albine.

*Myxa.*

MYXA arboris fructus est minor quidem prunis, facul-  
tate vero consimilis.

*Myrica, tamarix.*

TAMARIX incidit extergitque, ita ut manifeste non sic-  
cet, habet autem astrictonem nonnullam, qua de causa de-  
coctum ipsius potum lienes adiuuat, item dentium dolori-  
bus medetur: fructus autem & cortex ipsius gallæ virtute  
proximus est: cinis arboris vehementius exiccat.

*Myia*



*Myriophyllum, millefolium.*

MILLEFOLIUM tantam siccandi vim possidet, ut vulnera conglutinet.

*Myrrha, vel myrrhis.*

MYRRHA in secundo ordine calefacit, ac nonnihil etiam extenuat, radix ipsius odorata dulcisque est, mensibus mouendis, & humoribus & thorace & pulmone repurgandis idonea.

*Myrrhine, seu myrsine, myrtus.*

MYRTUS ex diuersis composita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, qua valenter siccatur: at myrtula quæ soboles myrti est, tuberosa, caudicem ipsius & ramos amplectens, vehementius astringit & siccatur. iam vero & folia aridiora viribus magis siccant: item fructus succusque tum foris applicatus, tum intus assumptus persimileis vires præ se fert.

*Moly.*

MOLY, quod nonnulli rutam syluestrem, alij zarmalam dicunt, Syrii besafam, tertio calefacientium ordini annumeratur, substantia tenue, hinc crassos humores viscososque incidit, discutit & urinam promouet.

### Quæ ab N incipiunt.

*Nascaphthon.*

NASCANTHON, sunt qui nascaphthon dicunt, Indicum est odoramentum, quod ad astrictos scæminarum locos suffitu vaporetur.

*Napy. sinapi.*

SINAPI calefacit siccaturque in quarto abscessu.

*Nardostachys, spica nardi.*

SPICAE nardi radix calefacit in primo, siccatur in secundo ordine, particeps est etiam astringentis cuiusdam qualitatis, acris, & subamaræ, iocinori igitur prodest & stomacho extrinsecus admota & ebibita, urinam mouet & interaneorum fluxiones desiccatur: sed Indica valentior est quam Syriaca, & nigrior.

*Nardus Gallica.*

NARDUS gallica superiori vireis habet similes quidem, sed imbecilliores, præterquam ad urinam ciendam: calidior enim est quam illa, minusque astringit.

*Nardus montana.*

NARDUS montana, quæ nonnullis thylacitis, pyritisque dicitur, commemoratis est infirmior.

Nar



*Nartex, ferula.*

**NERVLAE** semen extenuat calfacitq; medulla ipsius viscidis adhuc, astringit, eoq; sanguinem spuentibus & coeliis accommodata est.

*Narce, torpedo marina.*

**TORPEDO** marina viuens capiti imposita dolores eius excutit, idq; forsan eodem illo torpore quem membris eam contingentibus inducit: oleum in quo viua decocta fuerit, ad aciores articulorum cruciatus leniendos inungitur: eadem torpedo anum procidentem coercere appositâ fertur.

*Narcissus.*

**NARCISSI** radix adeo desiccatur, ut maximis vulneribus sit glutinandis, imò etiam tendinum præcisionibus confert, præterum abstergendi & attrahendi vim quandam habet.

*Neuras, seu poterion.*

**NEURAS**, quod alij poterion vocant, sine rosione desiccatur, ut & ipsa nervos præcisos glutinet: radices autem potissimum hunc effectum præstant, & impositæ, & potæ.

*Nerion, aut rododaphne.*

**NERION** extrinsecus applicatum vim refert discussoria: si intus assumatur, occidit.

*Nymphaea.*

**NYMPHAEA** vireis habet sine rosione ficas, quibus & ventrem reprimat, & genituram arefaciat: verum alba radice donata valentior est, eoq; fluxum muliebrem cum vino nigro & austero pota persanat: quæ nigram refert, deterforia quoq; vi nonnulla pollet, eaq; vitilignes, alphos dictas cum aqua exterit: alopecias cum pice liquida illita replet.

## Quæ ab X ordiuntur.

*Xanthion, aut phasganion.*

**XANTHION** phasganiûmve fructum fert discutiendi viribus præditum.

*Xiris, aut Xyris.*

**XIRIS** naturæ tenuis est, discussoria, & extrahentis, ac nimirum siccatoria, præcipue semen, quod & urinam cit, & heni in scyrrhum indurescenti medetur.

*Xiphion, gladiolus.*

**GLADIOLI** radix trahit, discutit, & siccatur.

Quæ



## Quæ initium habent ab O.

*Oc, sorbus.*

SORBUS arbor cuius fructus oa, à nonnullis & dicitur, astringendi vim obtinet, sed minorem mespilo.

*Othonna.*

OTHONNAM, alij herbæ esse succum in Arabia ad Aegyptum nascentis affirmant, alij lapidem Aegyptium: detegit autem eroditque, omnia quæ claritati oculorum officiant, exterens.

*Oenanthe.*

PLURIMVS sanè vsus sylvestris vitis: florem abundè astringentem esse fatetur: & ventrem potissimum corroborare. Dioscorides autem aliam describit *œnanthen* contrariis donatam viribus, unde secundas eam eiicere, & urinæ stillicidio, morboque regio mederi tradit.

*Oenos, vinum.*

VINVM ex iis est, quæ in secundo ordine calefaciunt, siccantque: quod admodum vetustum est, in tertio: Mustum verò in primo.

*Oesypus, lane pinguitudo.*

OESYPVS in sermone de lanis explicata est.

*Olymbi, grossi.*

GROSSI acrem & discussoriam vim obtinent, liquoris gratia qui in ipsis continetur. cocti igitur duros tumores dissipant: crudi myrmecias & thymos exterunt.

*Olostium.*

OLOSTIVM ficit astringitque: hinc eo ad rupta videntur.

*Omphacium.*

OMPHAGIVM succus est vuæ immaturæ, astringens egregiè & siccans in tertio abscessu: eoque fluidis affectibus & præsertim stomachicis, accommodatur.

*Onagra.*

ONAGRA, quam nonnulli onotheram, alij onothuria dicunt, frutex est arboreus, cuius radix inducta, ferocientia ulcera mitigat.

*Onoma.*

ONOMA, vel onomis, vel phlomitidis, vel ononis, acrem amaramque vim obtinet, eamque ob causam folia eius cum vino pota foetus occidunt expelluntque.

Oxo



*Onobrychis.*

*ONOBRYCHIS* virarefaciendi & discussoria, tubercula, quæ phymata dicuntur, dissipat, urinæ stillicidio medetur, & sudores prouocat.

*Oni, asini seu multipeda.*

*ONIMULTIPEDA* quæ sub aquariis vasis agunt, & in or-  
 tim se conduplicant, discutiunt siccantque, potæ cum vino  
 cinæ angustis & arquato medentur, anginæ itidem cum  
 melle iisdem illinuntur. Item detrita cum rosaceo calfa & c.  
 que in mali punici cortice, auribus dolentibus salutariter  
 stillantur.

*Onyches, conchula Indica.*

*ONYCHES* conchyliorum Indicorum opercula sunt,  
 quæ suffitu strangulatione vuluarum concidentis fœ-  
 minas excitant, item comitiales: potæ verò aluum tur-  
 bant.

*Ononis.*

*ONONIS* radice constat quæ in tertio ferè gradu cale-  
 fit, cortex ipsius extergit, & incidit, vnde etiam calculos  
 conterit.

*Oxos, acetum.*

*OXOS* ACETVM mixtæ est naturæ frigida & calida, sed vtriuf-  
 que tenuis, frigida tamen calidam excellit, cæterum in ter-  
 tio ordine siccatur.

*Oxiacanthos.*

*OXYACANTHVS* arbor piro syluestri & figura & vi-  
 ribus similis est, habet & subtile quippiam coniunctum: sed  
 fructus ipsius myrti baccis respondet.

*Opos, liquor.*

*LIQVORES*, & Cyrenaicus, & Medicus, & Syriacus  
 per excellentiam dicuntur, calidi natura, & spirituosè in-  
 signiter: verum Cyrenaicus cæteris est calidior tenuior-  
 que.

*Origanum.*

*OMNIA* origani genera incidendi, extenuandi, siccan-  
 di, & calefaciendi vireis in tertio abscessu ostendunt.

*Oreoselinum, apium montanum.*

*APIVM* montanum viribus domestico æquale est, sed  
 inualentius.

Oro



*Orobanche.*

OROBANCHE sicco & frigido temperamento est, secundum primum ordinem.

*Orobos, eruum.*

ERVUM calefacit in primo gradu, siccat in secundo, amarumque est, quapropter incidit, detergit, obstructa aperit: liberalius sumptum sanguinem per urinam expellit.

*Orminon.*

ORMINON marrubio specie simile est, calidum, mediocriter siccum & abstergens. venerem igitur stimulat, & oculorum crassities cum melle repurgat, tumores laxos quae oedemata vocant discutit, & extrahit aculeos. Sylvestre domesticum est valentius.

*Oryza.*

ORYZA vim quandam astringentiam praese fert: quae etiam ventrem mediocriter cohibet.

*Orchis herba.*

ORCHIS herba (nominatur autem etiam cynosorchis, id est, testiculus canis,) radicem habet bulbosam & duplicem: vis autem maioris, humida & calida, eoque veneri incitanda est: minoris, calida & sicca, contra igitur venerem coërcet.

*Orchis, serapias.*

ORCHIS, quae & Serapias dicitur, aliis triorchis, prior valentius desiccatur, quare laxos tumores cedentesque dissipat, ulcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpetas abigit: inarefacta autem magis siccat. Quoniam vero substringere idonea est, aluum quoque cum vino pota retinet.

*Osyris.*

OSYRIS, ex qua medicamenta ad exterendam, laeuigandamque cutem, Graeci coremata vocant, fieri solent, amara est, & iecoris laxandi vireis habet.

*Ossa, ossa,*

OSSA concremata vehementer discutiunt siccantque: praesertim id facere dicuntur humana: atqui suillus talus combustus inflationibus & circa umbilicum torsionibus mederi dicitur. quinetiam ossa cremata si potui quis exhibeat, morbum comitalem, & articulares dolores abigunt. Bubulus talus vstus, mobileis firmare dentes praedicatur, cum melle potus teretes tineas educit, cum oxymelite lic-

acm



rem consumit, & vitilignes, quas vocant leucas, illitus ab-  
 orem, item ad venerem commendatur: femora bouis cremata  
 totu sanguinis eruptiones, & alui fluxum compescunt.

*Ostraca, testa.*

TESTAE fornacium tritæ siccant exterguntq; hinc den-  
 friciis accommodantur, illitæ cum aceto prurigini, pustu-  
 ps, quæ appellantur exanthemata, conferunt, cerato exce-  
 itæ strumas discutiunt.

*Ostrea.*

OSTREORVM testa cremata æqualem buccinis vim, sed  
 minus crassam repræsentat, abstergit igitur faciei labes, &  
 lentibus nitorem cõciliat: elota rosionem amittit, ad carnẽ  
 icatricemq; humidis vlceribus iuducendâ accommodata.

*Ouron, vrina.*

VRINA quælibet calida est & acris, sed humana omniũ  
 mliorum animalium, exceptis maialibus, infirmior est. cæte-  
 u vehementer abstergit, quapropter nonnulli potione eius  
 n peste vfi, mortem euaserunt, eadẽ lepras, vlcera putredinẽ  
 experta, capitũq; manantia vlcera, quæ vocantur achores, &  
 furfures per sanat. item pedum attritus nondum inflamma-  
 ocione occupatos. At pueri venerem nõ experti vrina omniũ  
 efficacissima est, vnde etiam chrysocolla conficitur. Mulo-  
 rum, articularibus doloribus congruit. Caprarum & cha-  
 melorum, aluum deicit, ideóq; contra aquam subter cutem  
 bibitur.

Que à P incipiunt.

*Panration.*

PANCRATION & specie & viribus scyllæ simile est, verũ  
 imbecillius.

*Paliuron.*

PALIVRI folia & radix astringunt, eoq; aluum fluen-  
 tem sistunt, tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis  
 calida discutiunt: Semen eius tam vehementi incisoria vir-  
 tute valet, vt & calculos conterat, & excreationibus è pe-  
 ctore auxilietur.

*Panaces.*

PANACES Herculeum est ex quo opopanax dictus cõ-  
 fitur, in tertio ordine calefaciens, in secũdo siccans, emol-  
 liens, discutiensq; radicis cortex liquore imbecillior, habet

L



nonnihil & abstergens, & carni ducendæ idoneum: semen ipsius menſeis quoq; citat. Aſclepion panaces & Chironium priori calidiora ſunt, hinc floribus ipſorum & ſemine ad malefica vlcera & phymata vtuntur.

*Papyrus.*

PAPYRVS ignem non experta, materia quædã efficitur: uſta, ſiccatur chartæ crematæ modo, verum papyri cinis viribus inferior eſt.

*Paronychia.*

PARONYCHIA inde nomen accepit quòd digitorũ reduuiis, quæ græcis dicuntur paronychiae, medeatur, viſ eius eſt extenuare & ſiccare, idq; citra roſionem.

*Pentaphyllon, quinqueſolium.*

QUINQUEFOLIUM in tertio ordine deſiccatur, minimè acre, eoq; in multos uſus accommodatur.

*Peplon, herba.*

PEPLON nonnulli papauer ſpumeum dicunt: & hic fructus liquorem habet, & tithymalorum modo purgat.

*Peplion.*

PEPLION quoq; liquorem habet & magna ex parte maritimis locis naſcitur, cætera quidem inutile, ſemen aut ipsius feruidi ſaporis vt peplum expurgat.

*Peperi, piper.*

PIPERIS radix coſti vireis refert: fructus nuper quidem germinantis arboris, oblongum eſt piper, humidius natura & calidum: fructus veluti acerbus immaturuſque, album eſt piper, nigro acrius, vt quod impendio magis aſſatũ ſit: utruque verò & calefacit & deſiccatur.

*Pepon.*

PEPON abſterſoria facultatis eſt, inde veluti caro ipsius ephelidas & conſimilia faciei viſia exterit, ſemen renes obſtructione liberat.

*Periclymenon.*

PERICLYMENI folia & ſemen incidendi ſimul & calefaciendi vireis obtinent, quapropter urinã cruentam excernunt, ad ſex dies pota: ſemẽ autem ad quadraginta dies potum lienofos & ægrè ſpirantes adiuuant.

*Periſtereon, verbenaca.*

VERBENACA adeò deſiccatur aſtringitq;, vt vulneribus glutinandis, † & ſanguinis eruptioni ſiſtendæ ſit.

† Tot



† Totus hic locus in antiquis sic legitur. περιτριών εις τοσόντων ξη-  
 νει τε ηγὲ τύφει ὥστε δύνασθαι πολλὰν τραύματ'α, ἴδεν ὑδὶ τῶν  
 αὐοηδῶν τε ηγὲ φαγδαυικῶν ἀντὶ χρῶνται. Id est, Peristereon vsq;  
 deò siccatur & adstringit ut possit glutinare vulnera. Itaq; eo vtuntur  
 in malignis vlceribus & ad partes vicinas serpentibus.

*Persea seu persica.*

PERSAEA arbor est Aegypti, cuius folia & siccant &  
 stringunt, eoq; sanguinis eruptionem compescunt.

*Petasites.*

PETASITES tertio siccantium ordini ascribitur, vnde  
 & malefica & phagedanica vlcera eam vsurpant.

*Petroselinon.*

PETROSELINI semen calidum siccumque est in tertio  
 abscessu, vi incisoria præditum, vrinam, mensesq; copiose  
 trahit, flatibus discutiendis accommodatissimum.

*Peucedanum.*

PEUCEDANI liquore & succo affatim calefacienti, di-  
 scutiendi, extenuantiq; vtimur, tum naribus admoto, tum in  
 potione assumpto, ad pulmonum & pectoris vitia ex humo-  
 rum crassitudine contracta: item ad lienem scyrro indura-  
 tum: dentibus aut perforatis impositus, dolorem protinus  
 sopit, neruorumque affectibus idoneus est: radix squamas  
 ossium separat, maleficis vlceribus succurrit, in tertio ordi-  
 ne & calefaciens & desiccans.

*Peuce, pinus vel pinaster.*

PINVS piceæ viribus respondet, sed moderatior est.

*Peganum, ruta.*

RUTA sylvestris ad quartum calefacientium siccanti-  
 umque ordinem refertur: sativa, ad tertium, cuius vis est  
 crassos lentosque humores incidere, & dissipare, vrinam  
 mouere, attenuare, & flatus discutere, vnde & venerem  
 coërcet.

*Pissa, pix.*

PIX arida quidem in secundo abscessu desiccatur, minus  
 calefacit: liquida econtrario, imò etiam extergit, maturat,  
 discutit, acrisq; est, eamq; ob causam vngueis scabros edu-  
 cit, impetigines exterit, tumores maturat. Valètiore aut est li-



quida, vt etiam suspiriosis & purulenta excreantibus, lincta subueniat: sed arida vulneribus magis glutinandis est.

*Piselaon, oleum picinum, seu picis flos.*

**PICINVM** oleum ex liquida fit pice, qua natura tenuius existit.

*Pistacia.*

**PISTACIORVM** fructus esus stomacho mediocriter conducit, iecur obstructum laxat, praecipue summi & odoraticorum operimenti ex vino decoctum, profunt etiam contra serpentium morsus.

*Pityides.*

**PITYIDES** fructus sunt picearum, mistae facultatis, astringentiae & acris, quam ob rem reiectionibus e pectore opitulantur.

*Pityocampe, picearum eruce.*

**PICEARVM** eruce eiusdem sunt virtutis quam cantharis & buprestis obtinet.

*Pityos phloeos, piceae cortex.*

**PICEAE** cortex astringendi vim eximiam possidet, qua intertrigines & ambusta illitus persanat, ventrem potus reprimat: folia etiam vulnera conglutinant.

*Pityusa.*

**PITYVSAM** quoque nonnulli tit hymalli speciem affirmant, quonia & liquorem habet, & perinde vt illae purgat.

*Platanus.*

**PLATANVS** vi humidior & frigidior pollet, eaque de causa folia viridia ad inflammationes nascentes proficiunt: cortex & pilulae quoniam maiorem siccandi potentiam habent, in aceto decoctae dentium dolores sopiunt, ambusta cum adipe persanant. Cortex autem crematus siccatur vehementius & abstergit, eoq; lepras pellit, & humidis ulceribus medetur.

*Pneumon, pulmo.*

**PYLMO** agninus, suillusq; attritus pedum ex calceis curare creditur: vulpinus sale inueteratus si bibatur, suspiriosis proficit: marinus recens detritus podagris & pernionibus succurrit.

*Polemonium.*

**POLEMONIUM**, quod aliis phileterion dicitur, tenue est, & siccandi viribus donatum, inde nonnulli contra coxendicis dolores, dysenterias, lienem scyrrho induratum, radicem eius, cum vino propinant.

Pol



*Polium.*

**POLIVM** minus, quo & in antidotis vimur, tertij calefacientium siccantiumq; ordinis est, itaq; omnia viscera obstrueta laxat, vrinam mensesq; trahit: viride adhuc, magna glutinat vulnera, aridū maleficis inspersum vlceribus pro-  
ficat.

*Polygalon.*

**POLYGALON** folia habet gustu mediocriter acerba: potum, lac quoque generare putatur, calidi humidique temperamenti compos.

*Polygonaton.*

**POLYGONATVM** variae particeps est facultatis, astringentiorae, acris, amarae, & cuiusdam gustu ingratae, quae verbis nequeat exprimi: quapropter in multiplicibus vsus haud est accommodatum: radicem ipsius nonnulli vulneribus inducunt, & faciei labes, quas ptilos dicunt Græci, eo abstergūt.

*Polygonon sanguinaria.*

**SANGVINARIA** habet sanè vim quandam astringendi sed humiditas in secundo ordine frigida in ea præpollet, stomachi feruori frigida inspergitur vtiliter, erysipelatis, inflammationibusque calidis illinitur, ac talis quum sit, fluxiones repellit, atque hac ratione siccatoria esse putatur: foemina autem mas efficacior est.

*Polycnemon.*

**POLYCNEMON** in secundo ordine calefacit & desiccatur, eoque vulnera glutinat.

*Polypodium, filicula.*

**POLYPODIUM** siccatur abundè citrà morsum: potum, inferius purgationem molitur.

*Pompholyx.*

**POMPHOLYX** sine rosione siccatur, ideoque cancris vlceribus aliisque maleficis opitulatur, item cum oculariis medicinis miscetur.

*Porphyra, purpura.*

**PURPURAE** crematae testis similem vim sortitæ sunt, opercula ipsarum cum oleo incocta pilos fluidos confirmant, cum aceto pota lienes tumidos sanant: suffitu foeminas locorum strangulatu concidentes excitant secundasque eiiciunt.

*Potamogeton.*

**POTAMOGETON** refrigerat & astringit, perinde ut herba sanguinalis iisdem virtutibus præditum.



*Poterion.*

POTERII, quod alij phrynion dicunt, radices concisæ neruos præfectos & vulnera conglutinant, decoctum ipsius epotum neruorum affectibus auxiliatur.

*Prasion, marrubium.*

MARRUBIUM in secundo ordine calefacit, amplius autem siccatur, secur lienemq; obstructum laxat, excreationes è thorace & pulmonibus, mensisq; promouet: in cataplasmate verò inductum extergit, discutitq; præcipua extersoria in cisorisq; vi præditum.

*Prason, perrium.*

PORRUM mali succi est & acris. vt autem Dioscorides memoriæ prodidit, grauia facit insomnia, aluumq; bonam, urinam ciet, & extenuat: habet & abstergendi vim aliquam, qua pectoris excreationes elicit ptisanæ incoctum, semè verò ipsius nephriticis temperatur medicinis: folia etiam non nihil astringunt, ac eam ob causam succus ipsorum sanguinem suppressit.

*Prinos, ilex.*

ILEX simileis quercui vireis habet, sed multò ea est validior.

*Propolis.*

PROPOLIS calefacit quidè in secundo abscessu, abstergit autem mediocriter, tenuisq; naturæ est, & meatuū apertoriæ.

*Ptarmice.*

PTARMICAE folia sternutamenta mouent, totus autem frutex viridis sugillata, liuorésq; alios disijcit, est enim herba calida & sicca, viridis secundi ordinis, arida tertij.

*Ptelea, vlmus.*

VLMS siccare valet & abstergere, eoq; vulnera glutinare, cortex autem magis, si recens fasciolæ modo vulneribus circūuoluatur, cū aceto lepras quoq; tollit: radices idè præstant, si ossa fracta quæ solidari tophacia cicatrice, quæ poron dicunt, desiderant, decocti ipsarum iure perfundantur.

*Pteris, filix.*

FILIX vim siccandi & amaram repræsentat, eaq; foetus corrumpit, latásq; tineas enecat, instar quatuor drachmarum cum mulsa pota: quoniam verò modicè constringit, vlcera citra rosionem deficcare potest.

*Pycnocomon.*

PYCNOCOMON discutiente vi extrahenti acrisq; donatum



um est, folia igitur panos & furunculos dissipant, semen  
reterea infixa corpori spicula extrahit, radix flauam bilem  
urgat.

*Pyrethron.*

PYRETHRI radix adurentem potestatem occupat, dē  
mum qui frigori patuerunt dolores lenit, item ad febrium  
rigores ante accessionem infricatur cum oleo, adhuc iis  
quorum corpora stupent, & resoluta sunt, efficacissimè ad-  
hibetur.

*Pyros, triticum.*

TRITICVM in primo ordine calefacit, verum siccando  
humectandoque medium est, nonnihil etiam glutinosum,  
& obstruendi efficax obtinet.

*Pyria, coagulum.*

COAGVLVM omne naturæ acris est, tenuis, discutien-  
tis, & nimirum siccantis. sed leporinum comitiales sanare  
cum aceto potum, literis mandarunt: fluoremq; muliebrem  
emendat, lac in ventre concretum soluit, similiter etiam san-  
guinem: nonnulli vero cruentas pariter è thorace excrea-  
tiones cohibere ipsum tradunt, equinum verò coagulum  
coeliacis & dysentericis prodesse: phocæ autem castorij vi-  
reis præ se ferre.

### Quæ ab R incipiunt.

*Rhacos, attrita vestis fragmentum.*

ATTRITARVM è lana vestium fragmenta cōcremata,  
simileis eidem lanæ vireis repræsentant. Linei autem pan-  
niculi quum adhuc vruntur, tenuem ex se fumū reddūt, qui  
etiam destillationes in guttur liberet. & vuluæ sursum re-  
currenti salutaris sit: cremati iam ad lanæ virtutem acce-  
dunt.

*Rhamnus.*

RHAMNVS siccatur in secundo, refrigerat in primo ab-  
scessu, quare herpetibus & erysipelatis non admodum ca-  
lidis medetur. sed teneris eius foliis vtendum est.

*Raphanus.*

RAPHANVS in tertio abscessu calefacit, in secundo sic-  
cat: syluestris efficacior est, in ambobus autem semen valen-  
tius. itaque sugillata, aliosque liuores disijcit.

*Rheon, rha.*

RHEON, quod alij rha dicunt compositū est ex terrestri  
frigida & tenui substantia, aëreaq; calida & leniter acri, eaq;  
ob causam conuulsis, ruptis, orthopnœis opitulatur: quod



discutiendi vim habeat, liuores emendat: quòd astrictoriam, cruentas excreationes, cœliacos, & dysentericos sanat, vtraque vero facultate, iocinorosos iuuat.

*Rhetina, resina.*

RESINAE omnes & calefaciunt & desiccant, verum terebinthina principatum obtinet, discutiētis naturæ, emollientis, tenuis & abstersoria, eoque scabiem corrigit: & latrix huiusmodi est. Quæ vero è pinu destillauerit, atque hac magis adhuc strobilina, acrior est, non ramen aut discutit magis, aut attrahit: medium inter ipsas locum tenet, & quæ de picea, & quæ de abiete raditur.

*Rhoda, rosæ.*

ROSÆ mixta constant substantia, aquosa scilicet, calida, astringenti, & amara: flos autem ipsarum magis adhuc astringit, eoque desiccatur.

*Rhodia radix.*

RHODIA radix calefacit in secundo abscessu, tenui & discutiente vi prædita.

*Rhœa siue rhoë, malum punicum.*

MALVM punicum omne astringendi vireis eximias habet, quibus refrigerat siccaturque: verum dulce aliis minus: austerum magis refrigerat sicciusque est & stomacho amicum, acidum refrigerat quoque, & maiorem quandam incidenti virtutem repræsentat. verum acini succo magis astringunt siccantque efficacius his adhuc malicorium quod ficion Græci vocant: huic virtute respondet mali flos qui cytinus appellatur.

*Rhus.*

RHV coriariæ à medicis dictæ fructus præcipuæ & succus magno in vsu sunt, quum illa astringendi siccandique vim ex tertio ordine habeat, detergendi è secundo.

*Rypas, sordes.*

SORDES ex statuis æreis, aut vasīs in quibus multum olei inhærescit, detractæ sic vt nonnihil æruginis admixtum sit, discutiendi vireis habent, siccandique mediocriter & emolliendi, eiusque immatura phymata discutiunt. At de sordibus quæ in palæstris habentur, quas nonnulli etiam patos vocant, in sudore dictum est. Aurium sordiculæ reduuiis mederi dicuntur.

Quæ



LIBER VII.  
Quæ ab Sincipiunt.

337

*Sagapenum.*

SAGAPENVUM, ceu ferulæ liquor est, calidus & tenuis, & abstersoria quædam vis inest, qua & oculorum cicatricibus & suffusionibus prodest.

*Salamandra.*

SALAMANDRAE vstæ cinerem nonnulli medicinis exsiccantibus, tum iis quæ ad lepram & scabiem componuntur, admiscunt.

*Sampsuchum.*

SAMPSUCHUM calefacit siccaturque in tertio abscessu, est etiam tenuis naturæ & discussoria.

*Sandaracha.*

SANDARACHA adurentis est facultatis, quemadmodum & auripigmentum.

*Sandyx, vel siricum.*

SANDYX aut siricum extenuat & siccatur, non tamen calefacit.

*Saprotes, caries lignorum.*

LIGNORVM caries, præsertim ulmi, humentia purgat & ulcera & explet.

*Sapo.*

SAPRO abstergerendi vim habet.

*Sarcocolla.*

SARCOCOLLA persicæ arboris lachryma est, opplendi & citra rosionem siccandi vireis sortita, atque ideo vulneribus est glutinandis.

*Saxiphages, faxifraga.*

SAXIFRAGA VINAM mouet, & calculos conterit.

*Satyrion, trifolium.*

SATYRION, aut triphyllon humidum est temperamenti & calidi, item flatuosum, unde veneris appetentiam facit: nonnulli opisthotonis cum vino austero potum salutare esse tradunt. Galenus in commentario de theriaca trifolium hinc hyacintho simile esse, quum aëre inturgescens, semine sylvestris cnico equale habet: decocti ipsius ius superfusum phalangij aut viperæ morsus sanare: sano idem potui datum, si similem animalium horum ictibus affectum conciliare.

*Saura, lacerta.*

LACERTAE iecur & caput suo loco exposita sunt: totum aut caput dissectum impositumque scorpionum ictibus medetur.

L 5



*Selinon, apium.*

APIVM tanti caloris est, ut & urinas & menses eliciat, ceterum flatus discutit, praesertimque eius semen.

*Seris, intybum.*

SERIS subamarum olus est, admodum refrigerans humectansque, habet etiam nonnihil astringentis.

*Seriphum.*

SERIPHVM calefacit quidem in secundo, siccatur autem in primo ordine, consimile absinthio, minus tamen eo astringit, magis calefacit, animalia ventris occidit, mediocriter stomacho aduersatur.

*Seseli.*

SESELIS radix magisque semen insigniter calefacit, tenuisque substantiae est, urinam quoque ciet, comitialibus, & orthopneæ accommodatum.

*Sepia testa.*

SEPIAE testa per similes est ostreo quod ad vires attinet, sed tenuior substantia & abstergens, eoque in cinerem redacta, ungues cum sale fossitio extenuat: ignem non experta si infricetur, ficius exurit, & cutis labes abstergit.

*Sesamoides.*

SESAMOIDIS albi semen calefacit, detergit, & rumpit.

*Sesamum.*

SESAMVM non parum lentoris, pinguisque obtinet, idcirco opplere, mollire, & mediocriter calefacere idoneum est.

*Seps.*

SEPS, quam nonnulli chalcidicam lacertam dicunt, in vino pota, propriis moribus succurrit.

*Sialon, salina.*

SALIVA hominis ieiuni maxime discutit & abstergit, eoque infantium impetigines illita exurit & furunculos cum tritico, nimirum manso imposita, maturat, & sugillata delet, feris hominem occidentibus maxime aduersatur.

*Sideritis.*

SIDERITIS Heraclia & helxine dicta est, Achillea autem sideritis illi quidem consimilis est, sed magis astringit, eoque fluidis affectibus accommodata.

*Sideros, ferrum.*

FERRVM aqua restinctum subinde, vehementem desiccandi vim aquae conciliat, quae pota lienosis conducit: vinum



um autem in quo id reſtinctum eſt cœliacis, dyſentericis,  
holera infeſtatis, ſtomacho reſolutis, auxiliatur.

*Sicyos, cucumis.*

**CVCVMIS** eſculentus quidam viridis, refrigerat hume-  
ſcatq; in ſecundo ordine, caro ipſius feruidas ſolatur inflam-  
mationes, ſemē abſtergendi incidendiq; virtute præditum,  
urinas mouet, & corpus nitidum efficit. aridus ſiccatur in pri-  
mo ordine, magiſq; abſtergit, & ſemen, & radix.

*Sicyos agrios, cucumis ſylueſtris.*

**CVCVMERIS** ſyluatici ſeminis ſuccus elaterium dictus  
eſt, qui autem è radice & foliis premitur, elaterio ſimilis eſt,  
imbecillior: radix detergit, diſſipat, emollit: ſuccus ſic-  
candi vireis habet.

*Silybon.*

**SILYBON** ſpinofus frutex eſt, albo chamæleonti perſi-  
nilis, eſui accommodatus: radicis liquor drachmæ pondere  
mulſa potus, vomitiones excitat.

*Silurus.*

**SILVRVS** fale conditus ſi edatur arteriam humentem  
expurgat, applicatus corpori ſpicula educit.

*Silphe, blatta quæ in piſtrinis inuenitur.*

**BLATTAE** quæ in piſtrinis inuenitur interanea deco-  
cta contritaq; aurium dolores perſanant.

*Silphium, laſerpitium.*

**LASERPITIVM** probè calefacit, flatulentum eſt etiam  
& concoctu peruiçax: à foris corpori applicatum efficacius  
deprehenditur, magiſq; liquor ipſius, extrahendi potēs, item  
& ſuperexcreſcentia amoliendi vim quandam obtinet.

*Sifo.*

**SISON** calidus eſt, vrinam mouet, concoctionem adiu-  
uat, menſeis educit, & viſcera obſtructa aperit.

*Sion.*

**SION** calidum, vrinam citat, & diſcutit, renum calculos  
frangit, menſeis euocat.

*Sifarum, ſifer.*

**SISERIS** radix cocta ſtomacho vtilis eſt, & vrinæ cien-  
dæ, calida in tertio ordine: ſemen tenue eſt, diſcuſſorium,  
validumq; idcirco iis quos ſingultus & torſiones circa um-  
bilicum malè habent, cum vino exhibetur.

*Sifymbrium.*

**SISYMBRIUM** ſunt qui cardaminē vocāt, cardamo, hoc  
eſt,



est, nasturtio assimilatū: aridū quidem calefacit siccātq; in primo abscessu: humidū autem in secundo.

*Scammonia.*

SCAMMONIA calefacit, discutit, & biliosa extergit, magisq; eius liquor, qui iam & phymata dissipat, foetus appositū corrumpit, lepras extergit, diuturno capitis dolori cum oxyrhodino superfunditur: radix autem tum ipsa, tum decoctum eius potum, purgat: cum aceto autem & farina hordeacea decocta, coxendicum doloribus applicatur.

*Scandix.*

SCANDIX sylvestre olus est, calefaciens siccansq; in secundo gradu, urinam propellit, & viscera obstructione liberat.

*Scingos, terrestris crocodilus.*

SCINGI carnes renibus proximæ, naturalibus arrigendis bibuntur. rursus semen lactucae cum aqua potum eadem contraria virium lege videtur remittere: item lentis decoctum cum melle.

*Scylla.*

SCYLLA incidit, calefacit & desiccāt in secundo ordine: praestat autem eam assam aut elixam sumere.

*Scolopendra marina.*

SCOLOPENDRA marina in oleo elixa inunctaq; pilos abolet, vīta etiam pruritum excitat.

*Scolopendrion.*

SCOLOPENDRION asplenon est.

*Scolymon, carduus.*

CARDVVS calefacit, siccātq; in ordine secūdo, radix eius cum vino decocta, urinas foetidi odoris liberaliter educit, & alarum totiusq; corporis graueolentias corrigit.

*Scordion, trixago palustris.*

SCORDIVM variis pollet facultatibus, ut quod amarum, acerbum, & acre sit, purgat igitur simul & calefacit viscera, urinas & menstrua concitat, refrigerata omnia excalfacit, vulnera glutinat, repurgatq;: aridum inspersum cicatricem inducit.

*Scordon, allium.*

ALLIVM calefacit siccātq; in quarto abscessu: at sylvestre allium quod ophioscordon, quasi anguinum allium, & agrioscordon dicitur, domestico valentius est.

Scor



*Scordoprasum.*

SCORDOPRASUM porri & alij mixtas habet vireis, & gustatum.

*Scorpioides.*

SCORPIOIDES excalfacit abscessu tertio, ficit secundo.

*Scorpius.*

SCORPIUS terrestris crudus impositus, aut tostus in cibo, proprius remedium efficitur: marinus autem fel habet oculorum suffusionibus vtile.

*Scoria, recrementum.*

RECREMENTUM omne valide exiccat: ferri stercus amplius, quod excoctum & in tenuissimum pollinem retritum cum aceto auribus suppurantibus mirifice proficit, item iis qui aconitum biberunt: cum oxymelite potum remedio est. Plumbi recrementum eidem respondet, sed magis astringit.

*Smilax, aut cactus arbor taxus.*

SMILAX vel cactus arbor est virosæ virtutis.

*Smyrna, myrrha.*

MYRRHA è secundo calefacientium ficcantiumq; ordine est: capitis igitur vulnera inspersa glutinat, item amarum vim obtinet, qua tineas, & foetus occidat: adhæc abstergit, eoq; oculariis medicinis temperatur, & humores pectori infixos expurgat, ita ut guttur non exasperet. Bœotica myrrha vireis habet calefaciendi, emolliendi, & dissoluendi.

*Smyrnion.*

SMYRNION, quidam hipposelinon, quidam apium sylvestre nominant, calefacit & ficit tertio ordine; apio quidem fortius, petroselino autem inualidius, urinæ & mensibus educendis accommodatum.

*Sonchus.*

SONCHUS astringit, & manifestè refrigerat, tum corpori admotus, tum manducatus: exarefactus autem medio-criter calefacit.

*Sparganium.*

SPARGANIVM ficcandi & hoc vireis refert.

*Spartos, genista.*

SPARTI quo viteis ligant, & semen & flos cum mulsa instar quinque obolorum pota, per superiora purgant, ventri albi modo sine periculo: semen autem per inferiora quo



quoque purgat: virgulæ ipsius ad coxendicum dolores proficiunt.

*Specularium, lapis specularis.*

SPECULARIVM, alij per ph scribunt spheclarium, quononnulli loco vitri in fenestris vtuntur, eoque diaphanes à perspicuitate appellatur, substantia gypseum, vireis habet concrematis testis aut ostreis simileis.

*Spongos, sponsia.*

SPONGIA recēs quæ marinum odorem adhuc referuat, si cum aqua, aut vino, aut posca imponatur, vulnera glutinat, cremata acris est virtutis, & discussoria: cum bitumine autem & pice liquida vsta, appositaq; ex igne, sanguinis eruptiones compescit.

*Spodium, cinerula.*

SPODIVM pompholygi viribus æquale est.

*Staphylinus, pastinaca.*

PASTINACA vrinas mouet, menseis proritat, præsertim semen ipsius & radix, folia autem abstergerendi viribus prædita phagedænicis affectibus congruunt, & viridia cum melle: syluestris autem pastinaca ad omnia valentior est domestica.

*Stachis.*

STACHYS marrubio similis frutex tertium in calefaciendo ordinem occupat, menseis itaq; excitat, fœtus occidit, & secundas expellit.

*Steata, adipēs.*

ADEPS omnis humanum corpus & humectat, & calefacit, sed pro diuersis animalium temperamentis virtus eius euariat. Suillus igitur omnium humidissimus est, vt ad olei naturam accedat, vnde etiam rosiones obtundit. Caprillus, siccior est, & celeriter concrescit, eoq; iis qui in longanone rosiones experiuntur, ab inferiori parte iniicitur. Anserinus calidior est, maioremq; tenuitatem obtinet. Inter vtrunque hunc gallinarum, gallorumq; adeps consistit. Leoninus calore omneis, & tenuitate superat, & propterea etiam vi discussoria. Bubulus inter suillum & leoninum medius temperamento existit. Vrsinus alopecii medetur, vulpinus aurium doloribus, quemadmodum viperinus pilos abolere, & oculorum suffusiones impedire fertur. In omni autem adipum specie calidior, sicciorq; est marium, atq; ex his eorum ani



animalium quæ testes habent, magis quàm illorum quibus  
sunt execti, & vigentium ætate efficacior quàm aliorum.  
interum vetustate omnis adeps redditur calidior.

*Stimmi.*

STIMMI præter quàm quòd siccet, etiam astringentem  
habet, ob quam oculariis collyriis miscetur.

*Stœbe.*

STOEBÆ semen & folia in tertio ordine deficcant, viri-  
bus donata astringentius, eamq; ob causam vulnera magna  
conglutinant: decoctum ipsorum dysenteriiis, sanguinis eru-  
ptionibus, auribus purulentis auxiliatur: folia applicata o-  
culis ex ictu suffusis conferunt.

*Stœchas.*

STOËCHAS adaperit, extenuat, detergit, & viscera o-  
mnia, totumq; corporis habitum confirmat.

*Stratiotes.*

STRATIOTES aquaticus frigidus est natura: terrestres  
etiam astringendi vim habet, quæ vlcera committit: non-  
nulli eo & ad sanguinis eruptiones & ad fistulas vruntur.

*Strychnon, solanum.*

SOLANVM hortense esculentumq; astringit, & in secun-  
do ordine refrigerat. Solanum halicaccabum hortenfi simi-  
le, urinæ ciendæ idoneum semen habet acino vix æquale.  
hypnotici, id est, somnifici solani radices cortex, cum vino  
denarij pondere potius, somnum conciliat, semen habet ad  
urinam mouendam accommodatum, ex tertio refrigeran-  
do ordine: unde corymbi eius plures duodecim poti,  
furorem accersunt. Quartum verò genus solani intus as-  
sumptum, inutile est, à foris autem applicatum vlcera depa-  
scentia curat, refrigerando, siccandoq; ad secundum ordi-  
nem relatum.

*Stypteria, alumen.*

ALVMEN omne, maximè acerbum est, substantiaq; cras-  
sum: tenuius autem reliquis est quod vocatur scissile, mox  
rotundum, & astragaliote. Crassum admodum est liquidum,  
& quod placites & plinthites appellatur.

*Styrax.*

STYRAX calefacit, emollit, & concoquit: tussis, destilla-  
tioni in fauces, & grauedini utilis, mensis idem & potus, &  
appositus extrahit.

*Sycæ.*



*Syca, ficus.*

**FICVS** aridæ in secundo ferè ordine siccant: pingueis autem, duros tumores magis maturant, acriores detergant, discutiuntque, decoctum ipsarum mellis speciem referens, quod iam nonnulli siræon appellant, viribus melli respondet: virides autem ficus, imbecillioris virtutis sunt, utræque tamen & virides & aridæ aluum subducunt. At ficus caprifici, acres & discussoriae sunt, quemadmodum ex domesticis grossi.

*Syce, ficus arbor.*

**FICVS** arbor calidi tenuisq; temperamenti est, adeò ut liquor & foliorum succus non rodatur modò, aut abstergat vehementer, sed etiam exulceret, ora venarum aperiat, & myrmecias exterat: iam verò & purgandi vim obtinet. At sylvestris ficus, quam caprificum vocant, in omnia efficacior domestica est.

*Sycomorus.*

**SYCOMORI** fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius: liquor arboris vi pollet emolliendi, glutinatoria vulnerum, discussoria tumorum: bibitur inungiturque ad serpentium morsus, lienes scyrrho induratos, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores sanat.

*Symphytum petraeum.*

**SYMPHYTVM** petraeum contrariis constat virtutibus, habet enim aliquid quod incidat, pus in thorace & renes expurget: habet etiam aliquam contrahendi virtutem, qua sanguinis excreationibus medeatur, conuulsis, ruptis, mulierum fluori rubro, intestinorum ramicibus. item calida quædam humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriarum asperitates sanat. Symphyton alterum nempe magnum, viscosum quippiam & quod pruritus excitet, repræsentat, scyllæ simile. Utuntur eo, ut superiori.

*Spondylion.*

**SPONDYLII** semina & radix virtute acri & incisoria, suspiriosis, comitialibus, & arquatibus succurrunt, radix autem circumrassa, fistulisque imposita illarum callos tollit, succus è flore ipsius expressus, veterum aurium ulceribus instillatur.

*Schinos, lentiscus.*

**LENTISCVS** in omnibus sui partibus siccatur secundo  
ordi



ordine absoluto, calefaciēdo autem & refrigerando medius  
est, adeo astringens, ut ad hypocistidis succum astrictione  
cedat.

*Schœni anthos, iunci odorati & rotundi flos.*

**I V N C I** odorati & rotundi flos modicè calefacit, minus  
stringit, tenuem naturam sorritus, qua urinam mouet &  
menstruis trahit, obstructaq; referat in fomentis, poru & cata  
plasmatis adhibitus: radix adhuc magis flore astringit, sed  
colle calidior.

*Schœnos elia, iuncus palustris.*

**PA L Y S T R I S** iuncus duplex est, sed eius qui vocatur oxy-  
schœnos, semē est somnificum: holoschœni autem dicti, mi-  
nus, idem & capiti dolorem facit. vtriusque semen frixum  
cum vino bibatur, alui fluores desiccet, & mulierum flu-  
ores cohibet.

*Sori.*

**S O R I** vireis misy æqualeis obtinet, longè illo natura  
ralsius.

*Quæ à T incipiunt.*

*Tarichos salsamentum thynni.*

**C O N D I T A N E I** thynni caro acris est & desiccatoria: mor-  
tis igitur à vipera, quam præferem dicunt, quàm plurimum  
cius esui datur, vinumq; superbibitur liberalius, & vomitus  
excitatur: eadē ad acrimonias esicatorū valet, item rabidorū  
canū aliorumq; serpentium moribus vtiliter applicatur.

*Taurocolla, glutinum bubulum.*

**T A V R O C O L L A** aliis xylocolla dicitur, ex boum coriis  
confecta, vim habet insigniter abstersoriam, eoq; aceto sub-  
acta, impetigines & summæ cutis lepras exterit: ambustis, si  
cupaqua calida soluat, inflammationem oboriri nō finit: ea-  
dem oxymelite soluta vulneribus accommodatur.

*Tellinæ.*

**T E L L I N A E** conditaneæ crematæ, adurentem cinerem  
reddunt, qui cedrino liquori mistus euulsos radicitus palpe-  
brarum pilos, si instilletur nasci iterum prohibet.

*Terminthos, terebinthus.*

**T E R E B I N T H V S** calefacit in ordine secūdo, siccet autē  
si viridis est in primo, si aridus secundo, fructus ubi inarue-  
rit, ad tertium siccantium ordinem refertur. hac igitur ratio-  
ne & urinam mouet, & lienes adiuuat.

M



*Tettiges, cicada.*

CICADAE crudæ ficcatae ad colicum dolorem potui datur, aut tres, aut quinque, aut septem, cum totidem numero piperis granis. quidā tostas contra vesicæ dolores potui exhibent.

*Teutlon, beta.*

BETA nitrosam vim habet, qua abstergit, discutit, & per nareis purgat, sed alba elixa plenius, inflammationi arcendæ fit idonea, & modicè discutit.

*Teucrion.*

TEUCRION calfacit in secundo, ficcât in tertio ordine, vi incisoria tenuique, lienibus medetur.

*Tephra, cinis.*

CINIS non omnis idem exactè habet temperamentum, sed pro materiæ combustæ differentia euariat: acerbarum sanè arborum cinis, nempe quercus & ilicis, astringendi vim non modicam obtinet, qua sanguinis eruptione compescit, quum nullius alterius datur facultas: acrium verò, puta fici & tithymali cinis, acrior & magis deterforius efficitur.

*Telephon.*

TELEPHION in primo abscessu calefacit, secundo autem desiccât: est itidem absterforium, quapropter vlceribus putredinem expertis conuenit, & vitiligines, tum leucas, tû alphos, cum aceto abolet.

*Telis, fœnugræcum.*

FOENUGRÆCVM ex secundo ordine calidum est, è primo ficcum, idcirco feruidas inflammationes irritat: minus autè calidas & induratas scyrro magis discutiendo perfanat.

*Tithymalus, herba lactaria.*

TITHYMALI omnes è quarto calfacientium ordine sunt, acrimoniæ & validæ amaritudinis participes: sed radix quū sit quodāmodo imbecillior, aceto incocta dentium eroforum dolores finit: liquores vehementiore donati virtute, dentium cauis imponuntur, reliquum corpus si attingant, adurant, quare etiam pilos modicè delitos auferunt, item myrmecias, verrucas & huius generis alia tollūt: & cutis labeles abstergūt, maligna vlcera, & phagedænica, curāt. Ceterum ex septenario ipsorū numero validissimi sunt, appellati characias, myrsinites, & qui in petris arboris modo nascitur: hos sequitur qui verbasco similis est, & cyparissias, dein de paralius, quasi dicas maritimus, postremo helioscopius.

*Tita*



## Titanus calx.

† CALX viua quidē vehemēter adeo vrit, vt crustā inducat: restincta verò crustā quidē subito excitat, sed post diem nū non amplius, calefacit tamen & consumit carneis: si laetetur, idq; aqua marina, validas discutiendi vireis acquirit.

† Hec verba sic leguntur in veteribus libris, τίτανος ἢ μὴ ἀσβε-  
 ῥα λείκει σφοδρῶς, ὡς τε καὶ ἰσχυρῶς, σβενδύσας δὲ παραχρῆμα μὴ  
 χαροῖ, μετ' ἡμέρας δὲ οὐκ ἔτι, διαμαίνει δ' ἕως καὶ διαλύει τὰς σάρ-  
 κας, εἰ δὲ πολὺ δύν, ἀδυνάτω γίνεται, ἢ μέλιστα, εἰ πλεονάνυς πολυδύν,  
 μαφορῆν δὲ ἡνῶς γίνεται θαλάσσης πολυδύνα. Id est. Calx vi-  
 ua vrit multum, vt crustā inducat, extincta autem statim crustā effi-  
 cit, sed post aliquot dies vis eius remittitur, calefacit tamen & tabefa-  
 cit carnes: Si autē laetetur sine morfu redditur, praesertim si sapius lota  
 fuerit: marina verò aqua abluta vim digerendi habet. Quam esse huius  
 veri scripturam, ex Galeno & Aëtio facillè intelligi potest.

## Tragacantha.

† TRAGACANTHA persimiles gummi vires re-  
 praesentat.

## Tragium.

† TRAGIVM frutex est in Creta lentisco similis, virtute  
 balida in tertio abscessu, attractoria, discutiēte, & tenui: a-  
 bscessuleos igitur educit, calculos comminuit, mensisq; citat,  
 instar drachmæ potum, Sed alterum tragium, hoc amarius  
 est, scolopendrio asimile, nascitur multis in locis, tanta a-  
 stringendī virtute praeditum, vt fluidis affectibus commo-  
 de faciat.

## Tragoriganum.

† TRAGORIGANVM origani virtutes habet, & nonnul-  
 lam etiam astringentem.

## Tribolos, tribulus.

† TRIBVLVS mediocriter refrigerat: sed terrestris sic-  
 catio valentior est, aquaticus leuiter etiam humectat: vter-  
 que contra inflammationum generationes, omnesque influ-  
 xus conuenit: terrestris fructus quum tenuis existat, renum  
 calculos conterit.

## Tragositodes, tragus frumentaceus.

† TRAGVS frumentaceus zeæ respondet, sed difficilior in  
 stomacho conficitur, & aluum emollit.

## Trigle, nullus.



MULLVS piscis continuè esus claritati oculorum nocet, crudus dissectus & impositus marini draconis, scorpionis, & araneorum moribus succurrit.

*Tripolium.*

TRIPOLI radix calida est in tertio abscessu & acris.

*Triches, crines.*

PILI combusti per similes lanis cōcrematis vim obtinēt.

*Trigon, pastinaca marina.*

MARINAE pastinacæ aculeus impactus denti infirmo, ipsum conterit excutitq;.

*Tryx, fax.*

FAEX vini ignem nō experta compositis viribus constat, vt quæ abundè deficcet discutiâtq;, astrictoria autem facultas ei ex vini vnde confit specie, accedit. Utendum igitur est ea tum in humidioribus, tū in fluidis affectibus, phygethla discutit, lac, mammis eo refertis imposita, extinguit: cremata verò quæ etiā spheclen appellant, adurentem vim acquirit, quapropter & medicamentis quæ adurunt, ipsam miscemus. vngueis igitur scabros cū resina eiicit: pilos cū oleo lētiscino per noctem toram inuncta, flauos efficit. Lota oculorum medicinis absterforiis temperatur. Aceti fax in omnibus valentior est iam dicta, magisq; astringit.

*Troglodytes, passer.*

TROGLODYTES passer est, omnium auium excepto regulo minimus, in sepibus potissimum degens, qui & tostus & ctudus salsus manducatus renum calculos conterit: cremati ipsius cinis epotus, idem præstat.

*Tyros, caseus.*

CASEVS recens & mollis repellendi vim obtinet, leuiter refrigerans, quare & vulnera impositus conglutinat: at qui oxygalactinus dicitur, præter hanc facultatem etiā discussoriam modicam possidet, magisq; vulnera conglutinat: vetustus, isq; pinguis magis discutiendi virtutem præ se fert, quæ articulariorum quoq; tophis accommodatus est, præsertim cum suillæ carnis & salsæ & pinguis decocto.

Quæ ab Y incipiunt.

*Hyacinthus.*

HYACINTHI radix bulbi speciem repræsentans, primū in siccando ordinis est, secundi refrigerando, pueros itaque impuberes diu cōseruare cum vino inducta creditur: semen leuit



euter abstergit astringitq; idcirco arquatis cum vino datur, ut quod deficet magis quam refrigeret.

*Hyalos, vitrum.*

VITRUM læue cum vino tenui & albo potum, vesicæ calculos comminuere dicitur.

*Hydnon, tuber terre.*

TUBER terræ terrestri constat substantia cum modica quadam virtute tenui.

*Hydrargyros, argentum viuum.*

ARGENTVM viuum in medicinæ vsum non adeò accommodatur, quòd venenum repræsentet: nonnulli verò cōcrematum ipsum in cinerem, mixtumq; aliis speciebus, colicis & iliosis potioni exhibuerunt.

*Hydropeperi, aquaticum piper.*

HYDROPIPER, herbula est calida, sed non piperis, modo, viride cum semine suo inductum, sugillata, & tumores scyrrho induratos discutit.

*Hydor, aqua.*

AQVA præstantissima & alterius substantiæ expers, refrigerat, humectatq; ex peculiari sua natura: vbi autē ascititium calorem assumpserit, quamdiu eum seruat, calfacit: frigida autem facta, refrigerat. Porro quæ nonnihil mixta est, ut nitrosa aut bituminosa, adiunctæ substantiæ vireis acquirit. Pluvialis autem nonnihil etiam astringtionis habet, ob quam oculariis miscetur medicinis. Qualem verò conueniat laudatissimam esse aquam, in primo libro comprehensum est.

*Hyoseyamus, altercum, seu herba Apollinaris.*

ALTERCVM cuius semen nigrum est, item cuius flauū, venenosum est: accommodatissimum verò curationibus, quod & semen & florem candidum habet ex tertio refrigerantium ordine.

*Hypericum.*

HYPERICVM duplex est. alterum quod androsæmon & ascyrrhon appellatur, expositum est: alterum verò calefacit & siccat, tenui substantia præditum, eoq; urinas elicit & menstrua citat, totum ipsius semen, quòd si cum foliis inducatur viride, cicatricem vulneribus obducit, & arida verò folia inspersa vlceribus medetur, dantur etiam potioni aduersus coxarum dolores.



† Hic locus ita descriptus est in veteribus libris, ἔργα δὲ ἐπιμαρτυροῦντα τὰ πλάσματα τῶν ἰωρταί, id est, sicca autem inspersa, prae humida ulcera sanant.

*Hypecoon.*

HYPERCOON refrigerat in tertio ordine, papaveri viribus proximum.

*Hypoglossum.*

HYPOGLOSSON frutex pusillus est, cuius radix & succus emolliendi virtute pollent.

*Hypocistis.*

HYPOCISTIS eorum quæ ad radices cisti & cistari appellati subnascuntur, nempe cytinorum, succus est, medicamentum ad omnes fluidos affectus efficacissimum, ut quod particulas siccet corroboretque.

*Hypophaeston.*

HYPOPHAESTON species est spinæ fulloniæ, quemadmodum & hippophaës, ex huius capitulo, foliis, & radicibus, succus expressus siccatusque trium obolorum pondere, cum mulsa pituitam & aquam euacuat, maxime congruit orthopneis, comitialibus, & nervorum affectibus.

*Hyssopum.*

HYSSOPUM in tertio ordine & calefacit & deficcet, tenuisque substantiæ est.

Quæ à Ph auspicantur.

*Phaci, lentes.*

LENTEs in secundo ordine siccant, medio caloris & frigiditatis temperamento donatæ, sed astrictionis quoque non nihil habent. Totum verò lentis corpus siccet, aluumque sistit: decoctum ipsius proritat, ideoque prior aqua defunditur, quum comprimendi gratia lentes assumentur.

*Phacos, lenticula, palustris.*

LENTICULA palustris humectat refrigeratque in secundo abscessu.

*Phalaris.*

PHALARIDIS succus, folia, & semen pota, vesicæ doloribus auxiliantur, habet eadem herba & tenuem quandam vim, naturamque calidam.

*Phalangites.*

PHALANGITES quod phalangiorum moribus medea



deatur, nomen hoc inuenit: est & tenuis naturæ compos:  
qua torsionibus circa umbilicum auxiliari putatur.

*Phellos, suber.*

**SUBER** præsertim ex vinorum cadis, combustum, cinē-  
rem reddit siccando vehementissimum, qui medicinis ad  
dysenterias inscriptis admiscetur.

*Philyras, tilia.*

**TILIAE** arboris folia, syluestri oleæ similiter astringunt,  
quibus commanducatis, oris vlcera iuuantur, eorumq; deco-  
cto colluuntur: quod etiam potum & vrinam & menseis tra-  
hit.

*Phlomos, verbasum.*

**VERBASCI** genera plura sunt, inter quæ est & dicta  
tryalis: cæterum folia omnium siccantem & mediocriter  
astringentiam vim referunt: præcipuè eius quod aurei coloris  
est, & quod acerbæ sint, fluidis conferunt affectibus: non-  
nulli & dentes ex eis colluunt.

*Phœnix herba.*

**PHOENIX**, aliis rhu, herba est lolio confimilis, astringen-  
di viribus donata, in vino austero pota, omneis fluidos affe-  
ctus sistit.

*Phœnix arbor, palma.*

**PALMAE** fructus qui iam ematuruit, calidus medio-  
criter est, visceribus roborandis & stomacho idoneus, tum  
intus assumptus, tum foris applicatus: reliqua palmæ por-  
tio vehementer astringens est, quamobrem stomachicis, &  
hepaticis medicinis temperatur: longè magis astringit quod  
fructus enascentis veluti inuolcrum est.

*Phermion.*

**PHORMION** tenuis, absterforiæ & attractricis faculta-  
est: semen igitur cum melle albugines extenuat, & spicula è  
corporibus extrahit.

*Phu.*

**PHV** radicem habet nardi persimilem, quæ tamen ad ple-  
raque infirmior sit, sed vrinas magis quàm ea elicit, nardi  
gallicæ modo.

*Phyllum, folium.*

**PHYLLON**, Malabathri folium est, de quo in illius capi-  
te diximus.

*Phycos, fucus.*

**PHYCOS** refrigerat, siccaturque in secundo abscessu, ac  
mediocriter etiam astringit.



*Phylites.*

PHYLITES cūm acerba quadam prædita sit qualitate non immeritò alui profluuiis pota auxiliatur.

## Quæ à Ch auspicantur.

*Chalbane, galbanum.*

GALBANVM calore tertium ferè ordinem accedit, siccitate secundum, molliendi & discussoria vi donatum.

*Chalcitis.*

CHALCITIDIS vires astrictoriæ, acres, adurentesque sunt, & crustam inducunt, tenuitate media inter misy & sori consistit, vsta tenuior redditur.

*Chalcanton, atramentum sutorium.*

CHALCANTHON aqua est in Cypri metallis coalescēs, valentissimè astrictionis cū calore nō ignauo: quod omniū efficacissimè humiditas carnis conseruat suo condimento desiccatur; longiore temporis processu in chalcitidem mutatur.

*Chalcos, æs combustum.*

ÆS combustum acre quiddam habet & astrictionis pariceps est, quapropter ad cicatricem vlceribus obducendam in siccioribus corporibus præstantissimum est: si eluatur, teneris vtilius est, quàm illotum.

*Chalcu anthos, æris flos.*

ÆRIS flos tenuioris naturæ est, quàm æs concrematum, eiusque squama: mixtus itaque collyriis palpebrarum & asperitates, & ficus exterit.

*Chamaedrys.*

CHAMAEDRYS in tertio ordine calefacit siccaturque. licnes igitur consumit, vrinas & menstrua elicit, viscerum obstructions expurgat.

*Chamaecissus, hedera terrestris.*

HEDERAE terrestris flos quum amarus insigniter existat, iecoris meatus adaperit, item contra coxendicum dolores exhibetur.

*Chamaeleuce.*

CHAMAELEUCE in tertio abscessu calefacit, in primo desiccatur.

*Chamaeleon.*

CHAMAELEONTIS nigri radix calefacit siccaturque; prope modum in tertio ordine, est & abstersoria facultatis pariceps, qua cutis labes exterit, item duros tumores dissipat emollitque, & phagedænica vlcera admota in cataplasmate persa



persanat: si autem intra corpus sumatur, veneni loco est. Al-  
bi radix superiori proportionem responderet, sed amarior est:  
quæ si cum vino austero instar acetabuli bibatur, latas ven-  
enis tineas enecat: facit etiam ad aquam inter cutem.

*Chamamelon.*

CHAMAEMELON siue anthemis calefacit siccaturque in-  
ter primo abscessu, præterea virtute tenui, discussoria, laxanti,  
& odorata constat.

*Chamapitys.*

CHAMAEPITYS secundo gradu calefacit, tertio desic-  
cat, quam ob causam & purgare & abstergere viscera, po-  
tissimum iecur potest, item urinas mensisq; trahit, magna  
vulnera conglutinat, putredinem expertis medetur, duri-  
as discutit, decoctum ipsius etiam coxendicum doloribus  
salutare est.

*Chamedrops.*

CHAMAEDROPS, quidam & hoc chamedryn vocant,  
alij etiam teucrion, viribus chamedryi responderet.

*Chamaesyce, humilis ficus.*

CHAMAESYCE abstersoria & acri facultate pollet,  
quapropter & surculi ipsius & liquor myrmecias, verrucas-  
que abolet, crassas oculorum cicatrices cum melle abster-  
gunt, hebetudini, & suffusioni incipienti medentur.

*Chamaelea, oleago.*

OLEAGO abstersoria facultate, sordida vlcera & cru-  
stas cum melle purgat.

*Chelidonium, herba hirundinaria.*

CHELIDONIUM in tertio ordine calefacit, valenterq;  
abstergit: succus ipsius claritati oculorum utilis est: radix  
arquatos cum vino & aniso pota, obstructione liberat: man-  
ducata dentium doloribus auxiliatur. Minus chelidonium  
quarto calefacientium ordini ascriptum, acrius est, ut indu-  
ctum cutem exulceret: vngueis scabrosos eiicit: succus au-  
tem ipsius per nareis purgat.

*Chelidones, hirundines.*

HIRVNDINUM crematarum cinis cum melle illitus,  
anginarum inflammationes persanat: idem oculorum cla-  
ritati benefacit.

*Chole, fel.*

FEL omnium aliorum animantis humorum calidissimum  
est, colore tamen inter se differt: siquidem quod flauum, pal-  
lido calidius: & flauo, æruginosum. præterea variat pro ani-



mantium quæ id habent ratione, quatenus suillum omnibus aliis infirmius est, eoque citra rosionem aurium vlceribus medetur. Ouillum maioris acrimoniæ est quàm suillum, & ouillo caprillum efficacius. caprimo æqualia vrsorum & boum existunt. taurinum vehementius: hoc, fel hyænæ superat, rursus hyæna vincitur à pisce callionymo dicto, & scorpione, cuius animantis fel suffusionibus oculorum, hebetudini, & albuginibus accommodatur: item marinæ hirundinis. at capræ syluestris fel etiam lusciosis conferre dicitur. cæterum omnium volucrum fel, tum acrius, tum siccando vehementius est quàm quadrupedum: inter has ipsas autem gallorum & perdicum aliis est præstantius: accipitrum & aquilarum acrimonia & rosione quodammodo superat, æruginoso colore, nonnunquam etiam nigro.

*Chondrilla.*

CHONDRIILLA intybi species subamara gustu est, propterea etiam maiorem siccandi vim quàm illa obtinet.

*Chondrus.*

CHOND RVS tritico persimilis est, nisi quòd glutinosior.

*Chrysocolla.*

CHRYSOCOLLA altera in metallis reperitur, altera in rubriæris pyla ac tali pistillo in vrina pueri venerem non experti, sub caniculæ astu contrita, præparatur. hæc igitur abstergit, discussoria, siccanteque vi prædita maiore, quàm ea quæ in metallis inuenitur, vt etiam carnem absumat citra rosionem: ob quod vlceribus maleficis accommodata est: concremata vero minus erodet.

*Chrysocome.*

CHRYSOCOMAE, quæ etiam chrysitis dicitur, radix acris simul & astringente vi existit, quare non multi in medicina vsus est, quanquam peripneumonicis & iocinorosis in mulso elixa exhibeatur: cæterum menseis educit.

Quæ à Ps ordiuntur.

*Pseudobunium.*

PSEVD OBVNIVM buni] speciem repræsentat, calefacit, discutit & abstergit: torsiones igitur circa vmbilicum, stillicidia & laterum dolores soluit: strumas etiam cum sale & vino inductum dissicit.

*Pseso*



*Pseudodictamnion.*

*PSEVDODICTAMNON* imbecillis dictāni vires habet.

*Psimmythion, cerusa.*

*CERUSA* refrigerat & opplet.

*Psyllium, herba pulicaris.*

*HERBAE* pulicaris semen secundi refrigerantium ordi-  
nis habetur, siccando humectandoq; medium est.

*Psoricon.*

*PSORICON*, chalcitide duplicata, argenti spumæ mix-  
ta, efficitur, vtriusq; tamen aceto prius detritis, ac in recen-  
tem ollam coniectis, quæ diebus quadraginta sub fimo deli-  
scet: sic enim maiorem siccandi vim, tenuiorem & minus  
odentem quàm chalcitis, acquireret.

Quæ ab *O* magno incipiunt.

*Oon, ouum.*

*OVI* candidum & tenue, nullius planè rosionis compos,  
mediocriter refrigerat. vtendum igitur eo in oculis, puden-  
tium ulceribus, alijsq; omnibus malignis: miscetur etiam  
medicamentis emplasticis, quæ sanguinem supprimunt: lu-  
tium verò pari facultate præditum medicamentis tempe-  
ratur ad inflammationem arcendam efficacibus: tostum ve-  
rò magis siccat, minus lenit. Porro totum ouum aceto inco-  
ctum si assumatur, ventris fluxiones desiccet: si acerbum ali-  
quod adiunxeris, vt, gallam, aut rhum, aut balaustium, ac fri-  
xeris, multò redditur efficacius: ambustis autem crudum  
impositum, protinus auxiliatur. Sorbile assumptum, pesto-  
ris vitia concoquit lenitque, & arteriæ asperitates læuigat.  
Præponetur autem recens veteri: & gallinaceum reliquo-  
rum animantium ouis.

*Ocimum.*

*OCIMUM* secundo calefacientium ordini ascribitur: ha-  
bet & humiditatem quandam excrementitiam, propter  
iniquam neq; vrile est intus assumptum: extrinsecus autem in-  
ductum discutit, & concoquit.

*Ocimoïdes.*

*OCIMOIDES*, nonnulli philæterion nuncupant, inutilis  
quidē radix est: semen verò tenue est, & sine rosione siccat.

De medicamentis simplicibus quæ flauæ bili pur-

gandæ sunt.

¶ A P.



**A**Loës drachma cum aqua mulsa mane datur. qui vesperi eam exhibent, aut secundum cibum, noxam inferunt, quippe alimentum in membra digerit, flauam bilem vacuat minus, trium obolorum instar assumpta, ut quæ crassiora tantum excrementa abundè educat. Ceterum quum omnia purgantia medicamina stomacho aduersentur, sola aloë conducit. qui vero amaritudinem eius non sustinent, in catapotia coactam assument. Sciendum verò est, medicamenta ea non simplici quodam temperamento, verbi gratia, caliditate purgare, (omnia siquidem calida, quale piper est, vacationem molirentur) verum totius substantiæ proprietate, quo modo lapis magnes ferrum attrahere demonstratus est. Porro ex purgantium medicaminum numero ea quæ ventrem duntaxat emolliunt, primo libro sunt exposita: efficacioribus autem utimur vel ad materiam deriuandam, vel ad affectum induratum agitandum remouendumq; aut ad corpus reficiendum, mutandumq; ipsius temperamentum, aut ad noxium humorem eliciendū. Iam verò sunt nonnulli etiā mixti ex prædictis modi, inuicem cōnexi. Cæterum purgationibus hos uti conuenit qui viribus polleant, & mente constant, primosq; ætatis limites euaserunt, nondū verò ad extremos peruenerunt, item qui stomacho robusto sunt, & copiosam materiam inutilem in corpore collegerunt, non multi adeò sanguinis compotes. Tempus autem purgationis, si nulla vrgeat necessitas, vernum maxime & autumnale opportunum est.

*Quæ bilem vacuent.*

**Q**UAE bilem educunt, quouis anni tempore præterquàm in hyeme rectè vsurpantur: ætate verò florida, & declinante: habitu sicco, musculofo, nigri coloris, vel rubri: viris magis quàm mulieribus: item in quibus cibi continuè corrumpuntur, aluus astricta est, amara bilis redundat, iracundis, paucam vrinam reddentibus, cibo vsis sicco & calido. In affectibus, arquato, tecoris imbecillitate, pleuritide, phrenitide, angina, infania, cephalæa, lippitudine, erysipelate, lepra, febris, & quibus bilis superat. Datur aloë capite grauatis, lippientibus, siticulosi, & qui per somnū imaginibus torquentur sine febris, adhæc qui horroris discursus in corpore sentiunt, flatus acreis ædunt, intestinis roduntur, quibus stomachus



hus immodicè æstuat, aut nausea humoribus os eius roden-  
tibus evertitur: postremo, quibus ob recrementorum abun-  
dantiam clyster nequit iniici: abundè siquidem inanit, sic  
vt totum corpus non commoueat, nisi copiosa admodum  
fuerit exhibita: bilem autem intestinis, aluo & stomacho  
inherentem educat. Veratrum conuenit & acuto & lon-  
go morbo laborantibus, qui medicamentum bili ducendæ  
doneum requirunt, quales sunt qui insania, altera capitis  
parte (heterocranici dicuntur) humorum impetu in oculis  
decumbente, & pectoris affectibus torquentur: accommo-  
datissimum est visceribus, vteri & vesicæ vitii medicinam  
requerentibus. Laudatur etiam ad longam asperæ arteriæ  
affectionem, arquat, eruptiones quæ ex æthemata dicun-  
tur, impetigines, vel herpetas, vel erysipelata, vel lepras. Ve-  
ratrum nigrum bilem flauam potissimum è toto corpore  
citra molestiam educit, quam ob causam iis qui non graui-  
ter febricitant, magisq; febri carètib; instar drachmæ ex-  
hibetur, radicibus in mulsæ & aquæ maceratis, aut cum mel-  
le catapotiorum modo: verum ita exhibetur, vt ieiunium  
præcesserit. Sunt qui misceant ei pulegium, vel saturciam,  
vel aliquod ex iis quæ subito transeunt, stomacho non ini-  
mica. Scammonia perinde vt veratrum purgat, magis fla-  
uam bilem: cæterum inter omnia quæ purgatione moliu-  
tur, aduersissima stomacho est. datur igitur iis qui febri ca-  
rent & stomacho sunt meliori, ad pondus quatuor obolorū  
cum sale aut pipere, aut zingibere, aut quodam stomacho  
utili, quod protinus corpus permeet, aut etiam cum melle:  
item cum gummi quoq; fiunt catapotia. Colocynthidis,  
hoc est, cucurbitæ sylvestris medulla bilem potissimum va-  
cuat, & mucosa non à sanguine tantum trahit, quemadmo-  
dum veratrum & scammonia, sed etiam à nervis & nervosis  
partibus instar drachmæ in aquæ mulsæ cyathis duobus,  
quibus & ruta incocta sit, epota: læuiget autem accuratè,  
quoniam asperitates ipsius interaneis adherentes, vlcera cō-  
citant, & nervos confortij lege afficiunt. Exhibetur rectè,  
capite dolentibus, nempe quum cerebri membrana, vel ea  
quæ caluariam cingit, vitiata fuerit, vt, vertiginosis, hete-  
ronocranicis, cephalæa infestatis, comitialibus, apoplecti-  
cis, conuulsis, vt in vtramlibet partem deprauata sit facies,  
qui cynicus spasmus dicitur, diuturno in oculos fluxu vexa-  
tis,



tis, orthopnoïcis, suspiriosis, vetusta tussi conflitantibus, præterea iis quos articularij dolores, & renum aut vesicæ affectus malè habent. Elaterium scammonia modo euacuat. deligendum verò porraceum, leue, & anno non vestustius, triobolari pondere cum lactis hemina læuigatum exhibetur. Tithymalus bilem elicit, non aliter quàm elaterium & scammonia. datur liquoris guttæ quatuor aut quinque cum polenta macerata, quæ statim deglutientur. Nam in ore diu retentæ, linguam exulcerant, eiusque viciniam.

Lathyrides bilem purgant sicut veratrum & scammonia: offerentur igitur septem octo ve, & vsque ad quindecim: robustis sanè & qui liberaliore indigent purgatione, manducari præcipe, imbecillioribus & malo præditis stomacho, integras ipsas deuorare. Peplij turionum qui semper ficci existunt, instar octo obolorum in mulsâ datum bilem educit, veratri modo, & flatus disiciit. Agaricum simileis cucurbitæ syluestri vircis habet, tardum ad functionem obcundam, non autem stomacho admodum inimicum: datur læuigatum drachmis duabus cum mulsâ, sit autem albissimum, vehementer fragile, non adeò lignosum, neq; teredinibus obnoxium. Iris illyrica simili modo purgat octo obolorum instar ex mulsâ assumpta. Sit autem nec vetusta, nec teredines experta. Centaurium minus bili & mucus purgandis aptum, coxendicum doloribus peculiariter conuenit: ius ipsius drachmæ & semissis pondere in aquæ hemina decocti ad dimidias bibitur. Tragorigani flos cum semine instar duarum drachmarum ex mulsâ datur, quibus etiam veratrum nigrum, verum flos ille, gratior quidè stomacho existit quàm veratrum, minus autem purgat. Chamælæ drachmæ quatuor in mulsæ heminis duabus ad quartas decoctæ, perinde vt veratrum, purgant. Nonnulli vero chamælæ & absinthij dupla portione catapotia fingunt, exhibentq;. Aristolochiæ clematidis, hoc est farmentariæ seminis drachma in mulsâ pota, colocynthidis more purgat. Polypodij radix arida, si læuis mulsæ inspergatur, aut cum ea conteratur, eundem quem colocynthis effectum præstat.

*Quæ bilem atram vacuent.*

MEDICAMENTIS atram bilem ducentibus vtetur præcipuè in melancholicis, furibundis, iracundis, hominum  
conf



confortia exosis, aut secessu gaudentibus, itē in his qui dum morbo reficiuntur, purgationem desiderant, autumno feruidiore, habitu sicco & parum musculofo. Epithymum laudatissimum est remedium inter ea quæ atræbili vacuanda sunt. dantur ipsius drachmæ quinque læuigatæ ex lactis hemina. Epithymum quod thymbræ supernascitur vt epithymū similiter euacuat, sed imbecillius est. Pulegium atram ducit bilem instar acetabuli in mulsa potum. Tragorigani heracleotici idem modus, vti pulegium vacuat, cæterum ambo desiccant. Alypi semen inferius atrā purgare bilem pari epithymo mensura cum sale & aceto dictum est, intestina verò si fidem Dioscoridi accommodamus, leuiter exulcerat. Est autem meo iudicio, quæ nunc alypias vocatur: exhiberi debet in mulsa. Parthenium similiter siccum si potetur eadem solet extrahere. Alysson cum sale epotum non aliter quàm superiora expurgat.

*Quæ pituita vacuanda sint.*

eorum quæ pituitam educunt vsus est in habitu frigidiore & senio confectis perq; hyemem, in resolutis, apoplecticis, inturgescentibus tumore laxo fungosoq; quod œdema dicunt, insuper in his qui multum pituitæ in ventriculo, aut pectore, aut stomacho collegerunt, & in mulierum fluore. congruunt etiam copiosa emungentibus, crassa excreantibus fastidiosis, & coxendicum cruciatu detentis, quum mucis articulis incubuerint, aut elephantosis: maxime autem conueniunt iis qui aqua inter cutem laborant, cui nomen est anasarca. Styracis albi drachmæ pondus cum resina terebinthina æquali modo deuoratum, pituitam euacuat. Oleæ radices cortex drachmæ instar cum vino aut aqua. Pyrethri oboli nouem ex aqua. Lychnidis seminis drachmæ duæ. Cyclamini radices drachma cum hydromelite. Scordij drachmæ duæ cum melle. Chamæpytis in pollinem detrita, exhibitaq; in catapotis. Squamæ Cypriæ drachma semis cum resina pari in catapotis valentius purgat pituitam. Lauri foliorum viridium sesquidrachma. Cucumeris syluestris radices corticis oboli duo. Ricini grana quadraginta, crotones dicti, putaminibus detractis eduntur, similemque effectum præstant.

Apij dimidium quod ad radicem est manducatum: nonnulli id chamæraphanon appellant, hoc est, humilem raph



raphanum. Bdellij drachmæ duæ ex hydromelite. Peculiariter autem gummi oculis defluentibus idoneum.

*Quæ aquam educant.*

AQUAM elicientibus vti conuenit in his quos aqua subter cutem, ab vtre ascites dicta, malè habet, in mulieribus albo fluore infestatis, item in iis quos vlcera fluida torquêt.

Squamæ Cypriæ drachma cum mulsâ pota aquam educit: aceti verò momentum superforbere oportet, ne per vomitum reddatur. Coccum gnidium cortice detracto laue cum melle cocto potum ne fauces attineat, aquas trahit. dantur autem grana aut viginti, aut vigintiquinque, aut triginta: valentioribus quadraginta. Euphorbij drachma cū melle cocto pota pituitam emolitur, magis autem aquas.

Lonchitidis seminis oboli octo cum mulsâ aquas purgât.

Cneoron similiter aquas trahit cum polenta potū. Cnici seminis drachmæ quinque laugatæ ptisanæ incoquantur cum salis momento, sorbenturq;. Ammoniâ suffiminis drachma in mulsâ pota aquam educit. Nonnulli verò lienosis id cum posca exhibent. Sambuci corticis radicis succus instar vnciarum duarum potus cum vino aquas educit.

*De compositis medicamentis purgantibus.*

C A P. V.

*Catapotia ex aloë.*

Colocynthis medullæ pars vna, absinthij succi pars vna, aloës partes duæ, scammoniae partes duæ: ex aqua granula ad erui magnitudinem finguntur. dantur vndecim numero.

*Oxymeli Iuliani.*

RVTAE, origani, singulorum quadrans, thymi comæ triens, anethi fescuncia, iridis vncia, mandragoræ radicis fescuncia, agarici sextas, tedarū pinguiū vnciæ duodecim, cocci gnidij triens, lathyridum, alypiadis, singulorum quadrans, polypodij sextans, phylli, costi, spicæ nardi singulorum vncia, rheupontici fescuncia, scillæ, sambuci turionum, canopi, (qui est sambuci cortex) singulorum quadrans, asari vncia, pulegij quadrans, epithymi, veratri, acori, singulorum sextans, sij, amomi, hyperici, cumini, singulæ vnciæ, anisi sextans, aceti sextarij decem, mellis sextarij quinque: herbæ per triduum in aceto madescunt, deinde excoctis dum amplius



plus dimidio consumptum fuerit, mel adiicitur: vbi vnita fuerint, & illis abiectis admiscetur lathyrides, costus, cocum gnidium, spica nardi læuigata, & si voles postquā perfectē coctum fuerit oxymel, illa impones. Modus summus est vncia, aut pro virium ratione: benefacit podagricis affectibus & comitialibus, ac in quibus vacuare simul & crassos humores educere opus est.

*Purgatio ad ducendum aquas quæ constat caryophyllo.*

Aloës, epithymi, caryophylli, cocci gnidij, petroselinij, rheupontici, singulæ semūciæ, euphorbij scrupuli quatuor, mellis quod satis est. datur cochlearis mensura.

*Purgatio ex rhodomelite confecta, Alexandri.*

ROSARVM succi sextarij duo, mellis sextarius, scammonij vnciæ quatuor. summus modus est quinque cochlearia: leuior, duo: medius tria. ALITER. Mellis libra, rosarū succi libra, piperis drachmæ duæ, scammonij drachmæ octo, mastiches drachmæ quatuor, zingiberis drach. duæ. ALIO modo, quo ego vtor, Spicæ nardi, asari, epithymi, singulorū semuncia: macerantur in aquæ hemina per triduum: vbi mediocriter incoxeris, misceto aquæ rosarum succi sextarij dimidium, mellis tantundem. Postquam adusque spissitudinē fuerint incocta, scammonij sescuncia admiscetur.

*Purgatio ex malis cotoneis.*

MALORVM cotoneorum tostorum vnciæ quatuor, piperis vnciæ sex, scammonij drachma, mellis vnciæ quinque: trita exhibentur cochleario instar vnciæ, aut pro viribus.

*Compositio diaetiri, quod est, ex malo medico, stomacho utilis.*

MALI medici corticis carnisque pondo in aquæ sextario vno & dimidio ad tertias decoquitur, mellis sextarius dimidias adiicitur: vbi mellis spissitudinem ex coctione acceperint, inspergitur læuigari piperis longi vncia, scammonij tosta in fermento tantundem.

*Bucellatus purgans.*

SCAMMONIÆ tosta vncia, piperis, apij semini, singulorum scrupulum, fœniculi, anisi, singulæ vnci. mellis libra: tosta mediocriter instar vnciæ dantur in condito.

*Oliuæ purgantes.*

SCAMMONIÆ vncia, piperis tantundem, epithymi, cumini torrefacti, petroselinij, rutæ, foliorum menthæ viridis,

N



singulorum drachmę quatuor, laſerpitiј drachma, palmularum vnciæ quinq;, mellis tantundem, aceti hemine duę, oliuarum colymbadum sextarius, ſciſſarum videlicet: quidam & gari momentum addunt. Modus eſt quinque ſcrupula aut ſeptem aut nouem.

*Paſtillus purgans.*

SCAMMONIAE drachmę quatuor, euphorbij tantundem, phylli, piperis, ſingulorum drachmę duę, mellis libra. datur inſtar vnciæ.

*Fuſca purgans, & ſtomacho grata.*

CUMINI, ſœniculi, ſingulorum vncia, pulegij, apij, aniſi, ſingulorum ſemuncia, epithymi, ſcammonia, ſingulorū vncia, ſalis vnciæ duę. Summus modus datur ſcrupulis duobus in poſca, nonnulli etiam euphorbij ſcrupula quatuor adiiciunt.

*Vinum purgans in hydropicis.*

SCILLA tres vnciæ, apij ſeminis vnciæ ſex, piperis drachma, capparidis radicis drachmę quatuor, cocci gnidij cortice exuti drachma, folij malabathri galbuli duo, vini hemina duodecim, mellis ſextarij tres: ſcilla contuſa vino ſuperfunditur, reliqua læuigata miſcentur.

*Halatia, quaſi dicas ex ſale conſecta, purgatio.*

SALIS communis torrefacti drachmę ſex, apij ſeminis, zingiberis, panis ſicci, ſingulorum ſcrupula ſex, aniſi, piperis ſingulorum ſemuncia, ſcammonia, epithymi, ſingulorum vncia. datur circiter cochleare.

*Compoſitio dia Hermodactylu, ad podagram.*

HERMODACTYLI quadrans, aniſi, cumini æthiopici, ameos, thymi ſummitatum, piperis albi, zingiberis, ſingulorum ſcrupula tria, epithymi ſemuncia: exhibentur ſcrupulis quatuor. quidam ſcrupula ſex dant mane cum condito, aut mulſa, aut aqua calida. ALITER eadem purgatio. Hermodactyli vncia, cumini æthiopici, aniſi, agarici, zingiberis, ſingulorum ſcrupula ſex, maſtichæ, ſpicæ nardi, ſingulorum ſcrupula duo, muſci ſiliqua, cnici ſcrupula duo. datur quatuor ſcrupulis cum hydromelo, Scammoniam, quod ſtomacho ſit inutilis, auerſamur. Si autem liberaliore vacuatione opus ſit, ſcammonia ſiliquas treis menſurę admiſcebis: loto exhibetur.

*Catap*



*Catapotia, quæ constant lapide armenico, arthriticis  
potissimum exhibenda.*

ALOE S vncia quatuor, scammonia semuncia, agarici vncia, epithymi tantundem, lapidis armenici scrupula duodecim, cassia vncia, spica nardi vncia, scilla tostæ sextans, croci scrupula duodecim: rhodomelite excepta duobus scrupulis exhibentur.

*Compositio dia Coronopodii, ad eadem efficax, ad quæ ex  
Hermodactylo confecta, stomacho utilis.*

ZINGIBERIS scrupula duo, piperis scrupulum, agarici scrupula decem, cnici partis interioris scrupula quatuor, coronopodii radice scrupula sex. dantur scrupula tria: quibus alius est difficilis filiquæ viginti tres, quæ faciunt omnino obolos septem, aut ferè octo. vbi venter inanitus est, ad iulauacrum duces, inde ouis & pane enutries.

*Medicamentum ex Cyrenaico liquore ad febrem quartanam.*

LACTIS cyrenaici, piperis, zingiberis, rutæ foliorum, singulæ drachmæ. datur ad nucis auellanæ magnitudinem.

*Puls ad purgandum, tumoribus laxis, & elephanticis  
singulariter efficax, & in quibus humorem cras-  
sum glutinosumq; emoliri voles.*

CUCURBITIS duabus sylvestribus circumcisus semen eximetur, interiore ipsarum carne relicta, dulci oleo ipsas replebis, & propriis operculis obtectas pernoctare fines, in sequenti die vacuato oleo cucurbitas in aqua decoques dum tabescant, deinde ipsis proiectis oleo aquæ temperato nigri veratri triobolum adiunges, scammonia drachmā: vbi iam cucurbitis pulticulam è simila, aut panem siccum læuigatum incoxeris, inde ægroto dabis tenui pridie vso victu, ad nucis auellanarum, octo aut decem, aut plurimum quatuordecim magnitudinem, & portioni aquam calidam exhibebis.

*Quomodo eos qui purgantur tueri conueniat, quidq; faciendum vbi medicamentum purgans assumptum nihil profecerit.*

CAP. VI.

SVMMATIM in omni purgatione efficaci, medicamentum homini quem certa prius victus ratione alueris, ieiuno & concoctione obita trades, ac à somno quoad in totum purgatus fuerit, arcebis, motu mediocri si fieri potest adhibito, cibo omni & potu abstinere vsq; ad consummatam purgationem compelles.



*Ex commentarijs Philagri.*

At si in ediam non tulerit, aut quod ventriculi os ad bilem contrahendam expeditum ex longa penuria præcedente habeat, aut alia eiusmodi de causa, dabitur ipsi panis ex vino aquoso, aut ptisanæ cremor aut chondri, idq; nondum incepta vacuatione, (vt ne cibus corrumpatur) sed protinus vbi medicamentum fuerit epotum, sic enim nonnunquam ad celerem medicaminis motionem pōdere suo opitulatur. Si verò quocunque medicamento ad aluum emolliendam assumpto quis non purgetur, neq; vacuetur, nullo accedente periculo nihil moliendum est. At si magnitudo morbi urgeat, aut æger vellicetur, distendatur, & lancinationem expertus fuerit, clyster statim necessario iniicitur. Si ne sic quidem venter respondeat, corpore rofionem & veluti euerfionem sustinente, lauare liberaliter inungendo oportet: vbi repletum est grauaturq; sanguinis dimissio congruet, præfertim vbi multi compos sanguinis homo fuerit, oculos rubros habeat, & emissitios, nō ex natura, sed acquisitō ex medicaminis potione. Vbi horum nihil infestat, sed morsus & vellicatus affligit, à balneo cibū protinus offeres, vinum liberalius potui dabis, atq; interea clysterem inferes, nisi subsistat cruciatus, rursusq; lauabis. Esto autem oleum quod in aluum dabis rutaceum, aut ex alio quopiam flatus expertè præparatum.

*Si purgatio modum excedat.*

CAP. VII.

SI purgatio maior sit impendio, cutis infricari debet, & lauari calida: ante balneum vinum tenue, fuluum & flauū dari, tale siquidem celerrimè in totum corpus distribuitur: item panis ex eo madens, & malum punicum. Quod si euacuatio perseveret, artus vinculis excipientur, quæ è summo deorsum distributa, constringant, & nonnihil sanguinis & spiritus excipiant: dabiturque potui theriaces ex caribus viperarum momentum. deducit enim in cutem subitoq; reuellit humorū in ventriculū confluxum, obtunditq; medicinæ purgantis quod ceu virosum est & medicatū. huius penuria pastillos theriacos, præterea compositionem diaspermaton, & Philonium appellatam: imò etiā cucurbitulis supra stomachum, & cataplasmatibus ex polenta & mulso vti, prodest, deinde epithematis astringentibus: maximè verò ex totius corporis frictione, & medicaminum potu, adiuvatur,



tur. Aër ipsis vitandus qui frigidus nimium aut calidus existat: ille siquidem materiã à foris intro compellit, fluorẽmq; auget: hic discutit, & vireis resoluit. At si ex intestinorũ quæ medicamento irritantur, erosione, vacuatio augeatur catarrholasmatis obducere commemorata oportet, & in aluum dare, præ quæ acrimoniam retundunt, adipem anserinum scilicet, vinum dulce, nardum & consimilia.

*De Hieris antidotis.*

CAP. VIII.

*Hiera Antiochi.*

**C**Hamedryos, agarici, colocynthidis medullæ, stœchados, singulorum drachmę decem, opopanacis, sagapeni, petroselini, aristolochiæ sarmentaceæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinq; cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, croci foliorum, singulorum drachmæ quatuor, mellis quod satis est, **A L I T E R.** Colocynthidis carnis drachmæ viginti, scillę tostæ, agarici, ammoniaci thymiamatis, veratri nigri corticis, scammonia, hyperici, singulorũ drachmæ tres, epithymi, polypodij aridi, bdellij, aloës, chamedryos, marrubij, casia, singulorum drachmæ octo, myrrhę troglodytidis, opopanacis, sagapeni, petroselini, piperis cõmunis & longi & albi, cinnamomi, croci, castorij, aristolochiæ longæ, singulorum drachmæ quatuor mellis quod sufficit.

*Hiera Iusti.*

**E P I T H Y M I** drachmæ duodecim, marrubij, stœchados, chamedryos, veratri nigri, scammonia, agarici, piperis longi, scillæ tostę, singulorum drachmę sedecim, euphorbij, colocynthidis carnis, aloës, croci, gentianæ, petroselini, guttæ ammoniaci, sagapeni, singulorum drachmæ octo, opopanacis, polij, cinnamomi, myrrhæ, spicæ nardi, iunci odorati floris, pulegij, singulorum drachmæ quatuor, aristolochiæ longæ & rotundæ, vtriusq; drachmæ duæ, mellis quod satis est. datur scrupulis duobus, aut tribus, aut quatuor cum mulsæ & sale.

*Hiera Galeni.*

**C H A M A E D R Y O S**, piperis longi, piperis albi, stœchados, veratri nigri, scammonia, spicæ nardi, scillæ tostæ, (nonnulli etiam epithymi) singulorum drachmæ sedecim, myrrhæ, croci, ammoniaci suffiminis, euphorbij, singulorum drachmæ octo: excipiuntur melle.

N 3



*Hiera Rufi.*

C V C V R B I T A E syluestris, quę sicyonia vel colocynthis dicitur carnis, drachmę octo, chamędryos drachmę decem, sagapeni drachmę octo, petroselini, aristolochię rotundę, piperis albi, singulorum drachmę quinq;, cinnamomi drachmę quatuor, vel cassię octo, spicę, croci, polij, myrrhę, singulorum drachmę quatuor, mellis quod satis est.

*Hiera Archigenis.*

M A R R V B I I, agarici, chamędryos, colocynthidis carnis, stęechados, singulorum drachmę decem, opopanax, sagapeni, petroselini, aristolochię rotundę, piperis albi, singulorum drachmę quinq;, cinnamomi, spicę nardi, myrrhę, polij, croci, singulorum drachmę quatuor. arida tunduntur simul & incernuntur, opopanax autem, sagapenum, & myrrha contusa, mulsæ per noctem vnā in pila macerantur, deinde læuigantur, & sicca his admiscuntur: melle optimo excepta reponuntur in vitreo vase aut plumbeo. hæc ratio omnium hierarum cōmunis est. Summus ipsarum modus est drachmę duę: assumatur & salis drachma, mellis heminę duę, aquę quantum satis est. Quod si vehementiores ad purgandum voles efficere, quibus scammonia non inest, iniicitur, & his singulis ex illa obolus.

*Quę sedis & vmbilico illita purgent.* CAP. IX.

*Illitio sedis ad flatus excutiendos.*

**R** Vta cum melle in tenuissimum pollinem redigitur, vt vnus succus fiat, & penitissimē intra sedē delinitur. Efficacissimum verō est si cumini momentum & nitri assumat, vel cyclamini succum: stuppa exceptum imponitur, aut glādis forma melle apposito, flatus siquidem multi erumpunt, ventrem leuantes.

*Perunctio sedis ventrem mouens, Chęranance.*

A L V M E N CUM melle læuigatum coquitur quoad fuluū reddatur, atq; hoc sedes perungitur, faciliē enim copiosa citra laborem subducit.

*Medicamentum quod vmbilico illinitur epomphalium dictum, ad aluum subducendam.*

C Y C L A M I N I drachmę quatuor, nitri drachmę tres, veratri nigri & albi, singulorum drachmę duę, colocynthidis drachmę tres, scammonię drachmę duę, elaterij succi drachmę quatuor, cocci gnidij totidem, caricarum pinguiū  
vnc



uncia duæ, fellis taurini uncia.

*Aliud laudatissimum.*

ELATERII, lathyridis, galbani, cyclamini, veratri nigri, singulorum drachmæ quatuor, colocynthidis carnis drachmæ octo, cucumeris syluatici recentis, scammonia, cocci gnidij, rithymali, singulorum drachmæ duæ, terebinthinæ drachmæ tres: excipito hæc felle taurino, & vnguinis modo vtitor. Quidam verò adiungentes faui uncias septem & cyonij quod satis est, emplastri modo imposuerunt.

*Quæ medicamenta vomitum citent, & quomodo veratrum exhibeatur.*

CAP. X.

Vomitum vtuntur & sani, qui ciborum humorumve copia grauantur: & acuto morbo laborantes quum à pituita aut eiusmodi quodam infestantur. At medicamentis vomitum facientibus neq; sani, neq; acuta ægritudine occupati, vti permittentur: sed in lōgis profunt affectibus & præsertim induratis, quæ validam commotionem desiderent, qualis est podagra, morbus comitialis à stomacho originē trahens, elephātia, aqua subter cutem, melancholia, & perasimiles. Aduersatur vomitus sanguinem excreantibus, malo præditis stomacho, & iis qui suffocationibus opportuni sunt. Promptissimū igitur ad vomitum ciendū est Cyprinum, digitis aut pinnis in id intinctis, demissisq; in guttur. itē nardi gallicæ radicum drachmæ septem ex mulsâ potæ sursum valenter purgant: similiter etiam radicū betonica, quæ cestron dicitur, quinq; aut sex drachmæ cum mulsâ sumptæ & daphnoïdis tria folia viridia in læuorā coacta comestaq;. Item elaterij obolus in aqua assumptus, sursum pituitam & bilem expurgat: & herbæ pediculariæ grana quindecim cum mulsâ crassiore, ex bulbis autem qui manducari solēt, si crudi assumantur. Narcissi autem elixi sursum per vomitum purgant. idem facit apij radicis pars superior, aëri prior comesta, vocant eam nonnulli chamæraphanon, inferior autem pars per inferna purgat, tota vero sumpta vtrinq; raphani prædictis minus quidem purgant, sed vtilius: ceterū conuenit ipsas acreis & recēteis adhuc minutim cōcisas, ante duas trēsve horas in oxymelite maceratas quā fieri potest multas, assumere, ter quaterve à cœna vomitu excitato: semel autem ieiuni voment, & sæpe oxymel absorbeant: vbi duabus horis inambulauerint, egelidam bibentes aquam, digitis aut pinnis in os demissis voment.

N 4



*Quibus modis veratrum exhibeatur.*

VERATRUM dari debet, ubi lōgi valentesq; morbi sunt & spes ex aliis præsidiis adempta est, quod agritudo omnibus ipsis fortior extiterit. Conueniet autem siue continuē infestauerit morbus, vt aqua inter cutem, elephantia malus corporis habitus, resolutio, & id genus alia: siue statis temporibus repetat, vt morbus comitialis podagra. Porro quū plures hellebore exhibendi modi existant, simplicior quidem & præparatio potius ad id assumendum, talis est. Raphano arundine compuncto dissectoque veratri albi optimi radicum præsegmina inferuntur: ac ubi vna nocte in eo permanserint, proiciuntur: raphanus minutim concisus, cum oxymelite in dictum modum ægro exhibetur, nimirum vomitionibus assueto, atq; is horis quot diximus interpositis ad vomitū cogendus est. At proprius veratri exhibendi modus hic fuerit. Veratri optimi sextans in aquæ hemina diebus quinque maceratus, ad aquæ tertias incoquitur: ubi expressum veratrum est, aquæ miscetur tantundem mellis: excoctū vsq; ad spissitudinem prædicto modo, laboranti exhibetur, præterquā vomere prius exercitato etiā ieiuno, probeq; defuncto cōcoctione, & cui alius respōderit, vel sua sponte, vel clystere semen bisve secundum virium rationem sollicitata. Omnium vero efficacissimus modus talis est. Dissectis veratri radicibus in sesami magnitudinē (nam in tenuissimum redactæ pollinem virium efficacia strangu-lationes pariunt) veratri plurimum drachmas duas, modicē vnā, imbecillioribus ptisanæ cremorū aut alicæ, aut id genus alicuius incoctam, potui dabis: valentioribus ex aqua calida aut mulsa. Incipit autem purgatio post tres quatuorve horas: quibus tardior est, ij melius purgantur. Quod si vomitus lentē oboriatur mulsa potui data, vomere æger cogendus est, pinnis oleo madidis in os demissis. si ne sic quidem proficiatur, in balneum deduci debet. Vbi iam vomere inceperit si vacuatio paulatim respondeat, nullū egro negotium facessere oportet. sin autem vellicatum aut conuulsionem experiatur, hydrelæm potui dabitur, simul & in aluum ab inferiore parte indetur: quod alioquin in his qui helleborum assumunt, nonnunquam fieri solet, vnde medicamenti coaceruationem facilius ferunt. Si anima deficiat, naribus quæ odorem mouent admotis & consimilibus vi-

reis



is recolligere, aliisq; vt verisimile est superuenientibus ca-  
 pus, eadem accommodare oportet. At multa facta inani-  
 one, cibus dari somnusq; permitti debet, & alia sicuti in  
 iis qui nimium purgantur diximus, factitanda sunt. Si perse-  
 veret vacuatio, cucurbitulas stomacho defigere, & artus vin-  
 alis excipere conuenit: sin autem pro ratione facta sit, mul-  
 ius iusta portio propinabitur, qua superfluitates e medica-  
 mento reliquæ eluantur: mox cibus boni succi offeretur.  
 am verò in iis qui medicamenta per os abominantur, omni-  
 o autem hellebore potionem requirunt, Antyllus huius-  
 modi quodam vsus est clystere: hellebore albi drachmæ duæ  
 aquæ sextario per diem & noctem vnā macerantur, se-  
 quenti die veratrum in aqua ad dimidias coquitur, inde in  
 lum datur, vt vomitum concitet, superius purgat paulò  
 becillius quàm veratri potio. Vbi abundè purgatum est,  
 acris imposita, alius irritatur, vt quod iniectum est  
 leddatur, & æger non amplius vomat. Facta excretionē,  
 nula semel bisve intestinis abluendis iniicitur. ipse verò  
 antyllus tradit fieri etiam glandem ex helleboro albo ruse  
 ribratòq; deinde cocto melle excepto, ac clysteris modo  
 helleboro præparati, superiorem ventriculum purgare, ve-  
 hic hic est modus probatior. Nam purgationem partire in  
 vices nobis licet: pondus igitur sit veratri drachmæ duæ, cæ-  
 rum glans circumaptetur aut vinciatur stappa solidiore,  
 cuius initium extrinsecus per sedem recipiatur, quò glan-  
 dem vbi satis purgando profecerit, auferre possimus. hic  
 nodus purgat quidem absolutissimè, non autem suffoca-  
 tionem aut aliud quoddam periculum inducit.

## De differentia antidotorum.

## CAP. XI.

**P**Ræfatio Galeni de antidotis in hunc modum habet. Me-  
 dicinas quæ non extrinsecus impositæ, sed intra corpus  
 assumptæ affectibus medentur, antidota veteres nūcupan:  
 cæterum triplex ipsorum est differentia, quædam enim le-  
 thalium medicamentorum gratia offeruntur, quædam ob  
 pestias virus iaculanteis, quas Græci *ἰσθόλας* appellant, quæ-  
 dam verò morbis ex prauo victu contractis auxiliantur: nō-  
 nulla treis hos vsus promittunt, quemadmodum etiam quæ  
 theriaca dicitur.

*Hedychroi quod theriacen ingreditur, confectio.*

**ASPALATHI** radicis corticis, calami aromatici, costi,

N 5



asari, xylobalsami, phu, amaraci, mastiches, singulorum drachmæ sex, carpobalsami drachmæ duæ, mari drachmæ sedecim iūci odorati floris drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ vigintiquatuor, amomi, cassiæ, rha, singulorū drachmæ octo, nardi Indicæ, phylli, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ drachmæ vigintiquatuor, croci drachmæ duodecim: vino primi meriti excepta, in pastillos coguntur, manu in opobalsamum intincta.

*Quomodo pastilli scillini præparentur.*

SCILLA luto aut crusta ex panificio & opere pistorio oblita, modicè torretur, inde carnis ipsius partes, duæ, cum erui farinæ una capiūtur, simulq; læuigātur & finguntur pastilli.

*Quomodo pastilli theriaci fiant.*

SVMVNTVR viperæ quatuor aut quinæ, fului coloris & recens captae, & quaternis digitis à capite & cauda amputatis, totaq; cute detracta & interaneis exemptis, reliquū corpus in fictili nouo cum anetho & sale modico discoquitur, dū spinæ à carnibus segregentur: deinde his exceptis ablatiisq; accuratè à spinis carnibus, & panis puri æquali modo addito, læuigātur omnia pariter, formanturq; orbiculi manu in opobalsamum intincti: in vmbra refrigerantur.

*Quomodo paretur theriace antidotum.*

PASTILLORVM scillinorū drachmæ quadraginta octo, pastillorum theriacorum, pastillorum hedychoi, cinnamomi, piperis, communis, lachrymæ papaueris, singulorum drachmæ vigintiquatuor, rosarum siccarum drachmæ duodecim, scordij, napi buniados seminis, iridis illyricæ, agarici, dulcis radiculae, opobalsami, singulorū drachmæ duodecim, myrrhæ, croci, zingiberis, rheu pontici, quinquefolij radicis, nepitæ, iunci quadrati floris, marrubij, petroselinij, stæchados, costi, piperis albi & longi, dictamni, thuris masculi, terebinthinæ, mastiches, chiæ, cassiæ nigræ, nardi indicæ, singulorū drachmæ sex, polij floris, styracis, apiij seminis, seselis, thlaspis, ameos, chamædryos, chamæpityos, hypocistidis succi, malabathri, nardi gallicæ, nardi, mēu, gētianæ, anisi, fœniculi seminis, lemnis terræ, chalcitidis tostæ, amomi, acori, carpobalsami, phu pontici, hyperici, acaciæ, gummi, cardamomi, singulorum drachmæ quatuor, dauci seminis galbani, sagapeni, bituminis, opopanacis, castorij, centaurij tenuis, aristolochiæ sarmentitiæ, singulorum drachmæ duæ,  
mel



mellis attici pondo decem, vini falerni sextarij duo: conie-  
 mis in pilam, liquore hypocistidis, myrrha, sagapeno, dulci  
 dicula styrace, acacia, & opopanace, mellis momentum  
 stillatur, contusaq; dissoluuntur, deinde vino superfuso,  
 illa superet per triduum madescunt: inde reliqua contu-  
 ta in vnitatem coguntur, mel despumatum: ceterum in ar-  
 genteo aut vitreo vase non adeò pleno medicamentū repo-  
 nitur, frequenter operculum aufertur. Vfus eius est quū vr-  
 get necessitas in iis qui à feris commorsi sunt & venena as-  
 persione percipere, post annum ætatis septimum, sic vt instar nucis a-  
 mellanæ, cum tribus vini cyathis, quotidie bis bibatur. Simi-  
 liter facit ad eos qui ex quadam latente causa periclitati  
 sunt, corruptela quæ corpus conficit, lethalis medicamenti  
 qualitatem imitata, quemadmodum in pestilētia correptis  
 mortuosissimum accidit, semel quotidie. in aliis verò affectibus  
 decem annis vsq; ad viginti, vsus eius celebratur, in tussi,  
 thoracis doloribus aut laterum, si febris abest, cum mulso:  
 illa vrat, cum hydromelite, sub noctem ad fabæ Aegyptiæ  
 magnitudinem exhibetur. Sanguinem autem excreantibus  
 omnibus, si morbus recens est, ex posca: si vetustior, ex sym-  
 ptyti decocto, quantum faba Aegyptia explet, idq; manè,  
 & vespere. At quos inflationes & torsiones circa vmbilicum,  
 aut morbus celiacus malè habet, ex aqua calida ad fabæ  
 Aegyptiæ magnitudinē mane assument. ceterū appetētiā  
 vehementem excitat, rigores, perfriktionem, & bilis vomitū,  
 præsumptum ante accessiones discutit, mēstrua ducit,  
 & fœtus mortuos eiicit, fabæ Aegyptiæ instar potū ex mul-  
 so, aut passo in quo ruta aut dictamnū decoctum sit. Item  
 ad vocem abscissā valet & per se, & cum duplicato traga-  
 diantho ex mulso aut passo potum, atq; sub lingua retentum  
 triplicatumq;: lienosis, iocinorosisq; ex posca, si scyrrhus ad-  
 est, ex oxymelite, aut aceti scillini sesquicyatho: in nephri-  
 tidis cum mulso circa fabæ Aegyptiæ magnitudinem: dy-  
 entericis tantundem cum decocto rhus, mane & vespere. Ad  
 scippitudines autem summè etiā in hunc modū temperatū fa-  
 cit: antidoti & opobalsami vnciæ duæ, mellis cyathus: mixta  
 paulatim vnguntur. Itē denteis abstergit. pleriq; verò vt sani-  
 tatē ab iniuriis vindicēt, noua Luna ad Græcicæ fabæ ma-  
 gnitudinē ex eo sumūt, cōcoctione bene obita cū vno mellis  
 cochleari, & duobus aquæ cyathis. Similiter etiā in peregrina-  
 tio



nationibus eo vtuntur, quum prauū cuiusdam aëris aut aquarum in itinere suspicionem habent.

*Sales theriaci.*

S V M V N T V R viperæ recens captræ numero quatuor, mox salis ammoniaci aut communis modius Italicus, deinde cum ipso in pilam coniecto tunditur in crassiores partes gentianæ sesquilibra, aristolochiæ rotundæ sesquilibra, centaurij tenuis comæ libræ duæ, cardamomi, marrubij, singulorum vnciæ sex, scordij, apij, chamædryos cteticæ, singulorum libra, rutæ satiuæ seminis libra: melle attrico in unitatem coguntur, & dimidia ipsorum pars in nouum fictile coniicitur, deinde quatuor viperæ viuæ, quibus adduntur etiam scillæ teneræ recentes quinq; minutim concisæ, hinc reliqua misturæ portio dimidia superiniicitur: ac vbi olla cooperta diligenter fuerit, tribus quatuorve foraminibus operculum ipsius pertundes, vt per ea vapor tostionis modum significet. Primum enim videbitur fumus exire copiosus, obscurus, admodumq; turbidus, qui ignem bestias iam inuasisse nuntiet, quando te animum diligenter aduertere conuenit, ne tandem fumi huius aërem è viperarum exhalatu viciatū inspires. Postea, vbi vapor cessauerit, & tenuem quandam flammam per foramina ei aculatam conspexeris, tunc ipsa tosta esse quàm optime censeto, atq; ita fictili ab igne sublato tota die noctuq; refrigerantur. Deinde ollam aperito, exemptosq; inde carbones diligenter tundito, & cū hisce misturis incernito: rutæ syluestris seminis, hyssopi cretici, singulorum vnciis nouē, fœniculi seminis, nardi gallicæ, stachyos Scythici, singulorū vnciis sex, petroselinī macedonici, malabathri foliorum, singulorum vnciis quatuor, amomi vnz, hormini seminis torrefacti, singulorum vnciis tribus, origani summitatum, thymi summitatū, singulorum vnciis nouem, baccarum iuniperi, piperis albi, piperis nigri, fœniculi, singulorū libris duabus, laserpitij radicis vnciis decē, coriandri seminis, zingiberis non perforati, satyrii seminis vel radicis, pulegij mōtani, scelis massalioticis, rordyli mōtani seminis, menthe, singulorū vnciis sex, cassiæ fistule vnciis duabus, cinnamomi vncia. Porro ego sales ipsos preparauī, non combustis bestiis, sed ipsarum pastillis quemadmodū in theriaca, sic vt hos is quē cū bestiis cremantur admiscerem, quò si quàm in se amarulentiam haberent, eam per



adustionem deponerent: tantumq; pastillorum modum  
speci, quantum viperarum quaternionem habere coniucie-  
nt, atque hac ratione longè præstantissimi euaserunt.

*Antidotum Mithridatis, dia scinci.*

YM Y R R H A E troglodyticæ, zingiberis, cinnamomi, sin-  
gulorum drachmæ decem, spicæ nardi, thuris, thlapfis, opo-  
balsami, iunci odorati floris, costi, stœchados, seselis, galba-  
næ, resinæ terebinthinæ, piperis longi, castorei, hypocysti-  
succi, styracis, malabathri foliorum, singulorum drach-  
mæ quatuor, casisæ nigræ, polij, piperis albi, scordij, dauci  
minis, carpobalsami, cyphios, bdellij, nardi gallicæ, gum-  
mi, petroselini, opij, cardamomi, fœniculi feminis, gentia-  
næ foliorum rosæ, singulorum drachmæ octo, dictamni, a-  
cori, phu, singulorum drachmæ tres, mœu athamanti-  
acaciæ, alui scinci, hyperici feminis, singulorum sesqui-  
drachma, vini & mellis quod satis est. Præparatur theriacæ  
obodo. Galenus tradit ad eadem hoc valere, ad quæ illa, præ-  
turquàm ad viperæ morsus, in eos enim Theriace effica-  
cior est.

*Antidotum dia hematon, hoc est ex sanguinibus, ad omnia ve-  
nenata, & lethalia medicamenta.*

PIPERIS albi & longi, costi, acori, phu, anisi, dictamni  
retici, singulorum drachmæ duæ, amomi, opobalsami, ru-  
sylvæ sylvestris feminis, fœniculi feminis, cumini æthyopici,  
nethi, anatis masculi sanguinis sicci, hœdi sanguinis, anse-  
mini sanguinis, anatis fœminæ sanguinis, napi sylvestris se-  
minis, singulorum drachmæ tres, gentianæ radicis, trifolij,  
iunci odorati floris, lachrymæ thuris, rosarum siccarum,  
singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ duæ,  
scordij drachmæ octo, petroselini, polij, myrrhæ, nardi, sin-  
gulorum drachmæ sex, casisæ drachmæ tres, lactis cyrenai-  
rotidæ, stœchados drachmæ quinque, asari drachmæ duæ,  
guttæ ammoniaci drachmæ tres, mœu athamantini drach-  
mæ duæ, agarici tantundem, carpobalsami grana viginti,  
mellis cocti quod satis est.

*Oxymeli simplex.*

A C E T I quàm acerrimi albi sextarius, aquæ sextarij duo,  
mellis sextarius, ad liquidioris mellis spissitudinem inco-  
quantur, sic vt mel interea despumetur.

*Acetum scillites.*



SCILLA albi coloris in taleolas concisæ libræ sex, quadraginta diebus in umbra siccantur, deinde ubi rursus purgata fuerint, in aceti generosi sextariis duodecim, diebus sexaginta in sole madescere sinuntur, vase bene operculato. post eum numerum dierum scilla ex aceto expressa proiicitur, ipsum verò acetum defæcatum transfunditur. Nonnulli verò scillæ libram in aceti sextarios sex coniiciunt. alij viridem scillam in acetum pari utriusq; modo demittunt, sinuntq; usq; ad menseis sex, atq; hoc modo maiorem incidendi vim acquirit. Valet autem acetum scillatum collutū ad fluida oris vitia, & plerisq; interaneorum affectibus potum medetur, quibus exulceratio coniuncta non est. item alis compluribus efficax est.

*Oxymeli Scillinum.*

SCILLA partis internæ tenerioris libræ duæ, aceti acris albi sextarij quindecim, piperis, petroselini macedonici, singulorum vnciæ duæ, dauci cretici, ameos, anisi, nardi gallicæ, ligustici, asari, cardamomi, spicæ nardi, amomi, rheu pontici, singulorum semuncia, fœniculi seminis, cumini, laseris, zingiberis, pirethri, hyssopi cretici, costi, pulegij, singulorum vncia, menthæ viridis fasciculus, rutæ viridis turiones quinque, mellis atticæ sextarius, sapæ sextarij duo, apij viridis fasciculus: interior scillæ pars alba contusa in acetum mittitur, finiturq; diebus septem sub caniculæ æstu madescere, deinde scilla sublata, arida quidem iam contusa: viridia autem non contusa in acetum coniiciuntur. Rursus post dies septem omnibus exemptis, mel & sapa aceto adiiciuntur, excocta que usque ad spissitudinem in vitreum vas defunduntur. Cæterum præsidio hoc & ieiunus instar potionis vtere, & cum cibo instar condimenti, est enim longè utilissimum.

*Medicamentum Galeni è scilla, comitialibus potissimum efficax.*

SCILLA minutim manibus contusa in vas in quo mel solet colligi, demittitur, eoq; diligenter operculato in loco ad meridiem spectante sub æstu caniculæ reponitur, quadraginta diebus post caniculæ sidus in superficie vase soluto scillæ corpus effluxisse deprehendes, exceptus igitur ipsius succus melle optimo edulcoratur, daturque comitialibus quotidie cochleare, pueris exiguum, prouectis magnum.

*Ipsam*



Ipsūq; scillæ corpus tritum cum melle datur cochleari, atq; hoc virtute secundum est.

*Philonis antidotum.*

PIPERIS albi drachmæ viginti, alterci drachmæ viginti, lachrymæ papaveris drachmæ decē, croci drachmæ quinque, pirethri, euphorbij, spicæ nardi, singulæ drachmæ, mellis attici vel alterius generosi probe cocti quantum sufficit. datur prout Aioribus ad nucis auellanae magnitudinem: minoribus fabæ instar: pueris, ciceris. Medicamentum est quod dolorem sopit, & somnum accerit.

*Athanasia dolorem leniens, pleuriticis accommodata, aethore Oribasio.*

CASSIÆ drachmæ octo, spicæ nardi, amomi, croci, opij, styracis, myrrhæ, costi, singulorum drachmæ quatuor, mellis despumati quod satis est, datur quemadmodum Philonium.

*Medicamentum ex duplici pipere, eiusdem effectus.*

CARDAMOMI, castorei, opij, singulorum drachmæ tres, myrrhæ, costi, piperis albi & longi, galbani, singulorū drachmæ tres, croci totidem: excipiuntur melle decocto, & ad fabæ magnitudinem exhibentur.

*Medicamentum dia codion, id est, ex papaveris capitibus, & sapa.*

CAPITA papaveris viridia minimè aquosa octo decemve, die postquam decerpta sunt, incoquantur cum dulcis radicula vncia, madefacta in sapa sextario rursus incoquantur dum tabescant, vbi mediocris spissitudo facta est, ab igne sublata defunduntur: vsus medicamenti est in febribus vbi sopire opus est, & quum tenuis defluxio à capite in thoracem deferatur.

*Medicamentum ex capitibus papaveris & melle.*

CAPITA papaverum, vt dictum est, & dulcis radicula vncia, in aquæ pluuialis aut puteanae sextario donec intabescant excoquantur. vbi expressa fuerint, semisextarius mellis decocto iniicitur: excocta vsq; ad spissitudinem, dantur in quibus præterquàm quod dolorem lenire, & somnum conciliare oportet, etiam purgatione opus est, & abstersione eorum quæ in pectore aut pulmonibus renibusque inhaerescunt.

*Dia*



*Dia codion, compositum.*

**AQUAE**, in qua papauerum capita decocta sunt ad prædictam commode rationem, sextarius, vini dulcis heminae duae, mellis libra, croci, hypocistidis succi, singulorum drachmae quatuor, coquuntur vsque ad spissitudinem, verum stomacho vtilius est medicamentum ex melle, capitum papaueris decocto, & malis cotoneis præparatum: efficacius si præter capita, fertula campana & dulcis radícula aquae decocta fuerint.

*Eclegma ex marrubio, simplex, tabidis maximè ac commodatum.*

**MARRUBII** comae libra in aquae heminis sex decoquitur ad tertias, inde herba proicitur, adiicitur autem aquae mel: ea incoquuntur vsq; ad mellis spissitudinem. instar cochlearis exhibetur.

*Ex marrubio, compositum.*

**MARRUBII** comae, iridis illyricae, hyssopi, pulegij, dulcis radiculæ, apij, singulorum sextans, caricarum pinguium quadrans, nuclei pini resinati tantundem: crassius contusa, arida cum caricis in aquae sextarios tres demerguntur, coquunturq; vsq; ad tertias, illis exemptis, aquae, mellis librae duae induntur, & ad crassitudinem melleam incoquuntur.

*Medicamentum ex eruis.*

**AMYGDALARVM** amararum sextans, farinae erui triens, hyssopi tantundem, iridis semuncia, nucleorum pini torrefactorum vnciae duae, mellis sextarius, vel quod satis est.

*Medicamentum dodecatheon.*

**IRIDIS** Illyricae triens, erui triens, hyssopi, vrticæ seminis, dulcis radiculæ, fœnugræci, singulorum sextans, bulborum, seminis lini torrefacti, singulorum triens, melanthij scrupula octodecim, pulegij scrupula sex, nucleorum pini torridorum sextans, piperis scrupula sex, mellis quantum sufficit.

*Antidotum, soteria.*

**SPICAE** nardi scrupula trigintanovem, myrrhae scrupula viginti septem, croci scrupula triginta septem, castorij scrupula trigintanovem, opij scrupula triginta sex, petroselinij scrupula quadraginta quinque, anisi scrupula novē, apij scrupula septem, iunci odorati floris scrupula triginta sex, casiae



casia scrupula duodecim, piperis longi totidem, sinonis seminis scrupula sex, styracis scrupula octodecim, amomi scrupula duodecim, fefelis totidem, hedychoi, costi, asari, singulorum scrupula octodecim, mellis quod satis est.

*Ex styrace bechicon, hoc est, tusi efficax.*

AMOMI, casia, singulorum sextans, styracis, spicae nardi, singulorum fescuncia, croci, piperis albi, singulorum vnciam, mel lis sextarius: exhibetur cochlearium.

*Medicamentum Philoxeni, purulentis & longa defluxione infestatis idoneum.*

RESINAE terebinthinae drachmæ vigintiocto, nardi drachmæ sedecim myrrhae stillatitiæ drachmæ sex, cardamomi, bulborum tantundem, croci drachmæ duodecim, galbani drachmæ sedecim, amygdala amara octoginta, mellis hemipana: ex aqua potatur, quantum faba Aegyptia explet.

*Esdra, multiplicis usus, vehementer enim desiccatur.*

AMOMI scrupula sex, croci scrupula octodecim, dauci seminis scrupulum unum & dimidium, feniculi seminis scrupula tria, casia sesquiscrupulum, iunci odorati floris scrupula quatuor & dimidium, cinnamomi scrupula tria, hypocistidis succi scrupula quatuor & dimidium, sulfuris vnciæ quinque, papaue-  
ris seminis scrupula quinque, pyrethri scrupula tria, petroselinis sesquiscrupulum, iridis illyricæ scrupula septem & dimidium, alterci seminis scrupula tredecim & dimidium, spicae nardi scrupula septem & dimidium, rutæ seminis sesquiscrupulum, anethi scrupula tria, cardamomi vnciæ tres, rosarum siccarum scrupula quatuor & dimidium, nerij floris sesquiscrupulum, est autem veluti fibra ex qua oritur rosa, rhododaphnes & rosæ ipsius singulorum scrupula tria, rheu scrupula sex, gentianæ scrupula sex, hedychoi sesquiscrupulum, tragacanthæ scrupula quindecim: lycij scrupula sex, citri arboris foliorum scrupula sex, ocimi seminis sesquiscrupulum, anisi scrupula tria, costi, myrrhae, singulorum scrupula sex, bdellij scrupula sedecim, artemisiæ succi scrupula tredecim, rhu syriaci scrupula vigintiquinque & dimidium, asari, veteri mergi, lapidis iaspidis, singulorum scrupula tria, piperis scrupula quindecim, castorij sesquiscrupulum, cimoliæ scrupula sex, sisonis scrupula nouem, styracis totidem, opobalsami scrupula duodecim, fefelis herbæ sesquiscrupulum, mellis, vnciæ vigintiocto, vini quantum satis est.



*Medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus.*

MALORVM cotoneorum purorum libræ tres, coquuntur in vini peruetusti sextariis tribus, deinde conteruntur: quibus piperis, anisi, ligustici, singulorum contritorum vncia admiscetur. Nonnulli etiam zingiberis semunciam induunt. quidam in vicem vini, aceto vsi sunt.

*Medicamentum ex succis malorum, ad appetentiam abolitam & agram concoctionem probatum.*

MALORVM cotoneorū maturorum succi sextarij duo, mellis laudati tantundem, aceti sextarius, zingiberis vncia tres, piperis albi vncia duæ: incoquuntur ad spissitudinem. hoc Galenus ad eos qui perfrixerunt præparat: in quibus autem bilis redundat, sine pipere & zingibere conficitur.

*Quomodo paretur melaplacontium.*

MALORVM cotoneorum purorum libræ sex in vino coquuntur quousq; intabescant, inde exemptæ conteruntur. nonnulli mellis libras octo adiiciunt, coquuntq; igne lento, ferula agitantes. vbi tam spissum totum euaserit, vt manus quodammodo non inquinet, etiam tunc addunt contusi piperis vncias tres, anisi tantundem, petroselini vnciam. Sunt qui zingiberis vnciam & mastiches tantundem misceant: deinde mixta instar semunciae formant, & cum lauri foliis componunt.

*Cydonatum contusum fragmentis saluis.*

MALORVM cotoneorum purorum frustulatim concisorum libræ octo, in vini sextariis totidem incoquuntur temperatè, vt non dissoluantur, deinde mellis despumati libræ octo, piperis vncie octo, petroselini, anisi, singuli quadrantes, zingiberis quincunx, spicæ nardi fescuncia, caryophylli vncia, ipsis admiscetur: omnia contusa ac modicè incocta vsq; ad iusculi spissitudinem auferuntur, quibus refrigeratis fragmenta simul cum iure componuntur.

*Medicamentum dia trion pipereon, ex triplici pipere.*

PIPERIS communis, albi, & longi, singulorum drachmæ septem, zingiberis, anisi, thymi summitatum, singulorū drachmæ duæ, mellis quod satis est.

*Aliud, Oribasij.*

PIPERIS albi vncie duæ, piperis nigri, & longi, spicæ nardi, cinnamomi, ameos, caryi, hyssopi, fefelis, dauci, petroselini, singulæ vnciæ, zingiberis drachmæ quatuor, mellis libræ



Librae tres.

*Aliud.*

PIPERIS communis quadrans, albi vncia, longi tantun-  
dem, petroselini, cinnamomi aut cassiae duplicata, zingibe-  
ris, singulorum vncia, mellis vncia vna & viginti, vel quod  
satis est. ego etiam thymi comae vnciam miscui.

*Diospolites.*

CUMINI aceto macerati torrefacti; vncia, piperis, zin-  
giberis, singulorum vnciae duae, rutae viridis fescuncia, nitri  
drachmae duae & semis: melle excipitur.

*Medicamentum dia Calaminthes, id est, ex Calamintha.*

PETROSELINI, pulegij, seseleos, calaminthae, singuli  
quadrantes, apij, feminis vncia.

*Medicamentum dia citriu, hoc est, ex malo medico, tarde  
concoquentibus efficax.*

ACETI heminae tres, mali medici carnis libra, hyssopi,  
rute, singulorum fasciculus: per noctem in aceto madefacta  
ad tertias decoquantur, expressaque proiciuntur: aceto mi-  
scetur: mellis sextarius, rursusque incoquantur ad mellis spis-  
situdinem: ubi incrassata fuerint, insperguntur asari, meu,  
piperis albi, singuli sextantes: exhibetur cochleare mane, &  
ad dormituro.

*Picra, hoc est amara, compositio Galeni.*

ALOES drachmae centum, xylobalsami, mastiches, croci,  
spicae nardi, asari, cinnamomi, singulorum drachmae sex. Qui-  
dam addunt etiam iunci odorati floris & cassiae vtriusque  
drachmas sex. exhibetur drachma ex hydromelite.

*Picra ex oxymelite, ad stomachicos, vterum,  
& aquam intercutem.*

ALOES vnciae quatuor, phylli vnciae duae, costi, cassiae,  
amomi, iridis singulorum drachmae, foeniculi radices corti-  
cis libra, mastiches, nardi gallicae, zingiberis singulorum dra-  
chma, piperis drachma, meu drachma, aceti, mellis, vtriusque  
sesquiseptarius: foeniculum in aceto prius excoctum proici-  
tur, deinde mel additur. Vbi usque ad melleam spissitudinem  
incoxeris, reliqua detrita insperges.

*Medicamentum ex lupino iecore praestantissimum.*

GENTIANAe, chamapityos, petroselini, marrubij, succi  
arcij, sinapis, scolopendrij radices, panacis, minij, erythroda-  
ni, brassicae seminis, aristolochiae logae, piperis albi, spicae nar-  
di, costi, erucae seminis, eryngij radices, polij, echij, eupa-



torij, baccarum iuniperi, lupini iecoris, helenij, pares modi: melle discocto excipiuntur, mulsoq; probè cocto, ad nucis auellanæ magnitudinem dantur.

*Theodoretus dia anacardion.*

ANACARDIORVM fescuncia, croci, crassiae, philly, spicae nardi, cariophylli, mēu, agarici, iunci odorati floris, rheu, epithymi, singulorum drachmæ quatuor, acori, piperis, singulorum fescuncia, aloës vnciæ tres, saxifragæ, mastiches, iridis illyricæ, singulorum fescuncia, myrobalanorū vncia, mellis libræ sex, vel quantum sufficit.

*Theodoretus altera dia anacardion.*

ALOES drachmæ sexaginta, agarici drachmæ vigintiquatuor, croci, cassiæ, rheupontici, acori, cinnamomi, mastiches, singulorū drachmæ decem: costi, rutæ seminis, piperis albi, singulorum drachmæ octo, spicæ nardi drachmæ tres, xylobalsami, asari, chamædryos, mēu, singulorum drachmæ quatuor, mellis quod satis est. Nonnulli hinc quoq; addunt anacardia duo, datur drachmis binis cum mulsa.

*Medicamentum cyphoides, ad iecorosos & pectoris vitia.*

VVAE passæ carnis drachmæ vigintiquinq; croci drachma, calami odorati drachmæ duæ semis, bdellij drachmæ duæ & semis, cassiæ sesquidrachma, cinnamomi tres oboli, spicæ nardi totidem, iunci odorati drachmæ duæ semis, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum drachmæ quatuor, aspalathi ramenti oboli duodecim, mellis drachmæ sedecim, vini quantum sufficit.

*Aliud cyphoides, Alexandri.*

CROCI, cinnamomi, bdellij, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, calami aromatici, singulorum drachmæ duæ, aspalathi, iunci odorati floris, singulorū drachmæ tres, cassiæ, nardi, singulæ drachmæ, terebinthinæ resinæ drachmæ sedecim, vuæ passæ carnis drachmæ centum sexaginta, mellis sesquihemina, vini Chij quod sufficit.

*Dia bacani medicamentum, Hepati accommodatum.*

BACANI vncia, costi tantundē, phylli scrupula octo, piperis albi scrupula sex, spicæ nardi totidem, mellis quod satis est, datur cochlearium cum temperatura conditi.

*Medicamentum Zopyrios,*

MYRRHÆ drachmæ quinque, croci, cassiæ, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ tres, spicæ nardi dra



drachmæ duæ, iunci odorati floris tantundem, piperis albi fescuidrachma, thuris drachma, costi drachma, mellis quod satis est.

*Compositio pæonia.*

STYRACIS calamitis drachmæ sex, thuris, amomi, croci, singulorum fescuncia, spicæ nardi drachmæ sex, phylli drachmæ duæ, piperis albi drachmæ sex, & communis octo, myrrhæ vncia, costi tantundem, mellis quod satis est.

*Catapotia Dositer ad iecur inscripta.*

ALOES vncia, spicæ nardi, phylli, costi, singulorum scrupula duo, agarici scrupula octo, mastiches scrupula tredecim, epithymi scrupula quatuor, rheu scrupulum.

*Oxymeli splenicum, hoc est, lieni dicatum.*

CAPPARIS radicum corticis, scolopendrij, spicæ nardi, asari, iridis, iunci odorati floris, iunci quadrati floris, anisi, cumini, fœniculi, acori, ericæ fructus, singulorum vncia, myricæ foliorum, salicis foliorum, apij radices, thuris arboris, scillæ, singulorum vnciæ duæ, aceti sextarij tres, mellis tantundem, guttæ ammoniaci vnciæ tres, præparatum modo scillini, duobus cochleariis exhibetur.

*Oximeli, calculosis efficax.*

SAXIFRAGAE, betonicæ, graminis, adianthi, spicæ nardi, carpesij, asari, eryngij, singulorum vncia, petroselini macedonici, rutæ seminis, singulorum semuncia, fœniculi viridis, iridis, scillæ tostæ, chamædaphnes, singulorum vnciæ duæ, capparis radicum corticis vnciæ tres, sij vnciæ duæ, aquæ, aceti, mellis, singulorum sextarij duo.

*Plusca, ad conterendum calculos.*

PVLEGI, mastiches, apij seminis, menthæ siccæ, singulorum vncia, salis cōmunis torrefacti libra, coriandri seminis, spicæ nardi, anisi, ameos, singulorū scrupula sex, phylli scrupula quatuor, piperis albi semuncia, vel cōmunis vncia, lithospermi vnciæ sex, betonicæ totidē, aceti generosi sextarij quinq; omnia cōrussa, cribrata, & in tenuissimum pollinem detrita, per triduum aceto madescunt, deinde diebus quadraginta insolantur: vbi vsus inciderit, nigrum ciccer, asparagi radicē, apiū, & adianthū decoquis, in huius decocti misturā heminas duas aceti superinfundis, & ægro in calido balneo folio propinas. Nonnulli verò pulueris ex prædictis speciebus, scrupula duodecim cū posca dictarū herba-



tum iuri temperata exhibent, & nihilo minus medicamentum proficit.

*Conditum calculos confringens.*

PIPERIS albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betonica, singulorum vncia, petroselini, phylli, singulorū fescuncia, rutæ syluestris seminis semuncia, mellis sextarius, vini ascalonitis sextarij sedecim.

*Medicamentum ex sanguine hircino.*

Q V V M VUA inceperit maturescere, hirci ætate florentis sanguinis in sole siccati cochlearia duo calculosis exhibeto cū passo cretico. Quidā verò amomi & phylli, vtriusq; treis vncias miscent. Alij etiam myrrhæ quatuor scrupula.

*Excicadis medicamentum nephriticum.*

LITHOSPERMI, raphidis piscis combusti, seselis, singulorū vncia, ameos, cucumeris satiui, seminis, saxifragæ, vux passæ acinis exemptis, althææ seminis, phaseoli albi, lyncurij, singulorum semuncia, spicæ nardi, phu, mēu, lapidū ex spōgiis, singulæ drachmæ, adianthi, paliuri seminis interioris, sij sicci, rubi radices, graminis, polypodij, singulorū drachmæ tres, hircini sanguinis desiccati vt dictum est, scrupula sex, cicadarum siccarū sine capite, pennis, & pedibus, triens, piperis albi drachmæ sex, mellis probè cocti quod satis est. datur instar nucis auellanæ in condito tribus obolis, aut decocto saxifragæ, aut sij, aut radices asparagi, aut rorismarini, aut quinq; folij, aut struthij radices.

*Medicamentum ex lithospermo.*

LITHOSPERMI, betonica, saxifragæ, petroselini, piperis albi pares portiones cum melle excipiuntur.

*Medicamentum ex marrubij semine.*

PIPERIS albi & nigri, dauci cretici, cucumeris satiui, seminis, fœniculi, seminis, marrubij seminis, petroselini macedonici, pyrethri, zingiberis, phylli, singulæ vnciæ, mellis quod satis est.

*Medicamentum ex lapide Iudaico, qui tecolithos dicitur.*

SPICÆ nardi, hyssopi, lapidis Iudaici, singulorum scrupula octo, piperis scrupula duodecim, zingiberis, petroselini, costi, saxifragæ, singulorū scrupula sex, calsiæ, apiij seminis, singulorum scrupula tria, cyperi scrupula sex, ramenti eboris scrupula quatuor, cardamomi ligni scrupula sex, seminis lini scrupula quatuor, mellis quantum sufficit.

*Medic*



*Medicamentum ex sylvestris malua semine.*

CUCUMERIS domestici seminis drachma duodecim, alterci seminis drachma sex, cicutæ seminis drachma tres, (alii sex) opij, fœniculi, malua sylvestris seminis, croci, singulorum drachma tres, apij seminis drachma sex, cassiæ drachma quatuor, amygdala basilica decem, nuces auellane totidem, asari drachma quatuor: passo cretico excepta datur tribus obolis, si febris abest, cum sapa. Nonnulli melle excipiunt.

*Medicamentum ex bellarijs nephriticum, vesicæ & renum exulcerationi idoneum.*

VVAE passæ albæ cui acini sint exempti, nucleorum pinī recentium, singulorum vnciæ duæ, cucumeris seminis cortice exuti, baccarum myrti nucleo ablato, amygdalarum amararū, palmularum pinguium, apij seminis, papaueris seminis: croci, singulorum drachma, myrrhæ vnciæ duæ: iustar drachma ex passo ieiuno propinatur.

*Satyriacum antidotum.*

ZINGIBERIS, satyrii superioris, singulorum drachma octo, scinci caudæ, mēu, asari, petroselini, cardamomi, seselis, singulorum drachma quatuor, erucæ seminis, cinnamomi, singulorum drachma tres, hormini, piperis albi, cnicī seminis, singulorum drachma duæ, iunci odorati floris, spicæ nardi, singulæ drachma, sanguinis hircini mystrum: datur drachma imbecillioribus cum lacte.

*Catapotia ex xylomacere, dysentericis utilis.*

XYLOMACERIS, opij, rheu, singulorum scrupula sex, gallæ, myrrhæ, singulæ vnciæ. excipiuntur vino spathite.

*Podagrica remedia.*

*Medicamentum ex corallio, quod diacoralliu vocatur, podagricis idoneum.*

RHEV barbarici, præoniæ, myrrhæ troglodytidis, spicæ nardi, singuli sextantes, phylli vncia, caryophylli grana quindecim, anagallidis phœnicei coloris quam vocant coralliō, semuncia, aristolochiæ longæ vnciæ quatuor, & rotundæ totidem. datur instar scrupuli quotidie, cōcoctione probè defuncto. Incipiendum verò est ab æquinoctio autūnali, quod circa vigesimum quartum mensis septembris diem accidit, capiendumq; deinceps ad dies quinquaginta, deinde relinquatur quindecim dierum interuallo, atq; sic facere oportet quousq; dies quibus assumitur abstantur treceti sexa



gintaquinq; Sub caniculæ ortu omnino abstinendum est, hoc est, à vigesimo quarto die Iunij vsq; ad Augusti finem. Vitari debet venus, carnes præsertim suillæ, salsamentum, garum, beta, daucum, menta, & lactuca non cocta, pepo nesq;, piscium capita, cammari, tum qui molli, tum qui testacea cute præditi sunt, legumina omnia, & summatim quæ crassi succi sunt, vinum nigrum & liberalius. Balneum conuenit & quotidianum exercitium, vel pedibus, vel equo, vel gestatione obitum. Qui verò habitu sicciore sunt, etiam si plenius nutriantur, non offenduntur.

*Agapeti compositio ad podagram.*

PHYL LI, rheu barbarici, croci, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, costi, chamædryos, singuli sextantes, aloës hepaticæ quincunx, hyperici, pæoniæ, singuli quadrantes, aristolochiæ longæ, phu, mœu, damasonij, anagallidis, singuli trientes: vt edî modus idem est qui in compositione dia coralliu.

*Compositio atactos ad podagram.*

PHYL LI, mœu, damasonij, anagallidis cui flos est cæruleus, erythrodani, mastiches, croci, cassiæ aloës hepaticæ, gêtianæ, chamædryos, singulorū vncia, caryophylli, asari, piperis albi & nigri, singulorū semuncia, spicæ nardi, myrrhæ, rheu barbarici, pæoniæ radicis, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum vnciæ duæ. Similis vsus est.

*Procli compositio, podagræ & coxendicum doloribus accommodata.*

CHAMÆDRYOS vnciæ nouē, cētaurij vnciæ octo, aristolochiæ vnciæ septē, gêtianæ vnciæ sex, hyperici vnciæ quinque, petroselini macedonici vnciæ quatuor, mœu vnciæ tres, agarici vnciæ duæ, phu vncia vna, mellis attici heminæ duæ.

*Medicamentum ex rebus septem constans, ad eadem.*

HYPERICI, aristolochiæ longæ, singulorum vncia, centaury, chamæpityos, agarici, singulorum tres vnciæ chamædryos vnciæ sex, gêtianæ vnciæ quinque. Nonnulli etiam petroselini vnciam addunt, mellis drachmas quinque. datur instar drachmæ.

*De pastillis.*

CAP. XII.

Pastilli græcè trochisci à figura rotularum nominantur. Tres sunt eorum species, alij nanq; sunt potabiles, alij in alium dantur, alij delinuntur. Ex his igitur qui potantur, alij comprimunt alium, aut sanguinem, aut aliam quampiam fluxionem, refrigerando, aut astringendo, aut opplendo, aut



ut deficcando eam cohibentes:quemadmodum qui cōstat  
 spina ægyptia, & qui seminibus, confimilesq;: alij dolorem  
 opiunt, vel quòd sensum obstupefaciunt, vt crocodes di-  
 ctus, vel quòd humores diffundant, veluti ex aromatis con-  
 fecti: alij lienem, aut renes, aut iecur obstructione liberāt, vt  
 qui ex amaris amygdalis confit. Eorum verò qui in aluum  
 induuntur, nonnulli acrimoniam obtundunt, vt in dysente-  
 riis, quemadmodum ex pompholyge, amylo, terra samia,  
 cum cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo iniecti, nonnulli  
 aut sanguinis profluuium astringunt, sicuti qui alumi-  
 ne, acacia, & omphacio constant, qualis est qui Philippo  
 describitur, vel ex spina Aegyptia, cum rosarum succo, aut  
 poliantaginis inditi: nonnulli adurentes, dysenteria quā vlce-  
 ra depascentia exercent, idonei: ex sandaracha, auripigmen-  
 to, calce: charta combusta, confecti. Inserentur autē cū suc-  
 co lentilæ aut oryzæ, sic vt intestinum prius muria elotū  
 sit, ægerq; cibum & potū antea assumpserit, ne aliquid me-  
 dicamenti virtutis reliquū, ad stomachum rapiatur. Cæte-  
 rū vtilis sunt pastilli qui ab inferioribus partibus iniiciūtur,  
 ad affectus potissimum qui infra vmbilicū infestant. Nam  
 superius vis ipsorū peruenire non potest. At qui delinuntur  
 simileis illis vireis obtinent: verū astringentes, in herpete,  
 papulis, quæ dicuntur exanthemata, intertriginibus, sangui-  
 nis eruptionibus, & fluidis vlceribus proficiunt: cuiusmodi  
 est Andronius & Polyidæ. qui vero obtundunt, carbunculis  
 & maleficis vlceribus expediūt: vtpote Leucus dictus, & dia-  
 lorion. vrentes, sicut iam comprehensi, cuius generis ha-  
 bentur & Faustiani, serpentibus naturalium & fedis vlceri-  
 bus, pterygiis, & carnosis narium vitiis accommodantur.

*Pastillus aster dictus.*

CROCI, opij, castorei, spicæ nardi, cassiæ, myrrhæ, lemnis  
 cretæ, mandragoræ corticis, singulorum triens, dauci, apij,  
 anisi, fefelis, alterci seminis, styracis, singulorum drachmæ  
 octo: vino læuigantur.

*Pastillus trigonus.*

ANISI seminis, alterci seminis, singulorum drachmæ  
 duæ, anisi drachmæ quatuor, opij drachmæ tres: aqua te-  
 runtur.

*Pastillus à seminibus dia spermaton dictus.*

ANISI, ameos, fceniculi seminis, singulorum drachmæ



quatuor,apij feminis,opij,alterci feminis, singulorum drachmæ duæ:aqua læuigantur.

*Pastillus crocodes, hoc est croceus.*

ANISI, dauci cretici feminis, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, castorei, singulorum drachmæ duæ, croci, opij, singulorum drachmæ tres, apij feminis, styracis, singulorum drachmæ quatuor, alterci feminis drachmæ sex:ex aqua deteruntur.

*Pastillus diarhodon.*

ACACIÆ, gummi, rosarum floris, balauſiorum, hypocistidis succi, gallarum, singulorum drachmæ tres, rosarum viridium succi, plantaginis feminis singulorum drachma, lycij Indici tantundem.

*Pastillus dia corallin.*

ALTERCI feminis, thuris, singulorum drachmæ octo, terræ samix, corallij, minij Sinopici, opij, singulorum drachmæ quatuor, amyli, balauſiorum, singulorum drachmæ duæ:succo polygoni excipiuntur.

*Pastillus dia electru, hoc est, ex succino.*

HERBÆ pulicaris vnciæ quinque, mastiches vnciæ quatuor, succini scobis, iridis, croci, singulorum vnciæ quatuor, opij vnciæ duæ.

*Pastillus ex spina Aegyptia.*

SPINÆ Aegyptiæ, rhu, thuris, acaciæ, aluminis scissi, hypocistidis, succi, gallæ, lemnix cretæ, corallij, symphyti, terræ samix, aloës, ladani, pares portiones:vino subiguntur.

*Alius pastillus, quem Galenus aphrodisiasticon clidion scribit.*

SATIVÆ punicæ floris, spinæ Aegyptiæ, balauſiorum hypocistidis succi, acaciæ, singulorum drachmæ sex, lycij, rhēu pontici, opij singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ duæ, excipiuntur vino myrteo, vel rosarum baccarūve myrti decocto.

*Clidion Oribasij, ad dysentericos & cœliacos.*

GALLÆ omphacitidis drachmæ octo, opij drachmæ quatuor. ex aqua singuntur catapotia. dantur terna aut quaterna.

*Pastillus ex cornu ceruino dysentericis et sanguinē excreantibus salutaris.*

COCHLEARVM drachmæ duodecim, cornus ceruini cōbusti gallæ torrefactæ, acaciæ inarefactæ singulorū drachmæ quinq; oboli duodecim, baccarū myrti nigræ drachmæ



mae quindecim, opij siccati, hypocistidis succi singulorū drachmæ quinq; labruscæ floris drachmæ sex, mādragoræ radicis succi, terræ samiae quæ aster dicitur, singulorum drachmæ duodecim, rhu obsoniorum drachmæ quatuordecim, malicorij torridi drachmæ septē, thuris drachmæ octo, piceæ corticis exarefacti drachmæ quatuordecim, alterci seminis siccati drachmæ decē, rhus coriarij sextarij duo, vini nigri quātū rhu incoquēdo vt vinū fiat crassissimum, satis est, itq; hoc percolato reliqua excepta in pastillos coguntur.

*Pastillus amazonum.*

APII seminis, anisi singulorū drachmæ sex, absinthij comæ drachmæ quatuor, myrrhæ, piperis, opij, castorei, singulorum drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ sex aqua subiunguntur.

*Pastillus ex amygdalis amaris.*

ANISI, apij seminis, alari, amygdalarum amararum, absinthij comæ, paria pondera: ex aqua singuntur pastilli, quī drachmam pendeant. dantur febri carentibus ex mulso: febricitantibus cum hydromelite.

*Pastillus ex erica, leni dicatus.*

ERICAE fructus drachmæ quatuor, piperis albi, nardi syriacæ, suffiminis, ammoniaci, singulorum drachmæ duæ: ammoniacum aceto soluitur, aridiſque admiscetur. singuntur pastilli qui singuli drachmam expleant. exhibentur singulatim cum oxymelitis cyatho.

*Pastillus ex vesicarijs, diaphysalidon vocant.*

CVCUMERIS satiui excorticati seminis vnciæ quatuor, alterci seminis, cicutæ, singulorum vnciæ duæ, fœniculi, rumicis seminis, croci, nucleorum pini, amygdalorū amarorū, opij, singulæ vnciæ, vesicariæ sextarij tres, vini quod sufficit.

*Pastillus Philippi, ad dysentericos.*

BALAVSTIORVM, acaciæ, hypocistidis succi, opij, rhu thuris, myrrhæ, croci, gallæ, aloës, rhēu pontici, malicorij, baccarum myrti, singulorum drachmæ quatuor: excipiuntur vino austero, formanturq; pastilli triobolares. dantur si febris abest, cum vino: febricitantibus, cum hydromelite.

*Pastillus muse.*

ALVMINIS, aloës, myrrhæ, atramenti sutorij, singulorum fescuncia, mali corij, croci, crocomagmatis, singulorū drachmæ sex. excipiuntur vino.

*Quo*



*Quomodo crocomagma paratur.*

CROCI vnciæ duæ, rosarum, amyli, myrrhæ, aloës, thuris, gummi, singulorum vncia, costi, spicæ nardi, singulorum drachma: vino subiguntur. At in capite de oleo crocino alia quoque crocomagmatis confectura dicetur.

*Pastillus nere ex Herae commentarijs.*

MYRRHÆ, aloës, crocci, singulorum drachmæ octo, aluminis scissi drachmæ centum: aqua excipiuntur.

*Polyide sphragis.*

ALUMINIS scissi drachmæ tres, thuris drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ octo, atramenti sutorij drachmæ duæ, floris sativæ punicæ drach. duodecim, fellis taurini drach. sex aliàs drachmæ sedecim, aloës vncia: vino austero excipiuntur.

*Pastionis pastillus.*

SQUAMÆ æris drachmæ duodecim, æris combusti, salis ammoniaci, aluminis rotundi, æruginis rasæ, thuris, singulorum drachmæ octo, vini quod sufficit.

*Pastillus Andronius.*

SATIVÆ punicæ floris drachmæ decē, gallæ drachmæ octo, myrrhæ drachmæ quatuor, aristolochiæ rotundæ drachmæ quatuor, atramenti sutorij, croci, aluminis scissi, crocomagmatis, misyos, thuris, singulorum drachmæ duæ: læuigantur in vino astringenti, vel aceto.

*Pastillus Faustini.*

AVRIPIGMENTI drachmæ duodecim, sandarachæ drachmæ sex, calcis viuæ drachmæ octo, chartæ combustæ drachma: myrti baccarum succo vel decocto excepta, in pastillos redigito, & cum myrti baccarum, lenticulæ, & rubi radicum decocto immittito.

*Pastillus ex charta, diachartin appellatus.*

CHARTÆ combustæ triginta duæ, calcis, auripigmenti, sandarachæ, singulæ vnciæ: succo plantaginis excipiuntur.

*Pastillus cui nomen est thronus Marcellius.*

CHARTÆ combustæ drachmæ decem, sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, aluminis scissi, singulorum drachmæ quatuor, balauftij drachmæ tres, opij drachmæ duæ, calcis non restinctæ drachmæ tres, omphacij drachma, hypocistidis succi drachmæ tres: vino myrreo excepta coguntur in pastillos qui drachmas quatuor pendeant: vbi decoxeris

in.



in omni vino malicorium, myrti baccas, & rosas vsque ad tertias, dato pastillum vnum aut in totum quatuor, ex sex vini vicijs yathis.

*Pastillus à subere, dia phellon dictus.*

**GALLAE**, chartæ, fæculæ vini, panis, singulorum concretorum drachmæ quindecim, in alio habetur etiam cornu inueneruini combusti drachmæ quindecim, auripigmenti drachmæ duæ, sandarachæ, calcis, vtriusq; drachmæ quindecim, sicacaciæ, cerusæ, singulorum drachmæ quinque, argenti spumæ drachmæ tres: vino læuigantur.

*Bithynus.*

**MALICORII** drachmæ decem, cadmiæ vnciæ tres, aristolochiæ, gallæ, panacis radicis, iridis, atramenti sutorij, aluminis scissi, chalcitidis, misyos, squamæ æris, mannæ thuris (nonnulli etiam costi) singulorum sescuncia: aceto subiunguntur.

*Pastillus dia castorin, ad vlcera, nomas & defluxiones.*

**CROCI**, aloës, thuris, singulorum vncia, florum mali punicæ, aluminis scissi, castorij, mannæ thuris, æruginis rarsæ, singulorum vncia, minij sinopici libra: excipiuntur vino veteri.

*Pastillus dia castorin, colicis efficax.*

**MYRRHAE**, castorij, singulorum scrupula sex, croci, opij, singulorum scrupula nouem, anisi, apij seminis, dauci seminis, singulorum semuncia, alterci seminis scrupula octodecim.

*Pastillus dia œnelau, hoc est, ex vino & oleo mixtis, sedis & naturalium vitijs utilis.*

**CERVSÆ** vnciæ decem, argenti spumæ vnciæ quinque, thuris, recrementi plumbi, aluminis scissi, singulorum vnciæ duæ: vino marinæ experte læuigantur. in vsu vino & rosaceo aut vino & myrteo soluuntur.

*Pastillus ex lapide phrygio, naturalium vitijs accommodatus.*

**LAPIDIS phrygij** combusti restinctiq; ter, primùm butyro vel rosaceo, deinde vino, postea melle, vnciæ duæ, rosarum floris vnciæ quatuor, malicorij vncia.

*Pastillus dia lotarion, quod est ex loto syluestri, ad sedis & naturalium vitia.*

**CERY**



CERVS AE, amyli, glaucij, croci, aluminis, æquales portiones: teruntur succo loti sylvestris, aut vino.

*Pastillus leucus.*

TERRAE famiæ triens, pompholygis, cerusæ, amyli, singuli sextantes, opij scrupula quatuor: aqua subiguntur.

*Pastillus dia alicacabu, hoc est, ex vesicaria.*

Spumæ argenti drachmæ vigintiquatuor, cerusæ drachmæ duodecim, aut vna & viginti, vesicariæ drachmæ octo, atramenti sutorij drachmæ quatuor, aluminis scissi tantundem, minij quod ad colorem satis est: aqua excipiuntur.

*Pastillus ex duplici veratro, idem verò ex duabus acacijs.*

ACACI AE nigrae & fulvae, glutini fabrilis (in alio pisciū glutinis) singulorū vnciæ quatuor, guttæ ammoniaci, glaucij, aloës, singulorum vnciæ duæ, thuris masculi, veratri nigri & albi, singulorum vncia: aceto scillino excipiuntur. quum vsus incidit eodem vel communi soluta, ante balneū, & rursus post id inunguntur.

*Pastillus Criogenes.*

MYRRHAE, æris combusti, aristolochiæ rotundæ, æruginis rasæ, squamæ stomomatis, verbenacæ rectæ, aluminis rotundi, singulorum vncia, aceti quantum satis est. decerpi autem debet verbenaca, quum Sol est in ariete. Fit etiā emplastrum in hunc modū: pastilli, ceræ, colophonix, olei, par mensura, aceti quod ad læuigandum pastillum sufficit.

*Pastillus à nigro viridique colore dictus melanchlorus.*

MYRRHAE, aloës, squamæ æris combusti, auripigmenti, aluminis scissilis, & rotundi, iridis, chalcitidis, misyos, salis fossitij, atramenti sutorij, cerusæ, nitri, argenti spumæ, panacis radicis, cadmiæ, malicorij, gallæ, aristolochiæ rotundæ, squamæ stomomatis, æruginis rasæ, singulorum vncia, aceti quod satis est. Fit etiam hoc modo emplastrum: pastilli vnciæ duæ, colophonix, ceræ, olei, singulorum vnciæ sex, aceti quod pastillo subigendo satis est.

*Pantolmius ad chironia malignaque vlcera, & defluxiones.*

CASSI AE, æris cremati, cerusæ, argenti spumæ, æruginis rasæ, aluminis scissi, rotundi, liquidi, & lateritij quod plinthitis dicitur, panacis radicis, aristolochiæ longæ & rotundæ,



malicorij, atramenti sutorij, portulacæ, iridis astragaliti  
 chalcitidis, misyos, guttæ ammoniaci, salis ammoniaci,  
 ruginis ferri, squamæ aris, aloës, diphrygis, thuris,  
 gallæ, sarcocollæ, plumbi cremati, foliorum oleæ, so-  
 ps, myrrhæ, cretæ sutoriæ liquidæ, balaustiorum, spinæ  
 ægyptiæ, sulfuris ignem non experti, nitri, rhu rubri, rhu  
 coriari, chrysocollæ, rhus coriarij, acaciæ, salis spumæ, om-  
 niacij, auripigmenti, singulorū pares modi: cum aceto die-  
 bus triginta, sub caniculæ sidere læuigantur.

*Pastillus Nymphodoti.*

**A**PHRONITRI vncia, nitri Alexandrini, saponis gal-  
 licij, singulæ vnciæ, salis cappadocij, mastiches, gallæ, singu-  
 lorum drachmæ quatuor, foliorum rosæ, amomi, amyli, sin-  
 gulorum vncia, phylli drachma, aluminis scissilis, costi, sin-  
 gulorum drachmæ duæ, vini myrtei quod satis est.

*Pastillus ex thapsia, hemcranico doloriefficax.*

**S**VCCITHAPSIAE drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ o-  
 co, opopanacis, euphorbij, singulorum drachmæ sex, nitri,  
 quatuor parthenici, singulorum drachmæ quatuor, piperis,  
 gapei, singulorum drachmæ duæ, aceti quantum sufficit.  
 ubi vtendum est, aceto inunctum post horas sex abluito: at  
 si voles remissione vtī, cerato pari exceptum illinito no-  
 temq; finito.

*Pastillus qui ano subiicitur, hypotheton dictus, ad dysente-  
 riam, & ani dolores.*

**T**ERRAE samiae, amyli, singulorum quadrans, croci sex-  
 ans, acaciæ, tragacanthæ, singulæ vnciæ, castorij, thuris, ly-  
 ij, singulæ semunciæ: in calidioribus, etiam opij semuncia  
 adiicitur: herbæ pulicaris succo excipiuntur, singunturque  
 pastilli.

*De medicamentis quibus aridis vtimur, & smegmatis.*

CAP. XIII.

**A**Ridorum medicamentorum quæ sanè & cataplasmata  
 ab inspergendo, vocantur, alia vlceribus congruunt,  
 alia cuti applicantur: ex iis quæ vlceribus faciunt, quædam  
 carnis carnem inducunt, quædam excrecentia reprimunt,  
 quædam cicatricem generant, quædam vrunt exeduntque,  
 nonnulla sanguinem coërcent. Quæ igitur carni genera-  
 dæ sunt, vel repurgando sordida, carnem creant, vt quæ  
 constant ex cruo, aristolochia, iride, panace, myrrhæ, thure,  
 aloë:



aloë: vel humiditatem circumfluam desiccando, veluti quæ fiunt ex ære, diphryge, squama, charta combusta, piceæ cortice, & spina, quæ & ipsa cicatricem obducunt: vel acrimoniam rosionemq; obtundendo, qualia sunt ex pompholyge, amylo, cerusa, fæce combusta, ostreis crematis, terra samia, & consimilibus, & quæ compositorum ex his vireis habent. Ex reprimentibus lenia quidem sunt, quæ constant squama æris, quæ misy, chalcitide combustis, & galla: valentiora sunt, quæ atramento sutorio, ærurgine, misy, chalcitide, igne non expertis. Vrentia verò exedentiaq; fiunt ex calce, auripigmento, sandaracha, & fæce vini combusta, quam vocant spheclen, hoc est fæculam: atq; hæc omnia componuntur, cæterum in tenuissimum redacta pollinem, si vlceribus inspergantur minus rodunt: si spissiora, magis, idq; vrendo faciendq; crustam. Sanguinem reprimentia aut astringendo, aut refrigerando, aut siccando, aut opplendo illum coërescent, quorum materiam capite de pastillis sumus exequuti. At eorum quæ cuti admoventur, alia abstergunt exteruntque, vt ex cimolia, pumice, lomëto, fermëto hordei, peponū carne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutiunt, qualia fiunt ex veratro, alcyonio, sulfure, herba pediculari, sinapi, pyrethro, semine rorismarini, terra lemnia, sepia restata: atque hæc, assumpta calce & auripigmento cum liquore aliquo, pilis abolendis idonea, & smegmata fiunt. Quædam capiti admoventur, vt fluxum ex eo ruentem desiccant, cuiusmodi sunt ex nitro, sale, galla, malicorio, & id genus aliis præparata. omnia verò smegmata cuti non inunctæ accommodari debent.

*Cephalicus pulvis, capiti conueniens.*

ERVORVM quincunx, iridis fescuncia, mānæ thuris fescuncia, aristolochiæ, squamæ æris, singulorum fescuncia.

*Alius.*

PICEAE corticis drachmæ sex, thuris drachmæ quatuor, pumicis tantundem, iridis drachmæ duæ, resinæ siccæ drachmæ sex, aristolochiæ drachmæ duæ.

*Ex aloë, dia aloës, dicitur.*

ALOES drachmæ sex, erui drachmæ octo, mannæ thuris drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, aluminis scissi drachmæ duæ.

*Dia*



*Diasphecles, hoc est, ex fece vini combusta, Manethonis.*

CADMIÆ combustæ & illotæ vncia, terræ samiæ vncia, facis vini combustæ vnciæ quatuor, lapidis specularis vnciæ quatuor, thuris vnciæ quatuor. quidam & amyli vncias quatuor addunt.

*Melitera Oribasij.*

CHALCITIDIS, squamæ æris, gallæ, balaustiorum, aristolochiæ longæ singulorum vncia, malicorij, aluminis scissi singulorum semuncia.

*Medicamentum ex ostreis, dia ostreon dicitur.*

CADMIÆ, thuris, singulæ vnciæ, ostreorum combustorum vnciæ tres.

*Medicamentum ex thure, dia Libani.*

ARGENTI spumæ, thuris, squamæ æris, mali punici, amyli, cerusæ, pares modi.

*Aphroditarium.*

THURIS, squamæ æris, mali punici, amyli, cerusæ, paria pondera.

*Rhodia, ad supprimendum sanguinem, vlcera depascentia, & excrescentia.*

GALLÆ crudæ drachmæ sex, gallæ combustæ restinctæque vino aridæ drachmæ duodecim, squamæ æris nigri, si nō sit, rubri, drachmæ octo, atramenti sutorij, drachmæ vigintiquatuor, aluminis scissi drachmæ vigintiseptem: teruntur diebus sat multis.

*Medicamentum xanthon, hoc est, flauum.*

CHALCITIDIS combustæ drachmæ quadraginta, atramenti sutorij vsti drachmæ viginti, misyos cremati drachmæ decem, æris vsti drachmæ quinq;.

*Medicamentum à murino colore psaron dictum.*

MISYOS quincunx, gallarum triens, chalcitidis sextans, squamæ æris tantundem, atramenti sutorij vncia, æruginis rasæ sextans.

*Medicamentum heliocæ, adurens.*

AURIPIGMENTI libra, calcis viuæ libræ duæ: aqua læuigato per dies caniculæ, deinde siccatis vtitor.

*Antheron.*

CYPERI drachmæ octo, myrrhæ drachmæ duodecim, sandarachæ drachmæ tres, rosarū floris drachmæ duæ, croci drachma, crocomagmatis, aluminis scissi, iridis illyricæ, singulorum drachmæ duæ.



*Medicamentum ex charta, quod Græci dicunt dia charta, ad  
nomas oris potissimum & naturalium vlcera.*

AERIS squamæ, chartæ combustæ, singulorum drachmæ octo, auripigmenti, sulfuris viui, singulorum drachmæ duodecim, plumbi cremati drachmæ sex. Ad humidiores quidē sepedonas, sicco vtitor: ad siccas, rosaceo macerabis, nonnūquam & melle cum rosaceo.

*Medicamentum ex myrto syluestri, dia oxymyr sine  
appellatum, ad eadem.*

RHVS coriarij vnciæ duodecim, myrti syluestris foliorū, sandaraches, singulorū drachmæ octo, salicis foliorum siccorum, malicori, singulorum drachmæ sex, aluminis scissi, chryfocollæ, aloës, chalcitidis crudæ, squamæ, auripigmenti, salis communis, singulorum drachmæ quatuor.

*Medicamentum Massalioti.*

NITRI, opij, chryfocollæ, lapidis asij, sandarachæ, mysos, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, æqualia pondera: sicco vtitor.

*Smegma aridum, quod asclepios dicitur.*

BACCARVM lauri, nitri alexandrini, salis torrefacti, salis cappadocici, stillæ ammoniacæ, aphronitri, pumicis, singulorū libra, veratri nigri, herbæ lanariæ, pyrethri, fæculæ quæ est vini fæx combusta, herbæ pediculariæ, sinapi, iunci rotundi, aluminis scissi, iunci quadrati floris, iridis, gallæ, singulorum vnciæ sex, sampsuchi libra, viticis seminis, pulegij, farinæ fabarum, & lupini, singulorū vnciæ sex, chamæleontis nigri, sulfuris, gummi, thuris, piperis, cucumeris syluestris radices, marrubij, cimoliæ, pæoniæ, sepiæ testæ, fœnugræci, phylli, costi, cumini, euphorbij, spicæ nardi, singulorum vnciæ tres. Alexander autem præter hæc adiicit salis ex nitri fontibus, salis Tragasei, singulorū libram, adarces vnciam, aluminis liquidū, nardi gallici, cnici, cocci gniidij, graminis aridi, brioniæ siccæ, singulorum treis vncias.

*Smegma peponatum.*

THVRS, mastiches, stillæ ammoniacæ, singulæ vnciæ, tragacanthi fescuncia, succi vux acerbæ dodrans, peponis seminis recentis quadrans, similæ sextarij quinq; ouorum vnus & viginti albumina, iridis triens. quidam & veratri nigri sextantem miscent.

*Aliter*



*Aliter Critonis.*

**L O M E N T I** modius, similæ sextarij quatuor, trifolij, glādis vnguentariæ, iridis illyricæ, singulorum libræ quatuor, guttæ ammoniaci, costi, singulorum libra, ouorum tenuia aquata, peponum carnis sextarij duo, vux acerbæ succi tantundem: macerantur, redactaq; in pastillos siccantur, deinde contusa incretaq; in vsum adhibentur. **A L I T E R.** Tragacanthæ, thuris, mastichæ, guttæ ammoniaci, singulorum drachmæ decem omphacij drachmæ quinq; , similaginis sextarij quinque, candidi ouorum liquoris vncia, peponum carnis vnciæ decem: præparatur vt suprà dictum est.

*Smegma quod capitis defluxiones exiccet.*

**N I T R I** Alexandrini rufi vnciæ quinq; , salis communis torrefacti fescuncia, salis cappadocij vncia: hæc aceto quàm acerrimo macerata in patinam fictilem coniiciuntur, atque in furno vruntur, dum redigantur in carbones: inde refrigeratis læuigatisq; ad abstergendum vtitor, vinum in balneo instillans.

*Sapo Constantini.*

**R O S A R V M** siccarum, aloës, gallæ, malicorij, malabathri, sarcocollæ, singulorum tres vnciæ, balaustiorum, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum vnciæ duæ, costi vncia, saponis gallici libra, excipiuntur iure lupinorum.

*Puluis pilos abolens, vnde psilotrum dicitur, ad podagram.*

**M A S T I C H E S**, thuris masculi, herbæ pediculariæ, veratri albi spumæ argenti, singulorū vnciæ tres, phylli, amyli, veratri nigri, lapidis asij floris, singulorum vncia, alcyonij, pumicis tosti, cimoliæ, sampsuchi, singulorum vnciæ tres, spicæ nardi vncia. Nonnulli etiam aloës vnciam addunt. contusum in vase puluerem referuato: vbi necessitas incidet, oryzæ cremor & ptisanæ in ollam conicitur: postquàm inferbuerit, pulueris, saponis, gallici, auripigmenti, aluminis scissi, sandarachæ, singulorum fescuncia additur, calcis viuæ recentis libra. Vtitor vnguento mense ter. nono videlicet lunæ die, decimonono, & vigesimonono, idque vsque ad annum: post hunc, semel mense, quum vigesimumnonum luna diem agit.

*De medicamentis liquidis quæ illinuntur, ad oris vitia vnde stomatica dicuntur, ac guttur accommodatis*



**Q**uanto rarior molliorq; est summa oris tunica, cute quæ corpus totum obtegit, tanto etiam magis stomaticorum medicaminum vsus euariat. Quum igitur inflammatio incipit, ea requiruntur medicamenta quæ humoris influxum repellant, cuiusmodi sunt, arida quidem, omphaciũ, galla omphacitis, succus rhu, hypocistidis, aluminis, cortex piceæ, & thuris, balauſtia, & generatim omnia quæ astringunt, ita vt inſuauem ingratamq; & lethalem vim non præſentent: liquida verò, succus mororum tum quæ batina, tum quæ ſycamina dicuntur, item nucum viridium corticis, & mali punici, præſertim acidi, & malorum cotoneorũ, muſtum, aminẽumq; mel autem per initia ſolum vt medicamẽta adhereant temperatur, at quum humor ſubſtiterit, miſceri debet quæ concoquant & mediocriter diſſipent, cuius generis eſt crocus, myrrha, & dulcis radicula ſuccus at per totum id temporis quod ſtatum & declinationem intercedit, rectè uſurpatur mixtum aliquod ambobus, repellente puta, & diſcuſſorio: & per initia quidem ſuperabunt repellentia, deinde diſcutientia: in morbi declinatione ſolis vt diſcutiẽtibz abſque aſtrictione oportet, qualia ſunt nitrum, aphronitrũ, origanum, hyſſopum, thymus, nepita, iris, beſaſa, conſimiliaq; liquor tunc ſapa eſto, tum quæ ex mulſo decocto, tum quæ ex caricis & palmulis conficitur, ipſumq; dulce muſtum cum melle: vbi verò veluti reliquię quẽdam inflammationis remanſerint, etiam ſulphur ignem non expertum miſcebimus: ſuccum autem primum cũ melle incoquemus, dũ liquidioris mellis ſpiſſitudo fiat, inde ſic arida in tenuiſſimũ pollinem pertrita inſpergemus, poſtea modicè coquemus, quoad omnia ex actè in vnitatem cogantur, quo factò in vitreum vas medicamentum transfundemus.

*Dia moron ſimplex.*

MORORVM ſucci ſextarij tres, prius excoquantur dum tertia portio fuerit abſumpta, adiectoq; mellis ſextario, ruſus incoquantur ad melleam ſpiſſitudinem.

*Dia moron compoſitum.*

MORORVM ſucci hemine ſex, uſq; ad ſtrigmenti craſſitudinẽ coquũtur, deinde admixto leuĩs croci drachma, myrrhæ duabus, ſucci vuẽ acerbẽ vna, aluminis ſciſſi ternis obolis, mellis hemina, quouſq; ſpiſſeſcant incoquantur.

*De*



*De moris batinis, quæ rubi fructus sunt.*

ITEM quod ex moris batinis constat, eodem modo præparatur, maiore vi astrictoria præditum.

*Dia caryon, quod est ex nucibus, simplex.*

VIRIDIVM nucum corticis contusi succi hemine quinque, mellis hemina, coquantur ad dimidias.

*Dia caryon compositum.*

PER initia quidem & in vigore oris inflammationū, mīseri debēt croci, & aluminis, singulę drachmę, myrrhę duo, in declinatione verò ad discutiendum, nitri drachma, sulfuris tantundem, cum prædicta nucum corticis succi, & mellis mensura.

*Medicamentum ex succo mali punici.*

MALI punici cui nuclei sunt adempti dulcis succi sextarij quatuor, mali punici acidi succi sextarij duo, mellis sextarius, myrrhæ amineæ drachmę octo, crocomagmatis, gallæ singulorū drachmę octo, aluminis scissilis drachmę quatuor, iridis illyricę drachmę octo, omphacij drachmæ octo: conficitur quemadmodum quod moris constat.

*Aliter idem.*

MALI punici dulcis cum corio suo combusti succi sextarij sex, mellis generosi sextarius, aluminis scissi vncia, myrrhæ semuncia.

*Medicamentum è musto, dia gleucous dicunt.*

MVSTI sextarij sex, gallæ, aluminis scissilis, singulorum drachmæ duæ, croci, myrrhæ, singulæ drachmę. Si lenire voles, dulce esto mustum: si repellere, austerum. quod autem neutrum est, mediam inter hæc vim obtinet.

*Aegyptia stomatica.*

MELLIS pondo, olei bes, resinæ terebinthinę sextās, croci drachmæ quatuor: in cacabo liquefiunt.

*Medicamentum dia besasa, ex ruta sylvestri.*

ANISI feminis, apij feminis, iunci odorati floris, ameos feminis, aluminis scissi, iridis illyricæ, besasa, quod nonnulli harmala vocant (est autem ruta sylvestris) cinnamomi, myrrhæ troglodytidos, croci, gallę, singulorum vncia, aristolochię longę, cassisę, crocomagmatis, rosarum ficcarum, singulorum vncia, costi, hirundinum cineris recentis, singulorum vncię tres, nardi Indicę, amomi, singulorum semuncia, mellis quod satis est.



**D**Ulcium simul & vtilium potionum alia ex vino conficiuntur, coniectis in id quibusdam speciebus, exempli gratia, pipere, absinthio, casamo, aliisque compluribus, unde etiam appellationem nonnunquam sortiuntur, aliquando melle admixto, interim non: alia ex aqua in qua decoquantur mala, vel rosa, vel similia quaedam, nempe vua acerba, mala punica, myrti bacca, eoque mel optimum despumatum miscetur, tum quod firmum sit, tum quod dulce, interdum etiam vtile: si illud excipias quod à cibyra in parvis vasculis asportatur, asterum: item hydromalum vinosum, quod etiam sine melle fieri nouimus. quemadmodum apomeli ex melle solo & aqua, citra alterius cuiusdam substantiae misturam. Imò etiam ex vino confectae potiones, quas & propomata Graeci nominant, mellis despamati sextarium vnum, ad vini quaternos recipiunt, componunturque citra coctionem. At quae ex aqua & liquore fiunt, si quidem coquantur, vnum mellis ad treis liquoris, cuius duae ferè partes inter coquendum sint absumptae, sextarios assumant: sin minus, vnum mellis ad binos liquoris. ceterum quae non coquantur, diu satis insolare prorsus oportet, & praesertim omphacomeli. Ex aqua verò temperatas potiones coquere conuenit, quod propter imbecillitatem facillimè mutetur. omnes autem in fictilia vasa exigua oblita transfundendae sunt, iisque tutò operculatis in apricis locis vsquedum excoquantur reponendae. attenuantibus autè & probè aqua temperatis vti conuenit. Omphacomeli postquam musti modo inferbuerit crassumque euaserit, tunc operiri vas debet. his igitur quae vino constāt, quū febris abest, potissimum vtimur, vel solius voluptatis gratia, praeter eas quae scammonia aut grano gnidio aut eiusmodi purgantibus medicamentis componuntur, vel propter eiusmodi affectus in quibus & medicamentis in illas coniectis, per os vti licet. Ex aqua autem aut succo aliquorum confecturae febricitantibus conueniunt, interdū ceu hedysmata hoc est dulciaria, quū morbus vino vti non permittit: interdum ceu affectui commodae, quemadmodum apomeli ad saluam educendam, aut vrinas citandas, aut aluum emolliendam, aut extenuandum humorem: hydromalum autem & hydrorofatum siticulosis, febre ardenti pressis, resolutis, & stomacho vitiosis. Omphacomeli,  
myr



myrtites,, rhodostacton, hoc est, mel rosaceum, & rhœtes, coeliaco affectui, dysenterii, vomitionibus, aliisque fluidis vitiis congruunt. Iam verò his collutionibus subinde in stomachicis affectibus utimur.

*Hydromalum ex malorum cotoneorum succo.*

**MALORVM** cotoneorum nucleis exemptis contusorum succi sextarii duo, mellis sextarii tres, aquæ sextarii sex, incoquantur despumando ad tertias. **ALIVD.** Malorum cotoneorum frustulatim concisorum nucleis ablatis pondo quinq; in aquæ fontanæ sextariis decem incoquuntur dum intabescant. ablata ab igne, refrigerataq; eximuntur, expressq; succo proiciuntur, aquæ modo dimidia mellis mensura temperatur, iterumque incoquitur despumando, quoad octava portio absumpta fuerit. Nonnulli verò ex dulcibus etiam malis similiter hydromalum componunt.

*Hydrososatum.*

**ROSARVM** vnguibus exemptis libræ quatuor, aquæ sextarii quinque, mellis sextarii duo.

*Rhodomalum.*

**SVCCTI** malorum cotoneorum sextarius, rosarum trepondo, mellis sextarii tres, aquæ sextarii quinq;. Verum quoniam rosæ non eodem tempore cum malis inveniuntur, conuenit eas cum melle quando colliguntur componere, ac ubi mala prouenerint, totam compositionem moliri.

*Omphacometitis preparatio.*

**VVAE** acerbæ succi sextarii tres, mellis sextarius: mixta diebus quadraginta insolantur, vel discoquantur.

*Quomodo myrtites fiat.*

**MYRTI** baccarum succi sextarii tres, mellis sextarius, ad tertias decoquantur.

*Apomeli ex commentarijs Philagrii.*

**FAVORVM** melle scatentium alborum pondo, aquæ fontanæ trepondo & dimidium. confractis fauis vnitisq; aqua cum melle incoquitur, dum & spuma ipsius & id quod veluti cerosum supernatat, particulatim relinquatur, atque tunc refrigerata diligenter transfunduntur.

*Rhodostacti compositio.*

**ROSARVM** quibus vngues sint exempti succi sextarios duos, mellis sextarium incoquito despumans quoad quarta pars fuerit absumpta.



M A L I punici succi sextarij tres, mellis vnus, ad tertias decoquuntur.

*Decollyrijs & adglutinantis*

C A P. X V I.

**V**aria ocularium medicamentorum materies existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, particula stirpium, & metallica his inseruntur. ex quibus alia acrimoniã leniunt, & veluti opplent ostruuntq; , vtpote pompholyx, spodium, amyllum, plumbum, terra samia, quæ aster dicitur, cadmia, eaq; omnia lota, & candidus oui liquor. Quibus ita vtendum est, vt caput prius vacuationem experiatur: nam si repletum fuerit, metus est ne oculorum tunica humoribus distentæ perrumpantur. Alia contrariam his naturã obtinent, nempe acrem, recludendis vacuandisq; iis quæ diu impacta fuerunt accommodata, quemadmodum liquores Cyrenaicus, Medicus, sagapenus, euphorbium, & consimilia. Nonnulla sordidis vlceribus abstergendis conueniunt, qualis est squama æris, ipsumq; æs, chalcitis, misy, fori, flos æris, stimmi, cõcremata omnia. Quædã his vicina sunt, smectica ab exterendis sordibus appellata, cuiusmodi est auri-pigmentum, sandaracha, & lapidis asij flos. Sunt & astringentia, atq; ex his quæ mediocriter id faciunt vehementer lippitudini, vlceribus, & defluxionibus conducunt, nempe rosarũ folia, flores, fructus, spicæ nardi phyllũ, crocus, glaucium, & hypocistis. Quæ vehementiorem astringendi vim repræsentant, oculorũ claritati conducentibus potissimum medicinis miscentur, cuius generis est omphaciũ, acacia, balauustum, satiuæ punicæ flos & galla. Alia concoquũt discutiũtq; , vt myrrha, crocus, castorium, lachryma thuris, fœnugræci succus. Porro ex compositis oculorum remedijs, alia delinuntur, simplicemq; appellationem habent, alia xerocollyria, alia hygrocollyria vocantur. Quæ igitur delinuntur, omnem comprehensam materiam recipiunt, omnibusq; conférunt affectibus: cæterum vere præsertim præparari debent, æstate siquidem virtus ipsorum perspirat euanescitq; , hyeme species gelu rigidæ temperari nequeũt. Conterere autem ea oportet liquore non copiosè affuso, ne metallica subsidant, aromata supernatent, verum modicè, vt sordium modo conterantur. Aqua vero pluuialis erit, tum quòd tenuis sit, tum quòd modicè astringat. Si quidem

vin



omni vino aut succo aliquo læuigare oportet, ipsa quoque terenda sunt, metallica sanè longo tempore, quæ autem succo constant, exiguo, demum ubi satis læuia euaserint, gummi adiicietur: in formam redacta, vasis maximè æreis aut vitreis reponentur. Cæterum iis quæ succo conficiuntur, protinus vtilicet: metallica vetustate redduntur meliora. Porro inter collyria arida quædam consumunt exteruntq; callos, ficos, vngueis, scabiosaq; vitia, è chalcitide, ærugine & misy composita: quædam lachrymas mouent, obstructionibus & hebetudini accommodata, quæ tum ex his tum ex pipere & spica nardi fiunt. Sunt quæ præseruent, tueanturque oculos ab humorum influxu, cuiusmodi ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloë, cadmia, stimmi, croco: omnia in tenuissimum pollinem coacta oculis applicantur. At liquida collyria fiunt ex melle attico, opobalsamo, oleo ob vetustatē tenui, fœniculi succo, diuersorum animalium felle, liquore cyrenaico, aliisq; compluribus. Conferunt hebetudini, suffusionique incipienti, medicamenta quæ extenuent, calefaciant, purgentq;. Utendum his est, & omnibus acribus, ubi caput repletionē caret, sub dio, aëre, puro, austrino, non nimis frigido, neq; item calido nimum. At agglutinamenta quæ anacolemata græcè dicuntur, ex medicamentis præparantur quæ obstruunt, opplentq;, glutinant, stringunt, aut refrigerant, aut astringunt, siccantve, qualis est farinæ pollen, manna, terra samia, myrrha, cochleæ, acacia, opium, cum candido oui liquore. glutinantur fronti in quibus humor non intra caluariam delitescit, sed extrinsecus affligit.

*Collyrium quod protinus dolorem sedet monohemeron appellatum, ad incipientem vetustamq; lippitudinem.*

**A C A C I A E** drachmæ trigintasex, gummi drachmæ trigintaduæ, cadmiæ drachmæ vigintiquatuor, æris cremati & eloti drachmæ octo, opij, drachma: vino austero læuigantur. Medicamentum discutit & siccatur.

*Chiacum collyrium.*

**M I N I I** sinopici, gallæ omphacitidis, croci, rosarum recentium vnguibus exemptis floris quem thylaca vocamus, gummi, singulorum vnciæ quatuor, opij vncia: vino aminæo, aut falerno, aut chio austero teruntur. Sit autem vinum marinæ expers.



*Cygnarium.*

C A D M I A E vsta elotæque vnciæ sex, cerusæ loræ vnciæ quatuor, pompholygis tantundem, amyli vnciæ duæ, tragacanthæ, opij torrefacti, gummi, singulorum vnciæ duæ: aqua pluuiali læuigantur.

*Rubens cygnus.*

C A D M I A E crematæ elotæ sextans, terræ samiaæ quæ aster dicitur tantundem, cerusæ triens, pompholygis bes, amyli sextans, opij sextans, acaciæ, tragacanthæ, singulæ vnciæ, gummi triens: aqua cœlesti subiguntur.

*Albus cygnus.*

C A D M I A E vnciæ quindecim, cerusæ vnciæ septemdecim, opij drachmæ octo, thuris drachmæ septem, amyli vnciæ septem, gummi drachmæ tredecim: aqua cœlesti teruntur.

*Pelaron ad vlcera.*

C A D M I A E, cerusæ, singulorum drachmæ vigintiquatuor, acaciæ, opij, singulorum drachmæ octodecim, gummi, tragacanthæ, amyli, singulorum drachmæ nouem, myrrhæ drachmæ tres, eris, croci singulorum sesquidenarius: aqua conteruntur.

*Phæon ad oculos sanguine suffusos, & magnos affectus.*

C A D M I A E teneræ drachmæ vigintiquatuor, cerusæ drachmæ sedecim æruginis rasæ drachmæ duodecim, stimmi drachmæ octo, aluminis scissi drachmæ tres, chalcitidis vsta drachmæ tres, nardi Indicæ drachmæ quatuor, omphacij drachmæ duæ, æris drachma, squamæ æris drachmæ octo, ericæ fructus drachmæ tredecim, lachrymæ papaueris drachmæ vigintiquatuor, croci drachmæ quatuor, castorij drachmæ tres, myrrhæ drachmæ sex, lycij Indici, acaciæ, gummi, singulorum drachmæ quatuor, rosarum recentium drachmæ duæ & semissis: vino falerno aut surrentino, aut aminæo, aut chio austero perteruntur. inungitur per triduum, aquæ instar dilutum ex fœnugræci succo instillatum, deinde ex ovo aut lacte, postremo aqua crassius.

*Collyrium ex decoctis, diazematō dicitur.*

C A D M I A E vnciæ sedecim, cerusæ vnciæ octo, amyli, opij, tragacanthæ, acaciæ, singulorum vnciæ duæ, gummi vnciæ sex: læuigantur decocto rosarum siccarum, meliloti, capiti papaueris, dulcis radicula, pari singulorum modo.

Col



*Collyrium dia hydrias, repellens.*

**L I Q V O R I S** qui in vasis cerealibus tophi modo concretus reperitur, libræ tres, cadmiæ vstæ & elotæ libra, cerusæ, pompholygis, terræ samiæ, qui aster dicitur, singulorum celotorum vnciæ sex, thuris vncia, myrrhæ tantundem, succi lini seminis, herbæ pulicaris, ptisanæ, fœnugraci, singulorū libra, tragacanthæ vnciæ sex, gummi libra.

*Collyrium Ilambonis.*

**C A D M I A E** vnciæ octo, pompholygis vnciæ quatuor, cerusæ libra, tragacanthæ, gummi, opij, singulorum vnciæ quatuor: aqua pluuiatili teruntur.

*Cinereum, quod spodiakon dicitur, ad inflammationes, defluxus, & chemosin.*

**T H V R I S**, stimmi, singulorum drachmæ centum, cadmiæ, cerusæ, vtriუსq; drachmæ vigintiquatuor, terræ samiæ, papaueris lachrymæ, singulorum drachmæ tres, gummi drachmæ quindecim: læuigantur oleæ coliculi succo. fit autem in hunc modum: teneriora oleæ folia elota contunduntur in mortario, paululo aquæ superfuso, per linteolum exprimuntur.

*Collyrium ex oleæ turionum succo tenerum, dia thalias vocatur.*

**T H V R I S** drachmæ quatuor, stimmi drachmæ quindecim, cadmiæ drachmæ vigintiocto, cerusæ drachmæ quadragintanouem, terræ samiæ drachmæ octodecim, opij drachmæ sex, gūmi drachma, plumbi vsti eloti; drachmæ octo: excipiuntur oleæ turionum succo.

*Dia thalias, ruffum.*

**A E R I S** cremati drachmæ duodecim, sandycis vnciæ vigintiquatuor, foliorum oleæ vnciæ duæ, opij tantundē, gummi vnciæ decem, vino spathite vel aminæo excipiuntur.

*Dia smyrnon claudiacum.*

**G L A V C I I**, sarcocollæ, singulorum drachmæ quadraginta octo, croci drachmæ vigintiquatuor, opij, myrrhæ, lapidis hæmatitis, singulorum drachmæ sex, tragacanthæ drachmæ quadraginta octo, gummi drachmæ sedecim: vino Italico subiguntur. vsus est ex ouo.

*Aliud dia smyrnon ad rhyadas & agyloas.*

**C A D M I A E** lotæ, lapidis hæmatitis eloti, singulorū drachmæ vigintiocto, myrrhæ, spodij Cypriæ, singulorū denarij vigin



viginti quatuor, opij drachmæ octo, croci drachmæ quatuor (alij octo) piperis albi grana triginta: gummi drachmæ sedecim: vino Italico teruntur, ex ovo adhibetur collarium: si vitium sit recens, aquatum.

*Stacticum Prosechij.*

CADMIÆ, gummi, singulorum drachmæ viginti, stimmi, atramenti sutorij, singulorum drachmæ octo, opij drachmæ quatuordecim, æruginis rasæ drachmæ decem, piperis albi drachmæ sex, croci drachmæ octo, misyos crudi tantundem, opobalsami drachmæ quatuor: aqua conteruntur.

*Hygidion Ammonij.*

CADMIÆ, æris, singulorum drachmæ sedecim, cerusæ, castorij, aloës, croci, singulorum drachmæ quatuor, squamæ drachmæ quinque, rosarum floris, plumbi vsti, singulorum drachmæ octo, lycij drachmæ tres, lapidis schisti drachmæ quatuor, opij drachmæ decem, acaciæ drachmæ quadraginta, gummi drachmæ quadraginta octo: aqua excipiuntur.

*Olympos seu olympiacum.*

ACACIÆ, spicæ nardi, thuris, singulorum drachmæ octo, æris cremati elotiq;, stimmeos vsti & loti, cerusæ concrematæ lotæq;, cadmiæ, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ, opij arefacti, singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ quinque, æruginis rasæ drachmæ tres, lapidis schisti, squamæ rubræ, lycij Indici, omphacij, singulorum drachma, castorij, rosarum floris, singulorum drachmæ duæ, phœnicobalanorum drachmæ quatuor, similiter offea palmarum vstarum ligna numero quinque, gummi vnciæ quinque aqua pluuiali superfunduntur, in qua commadescent tres dies totidemq; noctes, calami odorati, alterci seminis, rosarum ficcarum, singulorum drachmæ quatuor, phylli drachma.

*Nardinum.*

CADMIÆ, croci, gummi, singulorum drachmæ triginta sex, æris vsti drachmæ octodecim, stimmi, acaciæ, singulorum drachmæ triginta, nardi syriacæ drachmæ duodecim, opij, singulorum drachmæ sedecim: aqua subiguntur.

*Theodotium minus.*

STIMMI, acaciæ, singulorum drachmæ viginti, æris vsti drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, myrrhæ totidem, ærug



gruginis drachmæ duæ, aloës, succi papaueris, lycij, singulorum drachma: pluuiatili aqua læuigantur.

*Rhinarium.*

LAPIDIS hæmatitis, lapidis schisti, singulorū drachmæ sex, missæ decim, æris combusti, cadmiæ, æruginis, singulorū drachmæ octo, opij drachmæ quinque, chalcitidis drachmæ duæ, gummi drachmæ octo: vino excipiuntur.

*Xyster.*

PVMICIS, misyos, ostreorum, singulorum crematorū vnciæ sex, cadmiæ, opij, chalcitidis vstæ, croci, aloës hepaticæ, castorij, phylli, singulorum drachmæ duæ, stimmios, acaciæ, singulæ vnciæ, æris combusti vnciæ quatuor, myrrhæ troglodytidis drachmæ quatuor, spicæ nardi drachma, cerusæ drachmæ octo, gummi drachmæ quatuor: aqua cælesti superfunduntur. Nonnulli etiam vinum miscent.

*Hecatombe, ad cicatrices crassas.*

CADMIÆ vstæ lotæq; , æris cremati & eloti, vniuscuiusque drachmæ octo, stimmios combusti, acaciæ rubentis, gummi, singulorum drachmæ quindecim, aloës, gallæ, æruginis vermicularis, castorij, lycij, spicæ nardi, croci, opij, myrrhæ, cerusæ, hebeni ramenti, chalcitidis, singulorum drachma, rosarum drachmæ sexaginta: aqua pluuiali teruntur.

*Collyrium ex cornu, dia ceratos dicitur, Galeni.*

PLUMBI combusti, cornus ceruini cremati, singulorū vnciæ duæ, cerusæ, squamæ æris, amyli, thuris, sepia testæ combustiæ, æruginis, myrrhæ, gummi, singulorum vncia: aqua pluuiali excipiuntur.

*Collyrium è thure, dia Libanu nuncupatur.*

THURIS vnciæ sex, cadmiæ, pompholygis, terræ samia quæ aster dicitur, amyli, gummi, singulorum vnciæ tres, cerusæ vnciæ sex, squamæ æris vnciæ quatuor, tragacanthæ vnciæ tres, opij vnciæ sex: aqua cælestis adiicitur.

*Libanium.*

CADMIÆ elotæ, amyli, singulorum denarij duodecim, cerusæ tantundem, spodij, pompholygis, terræ samia quæ aster dicitur, plumbi vsti & loti, tragacanthæ, singulorū denarij octo, opij denarij duodecim, gummi denarij quatuor: aqua pluuialis additur, & ouorum viginti albumina. Sunt qui etiam myrrhæ denarios quatuor addant.

*Aster*



*Aster magni.*

POMPHOLYGIS, cadmiæ, cerusæ, singulorū drachmæ sedecim, plumbi drachmæ octo, amyli drachmæ octodecim, thuris drachmæ decem, terræ samia quæ aster dicitur drachmæ duodecim, myrrhæ drachmæ duæ, tragacanthæ gummi, singulorum drachmæ octo: aqua additur.

*Vranium.*

TERRÆ samia, piperis, singulorum vnciæ tres, spodij eloti vncia, gummi vnciæ quatuor, stimmios cremati eloti; vnciæ duæ, squamæ lotæ vncia, opij drachmæ sex, cadmiæ combustæ & elotæ drachmæ duæ: aqua pluuiatilis admiscetur. Carnem inducit, repellitq;.

*Collyrium ex succo fœnugraci.*

CADMIÆ, tragacanthæ, singulorum vnciæ octo, cerusæ vnciæ triginta, amyli tantundem, opij vncia: læuigantur succo fœnugraci.

*Collyrium Cleonis.*

POMPHOLYGIS, plumbi, singulorum vnciæ quinque, croci fescuncia, squamæ æris quod stomoma dicitur vncia, gummi vnciæ duæ: aqua pluuiatilis additur, aquatū illinitur.

*Dia rhodon, hoc est, ex rosis, quæ septuaginta duas vncias pendunt.*

ROSARVM viridium vnciæ septuagintaduæ, cadmiæ vsta & elotæ drachmæ vigintiquatuor, æruginis rasæ drachmæ duæ, spicæ nardi drachma, squamæ æris elotæ drachmæ duæ, stimmios combusti eloti; opij, myrrhæ, singulorum drachmæ tres, croci drachmæ octo, amyli drachmæ duæ, gummi drachmæ vigintiquatuor: aqua pluuiatilis admiscetur.

*Album dia Rhodon.*

CADMIÆ crematæ & lotæ, cerusæ elotæ, singulorum libra, amyli, opij, tragacanthæ, singulorum vnciæ tres, aloës fescuncia, gummi vnciæ tres, croci fescuncia, rosarū vnguib; detractis vnciæ sex: aqua miscetur.

*Collyrium ex aloë, dia aloës nuncupatur.*

CADMIÆ, cerusæ, aloës, singulorum vnciæ decem, rosarum viridiū vnciæ sex, amyli vnciæ tres, opij vncia, tragacanthæ vnciæ duæ, gummi vnciæ tres: aqua pluuiatilis admiscitur.

*Crocinum dia rhodon.*



**SPICAE** nardi, rosarum siccarum, aloës, singulorum drachmæ duæ, alterci albi sesquidrachma, croci drachmæ quatuor & semissis, glaucij sex, sarcocollæ tantundem, opij drachmæ duæ, tragacanthæ vncia: aqua pluuialis additur.

*Nili dia Rhodon.*

**ROSARVM** tenerarum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, papaueris obolus, gummi drachmæ quatuor: aqua pluuialis excipiuntur.

*Lynceus ad claritatem oculorum.*

**CADMIÆ**, æris combusti, guttæ ammoniacæ, singulorum drachmæ duodecim, myrrhæ, lapidis hamatidis, opij thebani, singulorum drachmæ sex, aloës hepaticæ, fellis tauri, galbani, sagapeni, singulorum drachmæ quatuor, æruginis rasæ, opopanacis, salis ammoniaci, singulorum drachma, gummi drachmæ sex: aqua pluuiali teruntur.

*Proteus ad idem, cicatricesq; extenuat.*

**CADMIÆ**, cerusæ, chalcitidis crudæ, singulorum denarij quadraginta, piperis sesquidenarius, liquoris cyrenæici drachmæ octo, croci denarij duodecim, opij thebani denarij duodecim, sagapeni denarij duodecim, oliuæ æthiopice denarij duodecim, auripigmēti, aluminis scissilis, singulorum denarij octo, myrrhæ denarij duodecim, suffiminis ammoniaci denarij xx. opopanacis denarij sedecim, opobalsami denarij sedecim, gummi denarij viginti: aqua pluuiali excipiuntur.

*Collyrium ex succo fœniculi.*

**CADMIÆ** drachmæ septedecim, atramenti Indici drachmæ sedecim, piperis lōgi drachmæ tredecim, & albi duodecim, liquoris cyrenæici drachmæ octo, opobalsami drachmæ sex, spicæ nardi drachmæ sex, sagapeni, opopanacis, singulorum drachmæ quinque, opij drachmæ quatuor, euphorbij drachma, gummi drachma: succo fœniculi læuigantur.

*Collyrium ex opobalsamo.*

**CADMIÆ**, cerusæ, singulorum drachmæ octo, omphacij drachmæ quatuor, piperis albi vnciæ sedecim, opij drachmæ quatuor, opobalsami, gummi, singulorum drachmæ sedecim: aqua pluuialis additur.

*Thalasseros.*

**CADMIÆ** vnciæ octo, æruginis vnciæ duæ, atramēti Indici vnciæ octo, piperis albi vnciæ quatuor, liquoris medicij vncia, opobalsami vnciæ ij. gūmi vnciæ sex: aqua adiicitur.

Har



*Harmation.*

GUTTAE ammoniaci, æris combusti, corticis thuris, singulorum drachmæ quatuor, æruginis drachma, gummi drachmæ quatuor: aqua cælesti excipiuntur.

*Collyrium malabathrinum, quod & Isotheon dicitur.*

CADMIÆ drachmæ sedecim, æris vsti & eloti drachmæ quatuordecim, opij, lycij Indici, malabathri, nardi Indicæ, croci, aloës, singulorum drachmæ duæ, cerusæ drachmæ octo, castorij drachmæ duæ, myrrhæ drachmæ quatuor, acaciæ, summi, singulorum drachmæ quadraginta: aqua teruntur. vsus ex ouo.

*Crassus ex vino.*

CADMIÆ, lapidis hæmatitis, & schisti, singulorum drachmæ quadraginta, æris vsti drachmæ triginta, chalcitidis drachmæ trigintaduæ, papaueris seminis drachmæ tredecim: papaueris semen aqua decoquitur, succus expressus aliis adicitur, quæ leuigantur vino spathite vel aminæo.

*Aliud ex vino.*

AERIS combusti, cadmiæ placitidis, singulorum vnciæ nouæ, lapidis hæmatitis eloti vnciæ sex, croci, myrrhæ, aloës, suffiminis ammoniaci, singulorum vnciæ tres, lycij Indici, spicæ nardi, singulorum fescuncia, piperis albi grana cætum quinquaginta, acaciæ rubentis vnciæ nouem, gummi vnciæ tres: vino falerno aut aminæo teruntur.

*Collyrium ex duobus lapidibus ad aspritudinem.*

LAPIDIS hæmatitis, schistiq; cassiæ, singulorum drachmæ octodecim, æris, cadmiæ, opij, æruginis rasæ, singulorum drachmæ nouem, gummi tantundem, chalcitidis vstæ drachmæ sex: aqua teruntur.

*Aridum collyrium Galeni, quod oculos tuetur.*

LAPIDIS phrygij minutim contusi vsti q; in ollula quousque incandescat, & restincti butyro non veteri, deinde iterum similiter cremati, extincti q; vino falerno, ac tertium vsti & extincti melle siccati q; libra, æris cremati, piperis albi, phylli, singulæ vnciæ, summi fescuncia: omnibus in lauorem detritis quum medicamentum ab igne auferetur, liquoris balsami non crassi (id enim arefcere medicamentum prohibet) sed lucidissimi vnciam iniicies. Vti autem eo conuenit in palpebris duntaxat, sic vt specillo illato tunica non attin.



mittantur, sed vt solum medicamentum palpebris apertis  
inungatur. Inungi autem debet non semel, verum sepius, tum  
ante cibum, tum secundum ipsum, magisq; vbi iam lippitu-  
do sentitur. Mirum enim est, quàm omni alio medicamen-  
to securius ab iniuria vindicet.

*Aridum diacroc.*

SARCOCOLLAE drachmæ octo, croci drachmæ qua-  
tuor, glaucij tantundem: inungitur frequenter die. Nōnul-  
li vero aloē quoq; miscent.

*Aliud aridum ad siccam lippitudinem quæ xerophthalmia  
dicitur, sycosin, sepedonas, carnis excrescentias.*

CADMIÆ drachmæ decem, chalcitidis drachmæ vigin-  
ti, piperis grana quindecim, nardi gallicæ drachma: teritur  
& limbadmia & chalcitis cū vino: vbi inaruerint, reliqua adiciun-  
tur, cogunturq; in tenuissimum puluerem.

*Hygra, hoc est, liquidum collyrium, ex Caucalide.*

CAUCALIDIS succi, chamædryos, coronopodis, inter-  
medium & othonnæ succi par mensura. Est autem othonna ma-  
gis unguinum chelidonium.

*Aliud ad sycosin, quæ est veterrima palpebrarum asperitudo,  
encanthidas, & excrescentiam carnis.*

MISYOSTOSI drachmæ sex, atramenti sutorij drachmæ  
quatuor, mellis attici sextarius.

*Erasistrati pandrestos hygra, mirifica est in ocularijs vitijs,  
tonsillis, pudendis & auribus suppurantibus.*

AERIS drachmæ sex, misyos tosti, myrrhæ, singulorum  
drachmæ tres, croci sesquidrachma, piperis drachma, vini  
chij & paksi cretici, vtriusq; sesquihemina: omnibus in vino  
læuigatis, dum inaruerint, passum superfunditur, & vsq; ad  
melleam spissitudinem incoquantur.

*Agglutinamenta oculorum qui defluxioni-  
bus infestantur.*

TERRÆ samiæ, mannæ thuris, myrrhæ, pares modi,  
oui aquato excepti, in lintheumq; illiti fronti imponuntur.

ALIUD. Alterci seminis drachma, opij tantundem, myrrhæ  
drachmæ duæ, croci drachma, farinæ pollinis drachmæ qua-  
tuor, ouorum tostorū lutea duo, albumine oui excipiuntur.

*De emplastris, & medicamentorum quæ in illa mittuntur  
coctione, tum qui cera modus cum oleo esse debeat,  
ex commentarijs Antylli.*

Q



**M**edicamentorū quæ emplastra ingrediuntur, alia sunt terrestria, utpote metallica, lapidūque & terræ species, floeces, cinis, & conchylia, alia sunt oleamenta, alia lachrymæ, alia liquari possunt: quædam liquores, quædam succi sunt: semina verò, herbas, & radices pauca recipiunt. Cæterū ex ipsis emplastris nonnulla sunt vulneraria, quæ enama græcis quòd cruentis iniiciantur: colletica, quòd glutinent: & catagmatica, quòd fracturis accommodentur, appellamus. Constare autem ex siccantibus nō summè, verū secundi ordinis absoluti, & tertij incipientis, oportet cuiusmodi sunt salix, quercus, cupressus, piceæ & pini cortices, myrrha, thuris lachryma, bitumen, aloë, aristolochia, cinis farnetaceus, cerusa, spuma argenti, & pleraq; ex metallicis. Coqui debent quousq; manus non amplius inquinent. Porro quæ cicatricem ducunt emplastra & ipsa ex siccantibus componuntur, verum efficacioribus quàm glutinatoria, quod genus est, æs combustum, squama tum æris tum ferri, ærugo, chalcitis, æris flos combustus, alumē, galla, plumbago, cadmia, pumex, & ostracea. Discutientia verò & calefacientibus & siccantibus modicè fiūt, nempe aristolochia, thapsia, oleo veteri, & raphanino, melle, opobalsamo, pice, resina terebinthina, galbano, sale combusto, salis flore. Quæ emolliunt, ex argenti spuma, adipibus, medullis, oleo veteri, propoli, ammoniaco, styrace, galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, vel radice althææ & cucumeris sylvestris, preparantur. Siccantia, ex sulfure, nitro, sale, cinere, & bitumine. Ad extrahendum accommodata, fiunt ex sale, nitro, propoli, æruginē, fermento, stercore, sulfure, terebinthina. Quæ concoquunt, ex cera, ladano, vua passa, amomo, croco, thure, pice, mastiche Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, æsypo, adipe, æruginē. Pus mouentia, ex hydrelæo, polline, pane triticeo, chondro, butyro, adipe suillo & vitulino, thure, pice, resina. Quæ verò leniunt, argenti spuma constant, cerusa, oleo, anetho, chamemelo, amylo, cera alba. Iam verò enama dicta, recentibus adhuc vulneribus & fracturis iniici debent, adiutariq; è summa spleniorum parte spōgiis posca madentibus simul illigatis, solui tertio quoq; die, & rursus eadem splenia non alia accommodari oportet. At quæ emolliunt, extrahunt, discutunt, concoquunt, & pus præter



præterea mouent, post cataplasmatum ceratorumq; vsum adhibentur. Quæ leniunt etiã per initia statim, summis potissimum partibus applicantur. Cæterũ quomodo coquantur, deinceps exequemur.

*Basilicum tetrapharmacum.*

CERÆ, resinæ colophonix, picis, seui taurini, pares portiones. *Emplastrum ex succo lini seminis discutiens detergensq;.*

OLEI veteris duondo, ceræ vnciæ viginti, resinæ colophonix, adipis suilli, singulorũ pondo & dimidium, argenti spumæ pondo, cerusæ vnciæ sex, succi lini seminis tantundẽ, farinæ pollinis vncia, thuris vnciæ quatuor.

*Emplastrum ex melle, dia melitos dicitur.*

ARGENTI spumæ, ceræ, olei, singulorum libræ quatuor, terebinthinæ resinæ libræ duæ, mellis, adipis suilli, singulorum libra. ALIUD. Argentæ spumæ libræ sex, olei libræ quinq; & semissis, resinæ colophonix libræ septem & semissis, ceræ libræ tres & semissis, mellis libræ tres.

*Emplastrum à succo dia chylon dictum.*

ARGENTEÆ spumæ pondo sex, olei, æstate quidẽ pondo septem, hyeme verò pondo nouem, scænu græci semisextarius, lini seminis tantundem, althææ trepondo: althæa, seminaq; in viginti aquæ sextariis discoquantur, quousq; paululum ex ea relictum fuerit, inde succi pondo quatuor, exprimuntur miscenturq; oleo ac incoquantur dum ebullire defierint, post hæc argenti spuma in tenuissimũ pollinem detrita inspergitur, postremo omnia igne nõ acri excoquantur vsq; dum digitos intinctos non inquinent.

*Emplastrum ex polline farinaceo, dia gyreos appellatum.*

FARINACEI pollinis, guttæ ammoniaci, singulæ libræ, resinæ è picea derafa, ceræ, adipis suilli, singulorum libræ duæ, succi lini seminis quod satis est.

*Emplastrum ab herbis botanicum dictum.*

LAPATHI rhepelæi, anchusæ chærospelethi, hoc est, onocleæ, heptaneuri, plantaginis, singulorum vnciæ tres, olei libræ sex, adipis suilli tantundem: herbæ oleo excocta proiciuntur, reliqua cum oleo eliquantur.

*Emplastrum ex hastula regia, dia asphodelu dicitur.*

HASTULÆ regix radices succi libra, rosacei, chamemelini, adipis anserini, singulorum vnciæ duæ, adipis suilli vnciæ tres, ceræ vnciæ quatuor.



*Emplastrum è fermento, abscessus rumpens.*

FERMENTI, axungia, singulorum vncia sex, salis vncia quatuor, piceae resinae vncia tres, cerae vncia quatuor, aphronitri vncia, guttae ammoniaci vnciae duae, mellis vncia sex, saponis vnciae duae.

*Emplastrum dothiene.*

SUFFIMINIS ammoniaci pondo, nitri Alexandrini vncia sex, aphronitri tantundem, adipis suilli pondo duo, cerae totidem, resinae terebinthinae pondo, olei veteris vncia, aceti quod satis est.

*Emplastrum ex radice lanaria, dia struthiu dicitur, strumas discutiens.*

ARGENTI spuma, radice lanaria, aristolochiae singulorum triens, galbani, squamae aris, aloes, singulae vnciae, mannae thuris sextans, stillae ammoniacae scilicet libra, resinae e picea vncia sedecim, aceti scillini sextarii quatuor, ad aridorum laugationem.

*Smilion ad abscessus.*

OLEI veteris sesquilibra, argenti spuma, nitri rubri, salis ammoniaci, lixiuij e ficu cui calx sit admista: protofactos dicitur, resinae, singulorum libra, galbani, guttae ammoniaci, singulorum vnciae tres, atramenti sutorij vnciae quatuor, cere vnciae sex, aeruginis, opopanax, singulorum vncia, aceti quod satis est: argenti spuma & arugo in oleo coquuntur dum manus non inquinant, deinde reliqua admiscuntur.

*Emplastrum dia scorodon, hoc est, ex allijs, ad rumpendum.*

CERAE vnciae sex, resinae colophonie vnciae quatuor, resinae pityinae hoc est ex picea arbore vnciae tres, seu taurini vnciae quatuor, nitri rufi fescuncia, allia pura viginti, olei dimidium sextarii: allia in oleo excocta proiciuntur, reliqua miscentur.

*Emplastrum dia apyranu ad discutiendum.*

ADIPIS anserini, & fasianorum, singulorum vnciae tres, olei veteris vnciae vigintisex, herbae pulicaris vnciae tres, vrticæ seminis, radice apyrani viridis, singulorum libra, cerae albae vnciae decem, emplastri quod dia chylon inscribitur vnciae duae, resinae terebinthinae vncia. Radix apyrani minutim concisa cum herba pulicari in oleo madescit, semenque vrticæ per noctem & diem: ac ubi excocta fuerint, ipsa quidem proiciuntur: quæ liquari possunt, oleo mixta soluntur.

*Empla*



*Emplastrum pyrine, ad duritias & scirrhus.*

ALTHAEAE, palmularū, aut daetylōrū qui nicolai dicuntur, singulorū libræ duæ, fœnugræci, lini seminis, singulorū sextarij dimidiū, chamæmeli, meliloti, palmularum corticis singulorū vnciæ sex, vini aminæi sextarij dimidium, spumæ argenti libra, cerusæ, resinæ colophonix, singulorum libræ duæ, ceræ resinæ, terebinthinæ, singulorum libra, olei veteris libræ quinq; aquæ libræ duæ, panis aridi contusi cribratiq; libræ quinq; herbæ in vino decoctæ exprimuntur, succo panis immadescit, sequenti die læuigatur, argenti spuma, cerusaq; in aqua, deinde oleo iniecto incoquantur, dum medicamentum digitos non coinquinet, inde reliqua adduntur, sublatis ab igne panis inditur, valideq; rudicula agitur, adiunguntur etiam æruginis rasæ, & salis floris, singulorum vnciæ sex, iridis, aristolochiæ, singulorum vnciæ sex, terebinthinæ resinæ libra.

*Pelation ex scoria argenti, dia electrolysmatos dicitur, ad similia abrasis.*

CERAE, scui taurini, singulorum vnciæ quinq; scoriæ argenti vnciæ sex, resinæ colophonix vnciæ quatuor, picis, olei, singulorum vnciæ duæ: scoria argenti arida læuigatur vino vel succo fœnugræci: quod si scoria desideretur, plumbagine vtimur.

*Emplastrum ex althæa, podagricis alijsq; duritijs accommodatum.*

SVCCI fœnugræci, & lini seminis, & althææ, singulorū trepondo, olei dupondo: incoctis vsq; dum succus absumatur, colophonix resinæ pondo adiicitur, item terebinthinæ resinæ pondo, hederæ lachrymæ quadrans: vbi soluta fuerint, & ab igne sublata, ceræ pondo iniicitur, galbani triens: vtraq; simul contusa solutaq; rudicula agitantur.

*Cybinum ad neruorum vulnera, punctus, & maximè diuturna.*

SVAMAE rubræ vnciæ quatuor & semissis, thuris vnciæ, misyos fescūcia, chalcitidis drachmæ quatuor, aceti sex: læuigantur æstiuo sole vsq; dum acetum fuerit consumptū, deinde solutis ceræ vncias octo, olei octodecim misceto. Si autem diuisus fuerit neruus & nudus sit, in vicem galbani, resinæ terebinthinæ vnciæ duæ induntur.

*Melanchloron ad eadem, & cruentis aptum.*

MALICORII, æris combusti, gallæ, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ æris, aluminis scissi & liquidi, (alij vice liquidi rotundum ponunt) iridis, misyos, attramē-



ti sutorij, chalcitidis, eruginis rasæ, cadmiæ, aloës, myrrhæ, thuris, panacis radicis, argenti spumæ, cerusæ, pares omniū portiones, teruntur in sole æstiuo cum aceto diebus pluribus, fingunturq; pastilli. Emplastrum verò fit hunc in modum: medicamenti vnciæ duæ, ceræ vnciæ sex, olei vnciæ octo, in neruorum vulneribus veteris, in aliis communis, temperantur.

*Emplastrum ex senetione, quod dia erigerontos dicitur.*

SENETIONIS succi libræ duæ, olei veteris sesquilibra, cyprini olei vnciæ quatuor, axungia veteris libra, resinæ terebinthinæ vncia, galbani semuncia, resinæ piceæ sex, æruginis, thuris, hyssopi medicamenti, singulorū vncia, squamæ æris scrupula octo, ceræ vnciæ decem, apochymatis vnciæ quatuordecim: oleum & succus ad sordium spissitudinem incoquitur cum adipe suillo: arida cyprino leuigantur, galbanum cū cera contunditur & cacabo demittitur, apochyma si quidem siccum fuerit, læue in cretum ponderato inspergiturq;: quod si in læuorem deteri nequeat, portione olei solutum excipiat, atq; tunc omnia misceantur.

*Emplastrum Mnasei discutiens.*

CERÆ, axungia porcina, singulorum libra, resinæ colophonix vnciæ sex, argenti spumæ libræ duæ: vini generosi libræ quatuor adiiciuntur.

*Ariobarzanion, ad eosdem affectus.*

ARGENTI spumæ sescuncia, cerusæ libra quincunx, aque marinæ vnciæ vigintiquinq; , olei veteris sesquilibra, buccinorum concrematorum vnciæ septem & semis, ceræ rufæ vnciæ nouem, resinæ terebinthinæ vnciæ sex, thuris vnciæ tres, scrupula tria & dimidium.

*Emplastrum ex dracunculo.*

CERÆ, resinæ colophonix, picis aridæ, axungia, resinæ, singulorum libræ quatuor, guttæ ammoniacæ libræ duæ, dracunculi radicis libræ quinq;: radix arida læuis aliis solutis inspergitur.

*Psitacium.*

CERÆ, resinæ colophonix, adipis suilli, alterci foliorum tenerorum, vel succi eorum, æqualis modus. In Alexandria autem ceræ libræ duæ semis, alterci libræ duæ, axungia libræ duæ semis, colophonix resinæ libræ decem miscentur, magisq; discutit medicamentum.

Myr



*Myrsinatum.*

ARGENTI spumæ, cerusæ, sandicis, plumbi combusti & eloti, singulæ vnciæ, ceræ vnciæ sex, olei myrtei libra, vini quod satis est.

*Emplastrum ex cerusa, vel ouis.*

CERAE tractæ vnciæ sex, rosacei sesquilibra, argenti spumæ vnciæ duæ, cerusæ tantundem, amyli vnciæ, tres, ouorum quinque aquata.

*Emplastrum, quod liquidum sit parygrum vocatum, Oribasij.*

ARGENTEAE spumæ sescuncia, cerusæ tantundem, ceræ triens, pinguis suilli septuax, resinæ colophonie dodrans, lini seminis succi, olei, singuli dextantes: mirificè facit ad calcanei rimas. in vlceribus autem (inquit) vitant, nam eâ retti odoris reddit.

*Emplastrum dia Cadmias, cicatricem inducens.*

CHALCITIDIS vltæ vnciæ duæ, cadmiæ, manne thutis, singulorum vnciæ, ceræ, resinæ colophonie, olei myrtei, singulorum libra, vini quod satis est.

*Palmulatum, phœnicine dicitur.*

AXVNGIÆ veteris libræ duæ, olei veteris libræ tres, argenti spumæ tantundem, chalcitidis crudæ vnciæ sex: primum chalcitis cum oleo in pila commodiore læuigatur, vel in sole: vbi sordium spissitudo facta fuerit, etiam spuma argenti prius detrita superiniicitur, postea adeps: postquam probe in pollinem redacta fuerint, leni igne incoques, quoad digitos non inquinent, palmarum rudicula agitans.

*Emplastrum ex Anchusa, ambustis efficax.*

CERAE albæ vnciæ nouem, rosacei vnciæ octodecim: his liquatis porphyridos anchusæ radicis siccæ læuissimæ vnciæ quatuor inspergito. ALIVD. Anchusæ radicis viridis, marrubij, gummi, singulorum vnciæ tres, decoctæ in olei vnciis nouem proiciuntur, oleo ceræ albæ vnciæ quindecim superiniiciuntur, omniaq; soluuntur.

*Emplastrum ex Pompholyge, pompholygeron appellatum.*

POMPHOLYGIS vnciæ duæ, argenti spumæ vnciæ tres, læuigantur cum lini seminis succo, adiiciuntur ipsis liquatæ refrigeratæq; ceræ vnciæ sex, adipis anserini vel gallinacei vnciæ duæ, chamæmelini vnciæ sex.

*Philocotyche, dolorem leniens, ad sedem utilis.*

THVRIIS vnciæ septemdecim, myrrhæ vnciæ septē, opij



drachma quatuor, aluminis scissilis drachma dua, butyri drachma quatuor, ouorum tenuium lutea quatuor, cadmia cremata & elota drachma quatuor, pompholygis drachma sex, cera tyrrhenica drachma octo, adipis anserini drachma sedecim, medulla ceruina drachma vndecim, plumbi cremati elotique drachma nouem, lapidis hematitis drachma, hyssopi liquidi drachma quatuor: arida laeuigantur cum vino Italico. qua liquari possunt, admiscuntur.

*Emplastrum Amithaonis, ad articulos recenti cicatrice contractos, conuulsosque: est etiam ad extrahendum efficax.*

AMMONIACI, cera, bdellij, singulorum drachma octo, resina terebinthina, iridis illyrica, galbani, singulorum drachma viginti.

*Emplastrum Aristophanium emolliens.*

PICIS libra quatuor, apochymatis libra dua, cera libra, opopanacis vncia, aceti hemina.

*Emplastrum ex plumbagine ad calidas affectiones.*

PLUMBAGINIS vncia quatuor, spuma argenti vncia dua, cerusa tantundem, cera vncia octo, myrtei libra dua, vino laeuigantur arida.

*Coracon ex oxymelite, ad naturalium vitia & nomas accommodatum.*

GALLAE vncia dua, squama fescuncia, chalcitidis, thuris, singulorum vncia: teruntur aceto diebus complusculis, deinde mellis vncia quinque miscuntur, vbi vero seorsum ce ratum feceris, ex myrtei vel rosacei vncis duabus, seui raurini vncis octo, cera vncis quatuor: resina terebinthina vncia, mixta simul laeuigato & vtitur, quemadmodum medicamento quod charta constat, tum ex penicillo, tum ex linamento.

*Emplastrum ex oxaleo.*

ARGENTI spuma pars vna, olei, aceti, singulorum partes dua, nonnulli treis ponunt.

*Emplastrum ex achathe, discutiens emolliensque.*

LAPIDIS achatis semiuisti fescuncia, cera vncia quinque, resina fricta vncia tres, olei vncia.

*Isis, cruentis accommodata, ad glutinandum, carnem inducendum, & purgandum.*

SQUAMAE aris, aris combusti, aristolochiae rotunda, singu



singulorum drachmæ octo, aluminis scissi drachmæ sex, salis ammoniaci, thuris, guttæ ammoniacæ singulorum drachmæ octo, myrrhæ, aloës galbani, singulorum drachmæ duodecim, dracunculi radice succi drachmæ octo, ceræ libra, resinæ colophonix libræ duæ, olei veteris vnciæ tres, aceti quod satis est.

*Athena, ad vlcera sordida, impacta, neruorum vulnera.*

MALICORII, æris cremati, gallæ, aristolochiæ rotundæ & longæ, salis ammoniaci, guttæ ammoniacæ squamæ æris, aluminis scissilis, & rotundi, iridis, misyos, atramenti futorij, chalcitidis, æruginis rasæ, cadmiæ, aloës, myrrhæ, propolis, galbani, singulorum vncia, ceræ drachmæ ducentæ, picis tantundem, resinæ colophonix drachmæ centum, olei vnciæ sex, aceti quod satis est.

*Emplastrum dia dictamni, glutinans, ad canum morsus, & omnigena vlcera.*

ARGENTI spumæ pondo duo, squamæ æris vncias sex, æris cremati vncias octo, aloës vncias octo, galbani vncias duodecim, olei veteris sextarij duo, diphrygis vnciæ tres, gentianæ fescuncia, aristolochiæ, æruginis rasæ, singulorum vnciæ duæ & semis, dictamni tantundem, colophonix pondo, manna thuris vnciæ tres, guttæ ammoniaci vnciæ sex, propolis vnciæ duæ, ceræ vnciæ sex & semis, primum oleum cum argenti spuma incoqui debet dum incrascescat, nec digitos inquinet, deinde lebetē deposito æruginem & squamam iniicies, rursusq; incoques, dum manum non inficiant, iterumque cacabum ab igne tollens, resinam & ammoniacum incretum adicies mouens, donec feruere desinant, mox in ignem repones, ac vbi modicè infuerint, æs & diphryges admiscebis, ac rursus coques vsque dum firma spissitudo facta fuerit, deinde ceram iniicies, eaque discocta, vt digitos non coinquinet, propolin immittes, his abundè refrigeratis, mox aloën, mannā thuris, dictamnū, aristolochiam, gentianam, singula læuissima insperges.

*Barbara, emplastrum quod cruentis protinus vulneribus inijcitur, & fracturarum callos firmat.*

BITUMINIS Iudaici, picis aride, cere, resinæ, singulorum libra, terebinthinæ vnciæ duæ, argenti spumæ, vncia, cerusæ fescuncia, manna thuris vnciæ duæ, opopanacis vn-

Q 5



ciae duae, zingiberis vnciae duae, olei vnciae tres, aceti quantum sufficit.

*Emplastrum ex salicibus, dia iteon appellatur, glutinans, cruenta excreantibus, & purulentis efficax: thoraci impositum.*

MISYOS, chalcitidis, æruginis, cerusæ, gallæ, aluminis scissilis & rotundi, cretæ sutoriæ, singulorum vnciae sex, ceræ libræ duae, resinæ picæ libræ duae, picis tantundem, malicorij vnciae sex, bituminis libræ duae, salicis foliorum totidem, olei rosacei vncie quatuor, atramenti sutorij vncie sex, aceti quod satis est. sunt qui terebinthinæ vncias nouem addant.

*Emplastrum Nicolai ad recentia vulnera, & sinus glutinandos aptum.*

SYMAE æris vnciae quatuor, æruginis rasæ sescuncia, argenti spumæ tantundem, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum vncia, aluminis scissilis & rotundi, singulorum vncia, atramenti sutorij vncia, sulfuris viui vncia, gallæ omphacitidis vnciae quatuor, salis ammoniaci vncia, misyos vncia, origani vncia, chamæleontis vncia, cadmiæ botryitidis vncia, veratri albi vncia, peucedani vnciae tres, apij feminis vnciae duae, symphyti radice sescuncia, cerusæ sescuncia, mandragoræ succi semuncia, chalcitidis sescuncia, terræ samiae, quæ aster dicitur vncia, thuris masculi vncia, aloës vncia, bdellij vnciae duae, opij thebani tantundem, zingiberis troglodytici semuncia, stillæ ammoniacæ vncia, fœnugræci vncie sex, perdicij herbe succi vncie sex, ceræ flauæ vncie tres, resinæ colophonix libræ duae, resinæ pityni hoc est picea libra polentæ tantundem, mastiches vnciae sex, picis nigre libræ duæ, olei veteris libra, styracis vncia, opopanacis sescuncia, aceti quod satis est.

*Ictus ad strumas, abscessus, lienem, articulos: & coxendicum dolores.*

ARGENTI spumæ denarij centum viginti, olei veteris sextarij duo, aceti sextarius, æruginis sesquidenarius, picæ corticis denarij octo, chamæleontis radice, euphorbij, hypocistidis succi, propolis, zingiberis, helenij, pyrethri, singulorum denarij sedecim, ceræ libræ tres.

*Emplastrum Neronis, ad ictus, omnemque particularum carnosarum dolorem.*

Olei



OLEI veteris sesquilibra, argenteæ spumæ libra, ceræ  
sinæ piceæ, singulorum vnciæ septem & semissis, guttæ  
ammoniæ vnciæ quatuor, cerusæ tantūdem, galbani, man-  
thuris, zingiberis, thuris, singulorum vncia.

*Oxera, multiplicis vsus.*

PERIS aridæ libræ duæ, ceræ libra, guttæ ammoniacæ  
scia, resinæ terebinthinæ selibra, galbani vnciæ duæ, man-  
thuris vnciæ duæ, aceti sesquiseptarius.

*Aceratos, hoc est ceræ expers, emplastrum Galeni, glutinat,  
concoquit, vlcera ad suppurationem perducit, ex ri-  
cinino aut veteri oleo, medicaminis in  
lintheolos illiti modo, so-  
lutum.*

ARGENTI spumæ trepondo, olei ricinini, aut veteris  
pondo quatuor, aceti quā acerrimi dupondo, æris squamæ  
græ, chalcitidis, æruginis, singuli sextantes: argenti spu-  
a cū oleo incoquitur, dū strigmenti fiat spissitudo, deinde  
metallica compluribus diebus ex aceto leuigata adiciuntur.

*Emplastrum ex metallicis.*

CHALCITIDIS vncia, misyos vnciæ duæ, squamæ æ-  
ris vnciæ tres, thuris tantundem, colophonæ vnciæ duæ, gal-  
bani sesquicia, ceræ libra, olei quincunx, aceti quod satis est.

*Armenia, fracturis accommodata.*

CHALCITIDIS vnciæ quatuor, squamæ æris vnciæ  
duæ semis, æris cremati vncia, thuris vnciæ duæ, olei libra,  
aceti tantundem: coquantur metallica in oxelæo, dum ma-  
num non inquinant, inde thus adiicitur.

*Melene Serapionis.*

SPUMÆ argenti libra, ceræ vnciæ septem, guttæ ammo-  
niæ vnciæ tres & semis, galbani, æruginis, singulorum de-  
narij nouem, resinæ colophonæ vnciæ septem, myrrhæ dra-  
chma, olei sesquihemina: argenti spuma cum oleo incoqui-  
tur quousq; digiti intincti non inquinantur, deinde adii-  
ciuntur reliqua.

*Anicetos, ab insuperabili vi appellatum emplastrum, glu-  
tinat, discutit, squamas separat, et ad arti-  
culos recenti cicatrice contractos  
valet.*

BACCARVM lauri, iridis aridæ, thuris, singulorū drach.  
sexaginta, æris combusti drachmæ viginti, nitri, salis, am-  
monia



monia ci, singulorum drachmæ viginti, pyrethri, herbae pediculariæ, seminis roris marini, grani gnidij, sinapis, columbarum stercoris, aristolochiæ, cumini, æruginis, iunci quadrati, erucæ seminis, singulorum drachmæ octo, aceti hemina duodecim: læuigantur sub æstu cāniculæ, quousq; acetum consumatur, deinde decocti caricarum crassissimi vnciæ nouem adduntur, quibus mixtis pastilli fiunt, siccanturque. vbi vtendum est, pastillorum ipsorum vnciæ duæ læuigatæ aceto miscentur, resinæ vnciæ tres, ceræ tyrrenicæ vnciæ duæ, olei tantundem.

*Emplastrum ex lolio, diaæron dicitur.*

P I C I S libræ duæ, resinæ picæ vnciæ nouem, ceræ tyrrenicæ vnciæ quinque, olei vnciæ tres, bituminis increti vnciæ duæ, lolij farinæ sextarius, aceti quantum sufficit.

*Emplastrum ex liquore sycamino.*

A R G E N T I spumæ, picis aridæ, seui taurini, singulorum vnciæ octo, terebinthinæ vnciæ tres, ceræ vnciæ quinque, æruginis rasæ, opopanacis, galbani, singulorum vncia, olei ricinini, aut fusini, aut admodum veteris hemina, picis liquidæ tantundem, liquoris sycamini cuius fructus sycomora dicuntur, hemina.

*Emplastrum à duplici colore dichromon appellatum.*

A E R I S combusti, aluminis scissilis, guttæ ammoniacæ, singulorum vncia, ceræ libra, resinæ colophonæ libra, seui suilli libra, aceti, quod satis est.

*Inde conglutinans ad vlcera quæ serpendo depascunt,  
& sanguinis spurium.*

C E R A E, resinæ frixæ, picis aridæ, bituminis liquidi, zacynthi, singulorum libra, cerusæ, chalcitidis, misyos, cretæ futoriæ, aluminis scissilis & rotundi, gallæ omphacitidis, singulorum vnciæ sex, aceti quod satis est.

*Emplastrum ex cinere aspidum, discutit strumas  
& podagras.*

R E S I N A E terebinthinæ, lapidis hæmatitis, bituminis Iudaici, singulorum drachmæ trecentæ sexaginta, ceræ, baccharum lauri, guttæ ammoniacæ, aphronitri, seui vitulini, singulorum drachmæ trecentæ quadraginta, lapidis pyritis, calcis viuæ, singulorum drachmæ centum quadraginta, cineris aspidum totidem, olei veteris hemina dux: refrigerato medicamento cinis inspergitur. fit etiam sine cinere, quod



nonnulli eum auerfentur, & nihilominus etiam efficit.

*Leana, siccatur, discutiturque.*

**U. V. FIMINIS** ammoniaci, plumbaginis, singulorum  
 centum, sinapis drachmæ octo, chamæleontis ra-  
 dibus drachmæ sedecim, resinæ colophonix drachmæ cen-  
 tum, squamæ aris, lanariæ radicis, singulorum drachmæ  
 quinque, euphorbij, æruginis, singulorum drachmæ octo,  
 olostolochiæ drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ octo, o-  
 veteris hemina, raphanini quantum sufficit.

*Aliter leana, noxia educit in superficiem, humo-  
 resq; euacuat.*

**ATRAMENTI** sutorij vnciæ duæ, auripigmenti vncia,  
 atrati nigri, thoracum cantharidum, singulorum sesqui-  
 drachma, sandarachæ vnciæ tres, ceræ sesquilibra, resinæ  
 libellæ libra, olei heminæ duæ.

*Macedonicum.*

**CERAE**, resinæ colophonix, picis, seui taurini, lachrymæ  
 turis, pares portiones: eliquatis, ac sublatis ab igne lachry-  
 a thuris inspergitur.

*Spherion ad ardores.*

**CERVSÆ**, argenti spumæ, calcis viuæ, singulorum vn-  
 cæ tres, ceræ fescuncia, aluminis berenicarij, rosacei, singu-  
 lorum vncia: liquefacta aridis superfunduntur, ac orbiculi  
 formantur, quum vsus incidit, olei vncias sex liquato cum  
 suabus ceræ, adicitoq; medicamenti vnciam & agitato: re-  
 frigeratum ex aquæ vnciis nouem contundito, ego etiam  
 rosnas rosacei vncias addo.

*Emplastrum ex ochra, inflammationem arcet, tum sponte, tum  
 in iudicio tortis idoneum.*

**OCHRAE** atticæ libræ duæ, cretæ libra, argenti spumæ  
 vnciæ octo, vino lauigatæ ceræ, resinæ colophonix, picis,  
 resinæ piceæ, singulorum libra, resinæ terebinthinæ vnciæ  
 octo, olei libræ duæ, hunc in modum soluuntur: ceræ li-  
 bra, olei veteris libræ tres, medicamenti libra vino con-  
 tunduntur.

*Emplastrum ex cedria, glutinat, discutit, abstergitq;.*

**CERAE**, picis aridæ, singulorum libra, resinæ colopho-  
 niæ vnciæ octo, cedrini liquoris vnciæ sex: liquata simul in  
 coquuntur, dum digitos non coinquinent.

*Aliud emolliens.*

**CERAE**



CERAE, picis, singulorum vnciae octo, resinae colophoniae drachmae viginti quinque, propoleos drachmae septemdecim, cedrini liquoris drachmae viginti.

*Emplastrum ex pumice, ad cicatricem ducendam.*

MYRTEI librae duae, cerae libra, pumicis cremati vinoque; restincti drachmae sex, squamae ferri quod stomoma dicitur drachmae sex, æris vsti, cimoliae, singulorum drachmae quinque: super linamentum spongiamque; ex aqua accommodato.

*Emplastrum paula, strumis & bubonibus efficax.*

CERAE, resinae colophoniae, nitri, singulorum libra.

*Emplastrum ex nitro, ad carbunculos.*

NITRI tosti vnciae tres, cerae, olei, resinae colophoniae, singulorum sesquidrachma, liquoris cyrenaici aut medici drachmae decem: imponitur in linteolis, solutum.

*Emplastrum ex anemone.*

ANEMONAE vnguibus detractis vnciae duae, cerae vnciae quinque, olei vnciae quatuor, resinae vnciae quinque & semis, colophoniae resinae librae duae & semis.

*Emplastrum Macherionis viride, ad coxendicum cruciatus, articulos infarctos, & abscessus.*

OPOPANACIS, galbani, æruginis, myrrhae, iridis, guttae ammoniaci, aristolochiae, singulorum vncia, resinae terebinthinae, cerae, olei omphacini, singulorum vnciae septem.

*Viride aliud simplex.*

RESINAE librae tres, cerae libra, æruginis rasae selibra, thuris drachmae viginti quinque, aceti quod satis est.

*Aliud viride, ad humida vitia, & carnis excrescentias.*

RESINAE colophoniae vnciae sex, æruginis rasae fescuncia, cerae vnciae duae, salis cappadocij vncia, rosacei vnciae duae, aceti quantum sufficit.

*Peganera ad pleuriticos.*

RVTAE viridis pondo, butyri sesquipondo, resinae terebinthinae pondo & quadrans, hyssopi medicamenti tantundem, opopanax quadrans, galbani tantundem, anethi podo.

*Emplastrum dia stactes, hoc est, ex lixiuio, coxendicum doloribus, articularijs, & tumoribus œdema referentibus utile.*

CERAE, olei veteris, lixiuij quod habet calcem admistam, singulorum libra, resinae frictae, nitri alexandrini, nitri albi, resi



resinæ terebinthinæ, singulorum vnciæ sex: vtrunq; nitrum lixiuio teritur.

*Emplastrum è nitro ad abscessus, scyrrhos, & tumores.*

OLEI veteris, ceræ, aphronitri, saponis, lixiuij, singulorum libra, resinæ terebinthinæ vnciæ sex, galbani, propolis, guttæ ammoniaci, singulorum vncia: præparatur quemadmodum superius.

*Emplastrum ex sale, diabolon dicitur.*

CERÆ vnciæ quatuor, olei libra, salis communis vnciæ quatuor, aphronitri tantundem, cerusæ vnciæ octo, acetī vnciæ duæ, ad arida conterenda. ALITER. Salis communis, nitri, singulorum vnciæ quatuor, ceræ, olei veteris, singulorum vnciæ sex, aquæ marinæ quod satis est.

*Emplastrum diapternes, ex perna, tophos soluit.*

PERNÆ suillæ veteris pinguis, guttæ ammoniaci, casei veteris vaccini aut caprilli, seui taurini, apochymatis quæ est nauiis rasura, singulorum libra, medullæ ceruinæ vnciæ octo, hyssopicerati vnciæ tres, cyprini olei vnciæ sex, vini Aegyptij quod satis est.

*Emplastrum diacinnabareos, hoc est, ex cinnabari ad tophos aliósque omnigenos tumores induratos, dicitur pamplethes.*

ARGENTI spumæ libra, olei veteris sextarius, squamæ aris vncia, aris vsti tantundem, cinnabaris scrupula octodecim, lapidis magnetis viui vncia, lapidis phrygij drachmæ sex, lapidis pyritis, cadmiæ, æruginis rasæ, thuris, singulorum vncia, diphyrgis vnciæ duæ, aloës fescuncia, galbani tantundem, lapidis onitis scythici scrupula octodecim, lapidis hæmatitis vncia, propolis libra scrupula vigintiocto, ceræ vnciæ septendecim, lapidis perdicitis vncia, (in alio perdicati habet) betonicæ vncia scrupula octo, gentianæ vncia, aristolochiæ longæ & rotundæ drachmæ quatuor, chamæleontis nigri vncia, dictamni scrupula quadragintaduo, resinæ aridæ libra, seui struthiocameli libra: lapides cū spuma argenti teruntur seorsim, adiectis salis floris libris duabus, donec rotum absumatur.

*Emplastrum ex auellanis, dialeptocaryon dicitur, ad articulorum tophos probatum.*

LIXIVIUM quod calcē habet adiectam vnciæ sex, auellannarum



narum partis interioris vnciæ duæ, aphronitri vnciæ sex, olei veteris libra, saponis gallici vnciæ quatuor, mellis vnciæ octo, ouorum sex aquata, ceræ vnciæ decem, resinæ terebinthinæ vnciæ duæ: læuigantur ex lixiuio.

*Dia turpanes ceratum ad podagram, dolorem leniens mirabiliter.*

**Q**UINTO Martij mensis die, olei communis sextarios duos leberi in domo subterranea infundito, coquitoq; lignis è vite: vbi inferbuerit, turpanæ marini piscis libram adiecto, asphalacis animantis, quod nonnulli madamudam vocant, sanguinis vncias quatuor, incoquitoq; dum carnes piscis dissoluantur aut torrescant, deinde exemptis illis, olei & ceræ momentum adiecto in spissitudinem, vt mollissimū fiat ceratum, quod linteolo illitum impones.

*Emplastrum ex vrina muli, podagricis vtile.*

**V**RINAE muli sextarij quatuor, argēti spumæ libræ duæ, olei veteris mystrum, trita diu omnia vt strigmenti spissitudo fiat, incoquito donec digitos non inquinent.

*Emplastrum ex lapidis asij flore, philagrij ad scyrrhos.*

**P**EYCEDANI radices, asij lapidis floris, si non adsit, salis, guttæ ammoniacæ, lanarum succidarum crematarum, singulorum vncia, aristolochiæ rotundæ, pumicis, canini stercoris, æruginis rasæ, squamæ aris, misyos, singulorum scrupula octodecim, castorij tantūdem, myrrhæ vnciæ tres, aceti quàm acerrimi tantūdem, ceræ vnciæ duodecim, & semis, resinæ è picea, picis brutiæ, singulorum vnciæ octodecim, semis scrupula sex, olei veteris quod sufficit.

*Ex eodem Galeni.*

**C**ERAE, resinæ terebinthinæ, singulorum libra, lapidis asij, mannæ thuris, singulorum tres vnciæ, cyprini vnciæ duæ, aquæ lixiuæ quantum satis est.

*Emplastrum ex salis flore, articularijs in declinatione accommodatum.*

**R**ESINAE terebinthinæ, resinæ frictæ, resinæ è picea, ceræ, singulorum libra, picis aridæ, aluminis scissilis, salis floris, singulorum selibra: coquuntur in lebetes.

*Emplastrum quod nutriendæ vlcera carni est.*

**R**OSACEI, resinæ terebinthinæ, mellis, singulorum vnciæ duæ, cerusæ, butyri, singulorum vncia, alij etiam thuris vnciam addunt.

*Empla*



*Emplastrum Italicum ad purgandum sordida, inducendumque carnem.*

**ERINAEI** (dico autem sylvestris ficus) tenerum corticem oleo excoctū proiicito, cerę rufę quantum satis est in oleo liquefacito, in linamenta illito vtor.

*Entaticon, quasi dicas intensorium.*

**SATYRII**, pudendi ceruini, scinci caudę, singulorū drachmę duę, erucę feminis, pyrethri, seminis rorismarini, cerę, singulorū drachmę quatuor, resinę terebinthinę drachma, oua passerum troglodytarū tria, stelliones transmarini tres, olei laurini vel irini quod satis est: macerantur viui in aceto stelliones addies triginta, vase cui insunt in fimo defosso.

*Chryse, cruentis vulneribus accommodata.*

**THYRSI**, aluminis scissilis singuli sextantes, colophonię resinę libra, olei quadrans, auripigmenti sextans, aceti cum oleo mixti, quod satis est.

*Catagmatice quod est fracturis idoneum medicamentum, Oribasij.*

**PICIS** brutię libra, vncię quatuor, argenti spumę tantundem, thuris vncię octo, resinę terebinthinę vncię quinque, seui taurini libra, vncię quatuor, galbani, opopanacis, singulorum vncia, cerę vncię quatuor, olei veteris libra, aceti vncię quinque.

*Catagmatice ad fracturas cum vulnere citraq; id factas, ex commentarijs Heracleti.*

**PICIS** aridę mina, argenti spumę tantundem, mannę thuris minę dimidium, seui vitulini mina, cerę tyrrhenicę vigintisex, opopanacis vncię octo, æruginis rase, æris cyprij, singulorum minę quinque & decima eius portio, resinę terebinthinę sesquimina & quinta portio, æris vncia, ricinini, aut olei veteris hemina, aceti hemina semissis.

*Liquidi hyssopi medicamenti preparatio.*

**SERTVLAE** campanę vncię quatuor, cardamomi vncię duę, lanarum bene sordidarum vncię sex: macerata in vinū duobus sextariis ad triduum incoquit o, dum paululum fuerit reliquum. his ablatis miscentur vino olei vncię tres, coquanturq; dum exiguum supersit, atq; vino etiā tunc adiiciuntur resinę colophonię vncię decem, terebinthinę tantundem: nonnulli verò & cerę dextantem miscent, hyssopi herbę vnciam, aliisq; incoquant: alij lanas vino eluunt: vbi

R



desiccarint, vinum cum sordibus lanarum addunt, quas pl. non etiam appellant quum vsus incidit, treis ex eo vncias mittunt, tum reliqua vt comprehensum est.

*De Malagmatis & epithematis.*

CAP. XVIII.

**I**Nter ea quæ malagmata dicuntur, alia mediis corporis partibus iniiciuntur, longa inflammatione cōstictantibus, aut induratis, aut æstu flagrantibus, aut perfrictionem fluxionemve expertis: alia articulis quibus humores sint impacti vel nervis refrigeratis, vel etiā aliis particulis scirrhus obfessis cōgruunt. de his igitur tum in capite de emplastris tractatum est, tum vbi ad acopa ventum erit differetur. Porro inter malagmata mediis corporis regionibus accōmodata, (epithemata propriè nuncupantur) quæ quidem stomacho, & iocinori admoventur, qualiacunq; illa fuerint roborantem ex astringentibus vim postulant. Sine his etenim vitæ aliquod discrimen intulerint, cum illa nempe stomachus & iecur communes aliarum partium alimenti, sint officinæ. Quamobrem eiusmodi medicamenta ex aromatis potissimum conficiuntur. Stomacho igitur iniici debent, si nō concoquit, aut infirmatur, aut inflatione laborat, malagmata ex seminibus, meliloto, aloë, absinthio, sampsocho, nardo, & mastiche. Iecori autem ex myrobalano confecta, ammoniaco, pinguibus, & chamæmelino. At lieni applicantur, quæ cōstant calce viua, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, ærugine, ammoniaco, & aceto: iis autem qui alui fluore laborant, ex cenanthe, alumine, melino, & aliis astringentibus preparata. atq; hæc etiam per abusionem communiter malagmata nominant, & si diuersam à molliendo vim repræsentent. Si verò ardor viscera vrgeat, in febribus ardentibus, ex croco competunt malagmata, rosaceo, succo lini seminis, aut intybi, aut herbæ feminalis, adipe suillo, & spuma argenti: si perfrixerunt, ea quæ opobalsamum, phyllum, casamum, & piper recipiunt. Pectori, quum sanguis eiicitur, prosunt astringentia siccantiaq; ex alumine, salice, & bitumine. In tabe quæ phthisis dicitur, conducunt ex baccis lauri, marrubio, cardamomo, & lixiuio confecta.

*Malagma ex fertula campana, dia meliloton dicitur.*

**C R O C I,** nardi gallici, iunci angulosi, cardamomi, iridis, myrrhæ, singulorum vnciæ duæ, fertulæ campanæ libra, stillæ ammoniacæ tantundem, ceræ libræ tres, resinæ terebinthinæ libra, olei cyprini libræ tres, gleucini, libræ duæ, bdellij

vncia



uncia sex, nonnulli etiā cyphi uncias duas addunt, vini quod satis est.

*Polyarchion ex commentario Galeni de compositione medicamentorum secundum locos.*

CERAE, resinæ terebinthinæ, bdellij suffiminis ammoniaci, cardamomi, iunci quadrati, singulorum mina, fertule campanæ, amomi, nardi Indicæ, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamomi, singulorum drachmæ vigintiquinque. olei cyprini hemina, vini Italici quod satis est: præparato ac utitur, interim meraco, interim cerato quod ex cyprino fit, soluto.

*Aliter polyarchion.*

XYLOBALSAMI, costi, iridis, iunci quadrati, myrrhæ, iunci rotundi floris, cardamomi, thuris, spicæ nardi, mastiches, styracis, bdellij, amomi, phylli, croci, cassiæ, pyrethri, aristolochiæ longæ, singulorum uncia, guttæ ammoniacæ fescuncia, resinæ frictæ tres uncia, resinæ terebinthinæ libra, medullæ ceruinæ uncia duæ, ceræ libræ duæ, opobalsami uncia sex, vini uncia octo.

*Philagrianum.*

CROCIFESCUNCIA, aloës, ammoniaci thymiamatis, bdellij, styracis, singulæ uncia, adipis anserini sextans, hyssopi medicamenti triens, palmularum sextans, ceræ libra, nardi felibra, melini uncia sex, vini quod sufficit ad sicca læuiganda: per triduum macerantur mouenturq; rudicula ter die, deinde incoquantur oleo, secundo die cardamomum aqua pridie maceratum, tertio autem crocus, vino. Nonnulli cū croco etiam alias quinque myrrhæ uncias adiiciūt: illis autem exemptis, oleum purum reponunt, omni vero specierum facie in pastillos coacta siccataq; id habent quod crocomagma dicitur.

*Mendesium.*

DICTVM est Mendesium quod in Aegypto reperitur, vbi & Mendes, hoc est, caper colitur. Recipit autem olei balanini libram, aliàs sextarios decem, myrrhæ, cassiæ fistulæ, singulorū uncias treis, resinæ terebinthinæ libram, in alio, sextarios decem, cinnamomi uncias treis: hoc non decoquitur, sed aridis inditis diebus sexaginta agitatur, inde liquefacta terebinthina in partem olei mittitur, postea rursus diebus alijs septem mouetur, atque sic reconditur.



*Marciatum.*

MASTICHES, ceræ, styracis, singulorum vnciæ tres, hyssopi medicamenti semuncia, opobalsami fescuncia, nardini, gleucini, olei omphacini, singulorū vnciæ tres, medullæ ceruinæ fescuncia, terebinthinæ vncia.

*Iniectio prima dia omphacos.*

ASPALATHI, rudiculæ palmarum, fertulæ campanæ, iridis, iunci rotundi floris, xylobalsami, rosarum fliccarum, calami aromatici, singulorum vnciæ tres, olei omphacini libræ decem, vux immaturæ succi tantundem.

*Iniectio secunda, ex caryophyllo.*

AMMONIACI, spicæ nardi, costi, caryophylli, cassiæ, cassami, singulorum vnciæ tres, in alio etiam habetur arnabo vnciæ tres, vini quod sufficit.

*Iniectio tertia.*

THVRI S, guttæ ammoniaci, styracis, bdellij, myrrhæ, mastiches, singulorum vnciæ tres, vini quod satis est, ceræ albæ vnciæ quinq; , opobalsami vnciæ sex, nonnulli vncias octo. Primæ iniectionis medicamenta, pridie in vux acerbæ succo oléoq; macerantur, secundæ seorsim in vino aminæo aut alio veteri ac odorato, mouenturq; quotidie rudicula palmea: tertiæ ad triduum, post quod in cacabo nitente primæ iniectionis primæ medicamenta incoquantur, quousq; pauxillum succi vux acerbæ relictū fuerit: mox secundæ iniectionis species cū vino immittuntur, rectius autē fiet si prius aliis exemptis, puro deinde oleo ipsæ adiciantur, coquanturq; donec paululum vini super sit, ne aduratur oleū: sublata ab igne eximito, superq; adicito rursus oleo puro tertiæ iniectionis medicamenta, prius ex vino in pila soluta præter styracem quemadmodum prædixi, hic enim cum aliis inditus promptè soluitur. Coques autem carbonibus quousque bene habere tibi videantur: sublata ab igne refrigerari finito, insequenti die exceptis diligenter ex oleo calfactisque abundè super ignē ceram adicito, inde sublata rudicula agitato, vbi refrixerint, opobalsamum admisceto, & vitreis vasis reponito.

*Gleucinum, iniectionis prima.*

OLEI sextarij decē, musti aminæi sextarij sex, aspalathi vnciæ quatuor, palmæ fructus operimenti quod spathe dicitur vnciæ sex, iunci rotundi floris tantundem, fertulæ campanæ



panæ vnciæ quatuor, rosarum vncia, myrrhæ vnciæ tres, foliorum lauri vnciæ duæ, arboris thuris vnciæ sex, xylobalsami totidem, inulæ campanæ vnciæ sex, aristolochiæ longæ vnciæ tres, iridis tantundem: hæc macerantur in musto.

*Altera iniectio.*

NARDI gallicæ vnciæ quatuor, casami, qui est balsami fructus vnciæ duæ, cyperi, casia, spicæ nardi, asari, amomi, costi, sampsuchi, singulorum vnciæ tres, calami aromatici, caryophylli, phylli, singulorum vncia, cardamomi vnciæ quatuor, balsamum vino odorato madescit.

*Iniectio tertia.*

MASTICHES triens, myrrhæ troglodytica, bdellij, singuli sextantes, ladani quadrans styracis liquidi, thuris masculi, singuli trientes, opobalsami selibra, nonnulli & croci sextantē addunt, præparatur quemadmodum medicamentum ex vua acerba, nisi quod cerā nō recipiat, hic autem septem diebus oportet species duarum iniectionū macerari.

*Nardus cizicine, iniectio prima.*

OLEI primi meriti sextarij decem, aspalathi, cypiarum, inulæ campanæ, iridis, xylobalsami, aristolochiæ, cardamomi, iunci rotundi floris, singulorum vnciæ sex, sampsuchi vnciæ quatuor, herbæ sabinae vnciæ duæ, nonnulli & calami odorati vncias duas immittunt: hæc in vini odorati sextariis quaternis commadescunt.

*Altera iniectio.*

CASSIAE, casami, arnabo, singulorum vnciæ duæ, spicæ nardi vnciæ tres, caryophylli vncia, costi, amomi, singulorum vnciæ duæ, nonnulli etiam nardi gallicæ vncias duas addunt, atque hæc in vino macerantur.

*Tertia iniectio.*

MYRRHÆ troglodytica, aloës, thuris, singulorum vnciæ duæ, styracis vnciæ tres, mastiches vnciæ quatuor, opobalsami vnciæ sex, quidam & croci vino læuigati vnciam miscent. præparato & hoc sicut comprehensum est.

*Decamyron.*

SPICAE nardi, phylli, euphorhij, piperis, costi, adarces, singulorum vncia, mastiches fescuncia, opobalsami vnciæ sex, nardini libra, ceræ libræ tres.

*Pentamyron.*

STIRACIS vncia, mastishes vnciæ duæ, ceræ albæ vn-



ciatres, opopanax vncie quatuor, nardini vncie quinque.

*Euodes, à grato odore dictum.*

CROCI, aloës, mastiches, absinthij, styracis, ænanthæ, casami, caryophylli, singulorum vncie tres, nardi libra, ceræ tantundem, melini vncie sex, palmulæ duodecim, vini quod satis est.

*Baion.*

CARDAMOMI, cassiæ, ænanthæ, nardi gallicæ, balau-  
stiorum, propolis, singulorum scrupula octo, herbæ sabine,  
casami, amomi, singulorum scrupula sex, iunci rotundi flo-  
ris scrupula octodecim, iridis scrupula quatuor, caryophylli  
sesquiscrupulum, suffiminis Crinati vncie duæ, thuris, myr-  
rhæ, singulorum vncia, ladani vncie sex, bdellij, mastiches,  
aloës, nardi, olei lentiscini, singulorū semuncia, resinæ acer-  
næ quæ zygia dicitur, resinæ piceæ, resinæ terebinthinæ, sin-  
gulorum vncie tres, opobalsami vncia, guttæ ammoniaci  
scrupula sex, ceræ vncie sex: ænanthino liquida læuigatur,  
aridaq; contusa. in alio exemplari piperis quoque scrupula  
octodecim inuenio: nonnulli & moschi scrupulum vnum  
addunt.

*Galenium.*

CROCI semuncia, aloës vncia, mastiches tres vncie,  
absinthij seminis scrupula octo, ænanthes tantundem, pal-  
mulæ maiores tres, ceræ vncie tres, olei melini vncie sex.

*Erythrium.*

STYRACIS vncie quinque, malorum cotoneorum  
vncie viginti, masuchæ vel masuaphij, croci, singulorum  
drachmæ decem, psichæ, cyphios, singulorum drachmæ quin-  
que, ænanthæ vncie duæ semis, casami, absinthij, singulorum  
drachmæ decem, caryophylli scrupula quindecim, guttæ  
ammoniaci scrupula decem, opobalsami scrupula sex & se-  
mis, nardi vncie quinque, resinæ colophonæ, gleucini, me-  
lini, singulorum vncie decem, rosacei drachmæ decem, pro-  
polis vncie quinque, resinæ terebinthinæ vncie decem, mel-  
lis cochlearia decem, phylli drachmæ decem, spice nardi tan-  
tundem, ceræ vncie septem & semis: vino falerno aut ami-  
næo conteruntur.

*Malagma Nili ad lienem, omnemq; duritiem.*

CERÆ pōdo, guttæ ammoniaci pōdo, olei cyprini pon-  
do, croci semuncia, secundū alios vncia, aceti quātū satis est.

*Citr*



*Citrinum.*

CERAE resinae, colophoniae, singulorum libra, suffiminis ammoniaci, auripigmenti, calcis, aluminis, aceti, singulorum cyathi octo, laeuigantur arida in aceto.

*Malagma quod ad Cureum autorem refertur.*

PICIS aridae libra, cerae, resinae piceae, guttae ammoniaci, nitri, baccarum lauri aridarum, seui taurini, singulorum librae duae, farinae foenugraeci sextarius, pollinis frumentacei tantundem, chamæleotis nigri radice sicca libra.

*Malagma ex stercore caprillo Oribasij, ad lienosos,*

*hydropicos, & iecur in duratum.*

CYPRINI, aut vetustissimi olei librae tres, cerae librae duae semis, fimi caprarum, baccarum lauri cortice detracto, iridis illyricae, singulorum sextarii decem, resinae terebinthinae libra, sinapis, nitri, cyperi, raphani seminis, capparis radice corticis, singulorum vnciae tres, cucurbitae sylvestris carnis vnciae duae, foenugraeci vncia: interim arida excipiuntur liquidis, interim aceto macerata: quod si alius profluat, cucurbita iniici non debet.

*Ex fimo caprillo sphongion, hydropicis efficax.*

PICIS brutiae librae duae semis, nitri libra una, cucurbitae sylvestris carnis, pyrethri, opopanax, cocci gnidij, singulorum vnciae tres, capparis radice corticis, thuris, iridis, adipis taurini, elaterij, squamæ æris, apij seminis, lathyridum, singulorum vnciae sex, baccarum lauri sextarii dimidium, foenugraeci farinae semuncia, fellis taurini vnciae duae, olei cyprini sextarii dimidium, cerae libra, resinae frictae librae tres, caprilli stercoreis montani, cachryos, cyper, cardamomi, singulorum vnciae sex.

*Ex baccis lauri.*

CERAE, resinae, picis, baccarum lauri, seui taurini, singulorum libra, nitri, guttae ammoniacae singulorum vnciae sex, aceti quantum sufficit.

*Medicamentum dia spermaton, hoc est, ex seminibus.*

CARDAMOMI, cyperi, herbae sabinae, nitri, baccarum lauri, cassiae, fertulae campanae, foenugraeci, nardi gallicae, apij seminis, sampsuchi, anisi, panacis radice, thuris, guttae ammoniaci, terebinthinae, singulorum vnciae tres, mellis, cerae, nardi, singulorum libra, seui taurini tantundem.

R 4



*Malagma à fædo odore dysodes dictum, ad pleuriticos.*

RESINAE piceae libra ceræ, rutæ viridis, cyprini, singulorum vnciæ sex, sulfuris viui, opopanacis, sagapeni, singulorum drachmæ quatuor, nonnulli & galbani tantundem addunt.

*Malagma dia sampsychu.*

CERAE pondo, resinæ terebinthinæ pondo duo, sampsychi, bacarum lauri, foenugræci, singulorum sextarius, nardini quod satis est.

*Malagma apollophanis ad iecorosos.*

CERAE drachmæ octoginta, resinæ terebinthinæ, mannae thuris, singulorum drachmæ quadraginta, mortario irini sedimento vincto contunduntur.

*Copton ad duritiem stomachi & iocineris.*

PROPOLIS vnciæ sex, styracis vnciæ duæ, mastiches vnciæ, resinæ terebinthinæ semuncia, facis nardini quantum satis est.

*Malagma ex ænanthe.*

OENANTHAE, aloës, croci, acaciæ, aluminis scissilis, rosarum siccarum, absinthij succi, gallæ, omphacij, rhus syriaci, mannae thuris, singulorum drachma, olei myrtei, ceræ, vtriusq; libra, palmulæ magnæ quinque, vini quod sufficit.

*Antylium.*

ALUMINIS scissilis semuncia, aloës vnciæ, mastiches scrupulum, ænanthes scrupula sex, omphacij scrupula octo rosarum siccarum tantundem, rhus syriaci scrupula decem, spinæ Aegyptiæ totidem, balaustiorum scrupula viginti, gallarum scrupula quindecim, ceræ vnciæ quinque, olei melini quod sufficit.

*Malagma ex vinaceis, dia gigarton dicitur.*

CROCI, sandycis, labruscæ, singulorum vnciæ, aluminis ficci vnciæ quatuor, balaustiorum, omphacij, rosarum floris, myrtorum siccorum, singulorum vnciæ duæ, ceræ albæ libra, olei melini libræ duæ, malorum cotoneorum vnciæ quatuor, dactyli qui nycolai dicuntur decem, vini aminæi quod satis est, vinaceorum aridorum vnciæ octo. in vsu, medicamenti vnciis tribus, ceræ vnam misces.

*Anethine.*

ANETHI viridis vnciæ sex, fertulæ campanæ vnciæ duæ, chamæmeli tantundem, capitum papaueris viridium decem excoctorum iuris libræ tres, & olei quod sufficit: vbi verò consumptum fuerit ius, adipis suilli recentis libræ duæ addun



duntur, tritisq; priuatim scillæ tostæ interioris vnciis duabus & medullæ ceruinæ totidem, omnia miscentur.

*Ambrosia ad febreis arcendas apta.*

ARGENTI spumæ libra, adipis suilli recentis vnciæ sex, lini seminis succi tantundem, ceræ albæ vnciæ nouem, rosacei libra, mellis vnciæ tres, croci vncia, nonnulli etiam odororum decem lutea cruda addunt.

*De acopis, inunctionibus, dropacibus, & sinapismis.*

## CAP. XIX.

**A**Copa inde nomen fortiuntur, quod præcipuè ad lassitudinis, quæ copos græcè dicitur, nempe tensuæ vlcerosæ & eius quæ ossa defatigat, sensum conueniant, quam aliis quoq; morbis compluribus sint ex usu. †Alia siquidem ipsorum calefaciendi vim habent, alia emolliendi. Quæ calefaciunt, pipere, pyrethro, semine rorismarini, & consimilibus constant neruorum vitiis, perfrictionibus validis & quæ vix vlllo calore possunt euinci, accommodata. Quæ emolliunt, durities, scirrhus, & infarctos articulorum sinus discutiunt, quorum materies capite de emplastris comprehensa est. At emollientibus quæ adarce, semine rorismarini, euphorbio, cocco gnidio, & id genus aliis cõponuntur, in diuturnis affectibus, & qui ægrè possunt elidi, quibus etiã sinapismus cõgruit, vtimur. Porro spissitudinem vniuersa acopa inter cerata & emplastra mediam habere conuenit. Vngui- na vero acopis similia, liquidiorum propemodum substantiam obtinent. At dropax duplicem recipit præparationem hanc emplastro, illam malagmati consimilem, nonnulli & calidum ipsum illinunt: materiam verò acopis & emplastris cõfinè. Cæterum vsum cataplasmatum exhibet, diuturnis affectibus iisdem quibus & sinapismus, utilis, ideoq; ante illum assumitur, quo corpus sinapi reddatur idoneum, à sinapismo adhibetur, vt affectus reliquias discutiat. Sinapismus materiam quidem variam non habet, verum diuturnis potissimum affectibus post deprehensam probatamque aliorum præsidiorum vim, efficacissimus est, utilissimè autem applicatur capiti in eius dolore, quem cephalæam dicunt, & quum altera duntaxat ipsius pars affligitur. Græci heterocraniam vocant, in morbo comitali, vertiginibus, & infania: pectori autem in suspirio, orthopnœa, hoc est, quum non nisi recta ceruice spiritus trahitur, & tussi longa. At in

R 5



diuturna humorum è capite in fauceis destillatione, & caput & thorax sinapi oblini debet. Item stomachus & venter in longis ipsorum morbis eodem obducuntur. Iam conueniens est præsidium sinapi coxendicum & podagricis doloribus, omniq; parti resolutæ, aut alio quodam modo perfrictione expertæ, vt difficulter exalheri possit. At tunc profecisse satis id putato, vbi dolor subsequutus fuerit validus & caro liuidior altiorq; euaserit, & postquam ablotum fuerit, mitius pustulæ eruperint. Quod si etiã sensus perierit, animũ adhibere negotio conuenit, parte quã obliueris sapius detecta: nã si vel immodicè aduratur ita affecti nõ persentiscunt. Præterea in acutis morbis, vtpote lethargo, profunda in somnum delatione (cataphora dicitur) & catocho, sinapi inducitur, per initia quidẽ, cruribus, vbi verò materia radices egerit, capiti. Porro qui ita frigori patuerunt vt vix vlllo modo queant incallescere, iis crura & inguina sinapi oblinuntur. In his autem qui continua febre laborant, vlcusq; habent, tum in cartilaginosis, tum locis excarnibus, vitari debet sinapismus: nam partes carnis vacuæ si obducantur sinapi, vruntur, interim etiam nigrescunt.

† Hæc verba ita leguntur in nostris codicib. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐστὶ δισμῶν τὰ δὲ μαναντῶν τὰ δὲ ἀμυντῶν. Orosius tamen legendum putat ἀμυντῶν.

*Bromion acopon.*

C E R A E, resinæ colophonix, singulorum libra, adipis suilli vnciæ quatuor, butyri vnciæ sex, althææ, fœnugræci, seminis lini, singulorum libræ duæ, olei libra, galbani vnciæ duæ & semissis, excocto succo cum oleo quousque magna illius pars fuerit absumpta, reliqua cum cera & galbano adiiciuntur.

*Acapon à varietate pæcilon dictum.*

S V C C I althææ, fœnugræci, seminis lini, rutæ, cumini, singulorum libræ duæ, medullæ ceruinæ, olei veteris, adipis anserini, opobalsami, nardi, singulorum libra, ceræ, colophonix & resinæ, singulorum sesquilibra, euphorbij, resina terebinthinæ, opopanacis, singulorum vnciæ sex, castorij vnciæ tres, herbarum vnde succus exprimitur, singularum libra iniicietur: coques vt superius

*Acopon AZanite.*

A D I P I S suilli libræ duæ, seui taurini, resinæ colophonix,



nia, hyssopi medicamenti, ceræ, singulorum libra, galbani vnciæ tres.

*Acopon Basilij.*

ALTHAEAE, chamæmeli, fertulæ campanæ, lini seminis fœnugræci, singulorum sescuncia, amomi vnciæ tres: hæc macerantur in vini Ascalonij aut Cilicij sextariis octo, per triduum, coquunturq; ad melleam spissitudinem, deinde succi libræ quinque; cū olei veteris libris quatuor & semisse decoquuntur, quousq; modicum succi fuerit relictum, adiciuntur butyri vnciæ sex, resinæ terebinthinæ vnciæ quatuor, adipis anserini vnciæ quindecim, medullæ ceruinæ cum momento olei lauigatæ vnciæ quinque; ceræ albæ libræ tres.

*Lysipponum.*

PIPERIS, castorij, styracis, mastiches, aloës, inulæ campanæ, iridis, singulorum vnciæ quatuor, euphorbij, costi, guttæ ammoniaci, myrrhæ, sampsuchi, thuris, cyperi, casisæ fistulæ, semen rorismarini, singulorum vnciæ tres, adarcæ, amomi, bdellij, xylobalsami, singulorum vnciæ duæ, malabathri, spicæ nardi, pyrethri, croci, singulorum vncia, opobalsami, libra, nardini, cyprini, gleucini, singulorum libræ duæ, ceræ libra.

*Acopon à fædo odore dysodes appellatum, ex opere de compo-*

*sitione medicamentorum secundum genera.*

CERAE, resinæ terebinthinæ, singulorum drachmæ vintiquatuor, galbani, suffiminis ammoniaci singulorū drachmæ sex, olei veteris heminæ duæ, medullæ ceruinæ drachmæ octo: vitior mero & diluto.

*Aliud dysodes.*

RESINAE terebinthinæ drachmæ sedecim, ceræ drachmæ viginti octo, œsypi, mellis, singulorū drachmæ sex, medullæ ceruinæ vnciæ sex, stillæ ammoniacæ, galbani, aphronitri, baccarum lauri, singulorum vnciæ sex, olei veteris sextarius, vini cyathi duo, quidam etiam castorij drachmas treis admiscunt.

*Barbaricum, dia euphorbiu, ad coxendicum dolores, & alia pleraq;*

OPOPANACIS vncia, ceræ tyrrhenicæ libra, resinæ terebinthinæ libræ duæ & semis, galbani vncia, stillæ ammoniacæ vnciæ duæ, euphorbij, castorij, piperis albi, singulorū vnciæ duæ, medullæ ceruinæ vnciæ quatuor, œsypi tātundem, lemnestidis (est autem adarcæ) semuncia, olei styracini, laurini, irini, amaricini, singulorum vnciæ sex, olei veteris libræ duæ, hedychroi vnciæ sex.

*Acopon*



*Acopon cui nomen est pyxis.*

**R**ESINAE colophonix sesquilibra, resina terebinthinae vncia octo, gutta ammoniaci vncia tres, thuris vncia nouem, olei veteris librae duae, succi lini seminis libra, lactis vaccini tantundem, adipis anserini vnciae sex, butyri vnciae octo, ouorum vigintiquatuor albumina, praeparatum buxco vase reponitur.

*Acopon ex abiete Galeni.*

**A**BIETIS seminis cocti modius Italicus, hoc est, sextarii duodecim, olei librae quindecim, cerae librae quatuor, resinae strobilinae aut terebinthinae vnciae quatuor. Contusum abietis semen, oleo iniicitur. Vbi quadraginta diebus in eo fueris, expressum proiicito, mixtis reliquis vtitor, ad labores spontaneos, resolutiones, & articulorum perfrictiones. At si necessitas vrgeat coquere oportet semen abietis cum oleo mixtum, ne nimium aduratur, & aquae sextariis quatuor, idque in podagricis & articulariis affectibus.

*Aliud ad idem.*

**O**LEI heminae vigintiquinque, id est, sextarii duodecim & semis. fructus abietis modius, hoc est, libra semis, resinae abiegnae librae tres, strobilinae vel terebinthinae librae tres, cerae libra.

*Acopon ex nigra populo, dia egypcos dicitur, ad eadem.*

**L**OCCO fructus abietis, nigrae populi fructus aqua portio additur, & reliqua similiter illi praeparantur.

*Vnguentum Xosimi ad tremulos celebratum.*

**R**ESINAE piceae vnciae sedecim, cerae vnciae quatuor, olei veteris libra, opopanax vnciae duae, adarcae vncia, euphorbij tantundem, nitri vnciae quatuor, aphronitri teneri totidem: nitrum, euphorbium, adarce cum vino laeuigantur, deinde adiicitur opopanax, simulque in laeuorem teritur, seorsim autem quae liquari possunt, cum anchusa ad colorem accipiendum eliquantur, refrigerata excipiuntur.

*Dropax Gallus, Oribasij.*

**R**ESINAE colophonix quae thus redolet, piceae & ligno sae dictae quae sola in Italia nascitur, apochymatis, picis aridae, cerae, singulorum librae quatuor, resinae frictae vnciae quindecim, picis brutiae librae duae, nitri libra, bituminis, galbani, adarcae, pyrethri, singulorum vnciae sex, opopanax, euphorbij, veratri albi, piperis, singulorum vnciae quatuor, sulfu



sulfuris viui vnciæ tres, castorij, ammoniaci, vna passæ syluestris staphis agria dicitur, singulorum vnciæ duæ, olei sicyonij libra, opobalsami vnciæ sex.

*Aliter simplex.*

CERAE pondo, picis siccae pondo, picis brutiæ pondo, resinæ piceæ sesquipondo, frictæ pondo & quadrans, loco prius nitro exterso imponitur.

*Quomodo sinapismus fiat.*

FICUS siccatae pridie in aqua tepida macerari debent, die insequentiprobe expressæ valenter læuigari, deinde acre sinapi, cuiusmodi est syriacum ægyptiumque priuatim conteri, diluto illarum affuso, factaq; massa admisceri, & si quidem vehementem sinapismū voluerimus inducere, parteis duas sinapis cum vna ficuum temperabimus: sin imbecillem, e contrario: si mediocrem, æqualeis. Cæterum sinapi antequam deteratur, aceto commadescens, vt nonnulli faciunt, languidius euadit. At sinapi ablato, etiam balneum vtile est. Si dolor vehemens ruborve accesserit, & pustulæ, linteolum succo maluæ aut fœnugræci cum rosaceo madefactum imponemus, deinde rosaceo cerato cum cerusa utemur. Verum in resolutis in quibus sensus labefactatus est, cura adhibebitur, vt sepius partem retegamus, inspiciamusque. Quum enim admota non percipiant, sæpe immodicè exusti sunt. Item caprarum fimus cum aceto illitus sinapi est efficacior, & præsertim in coxendicum doloribus.

*Acopon ex atramento librario, cutis ruborem peculiariter inducens,*

*idq; potissimum in ijs, quibus altera capitis pars dolet, ex*

*commentarijs Alexandri.*

EUPHORBII, atramenti librarij, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ troglodyticæ, crocomagmatis, piperis albi, singulorum vnciæ tres, croci drachmæ duæ, aceti quod satis est ad hæc probè læuigāda, utq; spissitudo sordibus similis ipsi fiat: quo facto illines, à media superciliorum parte incipiens, ad usque tempora tota, præsertim si ager pilis careat: vbi refrigerata fuerint, rursus illines: & quum præsidium bene profecerit, in balneum hominem deduces.

*Quomodo diuersa olei & vnguentorum genera conficiantur.*

C A P. X X.

**I**Nunctionum vnguentorumq; vel olei generum quæ vnguenta representent, alia sunt simplicia, vna olei specie inieci



iniecta, alia composita ex pluribus conflata. Ac simplicium alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur, verbi causa, rosaceum, chamæmelinum, susinum. Quædam ex fructibus, & seminibus conficiuntur: quædam ex surculis quibusdā nempe rutæ, qui etiam simul cum oleo coquuntur. At cum nullus florum coctionem recipiat, insolantur potius. verum si validam odoris gratiam repræsentent, & pluribus diebus constantē, ex insolatu tenuius ipsorum oleum magisque vtile redditur, quemadmodum rosaceum & chamæmelinū. Qui inualidiores sunt faciliusq; diffuari possunt, minus insolatū tolerant, ut quorum virtus promptē evanescat, utpote liliū & viola. Ex iis quæ fructibus & seminibus constant nonnulla illis integris oleo iniectis conficiuntur, veluti melinum, nonnulla contusis vel læuigatis, oleamine ipsorum sequestrato, vel expressis ipsis in conchulas: vel ex aqua calida, sic ut ipsa discernantur, exempli causa, caryinon, sesaminum, amygdalinum, lentiscinum, laurinum, ricininum, raphaninum, atq; eius notæ alia. Porro quæ ex stirpibus odoratis componuntur, præparari potissimum solent, illis oleo incoctis cum vino vel misto, vel aqua, atq; eisdem deinde exemptis. Liquoribus autem quibusdam oleo contemperatis, interim & adipibus vel medullis, ex huiusmodi aliquo exactam olei spissitudinem sortita, simplici sermone vnguenta vel inunctiones nominantur, ut gleucinum, nardinum, sicyonium & cyprinum. Sunt quæ acopa crassitudine repræsentent, ceram aut resinam aut eiusmodi quippiā recipientia, vocanturq; myracopa, veluti decamyron, amara cinum, atq; his similia. Iam vero aliqua vna vice coquuntur, quæ non diuersam recipiunt materiam, sicuti metopion, mastychinum, sicyonium: aliqua duabus tribusve, & quatuor iniectionibus. Primum contumacioribus incoctis, ut aspalatho, spatha, thure arbore, lauro: inde aromatis, phyllo, spica nardi, amomo, herba sabina: postremo liquoribus, adipibus & medullis. Si autem eueniat, cera quoque & resinis inditis. At balsami liquor neququam coquitur, sed post absolutam coctionem vnguento mediocriter refrigerato instillatur. imò ex ipsis vnguentis sunt quæ nullam coctionē recipiant, sed tantum misceantur, quale est mendesium. Nonnulli verò viride vnguentū reddere cogitantes, ubi ab igne sustulerint, in olei sextariū intingunt, æruginis rasæ in extura



mitum detritæ laxiorem fescunciam, immiscentes, quemad-  
modum in cyprino & amaracino. Caterum simplicia qui-  
bus eadem vnguenta specierum quæ in ipsa mittuntur, naturam  
vel eorum ex quibus contulis facta sunt, obtinent, ut oleum  
veluti materiæ rationem obtineat. At quæ variam magis  
compositionem sortita sunt, tota eorū natura ad calidum  
inclinata est, sed quædam valide calefaciunt emolliuntq; , ut  
etiam articulis recenti cicatrice obductis & sinibus eorum  
infarctis conueniant, veluti metopium, mendesium, marcia-  
rum: mediocrius autem est pentamyron, quemadmodū de-  
camyron valentius ut etiam summa rodat: mediocriter au-  
tem calida tenuiaq; dico. At verò modicè calida extenuant  
leniunt & concoquunt, quale est fusinum, amaracinum, iri-  
num, crocinum, foliatinum. Alia præterquàm quòd calefa-  
ciunt, abundè siccant inciduntq; , veluti cyprinum & sicyo-  
nium. Alia calefaciunt quidè insigniter, sed vires magis con-  
firmant, vnde stomacho potissimum & visceribus resolutis  
competunt, qualia habentur mastychinum, nardinum, &  
gleucinum. Valentius adhuc corroborat, quod ex vua acer-  
ba conficitur. Iam nonnullis vnguentis ob gratū duntaxat  
odorē vtuntur, ut foliato, spicato, commogeno & quæ mo-  
schelæa, quasi dicas, ex musco & oleo confecta nuncupantur.

*Rosacei confectio.*

ROSARVM rubrarum detractis vnguibus marcescen-  
tium die nocteq; vna, vnciæ tres, olei omphacini sextarius,  
urna diligenter constricta ne perspirent, insolabis sub dio  
diebus quadraginta, atq; sic repones non in pavimento, sed  
assere. Aliqui vero vice insolatus in puteum urnam diebus  
quadraginta mittunt, ut ex frigiditate odoris gratia conser-  
uetur. Alij vero ipsam sub terra defodiunt.

*Chamamelinon.*

CHAMAEMELI floris sine albis foliis marcescentis, per  
diem noctemq; vnā olei sextarius Italicus. vase lintheo sim-  
plici contecto ut perspiret, insolatur, idq; diebus quadragin-  
ta, inde securè hoc percolatum repones.

*Anethinum.*

ANETHI viridis comæ arefactæ vncia, olei dulcis sexta-  
rius Italicus. Simili modo insolantur, fiet autem & pro tem-  
poris ratione anethinum cum insolatus desideratur, ficci e-  
nim anethi comam decoquentes cum oleo in cacabo vruntur,



tur, & chamæmelino similiter: verum hæc imbecilliora sunt iis quæ ex viridibus fiunt & præsertim insolatis.

*Liliaceum aliij susinum dicunt, quod in Susis forsan reperiatur.*

FOLIORVM alborum liliorum similiter marcescētium vnciæ duæ in olei sextarium Italicum, coniectæ exactè circumstringuntur, ne euaporent, & per triduum insolantur, inde primis exemptis proiectisq; , aliæ duæ vnciæ iniiciuntur per triduum subsequens, atq; sic reponuntur.

*Susinum compositum.*

O L E I sextarij tres, calami odorati libræ quinque, myrrha vnciæ quinque, cardamomi libræ tres, lilij foliorū vnguibus ablatis arefactorū libra, cinnamomi vnciæ res, croci cilicij vnciæ quinque: tota confectio tribus iniectionibus distinguenda est. Primum myrrha & calamus odoratus, vino ad dies quinque macerata ter die mouentur, inde oleo modicè incoquantur, deinde cardamomū aqua maceratum triduo mouetur, similiterq; rursus cum oleo ad horam vnā incoquitur, inde exemptis illis tertiam liliorum partem oleo puro inferemus, tribus diebus post his quoq; exemptis reliqua liliorum tertia portio immittetur, iterumq; post triduum exemptis proiectisq; primis, postremo tertia pars cū croco læuigata iniicietur. Secundum alios tres dies ablato oleo cinnamomum contusum indetur. Huius in vicem, Arnabo, aut carpesium, aut cassiæ duplicatum, atq; reponetur.

*Violaceum.*

V I O L A C E V M præparant, modò purpurearum, modò crocearum, modò candidarum violarum foliis vngue defecto, trium vnciarum pondere coniectis in olei omphacini sextarios quinque Italicos: circumstricta exactè, ne perspirent, ad dies decem insolantur, tertioq; eadem mutantur ad triduum, quemadmodum lilia: ad repositionem autem pauca iniciunt exactè arida.

*Melinum.*

H O C efficitur ex malis cotoneis extrinsecus panniculo inuolutis, & in frusta cum suis corticibus dissectis, deinde vnciis ternis illorum, in decem olei omphacini sextarios Italicos coniectis, atq; quadraginta dies insolatis.

*Sesaminum.*

S E S A M I N V M oleum fit, contusis vel læuigatis sesamīs, expressisq; per fiscellas in cochleis, oleo ipso ceu in aqua calida



lida segregato, vasisq; vitreis reposito.

*Raphaninum.*

EODEM modo fit raphaninum in Aegypto, ex semine raphani qui tenuem radicem habeat contuso segregatoq;.

*Ricinum, siue cicinum.*

HOC quoque similiter in Aegypto fit, ex semine ricini qui croton dicitur, pari modo contuso aut laeuigato.

*Aegirinum.*

VERNO tempore oleum fit Aegirinum, hoc est, ex nigra populo, quum resina circa semen copiosa existit: etenim grana populi contusa vncijs quatuor in dulcis olei sextarium immittunt, diebusq; quadraginta insolant, vel horis tribus in lebetes decoquunt, atque sic exempta reponunt.

*Amygdalinum.*

CONFICITVR hoc quoque sicut praedictum, amygdalis amaris ijsq; puris, cotusis, aqua modica irroratis separatisq; ut comprehensum est: Nonnulli tusa amygdala vncijs duabus, dulcis olei sextario Italico immissa, in catabo decoquunt.

*Amygdalinum, quod & metopion dicitur.*

AEgypti huius olei inuectores metopion ipsum nuncupant, quod galbanum recipiat: germen autem vnde galbanum nascitur, metopion appellatur. Haec recipit, olei omphacini sextarios viginti, amygdalarum amararum libras duas, cardamomi libram, iunci rotundi floris, calami odorati, carpobalsami, singulorum libram, myrrhae, galbani, singulorum vncias sex, resinae terebinthinae, libras duas, vini odorati ad arida imbuenda sextarios quatuor, mellis attici libras treis: refinam & galbanum in laeuorem redacta ex olei parte soluta, reliquis incoctis adijciemus, necnon ipsum mel: Mixta vero accurate omnia ab igne tollentes, quum tepidum est medicamentum eximimus, nam refrigeratum concrefcit.

*Balaninum.*

BALANINVM oleum perinde ut simplex amygdalinum praeparatur, ex querneis glandibus.

*Caryinum.*

HOC quoque ut supra dictum ex vetustis nucibus conficitur.

*Laurinum.*

PVRVM quidem laurinum simili ratione & lauri fructu confit, mixtum vero haec recipiet: maturarum oliuarum sexta



rium, cum duobus baccharum lauri miscemus: teruntur omnia exprimunturq;. Nonnulli æqualem amborum portionem miscent.

*Lentiscinum.*

LENTISCINVM oleum laurini modo ex lētisci semine conficitur, idq; bifariam & per se, & cum oliuis immaturis.

*Mastichinum.*

MASTICHINVM simplicissimum quidem fit, chiae mastiches vncia, omphacini olei sextario Italico immissa, excocta; in cacabo. Nonnulli verò absinthij & styracis, singulorum vnciam adiungunt.

*Mastichinum magis varium.*

OLEI sextarij quinquaginta, inulæ campanæ libræ quinque, xylobalsami libræ decem, iunci rotundi floris libræ quinque, cardamomi libræ septem, mastiches libræ quinque, xylomastiches libræ octo, resinæ terebinthinæ libræ tres, absinthij comæ libra, vini odorati sextarij quinque, aquæ sextarii decem, arida vino ante tertium diem macerata oleo miscentur, & aqua horis sex coquuntur, ac mastiche & terebinthina iniicitur: accuratè mixta excipiantur: refrigerata transfunduntur.

*Sicyonium simplex.*

RADIX cucumeris sylvestris marcida duarū vnciarum pondere in olei sextarium Italicum mittitur, atq; in lebece coquitur, fitq; sicyonium.

*Sicyonium compositum.*

OLEI sextarij decem, cucumis sylvestris radicis derafæ pondo, serpylli, fertulæ campanæ singulorum vnciæ sex, tedarum piceæ pinguium, althææ singulorum vnciæ quinque, scolopendriæ vnciæ sex, fœnugræi sextarij duo. Fœnugræcum aqua primum die vno prius commadescet, deinde exemptum inditur commemoratis vnâ cum oleo, & vini sextariis duobus, omnibusq; incoctis adiiciuntur medullæ ceruinæ cum momento olei læuigatæ vnciæ quatuor, adipis gallinarum totidem, rursus exceptum oleum in aliud vas transfunditur. Nonnulli ipsum post coctionem diebus quadraginta insolant.

*Aliud sicyonium efficacius.*

ELATERII succi sextarij tres, aristolochiæ rotundæ & longæ, styracis, inulæ cāpanæ, hyssopi, iridis, cucurbitæ sylvestris,



neftris, pulegij, origani, cyperi, thuris arboris, centaurij, foliorum lauri, singulorum vnciæ duæ, olei sextarij quinque. Mista incoquito dum parum succi relictum fuerit.

*Cyprinum ex commentarijs Posidonij.*

OLEI sextarius, iunci quadrati, inulæ campanæ, iridis, singulorum libra, sampsuchi, hyssopi, viticis seminis, eleliphaci, singulorum vnciæ tres, iunci quadrati floris libra. Reliqua omnia pridie in vino macerata coquantur cum oleo horis sex. Excepto oleo puro, iuncus quadratus iniicitur. Siquidem adsit viridis cum teneris virgultis non concisis, sin minus, certè aridus contusus cum aquæ momento coquetur sesquihora. At si voles ipsum tingere postquam ab igne fuerit ablatum, indito æruginis puræ sesquilibrâ. Posidonius autem acrimoniam æruginis vitans, à coctione (inquit) triduum dimittes oleum in cacabo bene humido, & tingetur ita ut virtus ipsius non offendatur.

*Alia scriptura cyprini.*

CYPERI foliorum, lauri foliorum, iridis, cyperi, eleliphaci, singulorum quadrans, thuris arboris, aristolochiæ lōgæ, viticis seminis, singulorum triens, inulæ campanæ, aspalathi, singulorum vnciæ sex, rutæ vnciæ duæ, cupressi vnciæ duæ, olei sextarij decē. Hęc prius vino madefacta, incoques oleo. vbi exemeris iniice, rursus xylobalsami, xylocassii singulorum vncias quatuor, sampsuchi, cumini, myrti, styracis, mastiches, singulorum vncias tres, opopanacis vncias duas, iunci quadrati floris vncias sex, æruginis vnciam.

*Amaracinum.*

INVLÆ campanæ pondo, xylobalsami libræ viginti, cyperi libræ octo, iunci rotundi floris, aspalathi, herbæ sabinæ singulorum libræ octo, opopanacis, amaraci seminis singulorum libræ duæ, olei primi meriti sextarij duo, vini odorati sextarij quinque. Alia omnia superius dicta primâ iniectionem habent vino prius macerata, secundâ herba sâbina, atque illa quidem horis sex incoquantur. hoc autem tribus. nonnulli etiam hoc tingentes æruginis vncias tres iniiciunt.

*Irinum.*

IRIDIS, aspalathi, cyperi singulorum libræ quinque, opopanacis vnciæ tres, anchusæ vnciæ duæ, olei sextarij triginta, aquæ sextarij quindecim. Sūt qui adijciāt iunci rotundi floris vncias sex, cassiæ vncias tres, xylobalsami vncias sex,



nardi gallicæ, tantundem, omnia contusa aqua pridie macerantur, inde oleo diebus quinque incoquantur in lebere ad sex horas: reponiturq; vnguentum.

*Crocinum, in quo & alterius crocomagmatis confectura explicatur.*

OLEI omphacini odorati libra, calami odorati, myrrhæ troglodyticæ singulorum vnciæ quinque, cardamomi vnciæ septem, croci cilicij vnciæ sex. primum iniiciatur calamus & myrrha vino læuigata, & ante vnciæ modo reposita, piperis albi grana quadraginta, myrrhæ troglodyticæ drachma, tunsa, cribrataq; teruntur rursus in mortario adiecta olei nardini libra. vt autem medicamentum reddatur nigrius, nucum cortices combustos detritosq; in mortario adiecito: inde opobalsami cochlearia tria, ceræ sesquilibram admisceto.

*De œnantharijs.*

CAP. XXI.

NON quodd ænanthen, hoc est, labruscam habeant hæc, (nonnulli enim ne ænanthen quidem recipiunt) sed ex vino & flore liliorum nomē hoc sortita sunt. Vñsus ænanthariorum apud quosdam odoris gratia duntaxat & delictiarum adhibetur, sic vt qui eis vtuntur, à lauacro perfundantur: & mensæ ipsis per spongiam oblinantur. At apud eos qui rectè vtuntur, etiam fiunt præsidia tum in resolutis, tum in iis quos syncope premit, si roborantibus stomachi cataplasmatis admisceantur. Item in iis, qui se à morbo præsertim febrili recolligunt, vbi lauacro egrediantur per totum corpus diffundentur: naribusq; admouebuntur, adhuc spirantibus. Trahitur enim in altum, & spiritum animale, vitalemq; confirmat. Adhæc vtilia sunt ad morbum pestiferum vitandum, cum eiusmodi mutationem aer sustinet. Refertur autem huiusmodi vnguētum ad Posidonium auctorem, à quo vocatur mesopotamenon.

*Œnanthini confectio.*

CASSIÆ, myrrhæ, thuris, phylli, amomi, mastiches, costi, carpobalsami, opobalsami, singulorum vnciæ tres, styraeis pinguis vnciæ quatuor, vini odorati aminæi, Italici sextarij decem, contusa omnia, cribrataq; styracem vero minutim concisum composito in vnam oris ampli, cum foliis liliorum pridie refrigeratorum, è domo vna in alteram & vnguibus detractis, sint autē lilia numero trecenta. deinde vinum adiicitur, & opobalsamū, mista, commotaq; ante iniectionem,



tionem, & constrictio vrnæ ostio quadraginta diebus insolantur. Balnei vsus est in virium ex morbo recreatione. Domus irrorabitur vnguento, vasaq; & spongiæ intinctæ faciei admoventur.

*Alia confectio, nostra.*

**C**OSTI vnciæ tres, spicæ nardi, arnabo, caryophylli, singulorum vncia, amomi vnciæ tres, cassiæ, cænāthes, calami, singulorum vnciæ nouem, styracis, opobalsami, singulorum vnciæ quatuor, lilia trecenta, vini falerni sextarii, decem. Simili modo præparatur.

*De suffimentis & cyphi.*

CAP. XXII.

**C**YPHIS materia inter medicamentâ quæ potuit dantur & antidota existit. vsus est eius incensi ad odorem gratum conciliandum, quemadmodum & suffiminum. Interim naribus admoventur, vt destillationes ex capite in subiectas partes concoquat, grauedinesq; & obstructione liberet, purgetq; cerebri ventriculos, item pestilentialibus morbis euitandis. Iam per os quoque assumitur, tum ad hæc, tum ac ea quæ pectori inhærescunt, concoquenda: nec non ad frigidiores iecoris affectus, vnde & Cyphoide appellata Antidota veteres inuenerunt. Miscetur autem compositis medicinis, præcipuè epithematis & antidotis.

*Rosatum suffimen.*

**C**OSTI, amomi, myrrhæ, cassiæ, singulorum vncia, styracis, chiæ, bdellij, conchulæ Indicæ, musci, ladani, singulorum drachmæ duæ, rosarum purarum vnciæ vigintinouem, opobalsami modicum, vini quod sufficit.

*Suffimen lirinum: quod crinaton dicunt.*

**L**ILIORVM vngue defecto libra, styracis primæ notæ, vnciæ nouem, spicæ nardi, vnciæ tres, costi, caryophylli, amomi, mastiches, conchulæ Indicæ combusta, mellis, singulorum fescuncia, opobalsami vnciæ quinque, vini quantum satis est, læuigata coguntur in pastillos.

*Cyphi magnum quod vocant solare, ex rebus triginta sex confectum.*

**S**TYRACIS, myrrhæ, ladani, aspalathi, inulæ campanæ, singulorum vnciæ sex, nardi gallici, phylli, cupressi seminis, guttæ ammoniaci, strobili, splanchni aut loco ipsius conchularum Indicarum maiorum, carpobalsami, singulorum vnciæ tres, cassiæ, iridis, seselis, sphagni, cyperi, cardamomi, calami odorati, singulorum vnciæ quinque, rosarum sicca-



rum, croci, spicae nardi, herbae sabinae, hastulae regiae radicis (alii succi) singulorum vnciae quatuor, lacapthi, hoc est, piceae corticis vel alterius cuiusdam arboris vnciae nouem, costi, iunci rotundi floris, singulorum vnciae duae, iuniperi maiores quadraginta, minores quinquaginta, amomi, resinae terebinthinae, palmularum purarum, singulorum libra, ficuum siccatarum granis exemptis, vuarum passerarum acinis ablatis, singulorum librae duae, mellis despumati librae quinque. Posidonius etiam vini odorati sextarios treis adiicit.

*Aliud cyphi, quod rebus viginti octo constat lunare appellatum.*

BDELLII, inulae campanae, singulorum vnciae septem, iunci rotundi vnciae duae, sphagni vnciae quinque, iuniperi minores quinquaginta, cardamomi vnciae quinque, aspalathi vnciae septem, calisiae fistulae vnciae quinque, spicae nardi vnciae duae, cyperi vnciae quinque, hastulae regiae radicis, herbae sabinae, singulorum vnciae quatuor, cupressi seminis, nardi gallica, malabathricum foliis, rosarum siccatarum singulorum vnciae tres, costi, croci, singulorum vnciae duae, ladani, myrrhae, singulorum vnciae septem, caricarum pinguium, vuarum passerarum, acinis exemptis, singulorum librae duae, strobilorum vnciae octo, resinae terebinthinae libra, styracis vnciae septem, palmularum pinguium libra, mellis librae quinque, vini odorati quantum satis est.

*Confectio masucha, quod nonnullis masuaphion vocatur.*

CAP. XXIII.

Meliloti sextans, xylobal sami, aspalathi, herbae sabinae, myrrhae, amomi, iunci rotundi floris, foliorum lauri, myrrhae stillatitiae, styracis, calami odorati, sampsuchi, singulorum vnciae duae, iridis vnciae quinque, phylli, croci, singulorum vncia, opobalsami semuncia, gummi libra, rosarum siccatarum vnciae sex, vini quantum sufficit.

*Ex commentarijs Antylli, de pesis.* CAP. XXIII.

Pes si mulierum locis admoventur, caeterum generales pipforum differentiae tres existunt, alij siquidem emolliunt, alij astringunt, alij aperiunt. Emollientes inflammationibus vteri, exulcerationi, perfriktioni, strangulatui, auersioni & inflationibus accommodantur. Fiunt autem ex cera tyrrhenica, cyprino, fusino, pinguedine anseris aut gallinae, butyro insulso, resina deusta, medulla ceruina, saenugraeco

&



& quæ sunt eius generis. Aperientibus utimur, quum purgationem suppressam irritare statuimus, aut vuluam conuenientem compressamve emendare. Præparantur hi ex melle, artemisia, dictamno, brassica, succo dulcis radiculae, porro, succo rutæ, scammonia, & similibus. Astringentes in contrarium aperientibus usum exhibentur, nam fluxum muliebrem cohibent, & adaperitum contrahunt uterum, prolapsumq; reprimunt. Materia verò astringentium prius in capite de collyriorum etiam modo comprehensa est. Cæterum conuenit pessi crassitudinem instar strigmenti & paulò spissiore facere, deinde lanam linamento tortili similem, duplicatam in medicamentum tinctam ori vuluæ condere, sic ut stuppam prælongam habeat alligatam, quo pessus facile possit extrahi, quando visum fuerit.

*Pessus crocodes, ad inflammationes, auersiones, duritias  
& inflationes*

CERAE albæ, medullæ vitulinæ, singulorum drachmæ sedecim, medullæ ceruinæ drachmæ undecim, adipis anserini drachmæ octo, adipis gallinæ drachmæ octo, mastiches drachmæ quatuor, hyslopi medicamenti drachmæ tres, mellis drachmæ duæ, croci drachmæ octo, rosacei quod satis est: crocus lacte muliebri læuigatur.

*Pessus ab aureo colore dictus chrysos emolliens  
laudatissimus.*

CROCI drachma, cæsyi tantundem, medullæ ceruinæ drachmæ duæ, resinæ terebinthinæ, ceræ, adipis anserini, singulorum drachmæ tres, ouorum tostorum lutea sedecim, irini & rosacei quod satis est ex æquo.

*Pessus libanius, menses euocans & vuluæ vitij singulariter accommodus.*

NARDINI vnguenti vnciæ sex, ceræ tyrrhenicæ vnciæ quinque, fusini vnguenti vnciæ quatuor, adipis suilli recentis vnciæ tres, anseris & gallinæ adipis, medullæ ceruinæ, amaracini vnguenti, singulorum vnciæ duæ, seui taurini, resinæ terebinthinæ, cæsyi, singulorum vncia: lebere eliquantur, omnesq; reliqui pessi.

*Enneapharmacus.*

ROSACEI vnguenti, ricinini, resinæ terebinthinæ, ceræ, mellis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ & butyri pares portiones.



*Titianus emolliens.*

CERAE vnciae sex, resinae colophoniae vnciae quatuor & semis, seui taurini vnciae quatuor, guttae ammoniaci tantundem: ammoniacum aqua soluitur.

*Pessus Aegyptia.*

MELLIS, resinae terebinthinae, butyri, rosacei vel susini, croci, singulae partes: in quibus autem inflammatio abest, & sordidis, æruginis dimidiam addunt.

*Gone ad concipiendum.*

BUTYRI vnciae sex, hyssopi mecadimenti, medullae ceruinæ, adieis anseris & gallinae, resinae terebinthinae, aloës singulorum vnciae tres, ceræ tyrrhenicae vnciae sex, rosacei librae duae, myrrhae, calsiae, singulorum vnciae duae, spicae nardi vncia, mellis quod satis est.

*Quomodo medicamenta quae emplastra ingrediuntur coqui debeant.*

*Argenti spuma.*

In medicaminum coctionibus argenti spuma cum oleo decoquetur. Conuenit autem leuigatam rursus ex oleo cōterere, vt sordium fiat spissitudo, inde leni igne cōtinenter excoquere, mouendo, initio igitur intumescit & in bullas attollitur: vbi vero iam ferè satis incocta fuerit, colorem faci similiorem recipit. Modus coctionis est, quum à tumore subidet, & manus non inquinat.

*Plumbago.*

PLUMBAGO similiter argenti spumae excoquitur, sed eo vsq; dum non modò digitos nō inquinet, verū etiā ex igneo colore in rufum & vehementer floridum elanguescat.

*Aes crematum.*

AES crematum non protinus ab initio ad coquendum iniicitur, sed vbi emplastrum semicoctum fuerit. finis coquendi est quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, superet, & emplastrum rufum efficiat.

*Sori & diphryges.*

SORI & diphryges demittuntur & ipsa inter coquendum lebeti: diphryges autem sicut & squama, eousq; coquitur dum colore reliqua vincat. sori peculiarem coctionis finem non habet, sed is omnibus communis est, vt emplastrum spissum reddatur, digitosq; non inquinet.

*Chalcitis.*

CHALCITIS incoquitur eisdem modo, coctionemq; ipsius meti



metimur inde, si emplastrum fuluū magis & phœniceū cūa  
ferit.

*Flos æris.*

AERIS flos similiter æri coquitur, sed eo modo qui com-  
munis esse coctioni solet.

*Atramentum sutorium*

ATRA MENTVM sutorium in media coctione empla-  
stro inditur, coctum verò vehementiorem eius colorem ef-  
ficat, & si alia ei non resistent, nigrum.

*Misy.*

MISY postremò adiicitur, quamdiu autem coqui de-  
beat, propriè definitum non est.

*Auripigmentum & sandaracha.*

AURIPIGMENTVM & sandaracha in coctionis fine  
iniiciuntur.

*Plumbum vstum.*

PLUMBVM vstum in media coctione adiungitur.

*Cerusa.*

CERUSA in alba emplastra postremò mittitur, sic enim  
colorem conferuat, magisque albescit: in nigra autem, prin-  
cipio: cocta enim largius, nigrescit.

*Aerugo.*

AERUGO viridibus emplastris post coctionem iniicitur.  
In quibus neutiquam ollæ inditur, sed cum aceto detritæ  
ipsi manentiq; in pila reliqua superfunduntur. In melinis  
emplastris, quum semicocta est confectio immittitur: nam  
moderatam consequuta coctionem, melinum quasi mali co-  
tonei colorem efficit. at in his quæ diprosopa, & dichroma  
dicuntur, per initia statim æruginem incoquimus. in quibus  
dam enim per coctionem primum melinum colorem indu-  
cit, qui duplicem repræsentat, postremò fuluum.

*Alumen.*

ALUMEN plerunq; secundum coctionem additur, pecu-  
liarem verò coctionis modum nullum habet.

*Minium, cadmia & pompholyx.*

MINIUM in fine admiscetur, cadmia & pompholyx per  
initia immittuntur.

*Salnitrum, sulfur.*

SAL & nitrum in medio coctionis, sulfur, in fine adii-  
citur, coctio autem ipsius emplastra nigrefacit.

*Terra & lapides, pumex, conchyliæ.*

TERRA omnem & lapides plerunq; ad coctionis fi-



nem inlicimus, item pumicem & conchyliis combusta.

*Oleum & reliqua pingua.*

**O L E V M** si quidem per initia fuerit iniectum, resinae aut pici liquidae, emplastrum non spissescit, quare ubi crassa euaferint incocta, recte indetur, reliqua vero pingua salis expertia, iuxta mediam coctionem adiungere conuenit.

*Vnguenta.*

**V N G V E N T V M** irinum coctionem quidem fert, sed cyprium & rosaceum minus: reliqua neutiquam. quare ad finem coctionis immittenda sunt.

*Cera.*

**C E R A** priuatim sola non coquitur, ut quae aduratur, neque cum resina liquida, aut pice liquida, non enim coit spissaturque, verum superiniicitur, vel oleo puro, vel oleoso cum quodam metallico incocto, aut resinae, aut pici prius incoctae, ac prius quam reliqua quae possunt iniici spissescet.

*Resina.*

**R E S I N A** arida, cum cera immittitur: liquida ante omnia alia ipsa priuatim decoquitur, nisi admodum paululum eius assumatur.

*Pix.*

**P I X** ante reliqua omnia additur. Modus autem coctionis, liquidae, dum inspissatur: aridae, maxime dum amplius non amplius inter coquendum ebullit, neque inturgescit.

*Apochyma pix nauibus derafa.*

**A P O C H Y M A** laeuigatum cribroque ab excrementis suis secretum, emplastro posteaquam coctum fuerit, inspergitur. Si autem molle fuerit, cum oleo soluitur, sed prima ratio coquendi exactior est, quod scilicet in secunda pondus non conseruetur.

*Bitumen.*

**B I T V M E N** inter initia iniectum coquitur, non autem id in laeuorem deterere oportet, quoniam asperitudines fici oliuarumque granis interioribus simileis, obtinet. Quapropter in crassiores particulas confringendum est, coquendumque in aceto, sic ut non agitetur usque dum ebullire desinat. Ego vero (inquit Timocrates) in oleo decoquens, voti copos euasi.

*Propolis.*

**P R O P O L I N E** molliore & discoquere oportet. si quidem a coctione neutiquam diffunditur. At si & ceram emplastrum  
reci



recipiat, propolin cum illa quemadmodum & galbanum, contusam iniiciemus.

*Ammoniacum.*

AMMONIACVM circiter mediam coctionem iniicitur: detritum verò si potest fieri & in tenuem redactum puluerem inspergere conuenit: sin minus, cum liquore quodam lauigatum iniicere: si emplastrum cruentis vulneribus adaptabitur, cum aceto aut vino: si fistulis aut strumis omnino cum aceto: at si molle futurum est, qualia sunt quæ ano accommodantur, cum aqua: inde in sordium spissitudinē coactum aliis refrigeratis infundere, ne efferuescat.

*Opopanax.*

OPOPANAX multò post ammoniacum inditur: omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex vino, acetòve prius lauigandus est.

*Galbanum.*

GALBANVM neutiquam coctionem tolerat, verum emplastro ab igne sublato, quò spissescat, sic vt digitos non inquinat, emollitum inditur.

*Sagapenum.*

SAGAPENVM tunditur in pila, & teneriusculum redditum cum emplastro vbi ab igne sublatum fuerit, emollitur.

*Aloë.*

ALOE secundum coctionem inspergitur.

*Lachryma papaueris.*

LACHRYMA papaueris pridie in aqua modica maceratur, inde in pila leuigatur, mox etiã emplastrũ ei superfunditur.

*Thapsia.*

THAPSIA inspergitur postrema, vel liquore quodam lauigatur.

*Bdellium.*

BDELLIUM in læuorem pertritum, emplastro ab igne iam sublato inspergitur: at si pingue existat & lauigari non possit, sagapeno similiter ipsum contusum, ac in emplastrĩ figuram coactum, post coctionem simul cum emplastro molliemus.

*Thuris lachryma, & manna.*

LACHRYMA thuris & mǎna coctione iam absoluta insperguntur, in fordiũ spissitudinem coacta ex melle modico aut aceto, aut aqua aut vino, si emplastrũ liquorẽ recipiat.

*Myrrh*



Myrrha.

MYRRHA vbi iam coctio finita est, inditur.

*Semina, radices, & herba.*

SEMINA, radices, & herbae nullam coctionem sustinent: laeuigatis igitur & in pila etiamnum subsistentibus liquida superfunduntur.

*Qui cera modus cum oleo esse debeat.*

Q V O D si vnguina quae Graeci à leuanda lassitudine acompa appellant, conficere constitueris, oleum ceræ quadruplum immittes: at si liquidum ceratum, vt in fracturis praeparamus, duplicatum. Si medicamentum quod emplastri figuram habeat efficere cogitauerimus, portionem olei ceræ aequalem miscebimus, si aer ambiens moderatus extiterit: at si cera vetus aut squalida, aer frigidus fuerit, oleum paulò copiosius quam cera erit: quemadmodum & si cera pinguis, aer existat calidus, paulò minor olei portio erit, paulum autem hoc, medij in vtrambet partem excessus duodecima erit portio, etenim vndecim & tredecim olei vncias, ceræ librae admiscebis.

*De medicamentis inuicem succidaneis ex commentarijs Galeni.*

CAP. XXV.

**I**N Alexādia (inquit) muliere quadam morbo periclitante, cum quaesisset lichnidem, nec eius fuisset data copia, nisi protinus vice lichnidis vsus fuisset acanthij semine, periisset mulier. Vnde rogatus ab amicis ad hanc succedentium inuicem medicaminum expositionem veni, secundum literarum seriem exorsus.

V I C E Abrotani, origanum.

ferri.

Absinthij, abrotanum.

Aethiopicæ oliuæ, lachrymæ acatiæ partes duæ.

Acanthæ, Cerasiorum acanthus.

Agarici, euphorbium.

Acanthij seminis, lychnis.

Aconiti, radix iridis syluestris.

Agriostaphidis, hoc est, syluestris vuae passæ, dactyli Syriaci.

Acori, asari radix.

Alicacabi, semen Solani.

Actes, hoc est, sambuci, acantha.

Aloës. Galenus Agalochi, centaureum, &amp; impressus

Adianthi, aphroselinum.

Pauli codex, aloës Indicæ,

Adipis vulpini, adeps vrsina.

aloës viridis folia vel glaucium, vel lycium, vel

Adipis ceruini, adeps anserina.

Adipis suilli, adeps vulpinus.

Aeruginis ferri, excrementum

centau



'centaureum.

Aluminis, sal fossilis.

Amianti, aphroselinum.

Ammoniacy thymiamatis,  
propolis.

Ammoniacy salis, sal Cappadocum.

Amyli, aridus pollen.

Amygdalarum amararū, ab-  
sinthium.

Anacardij, psylla herba.

Anchusæ, hyacinthus.

Aracis, hoc est Cicerculæ, se-  
samum.

Aristolochiæ rotundæ, aristo-  
lochia longa.

Argemones, seriphion.

Armeni lapidis, atramentum  
Indicum.

Asbesti, hoc est calcis viuæ,  
adarse.

Asij lapidis, Gagates lapis, vel  
sal ammoniacus crematus.

Aspalathi, hoc est bituminis,  
pix liquida brutia.

Aspalathi, ericæ semen.

Asphodeli radices, betæ suc-  
cus.

Auripigmenti sandaracha.

## B

Balsamiliquoris, myrrha sta-  
cte.

Bdellij, spagnum aromaticum.

Buccinorum, ostrea.

Buprestis, blattæ pedentes.

Butyri, lac bubulum concre-  
tum.

## C

Cadmia, leucographis Ae-  
gyptia.

Calamintha, mēta sylvestris.

Calami odorati, sphagnus.

Cantharidum, phalangia.

Capparis radices, radix ericæ,  
vel myrica.

Cardamomi, cyperis ammo-  
niaca.

Cassia, cinnamomum.

Castorei, blattarum pedetū  
intestina.

Cedri baccarum, ladanum.

Ceraunij, leucographis.

Ceræ lomentum cum pro-  
poli coquitur, & contundi-  
tur.

Ceruini cornu, caprillum cor-  
nu.

Cerussæ, recrementū plumbi.

Chamædryos, rumicis sylue-  
stris radix.

Chamæmeli, Anthemis.

Cicior, hoc est, ricini sordes  
palæstrarum.

Cicutæ, semen coriandri.

Cinnabaris, rhodocides.

Cinamomi, cassia duplum.

Clinopodij, heliotropium.

Cnidij seminis, semen viticis.

Colocynthidis, semen ricini  
quod est crotonis.

Colophonæ, apochyma, seu  
pix derafa nauibus.

Comaræ, ammoniacum thy-  
miama.

Corallij, moly.

Costi, cedrinæ baccæ. Gale-  
nus, costi, ammoniacum,  
baccarū cedri, baccæ lauri.

Cotyledonis, anacardium.

Crinanthemi, aphrodisium.

Croci.



Croci, crocomagma.  
 Crocodyli adipis, adeps canis  
 marini.  
 Crocomagmatis, aloë Indica.  
 Cymini, semen brassicae  
 Cymini Aethyopici, melan-  
 thium.  
 Cynosbati, halicacabi semen.  
 Cyperi, Iuniperus maior.  
 Cypheos, carica cremata.  
 Cyrenaici liquoris, syriacus  
 liquor.  
 Cucumeris, anchusa.

## D

Dauci seminis, semen sij.  
 Dictamni, salvia.  
 Diphrygis, lapis phrygius.  
 Dorycnij, semen alterci  
 Dracunculi, apobrosimum.  
 Galenus addit Damasonij,  
 eryngium.

## E

Ebeni, lotinum aridum.  
 Ebisci radicis, folia mori.  
 Elaterij succi, eiusdem herbae  
 succus.  
 Elelisphaci, hoc est, salvia,  
 nepita.  
 Hellebori nigri, radix papy-  
 ri.  
 Eneaphylli, potamogiton.  
 Ericae seminis, galla ompha-  
 citis.  
 Erini foliorum fimus cico-  
 niae.  
 Erysimi foliorum herba lana-  
 ria.  
 Erucae seminis, erysimi se-  
 men.

## F

Feculae vini combustae, sanda-  
 racha.

Fellis cameli, fel ascalabotae.  
 Fellis muris aranei, fel came-  
 li.

Fellis hyenae, fel perdicis.

Fellis viperæ, fel ichneumo-  
 nis.

Fici liquoris, liquor mo-  
 ri.

Fimi palumbini, fimus colum-  
 bae.

Fimi Aluri, fimus ichneumo-  
 nis.

## G

Galbani sagapenum.

Gentianae radicis, apij odora-  
 ti radix.

Glycyrrhizae succi, fycamini  
 succus.

Gongilidis, hoc est rapae, he-  
 liotropium.

## H

Hederæ succi, persici li-  
 quor.

Hippuris, chamæpytis.

Hormini, lini semen.

Humidæ picis, succus pana-  
 cis.

Hyacinthi, flos Isateos.

Hyenæ adipis, vulpis adeps.

Hyenæ fellis, fel perdicis.

Hyosciami, quod est alterci,  
 rubi canini semen.

Hyperici, anethi semen.

Hypocystidis succi, acatiæ spi-  
 nae succus.

## I

Iridis Illyricæ, helenium odo-  
 ratum.

Iunci



Iunci odorati, cardamomum.

## L

Lachrymæ papaueris, succus mandragoræ.

Ladani, sampfuchum.

Lanariæ radicis veratri nigri radix.

Lapathi radicis, pyrethri radix.

Lapidis pyritæ, lapis pyrobo-  
lus.Lapidis phrygij, lapis argyri-  
tes.Lapidis magnetis, lapis phry-  
gius.

Lapidis asij, lapis gagates.

Lathyridum, granum cni-  
diumLauri baccarum, serpillum a-  
ridum.

Lentisci, polygoni radix.

Lepidij, erythrodanum.

Lepidi radicis, folia cappari-  
ris.

Leporis marini, cancer fluuiatilis.

Leucini floris, struthion, seu lanaria.

Ligni balsami, radix violæ candidæ.

Lini seminis, fabæ succus.

Loti seminis, Bêtæ semen.

Lybistici, semen staphylini.

## M

Malabathri, cassia vel nardus Indica.

Magnysinæ vitreæ, labrum Italicum.

Malorum cotoneorum, melilotum,

Maluæ, fœnugræcum.

Mandragoræ, oleæ lachryma.

Mandragoræ succi, dorycnium.

Mannæ thuris, cortex thuris.

Mastichæ, lentisci medulla seu cor.

Medullæ ceruinæ, adeps cerui, vel medulla vituli.

Mellis sapa.

Mellis Attici crudi, mel aliud despumatum.

Mëu, myrobalanus.

Myrsinites vinum, succus mori.

Misyos Cyprij, ochracigna.

Muscerdæ, muscæ tantundem.

Mororum succi, ruborum folia.

Myrobalani, peucinum.

Myrrhæ trogloditidis, calamus odoratus.

Myrtei olei, lentiscinum.

Myrti, succus mori.

Misy torrefactum, diphryges.

## N

Nardi Syriacæ, iuncus odoratus.

Nepitæ, menta sylvestris.

Napi, gongilidis semen.

## O

Ocymi, gisymbrium.

Ocymoides, syluatica menta.

Oenâthes succi, ampelini arboris succus.

## Olei



- Olei ricinini, oleum laurinū. Recrementi plūmbi, helcys-  
 Olei veteris, duplum olei co- ma.  
 quitur cum adipe suillo ve- Recrementi æris Cyprij, me-  
 teri. linteria Aegyptia.  
 Oleæ lachrymæ, hypocistidis Resinæ piceæ, resina terebin-  
 succus. Galenus oleæ Ae- thina.  
 thyopica lachrymæ. Resinæ colophonix, apochy-  
 Opocarpasi, liquor myrti. ma.  
 Opopanacis, lac fycamini. Rhodoïdis, sinopis.  
 Orizæ, hordeacea farina. Rhododaphnæ liquoris, vi-  
 Oenithogallorum, anthani. scus quercinus.  
 P Rosarum ficcarum, Persææ  
 Papaueris liquoris, mandra- folia sicca.  
 goræ succus. Rhu, centaureum.  
 Peristereonis, chameleuce. Rubi canini, vesicariæ semē.  
 Peucedani liquoris, succus Rumicis, pyrethri radix.  
 glycyrrhizæ. S  
 Picis liquidæ, opopanax. Sabini olei, oleum recininū.  
 Pityocampæ, vespæ, in Ce- Sagapeni, piceæ resina arida.  
 driam. Salamandræ, lacerta viridis.  
 Piperis, zingiber. Salis ammoniaci, sal Cappa-  
 Polypodij, radix Chamelææ, docicum.  
 vel chamæleontis. Salicis liquoris, nigræ hede-  
 Polytrichi, absinthium. ræ liquor.  
 Propolis, ladanum. Saluiæ, nepita.  
 Populi nigræ furculorū, sam- Sampfuchi, rhus cūlinarius  
 psuchus. ficcus.  
 Psilij, lenticula palustris. Santonici, abrotanum.  
 Pterei, cneori semen. Satyrij, semen erucæ.  
 Pulegij, hyssopus. Scammonij, ricini.  
 Pyrethri, zingiber. Scillæ, bulbus.  
 Pumicis, terra Cretica. Scinci, satyrium.  
 Phu, sphagnus. Scordij, albi papaueris ca-  
 Phyci, anchusa. put.  
 Q Semperiuii, lactuca serapia-  
 Quercus, chamæleon. dis, radix pæoniæ.  
 R Semperiuii succi, lactucæ suc-  
 Rapæ, heliotropium. cus, aut folia.  
 Radicis rumicis, Cinira. Sepiæ testæ, pumex.  
 Raphanini olei, rhicininum. Serpylli, potamogiton.

Sesa



Sesami, semen lini.	Thapsiæ, Elydrion.
Sesamoïdes, expressum amaracium.	Thapsiæ succi, chamæleontis nigri succus.
Sinapis, cardamomum.	Thermuntiadis, lycopsolos.
Sisonis, anisi.	Troximi maiouniū, aut maioulium.
Sisymbrij, ocymum.	Thuris, ampelites.
Sphagni odorati, iuncus cul- tus.	V
Spheclæ, hoc est fœcis vini cō- bustæ, sandaracha.	Vini Italici, vinum mendesiū.
Stymmeos tufi, squama aris,	Vuæ acerbæ, galla omphaci- tis.
Styracis, castoreum.	Vuæ passæ fatiux, palmulæ.
Strobilorū, semē cucumeris.	Visci quercini, chamæleō ni- ger.
Sruthij radices, radix veratri nigri.	Vulpini adipis, vrsinus adeps.
Sulphuris viui, sandaracha.	Vulturis fimus, columbinus fimus.
Syrici, spuma argenti.	X
T	Xylobalsami, violarum alba- rum radix.
Terræ Samiæ, leucographis Aegyptia.	Z
Terræ erythriadis, calx The- baïca. Galenus addit terræ reneræ, plumbago.	Zingiberis, pyrethrum.

## De ponderibus &amp; mensuris.

## CAP. XXVI.

**P**ondus, grauitate dimensum iudicatur, mensura autem vasis capacitatem: vas autem, siccæ quantitatis aut humidæ mensura est, vt tres quantitatis quæ mensuratur, sint differentia, vna quidem ponderis, altera verò aridæ substantiæ qualis ea quæ in cumulum cogi potest, porrò tertia humidæ est substantiæ. Cum autem multa propeq; infinita sint pondera & mensuræ, pro regionum diuersitate, & vtentiū consuetudine, de iis quæ omnibus in vfu communi sunt, nobis sermo erit præcipuus.

## De notis ponderum &amp; mensurarum.

**Q**UONIAM verò nonnulli literis non integris sed notis, signisque pondera & mensuras demonstrant, satius fuerit, veteres in hac re imitari, & primum characteras ipsos exponere. Primum igitur χ litera, cum superscriptum habet α, chalcum hoc est areolum signat, exempli gratia, χ α. Si o habeat,

T



choa, quod est congiū,  $\chi$ . Si  $\nu$ , chœnicem,  $\Psi$ . Si  $\mu$ , chemam,  $\chi$ . At  $\mu$  si  $\epsilon$  habet suprapositu, & lineā rectā, quæ per obliquum inferius cornu ipsius secet, ceratium, hoc est siliquā notat, ut  $\chi$ . Si  $\nu$  superiectum est, cyathum  $\chi$ . Si  $\sigma$ , cotylam, hoc est heminam,  $\chi$ . At linea circumflexa quam nihil aliud circumstat, & quæ per obliquū ponitur obolū notat,  $\omega$ . Si duæ huiusmodi lineæ sint, quas nihil circumstat, duos signant obolos,  $\omega$ : qui obuli gramma, hoc est scrupulum faciunt. is notatur litera  $\rho$ , quæ  $\epsilon$  literam habent annexam, recta quadam linea diuisam,  $\chi$ . Duæ autem coniunctæ atq; altera parte in angulum coactæ, duobus  $\mu$  literæ cornibus similem ad rectam lineam spectantibus, notant drachmam, quæ alio nomine vocatur olca,  $\omega$ . propriè verò olca per  $\lambda$  scribitur, cui in medio litera  $\sigma$  fit addita,  $\omega$ . Verum si  $\lambda$  adiectum  $\epsilon$  habet, libram signat,  $\omega$ . Nonnulli verò alteram  $\lambda$  literæ lineam obliquè secantes libram ostendunt,  $\omega$ . At cum  $\rho$  litera, in ipso sui angulo  $\sigma$  habeat, vnciam denotat.  $\omega$ . Quod si  $\mu$  in summo vertice habeat oppositum  $\nu$ , minam refert,  $\omega$ . Si  $\nu$ , notat mystrum.  $\omega$ . Si  $\epsilon$ , medimnum,  $\omega$ . Si  $\sigma$ , modium,  $\omega$ . Porro  $\tau$  post se habens  $\epsilon$ , &  $\nu$ , signat trygliō,  $\omega$ . At  $\epsilon$  cui iuxta sit positum  $\epsilon$ , xesten, qui sextarius, ostendit,  $\omega$ . Si  $\sigma$  apponitur, oxybaphum id est acetabulum  $\omega$ . Aliqui verò sextarium linea recta  $\epsilon$  secantes conficiunt.  $\omega$ . Sed  $\mu$  adiectum literæ  $\mu$ , heminam  $\omega$ ,  $\mu$  addito  $\epsilon$ , incumbente ipsis  $\mu$ , ceramium valet.  $\omega$ .

*De ponderibus.*

MINA Attica & Aegyptia habet vncias sedecim. Romana viginti. Libra vncias duodecim. Vncia drachmas octo. Drachma habet scrupula tria. Scrupulū, obolos duos. Obolus, siliquas duas. Siliqua, areolos duos, & duas tertij partes.

*De mensuris liquidis.*

ITALICVM ceramium habet congios octo, Congius sextarios sex, Sextarius cochlearia duo, quæ nonnulli triblia nuncupant. Hemina idem triblium continet, mystra magna tria, acetabula autem quatuor. Nam magnum mystrū habet acetabulum. Acetabulū sesquicyathum habet. Cyathus, chymas paruas seu mystra parua duo. At si voles & ponderum liquidorum mensuram scire, permultæ liquidarum rerum secundum lancis momentum differentie habentur, ut in olei, vini, & mellis exemplo dicemus. Mel igitur vino pōder



derosius quarta parte, itémque decima est: quo fit vt ferè tertia ponderis pars melli accedat: capit enim integram huius mensuram, & insuper trientem. Mel autem oleo ex media parte grauius est: continet enim totum olei modum, & vltra semissem. Vinum oleo nona parte supereminet, totū enim ipsius pondus continet, & nonam eius partem. Quò autem res fiat dilucidior, omnium mensurarum pondus sigillatim veluti in tabula depictum subiecimus. ex qua liquido cōstat, per pondera quæ singulis mensuris subiecta sunt, oleum, vinum, & mel, ex ordine demonstrari.

	Olei	Vini	Mellis.
Ceramium Italicum habet	lib. 72.	lib. 80	lib. 108
Congius	lib. 9	lib. 10.	lib. 13. S.
Sextarius	lib. 1. 3. 6	lib. 1. 3. 8	3. 13. & S.
Hemina	3. 9	3. 10	3. 13. & S.
Mystrum magnum	3. 3	3. 3. 8	3. 4. & S.
Acetabulum	3. 18	3. 2. 12	3. 27
Cyathus	3. 12	3. 12. 4	3. 2. 3. 2
Mystrum paruum	3. 16	3. 20	3. 9

ORIBASIVS secundum adamantium author est sextarium Italicum vini mensura quidem vnciarum viginti quatuor esse, pondere vero vnciarum viginti. sextarium pondere mellis duas libras, & dimidiam habere.

*De aridis.*

ÆGYPTIA artaba habet modios quinq;. Modius ægyptius & Italicus Chœnices octo. Chœnix sextarios duos. Sextarius, semifextarios duos quos & heminas vocant. Hemina habet cyathos octo. Atticus medimnus habet semifextaria, quæ hemiecta vocant duodecim. Hemiectum chœnices quatuor. Ita medimnus habebit minas quadragintanovem, sextarios nonaginta sex. Huiusmodi autem mensurarum pondus exponere haud facile, quòd aridarum rerum infinita iuxta momenti lancis rationem differentie existant.

FINIS LIBRI SEPTIMI, IOAN.

NE GVINTERIO ANDER-

NACO MEDICO IN-

TERPRETE.

T 2



## LECTORI.

Antequàm te ad lectionem Pauli conferras, scito aliquando verbum digerere positum esse pro discutere. Item mannam pro tenuiore parte thuris. Cachry pro flore roris marini.





# IOANNISAN-

## DERNACI IN LI-

BRVM PRIMVM PAULI

AEGINETAE COMMEN-

TARIVS.

\*

### CAPVT I.



VANDOQ VIDEM grauidis. Primum hoc caput Pauli ad verbum ex quinto Orisij sumptum est: in quo grauidis multa superuenire legimus: inter cetera stomachi re-

stomachi re-  
dundatio.

πρίστανσις

Paulus verbo τῷ περισσεύειν significat. Id si Hesybio & Suida credimus, à canibus cau-

dam mouentibus: aut potius, quod hic etiam magis congruit, à fluctuum agitatione tralatum est. In grauida enim sanguis menstruus, qui ante conceptum stato tempore, expurgari solebat, copiosior in utero collectus quam pro foetu adhuc exiguo ad stomachum regurgitat, ibique exundans, nauseam excitat. In prima nostra versione erat, Nausea, sicuti etiam Aristoteles libr. 7. de historia animalium ponit. ἐτι δὲ ναυτία, inquit, καὶ ἐμετοὶ λαμβάνουσι ναυτία τὰς πλείους. id est, praeterea nausea & vomitus plurimas infestant. Aetius πλάδ & στομάχου ait, quod est nimia humiditas stomachum debilitans, non ut Orosius putabat, sola imbecillitas. Nam Galenus Commentario secundo in primum de morbis vulgaribus, ait τὸν περιττὴν ὑγρότητα πλάδον ἐκιδόνον ὀνομάζειν, hoc est superfluam humiditatem, pladon appellare consuevit, de Hippocrate dicens. Idem Commentario secundo de ratione victus in morbis acutis, ἐφ' ᾧ καὶ πρὸς ἐκιδόνον, ὡς ὁ μὲν ὑδαρὴς δυνάμις πλάδ & ἐν τῇ αὐτῇ λογικῇ τοῦ σώματος

πλάδ &



ὕγρῳ τῇ α, καὶ ἀτονίαν ἐμποιοῦναι. hoc est, in quibus etiam adiecit, vinum aquosum, Pladon, id est, humiditatem & imbecillitatem in superiore ventre excitaturum.

Sputa crebra. Quia stomachus ex humiditate languet, eoq; os ipsum tenui sputo assidue plenum existit: Græca dictio est πῶνελίζειν: quam Galenus in priore prædictionum interpretatur, πῶνελαι πῶνελανίς, hoc est spueri frequenter.

Stomachi erosio. Quando ab acrioribus humoribus irritatur, mordeturq; vomitus futuri signum non exiguum habetur, Græce dicitur καρδιωγμός, quasi dicas cordis morsus. Veteres autem olim os ventriculi cor appellauerunt, nimirum ex situs vicinitate: quia cor prope os ventriculi situm est, ut ait Galenus, & ipsa rei euidentia docet. eundem affectum Galenus etiam καρδιαλγίαν vocat libro secundo de placitis Hippocratis & Platonis.

Cibi fastidium.

ἀσιτέω.

ἀσιτοι.

ἀπόσιτοι.

ἀνορέηται.

ἀσιτία.

ἀποσιτία.

Fastidii abstinentia.

ἀσιτῶ.

Corrigitur locus Pauli impressi.

Cibi fastidium. Nimirum ex vitiosis humoribus stomachum infestantibus, si Galeno credimus, græca dictio est ἀσιτέω, quæ signat cibo abstinere, & inedia uti, sicut Grammatici nobiles interpretantur. Galenus etiam libro primo πρὸς ἐπιδημίων differentiam inter ἀσιτίας & ἀποσιτίας ponit hisce verbis. ὅτι τὰς ἀνορέησας ἀσιτους ὀνομάζουσιν οἱ Ἕλληες τὰς μὴ προσσυνεῖναι μὲν οἰτία, τοὺς δὲ ἀπεστραμμένους προσεῖναι, ἀποσιτίας καλεῖσιν. hoc est, quod Græci appetentia carentes vocant, Asitos, eos sane qui cibos non assumunt: illos autem, qui assumere oblatos auersantur, abhorrentq; appositos, omnibus est manifestum. Ibidem ἀπόσιτοι πάντων γουμάτων διετέλειον, quasi dicat, omnium ciborum fastidio laborabant. Erit itaque ἀσιτία abstinentia à cibo in totum: ἀποσιτία, fastidium quidem, sed ut aliquid tamen assumatur, quod Galenus ostendit libro primo de causis symptomatum, grauidarum accidentia enumerans in hac verba, βραχία σιτου μένους τ' ἀνθρώπους διὰ τὴν ἀποσιτίαν. Hoc est quod mulier pauca comederet ob fastidium. Hippocrates in Aphorismorum commentario quarto: ἀπυρέτω ἔνυσσι ἀποσιτία. Galenus interpretatur ἢ μὴ ἀποσιτία τὸ αὐτὸ δουλοῖ τῇ ἀνορέῃ. Rursus in libello de victu priuatorum: οὐδέσσι δὲ ὀδύναι γίνεσθαι ἐν τῷ σπλάγχνῳ, ἢ ἐν γυναικείᾳ, ἢ ἐξ ἄλλης τινὸς ὀδοιπορίας τούτοις συμφορὰ ἀναπάνεσθαι ἀσίτας. Hoc est: quibus dolores viscerum oboriuntur, aut ab exercitio, aut alia quadam obambulatione, his conuenit in abstinentia conquiescere. His omnibus animaduersis, legendum videtur ἀποσιτέω pro ἀσιτέω, id quod ex sequenti oratione cuius mediocriter sagaci licet deprehendere. Nam Paulus singulorum accidentium remedia tradens, ἀποσιτίας δὲ, inquit, non ἀσίτας: quam



quanquam non ignarus sim aliquando auctores, alterum pro altero usurpare: ut è capite 35. Verum cum utraque hic ponatur, ἀποτοῖ, & δοτοῖ exacte intelligenda sunt. Miror hoc Orosium qui in alijs corrigendis nihil facit reliqui, non advertisse: Castigatorem vero Basiliensem, qui Paulum Græcum germanicis typis excusum edidit: tum hoc, tum alia pleraque præteruisse, notatū alioqui dignissima.

Orosius.  
Castigator  
Basiliensis.

Vina fulua. Vipote frigidioribus naturis accommodata: tum ad concoctionem, tum ad succi bonitatem procreandam, vt ex Galeno didicimus. At enim libro duodecimo Methodi οὗτοι ἀνὰ ἡμέραν εἰσὶν ὑγιεινοὶ ὑπὲρ τοῦ ὕδατος, καὶ ὁ ἰσχυρὸς καὶ ὁ ἰσχυρὸς εἰσὶν, καὶ τῇ οὐρανῇ μίσσει τὴν ὑδατῶν καὶ τῶν πικρῶν. Hoc est, omnia hæc vina fulua, tum calida, tum odorata sunt, & substantiam habent inter aquosa & crassa mediam.

Vina fulva.

λεῖπον.

Color hic fuluus, qui Græcis λιπρὸς dicitur, proximus est flauo, quasi dicas in pellucido flauum: hinc etiam flauus color & fuluus eidem sæpe rei accommodantur. Id quod ex Galeno licet disciscere libro quinto de Sanitate tuenda, ubi habet, εὐόπου ἔχωρ ὄνον λιπρὸν μὲν τὸν αὐτῶσιον ἀπὸ τὸν λεπτῆτατον αἱ ρέειν, λιπαρὰ δὲ τὸν χροῶν, ὃν ὁ ἵππουράτης διότι λιπρὸν λιπαρὸν, δύναται δ' ἂν καὶ εὐαθὲρ ὀνομάσθαι ἂν τὸν. Id fere sonat, huc consilium dirigens, ut vinum substantia quidem tenuissimum semper: colore autem, quem Hippocrates λιπρὸν id est, fuluum nominare consuevit: postis etiam eundem flauum appellare. Galenus alibi τὸ λιπρὸν χροῶμα δύναται ἂν λέγειν πωρρὸν ὡχρόν. Hoc est, fuluum colorem postis rufum palens dicere. Sunt qui hunc colorem latine Giluum nuncupent: ego malim ex Galeni interpretatione, fuluum conuertere, Plinium secutus: qui hunc colorem inter alios vino attribuit, non giluum. Siue autem dicas gilua flaua, aut fulua, nihil interest, modò observes plerunque vina ex vetustate hunc colorem induere.

Color ful-  
uus,  
*luxuriosus.*

Flavus.  
 πρὸς  
 ὁχλόν.

At medicamenti nomine. Superius commemorata ad cibum referuntur: sequentia ceu medicamenta adhibentur, quæ stomachum ex nimia humiditate imbecillum corroborent, exciccentq; ὡς φάρμακον ἁ. id est, ut medicamentum vero habet textus, ego nomine medicamenti verti.

Radix Pontica. Hoc est, rhabarbaricum, vim habet corroborandi  
stomachum imbecilem: vide Dioscoridem.

Extrínsecus præcordia. Hoc est, quæ parte ventriculi os habetur. Abusus est Paulus dictione *περιγάδιον*, quæ apud Ga-



περιμά-  
σιον.

Præcordia.

Præcordia  
apud Pliniū.

ὑποχόνδρι-  
ον.

Subcartila-  
gineū. Medi-  
camēta in af-  
fectu stomi-  
chi ubi ap-  
plicanda.

Recentiores  
quidā apud  
Lugdunum  
Medici.

Linacri ver-  
sio.

Galenī lo-  
cus. 13. Me-  
thodi.

lenum proprie significat membranam, seu tuniculam, cor am-  
bientem, aut si mauis, cordis inuolucrum. Quia vero os ven-  
triculi olim cor appellabatur, excusari potest, ut Pericardion  
pro regione externa, sub qua illud delitescit, accipiatur. Plinius  
libro naturalis historie I. membranas septi transuersi, præcordia ap-  
pellauit, quod cordi prætendatur. Galenus autem, & Hippocrates  
ὑποχόνδριον totam illam regionem appellant, quæ à mucronata car-  
tilagine, vtraq; in parte ad vmbilicum vsq; porrigitur. Celsus au-  
tem latine lingua in Medicina princeps, præcordia nominat. Cate-  
rum ex hoc Pauli loco constat, ubi os ventriculi affectum est, ante  
non ad dorsum applicanda remedia. Nonnulli autem Medici apud,  
Lugdunum dorso admoueri præsidia, ut in inflammatione gulæ vo-  
lunt, erroris occasione sumpta ex loco quodam Galeni in 13. Me-  
thodi perperam à Linacro Anglo conuerso. Habet autem in hunc  
modum tralatio. Verum gulæ, quæ proprie vocatur stomachus, cata-  
plasmata super spinam dorsī imponimus, non autem ad pectus: idē fa-  
cimus, & cum phlegmone os ventris laborat. Multo melius sonant  
græca. ἀλλ' ἐπὶ τῷ λυγρῷ ὀνομαζομένῳ στομάχῳ καὶ τὰ κατὰ  
πλάσματ' ἐπὶ τῇ ῥίχῳ ἐπιτίθειν, ὅν κ' ἐμπροσθεν, ὥσπερ ὅταν τὸ  
στόμα ᾗ γαστὴρ φλεγμένον, id est: Sed gulæ quæ proprie nominatur  
stomachus, etiam cataplasmata super spinam dorsī applicamus, non  
anteriorius, quemadmodum (intellige) facimus in anteriore parte, cum  
os ventriculi inflammatur. Huic sententiæ ipsa rei euidentia, quæ ex  
Anatome apparet, adstipulatur.

Præcordia contegere. Hoc loco vsus est dictione, ὑποχόνδριον: cū  
hic eundem locum quem superius in vomitu voluerit, intelligat.

At eas quæ cibum fastidiunt. Græce est τὰς δὲ ἀποσίτῃς. Re-  
medium fastidientium ponit, quanquam superius ἀσιτον scriptum  
erat.

Oenanthe. Hoc est, vna syluestris vitis, ut ait Dioscorides: ad  
verbum hæc ex Oribasij quinto transcripta sunt. Auicennæ inter-  
pretes eundem locum turpiter corruerunt.

Error Oro-  
scij. λήτλα.  
Malacia.

Citta. Oroscius Cittam male interpretatur picam: non enim pi-  
ca morbus est apud latinos, sed malacia: à græco autem verbo λήτλα  
possis dicere picam, sed apud idoneos authores vsurpatum non est.  
Galenus originem huius mali tradit libro primo de Symptomatum  
causis in istū modum. μοχθηρῶν δὲ ποιότητων ὑδιθιμῶν οἷς ἂν εἰς  
τὸς τ' λοιπὰς χιτῶνας ἀναποδῇτι πόσιτ' ὡμα μοχθηρῶν, εἰωθεῖ ἢ το  
γίνεσθαι μάλιστα ταῖς λιανοχύμοις γυναιξίν, ἐπειδὴν λυγρῶσι,  
καὶ καλῶς λήτλα τὸ παθός. Hoc est: Præuas autem qualitates ap-  
petunt



Malacia sto-  
machi.

Aduerte lo-  
cos Pauli &  
Galení.

ἰνύμα.  
 Conceptum.

Remedia  
malaciæ sto-  
machi.

ἐνσῆτοι.

ἐνθετοί.

T 5



**Acia.** Verum acia. *Ut piper, ginger, nasturcium, aliæque id genus quæ calore suo stomachi superflua consumant.*

**Oedemata.** Tumore sunt ex pituitoso humore collecti, qui digitis prementibus cedunt: varijs etiam morbis superueniunt. *Vide Galenum de Tumoribus præter naturam.*

*Λατάνισον.* Lauantur. *Græcus codex impressus κατανύσσειν pro κατανύσειν habet. Superfundere etiam significat.*

## IN II. CAPUT.

**Mulier adolescens.**

**A** Erate nec nimium. Ex hac clausula *Græca μήτε δὲ νεώτερά, reddidi: nec nimium adolescens, hoc est, quæ sit in ipso vigore ætatis: quo nimirum corpus absolutum iam est, & copioso abundat sanguine. Sin infra viginti quinque sit annos, nempe adolescens, corpus adhuc increscit, & alimentum minus habet perfectum. Eoque νεώτερά verti adolescens. Nam ab anno quartodecimo usque vigesimum quintum, ætas vocatur adolescentia. Ab anno trigesimo quinto, multis solent menses cessare, aut omnino pauci fluere, eoque alimento minus ad fœtum alendum abundant.*

**Nutrix** non multo ante. *Quia sanguis tunc vberim ad mammas confluit. unde lac copiosius etiam suppeditatur.*

**Masculum.** *Hippocraticum est. propterea quod laborato magis, proboque nutrimento ex sanguine pollet, & minus excremento.*

**Ἀγρύμια.**  
**Ἀγρύσεις.**  
**Condimenta.**

**Condimenta.** *Sic dicuntur qualiquoribus quibusdam ut aceto & sapa, alijsque condiendis induntur aromata, siue semina odorata quod genus sunt cuminum, anisum, feniculum, græcis dicuntur ἀγρύσεις & ἀγρύμια. Lege in textu τὰς ἐπιούσας ἐν ωδὶ καὶ τὴν ἀγρύσεις, pro τὰς ἐπιούσας.*

**Venere** nutrix. *Galenus præceptum ex primo de sanitate tuenda: quia ex hac menses prouocantur, & lac odoris gratiam in deterius mutat.*

**Manus humerosque.** *Exercitationem nutrici idoneam præscribit: qua videlicet partes superiores agitata sanguinem copiosum lacti generando suggerant. Dicit enim Galenus sanguinem optimum gigni exercitatione moderata, cibis tum boni succi, tum iusto tempore, modoque assumptis. Præterea potione tempestiua modiceque sumpta. Græce est, ἀλείτω, id est, molat.*

## IN III. CAPUT.

**L** Audatissimum. *Galenus libro primo de sanitate tuenda ad verbum omnia comprehendit. De vngu autem, ex Dioscoride*



inde libro secundo sumptum est, quod autem ad lucem debeat in  
linari, de suo Paulus adiecit: quemadmodum etiam de proba-  
tione.

## IN IIII. CAPVT.

**L** Ac viciatum. Ex quinto Oribasij transcripta sunt remedia  
nimirum lactis viciati: quæ tum corporis totius purgatione,  
tum victus ratione constant.

**Oxymelite.** Hic vomitus facillimus est, aliquando additur Vomitus.  
radicula quæ raphanus dicitur, minutim concisa horis duabus in oxy-  
melite madescit. Deinde ea proiecta, oxymeli assumitur. Vel radi-  
culam esse oportet, deinde aquam tepidam bibere. Valentiores vom-  
tus ciendi modi septimo libro traduntur.

**Laboribus.** Nam exercitatio calorem prouocat: qui frigidum, vi-  
scosumque humorem calefacit, extenuatque.

**Cibum præcedentibus.** Alioqui plus noxæ quàm commodi  
afferrent: imo plus pituitæ generarent, dum videlicet cibum prius  
quàm esset concoctus, in membra digereret.

**Salsamentum.** Græce τάρυχον est, quod conditæ thynni car- τάρυχον.  
nem significat. Cuius generis & Cybia sunt: quo nomine Plinius  
Pelamidem concisam appellat. Pelamidem vero Thynnium, qui  
nondum attigerit annum. Idem à recenti partu Cordyla dicitur.

**Carnibus suillis.** Ad obtundendam nimirum humoris biliosi  
acrimoniam. Nam humida & crassi succi: quæ qui concoquere pos-  
sunt, vtilissima. Habet autem viscosi aliquid, quo iecur & renes  
obstruat: cetera ex omnium animantium genere quæ pedibus fi-  
dunt, ut ait Galenus, saluberrima. Porro indistincte dixit Pau-  
lus carnibus suillis, cuius putæ etatis esse velit omittens. Nam flo-  
ride etatis hominibus ac sese exercitantibus iusta magnitudine ad-  
ulti: inclinantibus, qui adhuc increscunt, porculi conueniunt. Mini-  
morum caro excrementis generandis est: vetulorum siccitate, & duri-  
tia displicet.

**Sapaxque & vini dulcis.** Galenus libro περιερχόμενος ην νενο-  
χυμίας, contrarium fere scribit, docens biliosis, quibus iac acrius te-  
nuis que esse solet vinum dulce nequaquam conuenire. His verbis:  
τοῖς χολωδέτεροις σώμασι, ἔτε διὰ φυσικὴν δυσπρασίαν, ἔτε δι'  
ἐπίσταντον ὁπωσὺν γενομένην, ἔτε φαρμακικὴν, ἔτε τιμωρίαν, ἔτε  
πρὸς γλυκύς, ἔτε ἀγροσιν, ἔτε ὁ λίσσι, ὁ ἐν ὁδῷ τε ην λιπρὸς ὁμοίως  
τοῖς

Esus porcu-  
lorum pro  
fumentis eta-  
te variatur.

Collatio lo-  
corū Pauli  
& Galeni.



τοῖς προεργημένοις ὡς ἐπιτέδδος πίνεσθαι. ὁ δὲ μὲν γὰρ ἀπαύσθαι τοῖς  
 τοῖς. Μὴ τ' οὖν χωλόμενοι, μήτε τοῖς ἐκ γυναικείας ἢ λαυμάτων πολλῶν,  
 ἢ ἐνδείας, ἢ λύπης, ἢ ὥσπερ, ἢ χόλεως καὶ λήλαστος δὲ βρῆναι, διδόναι τοιοῦ-  
 του ὄνου. ὁ δὲ ὑποναύτις ἢ ὄνου ἀγαθὸς ἀπασὶ τοῖς δὲ βρῆναι δὲ αἰ-  
 μένοις, φλεγματώδεσι, καὶ ψυχραῖς λιράσιν, καὶ χυμῶν πολλῶν  
 ὡμῶν ὑδρωκόσιν, ἀργῶς βίβωσιν, ἐν χωρίῳ ψυχρῷ, καὶ χερμῶνι, καὶ κα-  
 τὰ τὰς αἰσθητικὰς ψυχρὰς ἢ ὑγρὰς. τοῦτο τοῖς μὲν ἀπασιν ἀγαθὸς ὁ λιρῶν δὲ οὖν  
 καὶ γλυκὺς. ἐν αὐτῷ δὲ τοῖς ἐν αὐτῷ ἔχουσιν, id est, Biliosiori corpo-  
 ri, siue ex temperamento naturali, siue qualicunq; ascititio, nec faler-  
 num, nec dulce timolites fuluum, nec Aruissium, nec Lesbium odo-  
 rum & fuluum prædictis simile potui est idoneum. Quippe omnia id  
 genus vina calida sunt, eoq; nec biliosis natura, nec ex insolatione, aut  
 alijs ardoribus, vel inedia, vel tristitia, vel anni tempore, vel regio-  
 ne, & calido aëris statu huiusmodi vinum exhibendum est. E con-  
 trario salutare est omnibus qui caleferi desiderant, pituitosis, frigi-  
 dis temperatura, ijs qui crudorum humorum copiam coaceruarunt, in  
 ocio viuentibus: in loco frigido, hyeme, & statu aëris frigido, humi-  
 doq;. His inquam vniuersis fuluum ac dulce vinum salutiferum est,  
 contrarium ijs qui secus habent &c. Quid igitur hic dicemus? ratio-  
 ne alimenti exhiberi. Nam antea dixerat ἢ ῥοφὴν δὲ ὁ ἀπαύσθαι  
 ὡς ἐν αὐτῷ ἀνάλογον τῷ πᾶσι. Hoc est: Alimentum vero ex o-  
 mnibus ipsis crassitie respondet: puta qualem substantie crassitiem  
 obtinent, tale etiam nutrimentum, nempe crassi succi producunt. Sic  
 igitur ijs quibus lac tenue est, conuenit. Quamquam muliebris etiam  
 sexus, respectu masculini, frigidior existat: deinde sanguis tenuis, &  
 serosus esse potest, acris, non etiam statim biliosus, ac calidus.

Cucurbitula etiam. Vt videlicet sanguinem ad partes eas ex  
 alijs attrahat. Cautè verò ad mamillas defigenda est. Caro enim mol-  
 lis cum sit, facile intumescit, cucurbitulaq; repleta difficile auellitur.  
 Quod si hoc acciderit, sponsia calida illi superponi debet: sic enim la-  
 xatur. Sin minus, pertundetur.

Error Oro-  
scij.

Textus Græ-  
cus corrigi-  
tur.  
Melanthiū  
quod gith di-  
citur.

Melanthium. Dioscorides hoc docet lac extrahere: in qua re mi-  
 nor castigatorem Oroscium, papauer nigrum vertere: quod contra o-  
 mnem medicinam est, ne dicam piaculum, præbere ad lactis genera-  
 tionem vehementer refrigerantia addeò vt soporem inducant, & qui-  
 dem violenter, nec sine incommodo natura. In Græco exemplari le-  
 gendum quidem ei assentior pro γλυκὺ, γλυκῆ, quod præteryt Ge-  
 museus. Melanthium vero apud nullos autores papauer nigrum si-  
 gnat, etiam si conueniret instituto. Ita sunt quidam ad vituperan-  
 dum alios proclives, vt sæpe ipsi in multo gravioribus erroribus incidant.

Cali



**Calida prius.** Græce est  $\theta\epsilon\mu\omega\ \pi\rho\sigma\sigma\alpha\iota\upsilon\nu\acute{\eta}\sigma\alpha\iota\ \delta\epsilon$  legendum: non  $\pi\rho\sigma\sigma\alpha\iota\upsilon\nu\acute{\eta}\nu$ .  
 $\pi\rho\sigma\sigma\alpha\iota\upsilon\nu\acute{\eta}\sigma\alpha\iota\ \delta\epsilon$ , ut habent codices impressi, quod neuter Aristar-  
 chus, vel Orosius vel castigatior Basilienensis aduertit. Dicitur etiam  
 $\lambda\alpha\tau\alpha\iota\upsilon\nu\acute{\eta}\sigma\alpha\iota\ \delta\epsilon$  à verbo  $\lambda\alpha\tau\alpha\iota\upsilon\nu\acute{\eta}\nu$ , quod significat  $\lambda\alpha\tau\alpha\iota\ \lambda\acute{\epsilon}\nu$ , &  
 $\lambda\alpha\tau\alpha\chi\acute{\epsilon}\nu$ . Galenus in primo ad Glauconem.  $\tau\omega\nu\ \delta\epsilon\ \sigma\pi\lambda\acute{\alpha}\chi\eta\nu$   
 $\pi\rho\nu\omicron\sigma\acute{\alpha}\delta\alpha\iota\ \lambda\alpha\tau\alpha\iota\upsilon\nu\acute{\eta}\nu\ \tau\acute{\alpha}\tau\epsilon\ \eta\gamma\epsilon\iota\ \lambda\alpha\tau\alpha\pi\lambda\acute{\alpha}\tau\iota\upsilon\tau\alpha\ \tau\omicron\iota\varsigma\ \mu\alpha\lambda\acute{\alpha}\tau\iota\varsigma$   
 $\eta\gamma\epsilon\iota\ \chi\alpha\lambda\acute{\alpha}\nu\ \delta\iota\omega\alpha\mu\acute{\epsilon}\nu\omicron\iota\varsigma$ : hoc est visceribus autem prospicere oportet,  
 superfundendo, obducendoq; ea quæ emollire possunt, & laxare. Leo-  
 nicensis rurgendo verterat.

Prius emulcto.  $\omega\rho\sigma\alpha\mu\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\alpha\sigma\alpha\nu$  passue positum est: cum medium  
 alioqui sit.

Ieiuno. Hic proprie positum est  $\acute{\alpha}\sigma\iota\tau\omega$ , ut facile intelligas in  
 initio primi capituli pro  $\acute{\alpha}\sigma\iota\tau\omega\varsigma$  legendum  $\acute{\alpha}\pi\omicron\sigma\iota\tau\omega\varsigma$ .

Cibus solidior. Galenus primo de sanitate tuenda puerum vult  
 nutririlacte, quoad primores dentes emiserint. Deinde cibo solidiore,  
 utpote pane, leguminibus, carne, similibusq; sed omnibus prius com-  
 mansis. Græce tantum est  $\sigma\iota\tau\omega$ , quod per se cibum simpliciter signat,  $\acute{\epsilon}\iota\tau\iota\omega$ .  
 verum lactis ratione solidior intelligendus venit.

Si autem imprudentibus. Græce est,  $\epsilon\iota\ \delta\epsilon\ \lambda\alpha\theta\acute{\upsilon}\nu\tau\alpha\ \omega\lambda\upsilon\pi\omega\theta\acute{\epsilon}\iota\nu$ ,  
 id est: Si autem latentes repleti fuerint. Sed verbum  $\lambda\alpha\theta\acute{\upsilon}\nu\omega$  in eius-  
 modi locutione vertitur, recte conuertitur, imprudentibus nobis, aut  
 nescijs, id quod etiam Budeus annotauit.

## IN VI. CAPVT.

**P**Ustulis quæ quod puero. Post educationem infantuli morbos  
 enumerat, quibus in ea ætate consiliari solet: vocatq; Græce  
 $\theta\epsilon\lambda\omega\theta\acute{\eta}\mu\alpha\tau\alpha$  à verbo  $\theta\epsilon\lambda\omega\theta\acute{\epsilon}\nu$ , quod est efflorescere.

Exanthe-  
mata.

Ad summa eruperint.  $\theta\epsilon\lambda\omega\theta\acute{\epsilon}\nu\ \delta\epsilon\ \epsilon\pi\alpha\nu\theta\acute{\iota}\sigma\eta\nu$ , quod est in extrema  
 eruperint. Ut  $\theta\epsilon\lambda\omega\theta\acute{\epsilon}\nu$  sit simpliciter se in altum promere:  $\epsilon\pi\alpha\nu\theta\acute{\epsilon}\nu$   
 verò iusta magnitudine & figura per summa apparere.

## IN VII. CAPVT.

**G**RAUEDO. Græce est  $\lambda\acute{\omicron}\rho\upsilon\lambda\alpha$ . Sic enim Celsus lib. 4. interpre-  
 tatur: quæ nimirum pituita ex capite defluens, nares claudit, vo-  
 cem obtundit, tußim mouet.

$\lambda\acute{\omicron}\rho\upsilon\lambda\alpha$ .

Melitismi. Ita dicuntur, sicut sinapismi, cum melle pars obli-  
 nitur, melitismus, cum sinapi, sinapismi.

$\mu\epsilon\lambda\iota\sigma\iota\sigma\mu\acute{\omicron}\varsigma$ .

Copioso calido. In Græco deerat  $\theta\epsilon\mu\omega$  quod est calido. Sic enim  
 magis aperit & discutit si quæ sunt superflua.

Textus Græ-  
cus mutilus.

## IN VIII. CAPVT.

**D**ISCOCTO. Hoc est, probe cocto: quod Græci dicunt  $\acute{\alpha}\pi\epsilon\phi\theta\omicron\rho\upsilon$ .  
 $\phi\theta\omicron\rho\upsilon$ .

IN



## IN IX. CAPVT.

**Tendines.** **T**Endinum. Quos hic vocat tendines, considerato, an musculo-  
rum buccā mouentium, an neruos à cerebro dentium radicibus  
adherentes, vnde sensus ipsis comunicatur. An tendines alios malis.  
**Exoriba-** Anisum. Impressi codices habent ἀνιδον, hoc est anethum, quod  
**fio.** ipsum quoque alium sistit. Sed Oribasius habet anisum.  
Calide. Non calidis potentia, sed calide actu alius sisti debet.  
Græce δὲ μῶς non δὲ μῶς legendum.

## IN X. CAPVT.

**ἀφθαί.** **A**phthæ. Celsus libro secundo capite primo: Proximum est vt  
infantes adhuc pueros serpentina vlcera oris quæ Græci ἀφθαί  
nominant, exerceant. Varijs interim coloribus apparent, pro humo-  
rum ea gignentium natura.

## IN XIII. CAPVT.

**τῶν γυμνασίων.** **T**Omenti modo. Græce est ἐν ῥόπῳ τῶν γυμνασίων. Significat  
autem idem τῶν γυμνασίων quod τῶν γυμνασίων, τῶν γυμνασίων, ὅτι τῶν γυμνασίων  
ῥόπος, hoc est. hapsus lanae vt Celsus ait, vel circulus.  
Heliotropion. Celsus herba solaris dicitur. Ab herbarijs vulga-  
ribus nouo indito nomine, vocatur herba cancri, cum scorpionides po-  
tius appellaretur. Sed quia scorpio incognitus magis est, à cancro ap-  
pellationem traxerunt.

**Pepones, Me-  
lopepones.**

Cucumeris. Cucumis statim in Pepones, & Melopepones dege-  
nerat, figura tantum & quantitate inter se dissidentes: cum magni-  
tudine excessere, pepones vocantur, cum vero rotundi, formam & ef-  
figiem mali referunt, facta ex pepone, & malo appellatione.

## IN XIII. CAPVT.

**I**Am victus rationem præscribit ab infantia vsq; ad etatem de-  
clinantē, quæ nō tam ex Medicina, quàm Philosophia petita est:  
qui mos est etiā Galeno, vt non solum corpus, sed animū quoq; curet.

Liberiore. Græce est ἐν ἀνίσει, hoc est, cū animi remissione, à ver-  
bo ἀνίσταμαι, quod est, licentia permitto, aut solute indulgeo.

**ἐλαφγῶς.**

**Leuiores.** Græce quidem ῥοφᾶς ἀντὶ τοῦ εὐποροῦ ἐλαφγῶς,  
hoc est, alimenta ipsis leniter præbere, reddidi ego leuiores: vtrum ma-  
lis accipe. Hæc dixi, ne vitiligatores vllam calumniandi occasio-  
nem habeant, si vel tantillum immutauerim.

## IN XVI. CAPVT.

**E**Xercitatio. Totum hoc caput ex secundo Galeni de sanitate  
tuenda transcriptum est: ex quinto vero Oribasij. in eodem vero  
**Locus Pauli** hæc clausula aliter legitur. Græcus codex Pauli impressus habet: Ἀλλὰ  
**castigatus.** μήτε πλεονάζειν, μήτε ἀπεντίζεσθαι, μήτε ἐπιτιμᾶν, μήτε χυμῶν, ἢ ἁπλῶς  
τὰς



ἢ τῶν λοιπίων ἢ ἐν τοῖς ἐντέροις, hoc est: Non debet crudi, incoctūq; siue cibi, siue humoris copia aut in ventre, aut in intestinis contineri: pro ἐν τοῖς ἐντέροις. Galenus habet ἐν τοῖς ἀργείοις, quod est in vasis: cui lectioni ego assentior. Intestina siquidem concoctioni proprie dicata non sunt: deinde ventris dictione etiam ipsa comprehenduntur. Verum ut concoctio altera in ventre, altera in vasis administratur: ita distributio ex intestinis prima: altera ex vasis obitur. Hæc non aduerterunt Orosius, & Basiliensis castigator. Omitto quod etiam ἐν τῇ γαστρὶ in eodem fere Galeni loco, Orosius ex stomacho distribuitur, verterit, cum dicendum sit ex ventre. Nam inde fit distributio.

Erratum Orosij.

Vnde manifesto liquet. Galenus cum libro de sanitate tuenda, iam citato, tum maxime in commentario: τὸ πρὶν χυμῶν, καὶ τὰ ἀποχυμῶν simillimam habet sententiam: ὅτι πρὶν ἂν γὰρ μὲν γινώσκῃς εἰς ὑγίαν τὸ πρὶν τῶν σιτίων γινώσκῃς, ἐν τῷ βλαβερῶτάτῳ ἀπαρῶν λίνῳ ἐπὶ σιτίοις, ἀναδίδῃς γὰρ ἐν τῇ λοιπίᾳ ἢ ῥοφῇ, πρὶν πεφθῆναι, καὶ τὰ πλεονάζοντα χυμῶν ἀθροίζεται καὶ τὰς φλέβας, ἐξ ὧν ἐνθε νόσῳ μάλιστα γίνεσθαι. καὶ φθασάντων αὐτῶν ἡτοιμασθῆναι νόσους πολλὰς, καὶ πεφθῆναι, καὶ μεταβαλεῖν εἰς αἵμα καὶ τὸ κατ' ἡπαρ, καὶ φλέβας διασείρει. Hoc est, ut Græce

Exercitatio.

lingua ignari intelligant: Sicut enim exercitatio cibū præcedens plurimum conseruande sanitati conducit: sic quælibet à cibo commotio, nocentissima est. Nam alimentum antequam sit cōcoctum, ex ventre distribuitur. Vnde crudorum humorum copia in venis collecta, omni-genas morborum species procreare solet, nisi protinus labore multo fuerint discuti, vel cōcocti, ac in sanguinem facultatis beneficio quæ iocinori, venisq; insita est, transferint.

Modo factam. Galenus addit, secundam, ut sit mediocriter pallida concoctionem secundam (nempe quæ in venis fit) modo factam significat. Omisit Paulus secundam, quia ex vrina iudicium non nisi de secunda concoctione sumitur.

Compendiū Pauli.

Acclius deambulatio. Codex impressus viciatus est, habet enim καὶ δὴν ἀντὶς ἀντατο pro καὶ οἱ ἀντατο πρὶν αὐτοῖς ex Galeno instauratum, vnde hæc omnia transcripsit. Est autem acclius ambulatio, cum quis contra montem, aut loca editiora inambulat. Non aduertit Basiliensis castigator.

Castigatur Paulus.

Præterea per alias ex. Quippe itatio, cursusq; crurum exercitationes sunt: acrochirismi, & sciomachia, brachiorum, ac manuum propria. Lumborum autem, assidue se inclinare, & rursus reuocare. aliter, spine, thoracis autem & pulmonis, maximæ respirationes propria

Exercitationes singulorum partium.



prie exercitationes sunt.

*ivavθis.* Donec rubescat. Hoc est dum sanguis in extimam cutem fuerit euocatus. Id signat *ἐθελυυαυθίς ὑπὸ ἀρχῇ*. Hoc est cum floridus, ruidusq; & ruber apparuerit.

*Castigatur codex Græcus impressus.* Concinnæ. Malè in Græco *ῥαθυμοί*, pro *ὑγροί* legitur. Vide Oribasium & Galenum. Non aduertit Gemuseus.

*Viciatus codex.* Calido vapore. In codice Græco impresso *δρῦον* ad sudorem videtur referri. Galenus lib. 2. de sanitate tuenda legit *δρῦον*, ut referatur ad vaporem, sicut nos conuertimus. Vterq; Aristarchus, & Oroscius, & Basiliensis hæc præterierunt.

Apothèrapia. Exercitationis omnis pars vltima est apothèrapia, seu dicas recreatoria: nam corpus expurgat, & lassitudinem arcet.

#### IN XVIII. CAPVT.

*ἀνὰ βίβλιν.* Inter frictiones. Paulus hoc ex secundo Galeni iam dicto libro ad verbum mutuatus est. Galenus autem ex commentario Hippocratis, qui inscribitur *λαβὴν ἰατρικόν*, in hunc modum: *ἀνὰ βίβλιν ἀνὰ τῶν λῦσαι, ἀνὰ τῶν σαρμῶσαι, ἀνὰ τῶν μινυθῆσαι. ἢ σκληρὴν ἀνὰ τῶν ἰσχυρῶν, ἢ μαλακὴν ἀνὰ τῶν ἰσχυρῶν. ἢ πολλὰ μινυθῆσαι, ἢ μετρίῃ πᾶσιν αὐτοῖς.* Hoc est, frictio potest soluere, ligare, replere, minuere. Dura ligare, mollis soluere, multa minuere.

#### IN XIX. CAPVT.

*ἀναφώνησις.* Inter vocis exer. Hoc est ex quinto Oribasij transcriptum. Galenus huius exercitationis fere nō meminit. Est autem dictio Græca *ἀναφώνησις*: quæ signat exclamationem vociferationemq;: qualis in cantu editur, & lectione clara, orationeq;. Verbum *ἀναφώνησις* pro voce contendere interpretari potes.

#### IN XX. CAPVT.

*Lassitudines.* Vlcerosa. Exercitationum genera persecutus, nunc ea quæ illis superuenire solent, enumerat. Sunt itaq; lassitudinis tres numero differentie, vlcerosa, tensoria, & inflammatoria, seu ut Græce dicam, *φλεγμονώδης*. in tertio Galeni de sanitate tuenda ad verbum explicat.

*Negligentia Oroscij.* Quo tendi videntur. Græce impressi codices, *τὴν ἐλαττωμένην*, quod est liquari, consumi; habent, pro *τὴν ἐλαττωμένην* non tamen hoc aduerterunt Oroscius & Gemuseus. In eodē capite *χαλᾶται δὲ σὺν ἰσχυρίσιν*, pro *χαλᾶται δὲ σὺν ἰσχυρίσιν*, quod est, sane laxatur, quod distentum est.

Olco dulci atque egelido. Hoc est: Ex maturis oliuis quarum baccæ iam nigrescere inceperint, druppas appellant, confecto. Egelido, hoc est tepido, ut soli expositum fieri solet. Id Græca dictio videtur innuer



innuere εἰληθῆς si Grammaticis credimus, qui exponunt ὡς κλί- εἰληθῆς.  
 θῆμαυθῆς. id est à sole excalesfacto. Quid si hyems, aut frigidum  
 alioqui tempus sit: quo sol non solet, aut certe parum nos excalesfacere, Egelidum.  
 tunc ne etiam soli erit exponendum ut incalescat. Sane friuolum esse  
 puto quod Orosius adfert, & pro tepido tantum poni, ut postea in Tepidum.  
 lassitudine inflammatoria legitur, εἰλαον τε οὐν πολὺ χλιαρὸν, quod  
 est: Oleum igitur copiosum tepidum adhibendum. Verum ideo me re-  
 prehendere videtur Orosius, quod Egelido dixerim, putans hoc fri-  
 gidum significari: male mehercules in authoribus latinis versatus.  
 Celsus egelidum in eodem sensu quo ego multis in locis usurpat: ut  
 lib. 4. cap. 11. Neq; ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est. Quo-  
 modo etiam Linacer eundem locum in Galenum ante me vertit, qui  
 antea corrigendus erat. Scio quidem apud veteres in usu fuisse post  
 lassitudinem vnctionem, vel in sole, vel ad ignem, si hoc pacto volet  
 intelligere εἰληθῆς, verum hoc omni tempore non est perpetuum.

Vnctio. Non est in græcis codicibus impressis: aliquot autem scri-  
 pti manu habent, & sensus exigit. Quid enim est, si referatur hæc di-  
 ctio, continua, ad quietem. Multa quidem esse debet: non tamen per-  
 petua, quod συνεχὴς significat. Iam Galenus ipse & Oribasius ha-  
 bent, ἀλειβὴ συνεχὴς, hoc est, vnctio continua. Legendum itaque in  
 Paulo pro μάλα α συνεχὴς, quod est maxime continua, ἀλείμματ' α  
 συνεχῇ, vnctiones assidue. Hoc omiserat Gemusæ, qui maius curta  
 omnia & mutila aliquando in Paulo legi, quam dictione vna, aut  
 altera ex Galeno, unde hæc transcripsit, sententie autoris adiuncta:  
 vtrum maius sit peccatum, alij iudicent.

Instauratur  
lectio Pau-  
li.

Gemusæ

Apothepiæ exercitationem. Quæ tum in motu, tum in fri-  
 ctione, & pauca, & mollis, & tarda sit: præterea solum similiter ca-  
 lidum. Protinus autem in lauacra frigida exiliant, ut nimirum ipsis  
 robur, in cute vnâ cum calore constet, quæadmodum ait Galenus li-  
 bro 3. de sanitate tuenda. Lege in codice græco, ἐν τοῖς λούφοις ἐν  
 τῇς &c.

Boni succi. In codicibus impressis perperam habetur ἐν τοῖς pro  
 ἐν τοῖς. Gemusæus omisit & hoc & superius.

Corrigitur  
textus.

## IN XXI. CAPVT.

Strictio. Galenus libr. 3. de sanitate tuenda inquit, Voco ita  
 A meatuum cutis vicium, quo superuacua transmittere prohibe-  
 tur. Στρίψις græcis appellatur.

Στρίψις.

quid.

Oleumque ex. Hoc Oribasius debet. Is enim lib. 5. ad verbum  
 ex Galeno prius mutuatus erat. Verum in hoc dissentiunt, Paulus  
 habet αἰγύγιον εἰλαον, hoc est, oleum ex populo nigra confectum,

Acopum ex  
populo ni-  
gra.

V







ὁὐτάρ ἀμὰ τοῖς θερμαίνουσι, hoc est: Corrigitur autem ea calefacientibus, & humectantibus una cum calefacientibus. Superfluum est ἀμὰ τοῖς θερμαίνουσι. Oroscius & Gemusæus non aduerterunt.

Erratum  
Oroscij.

Friccio. Cum oleo scilicet adhibita, quæ vitale robur excitat, & modice calefacit, unde & distributio nutrimenti faciliior, & nutritio promptior consequitur.

Imbecilliores. Ut qui decrepita potissimum ætate sunt: et si alijs alijs celerius senectutis incommoda experiantur. Quicunq; igitur vel crudi adhuc senes. quos græci ὠμογέροντας appellant, vel decrepiti, imbecilliores viribus existunt naturalibus, ter die cibum assument, idq; hanc ob causam potissimum: nempe quod una vice multum assumere nequeunt. Deinde, etiam si sumant, concoquere nequeunt, quare melius est cibum parti in tres vices.

ὠμογέροντας  
Viridis senectus.

Ac fici maturæ. Hæ paulo innocentiores, immaturis: mediocriter tamen in usum adhibite. Ante cibum alium assumi debent, eo quod si nō citò per aluum descendant, corruptionem in ventriculo subeant, & alios secum cibos corrumpunt, id quod de omnibus fructibus fugacibus intelligendum est.

Ficum.

Per hyemem vero caricæ. Hæ incidendi, extenuandique vim habent, quo nomine aluum citant, renesq; expurgant. Cum nucibus verò simul commestæ ad omnia præstantiores existunt, atque hinc nonnulli qui medicamentorum aduersus lethalia confecturas perscripserunt, ficus aridas cum nucibus, & ruta præsumptas omnium illorum præsens esse remedium tradunt.

Si nullum in dextra. Galenus libello περὶ ἐνχυμίας καὶ λιανοχυμίας inquit: περὶ ἰσχάδων ἡ δόξα ἐστὶν ὅτι τινὲς ἐν αὐταῖς λέγων ἀληθεύειν, εἰ λιανοχύμους γὰρ ἀμὰ καὶ ἐνχυμίας αὐτὰς εἶπεν νοσῶντες τε καὶ ὑγιεῖν ἐχούσας. ἐὰν γὰρ αὐταὶ διεξίχοντο καὶ τὸ γαστήρ, καὶ ἡ ἀπ' αὐτῶν ἀναδοθεῖσα ῥοφή, διὰ τὴν δόξαν, καὶ τὴν νεφρῶν ὑγιεινὰ τε εἰσὶ καὶ ἐνχυμοὶ βραδύνουσι καὶ λιανοχυμότης αὐτὰς γίνονται. Id est: De caricis autem, si quis contraria pronunciet, vere dicere censeri queat, nempe bono maloq; esse præditas: morbidi cuiusdam & salubris participes. Si namque per aluum descendant, ac alimentum quod ab eis provenit, in corpus distributū, iecur renesq; transierit, salubres sunt, & succi benignioris: sin remorentur, prauioris quodammodo fiunt. In textu hoc Galeni habes διὰ τὴν δόξαν, quod est, per cutem, male pro διὰ τὴν ἡπείραν. Hoc in codice nuper impresso Gemusæus castigatior præterijt.

Textus  
Galeni victus.

Ante cibum. Alui subducendæ gratia: quæ etiam oliui, ut Galenus in cōmentario de alimentis docet, & damascenis sollicitatur.



Corrigitur  
Pauli lectio.

Erratum

Orosij.

φίμνα.

**Q**Vandoquidem vero. Ex quinto Oribasij sumptum est. *Græcus* textus deprauatus in Paulo est. pro *ἐπειδὴ δὲ δὲ καὶ αὐτὸς* legi debet *ἐπειδὴ δὲ δὲ τῇ ἐξ ἑ* &c. quod annotauit Orosius. Verum in hoc grauissime peccat, dum alios reprehendit quod *φίμνα* verterit frictione, cum Galenus, Paulus & Oribasius semper dictionem *φίμνα* & *ἀνάτριψιν*, pro frictione usurparint. *φίμνα* vero apud grammaticos, Suidam, Hesichium, Budeumque nostrum pro detrimento accipitur, veluti cum lapides atteruntur, aliàs aliæ res minutissima deteruntur. Quid hic commodius erit quàm puluis? qui ex medicamentis contritis effectus sit, & corpori admotus in balneo.

Erratum

Orosij.

Addidi hic, *ἀνὰ τὸν ὕδατος*, ad sensum explendum. Præterea errat Orosius, qui *λουόμενος*, id est, dum lauatur, verterit, post balneum, cum eiusmodi smegmata in balneo soleant adhiberi. Sed frictionem intelligit: quanquam ipse textus sequens eum admoneat. Nam à balneo acopi usum præscribit: in balneo, aliorum erit. Reliquit textum viciosum corrector Basilienfis.

Propomata.

Summatque propoma. *Usus* sum dictione *græca* quod ferè nulla apud latinos extet, quæ ad unguem eam referre possit. *Græci* autem vocant *ποπόματα* quæ ex vino fiunt, & melle dissimulato. Nam Paul. li. 7. inquit: *ἀλλὰ καὶ τὰ μὲν ἐξ οἴνου σιτισθῆναι, ἀπὸ τῶν ποπόματων λαλῆσαι, τὸ μέλι τὸ ἀπαραιρέειν* &c. *ἐξ αὐτῶν λαμβάνει τὸν οἶνον, καὶ σιτισθῆναι μὴ ἐξ οἴνου.*

βίος ἐν πο-  
σύνῃ.

ποσύνῃς

βίωσις.

ἐλλληνισ.

**C**ORPUS decoloratum. Vita latior, citra curas, & melancholiam actiones naturales non habet impeditas, unde sanguis primum coqui, deinde toti corpori distribui potest. *Græce* est. *βίος ἐν ποσύνῃς*, hoc est, vita lata, & iucunda: *ποσύνῃς βίωσις* est *ποσφιλής*, quod signat chara, grataq; comnestio.

Pastillos. *Græca* dictio est *λεπιδίμας*, à nullo fere grammatico exposita, Galenus autem ex Hippocrate interpretatus est *ποχίονας*, quod hic optime quadrat. Magni alioqui viri in hac voce decepti sunt, qui pro glutinantibus quibusdam rebus usurparint.

Corrigitur  
codex.

**M**EL coctum. Exemplaria *græca* deprauata sunt, habet enim *μελι μέλι ἐφθον τὸ συνθεῖν ἄγαρ*, pro *τὸ συνθεῖν ἄγαρ ἔναι*, hoc est, qd durum nimis sit: causam addit, cur mel coctum detibus noceat.

**I**N superiore ventre. Ex quinto Oribasij transcriptum est, *ἀνα-  
vertι in superiore ventre, in quo fit concoctio. In eo si diutius im-*

morem



morentur, peruicacia sunt & dura.

Ventos contrarios. Nihil oculis magis incommodat quàm ventus contrarius, eoque miror, cur Germanicus corrector mutauerit in *αἰτίους*, hoc est contrarios in *ἐν αἰτίαις*; quasi dicas cause authores

Germanicā  
impressio

## IN XXXII. CAPVT.

**P**lurimum noxæ ciborum. Similem habet sententiam Galenus in commentario Aphorismorum primo: *ἐταρ γὰρ τῷ ὀφθαλμῷ τὰ ἀγεῖα ποτῶν ἢ σιτίων το διαρρηγνύναι κινδυνὸν αὐτοῖς, ἢ καὶ ἀπνευγνύναι ἢ ἐν οὐδυναι τὸ ἐμφύλον αὐτὸ δρῦν, καθάπερ καὶ ἀπὸ πολλοῦ τινος.* Hoc est: Cum enim vasa potu, aut cibo repleta supra modum fuerint, periculum ne ea rumpantur, aut ipsi suffocentur aut etiam calidum natium ipsum extinguant.

Vomitum igitur. Post vomitum autem os colluendum, dentes, oculosque & totam faciem postea præcepit Oribasius. Id nisi fiat, dentes eis qui vomunt, computrescere. Sollicitari autem vomitus debet aqua tepida statim assumpta.

At si neque descenderit. Signa repletionis venarum commemorat. At sanguinis redundantia proprie *πληθώρα* grecis dicitur. *πληρὸν* pro omnium humorum separatim plenitudine accipitur. *πλησμονή* pro repletionetum potus, tum cibi, & ventris & venarum rursus patitur.

*πληθώρας*  
*πληρὸν*  
*πλησμονή*

## IN XXXIII. CAPVT.

**C**ibis in ventrē. Hoc sumptum est ex sexto Galeni de sanitas te tuenda. Fit autem saepe, ut cibi corrumpantur, aut nimia copia ingesti, aut qualitate praua donati, aut tempore in commodo assumpti, aut ipsius ventriculi affecti vicio. Quomodo autem corrupta educantur, Galenus ample docet. Inter cetera vomitum commendat ex vini dulcis potu. Sed Pauli textus impressus in omnibus exemplaribus deprauatus est, habet enim *ἀνδρῶν τῶν αἰσθητικῶν* pro *ἀνδρῶν τῶν αἰσθητικῶν*.

Corrigitur  
textus Pauli

Quæ medio crite purgāt. Sunt enim quædam medicamenta, quæ admodum grauitur, & magno cum naturæ detrimento purgāt. Itaque mediocria hic præcipit, quæ sæpius per intervalla sumi possint: qualis est picra dia aloes, cuius compositionem habes in septimo descriptam.

## IN XXXV. CAPVT.

**V**eneris hæc sunt commoda. Ex Oribasij lib. 1. hæc sunt transcripta. Ante commoda autem docet, quibus venus noceat: tum partibus corporis, tum temperaturis. Noxia itaque venus est inquit, pectori, pulmonibus, capiti, & nervis: item siccis natu-



ra, & frigidis. Caueri etiam debet post repletionem, cum cibi, tum vini, item post euacuationem ex vomitu factam: purgatione, & si venter sua sponte fuerit solutus. Præterea si cibus nondum sit concoctus, aut si ægritudo quædam infestat.

Eoq; melancholicis. Vide Aristotelem in problematum sectione 4. ad finem, nimirum quod flatu redundet. Semen autem decessio flatus existit. Sed quid de insanientibus dicemus, an & illi flatus habent? Ego sane opinor venerem insanientibus conuenire, quod seminis qualitas quæ virilitate & ut dicam græce θυμὸν homini conciliat, si in corporibus aliquo temperamento calidis, copiosior impertiatur, ex θυμῷ solet μανία fieri. Semine autem excreto, animus ille remittitur & qualitas imminuitur. Galen. optime de veneris usu scribit in commentario qui inscribitur, ἱατρικὴ τέχνη, verba ipsius in hunc modum habent: ἀφροδισίων δὲ ἡ ἀξία μὴ ἐπίκουρον ἔδεμια χηρὸς ὕγιεινῇ, κατὰ τὸ ἀληθὲς, ἐν διαλεγματάων τεχνικῶν ὡς ἐπὶ ταῖς χηρῶσι, μὴτε ἐν λύσει ἀποδιδόναι, καὶ λυφτόρων αὐτὴν ἑαυτὸ δόνειν γυγνῆναι, καὶ ἐν πνοῇ τὸν οὐ καλὸν τὸ χηρὸς, ἐταρ ἀνεχθῆναι μέσον ἢ τὸ ἐξ ὅθεν περισσώτερον ἀπασῶν τὸ οὖμα μὴδ' ὑπερπεληγῶμενον, μὴτ' ἐνδεῆς, μὴδ' ὑπερφυγμένον, μὴδ' ὑπερβασμένον, ἢ ὑπερβασμένον ἢ ὑπερβασμένον ἀμείψας. i. Rei venerea secundum Epicurum sane nullus ad sanitatem usus est. Sin autem verum fateri velimus, conducit, si tanto temporis intervallo exerceatur, ut ex ipsius usu nec resolutionem corpus sentiat, & leuius quam fuit euasisse, perspirantiūq; videatur. Tempus autem coeundi est, cum ex omnibus quæ foris accidunt medium exacte corpus obtinuerit, neq; videlicet repletum nimis sit, neq; inane, neq; refrigeratum impendio, neq; excelsatum: neq; siccatum, neq; humectatum immodice.

Venus corpus integrum requirit.

ἑσπεῖροι.  
ἄσπεροι.

Cæterum alij etiam. Dux dictiones contrariæ in græco ponuntur, nempe ἑσπεῖροι, & ἄσπεροι, quanquam improprie si Galeno credimus, ἄσπεροι ponitur pro ijs qui fastidio laborant. Nam id ἀσπεῖροι significat, ut superius annotatum est. Sed positum est opinor, ut ἀσπλάγην, hoc est, sine visceribus, pro eo qui parua viscera habet, ἄφων, hoc est, voce carens, pro illo, qui paruum vocem edit, ἑσπεῖροι cibi appetens. Superius nempe capite primo positum videtur pro ἑσπεῖροις ποσῶν, hoc est, cibi cupidos faciens. Nam ἑσπεῖροι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ποσῶν. καὶ ἀμαργῶσαι ἀποδιδόναι. Id est: Iam vero & labores, & longiores profectioes cibi appetentiam faciunt. Verum alius ἑσπεῖροι legendum putat.

Celsus. At vehementes. Celsus eleganter libro primo hanc sententiam ex græcis confirmat his verbis. Concubitus vero, neq; nimis concupiscendus,



aus, neque nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat, frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura, ratione etatis & corporis scire licet, eum non inutilem esse, quem corporis neque languor, neque dolor sequitur.

Antequam somnus inuadat. Ex Oribasio hæc particula sumpta est: & videri possit Galeno contraria. Is enim libro primo de sanitate tuenda ex Hippocratis sententia hunc ordinem obseruat. Labor, cibus, potus, somnus, Venus, & hæc omnia mediocria. Paulus ante somnum venerem ineundam censet, redditq; rationem non certe invalidam. Sed intelligendum est, secundum cibum, non statim, sed concoctione obita: nihil etiam refert, si somnus aliquis breuior præcesserit: sequatur autem prolixior: ex quo vires recolligentur.

Frigus superueniens. Bisariam legitur in græcis exemplaribus, Germanicum habet ἡ ψύξις αἰ ἐπερχομένη, hoc est, frigus vrgens, aut valens. Alia habent ἀδύριτομένη, quasi dicas superueniens. Ita quoque Oribasius habet. Nescio cur Gemusæus mutauerit.

Contrariæ  
sententiæ.

Varia le-  
ctio.  
Gemusæus.

## IN XXXVIII. CAPVT.

Capite grauantur & anxij fiunt. Hoc caput ex Oribasij libro primo transcriptum est. Vbi etiam græce habetur, ἡ αἰσώδης γίνεται, quod est, & anxij fiunt, conflitanturq; Orosius alios reprehendens, ex Marcelli Florentini Dioscoridis interpretis sententia vertendum censet αἰσώδης ex repletione cibum fastidientes. At Galenus in commentario libri secundi τοῦ ὁρίωνος Hippocratis hoc modo interpretatur. Αἰσώδης γὰρ γίνεται αἰσώδης τῆς καμίντου, ἢ αἰσώδης τῆς πόνου, ὅταν ἡ δύναμις τοῦ σώματος & βαρύνεται ἢ μὴ δὲν φέρει σκῆμα πένθους. ἔστω δὲ ὅταν τὸ σῶμα τῆ γαστρὸς ᾗ ἐν μολύβδῳ δάκρυον χυμῶν. οἱ πότφοι μὲν ὁδεχθῆναι δύνανται, αἰσώδης δ' εἶσιν οἱ αἰσώδεις. Id est: Cum bisariam egrotantes fiant αἰσώδης, vno quidem modo, quum virtus à corpore grauat, nullamq; eius figuram ex facili tolerat, altero autem cum os ventriculi à viciosis humoribus mordetur, priores quidem affecti sunt perniciose: alteri vero nauseabundi existunt &c. Hoc itaque Pauli contextu prior significatio accipienda est: non secunda, quandoquidē virtus seminis copia multum grauat. Deductum autem αἰσώδης est ab αἰσώ: quæ dictio frequens est apud Galenum & Hippocratem, primum ἀσφορίαν, signās: deinde fastidium acerbis humoribus stomachum rodentibus excitatum, unde & vomitus αἰσώδης dicitur. Nolo hic commemorare, quā multi etiam celebres viri in eius interpretatione sint decepti. Legendum est αἰσώδης, non αἰσώδης, quod etiam αἰσώδης & dicitur.

αἰσώδης.

Hippocrates.

Duplex si-  
gnificatus  
dictionis  
αἰσώδης.

αἰσώ quid.

αἰσώδης &.



lectio casti-  
gata.

Aliorum. In codicibus graecis impressis habetur ἀλλῶν, hoc est, sa-  
le, pro ἀλλῶν, quod est, aliorum, quam lectionem & sensus, & Ga-  
lenus in sexto de sanitate tuenda approbat. Nos antea quoque ad-  
uertimus.

lectio de-  
prauata  
Erratum  
Orosij &  
Gemusæi.

Semen viticis. Graecus codex habet καὶ σπέρμα τοῦ λίνου: hoc est  
& semen lini, pro σπέρμα τοῦ ἄγρου, quod est semen viticis. Sic etiam  
habet Oribasius. Item superius iam fecerat Paulus mentionem se-  
minis lini. Hoc non aduerterunt Orosius & Gemusæus.

IN XXXIX. CAPVT.

Orosius fal-  
so emēdat.

**P**iper myrrham cum dulci. Calida perfrictionem expertis prae-  
scribit: quae nimirum habitum ipsorum restituant. Nescio au-  
tem cur Orosius legendum hic censeat cum vino albo, cum nul-  
lum eius generis calidum sit, nec odorum, quale Paulus requirit. Me-  
lior itaque lectio cum vino dulci, quale est fuluum, frigidis aut tem-  
peramento, aut ex accidenti accommodatissimum, si Galeno credi-  
mus, & ipsi euidentiae.

IN XL. CAPVT.

ἔκστασις.  
quid.  
Celsus.

**S**I qui vero. Graece est ἔκστασις, quod ad verbum sonat adustio  
vel exustio. Galenus lib. secundo λατὰ τόπος proprie dici affir-  
mat, de ijs qui exuruntur in sole. Celsus: Si quis in sole exustus est,  
huic corpus & caput oleo persundendam.

lectio emē-  
data.  
ἀδρόως.

Paulatim. In impresso est λατὰ λόρον, quod est secundum ratio-  
nem, pro λατὰ ὀλίγον, id est palatim, cuius contrarium sequitur ἀ-  
δρόως, quod idem significat quod vniuersim, subito ac vna vice.

IN XLI. CAPVT.

Cibi valētis  
materiæ.  
πόσιμα.  
Celsus.

**C**ibos valentis materiæ. Ex quinto Oribasij traducta sunt:  
voco autem cibos valentis materiæ, quæ probe & multum nu-  
triuunt: vt Celsus alia valentis, alia inedia, alia imbecillæ mate-  
riæ, libro secundo commemorat: vocatq; valentissimum, in quo pluri-  
mum alimenti est. Graeci vocant πόσιμα.

Instaurata  
lectio.

Et iis quidem obl. Graecus codex deprauatus est, habet enim  
χαίροντι μὲν ἐπὶ τοῖς. Id est, oblectetur, neque ob hæc, pro χαί-  
ροντι δ' ἐπὶ τοῖς omīssa negatione μὲν. Sic legit Oribasius, quod  
etiam Orosius annotauit: sed Gemusæus omisit.

IN XLII. CAPVT.

Vomitum  
quot modis  
excitetur.

**Q**Voniam laboriose vomentibus. Hoc caput ex primo Ori-  
basij sumptum est. Vomitum primum victus ratione exci-  
tatur: deinde medicamenti &c. Victus ratione excitato vtuntur  
etiam in secunda quoque valetudine: præterea in acutis fere mor-  
bis



s, quum bilis, aut pituita in stomacho superat. Medicamentis vomitum facientibus, neque sani, neque acuta aegritudine occupati tententur. Nam ea longis tantum affectibus, & induratis conueniunt. Hinc etiam veteres cum nihil in medicina spei deprehendissent, ad vomitum solebant confugere. Id quod hodie etiam empirici quidam sine ulla ratione facitantes, optimis quibusque medicis laudem præripiunt. Nam ea medicamenta propinant, quæ supra & infra valentissime purgent: quæ si æger ferre possit, sanitati plurimum restituitur: sin autem moritur, audacie suæ & temeritatis patrociniū habent, quod scilicet morbus fuerit desperatus, tot medicis antea curationem frustra molitis. Ceterum quando potissimum vomitus sollicitari debeat, Polybus in libello de victu privatorum docet. Sex mensibus hybernis inquiens, vomitu, æstate clysterijs vtendum est. Quia enim per hyemen pituita in ventre generatur, vomitu eam euacuari precipit: æstate vero bilem supernatantem, deorsum reuellere. Quæ sententia Hippocrati contraria in Aphorismis videri queat: vbi habet: Aestate superiora magis, hyeme inferiora medicamentis sollicitare oportet. Hic dicemus ex sententia Galeni, totum corpus si purgare volueris, æstate per superiorem ventrem, hyeme per inferiorem medicandum est. Sicut in Aphorismis dictum inuenimus. Etenim redundantibus, purgatio medetur, illuc quod vergunt adhibita. At si ab incremento humores in parte aliqua prohibere volueris, per opposita reuellere conducit. Melancholicus autem humor quocunq; in loco fuerit, per inferiora educi debet. Ceterum alij singulis mensibus his vomunt: alij per longiora intervalla: alij nullo tempore præscripto, sed quoties aut vino, aut cibo plenior se ingurgitarint. Qui autem vomere bis in mense vult, inquit Polybus, & post eū Celsus, melius consulet, si bi duo continuarit, quàm si post quintumdecimum diem vomuerit. Galenus autem nihil referre dicit, si ex intervallo non continuatis diebus vomas. Porro vomitus quomodo medicamentis excitetur, septimo libro est comprehensum.

Ferculum ex fabis. Græce hoc vocatur *ἔτυθ*. Galenus interpretatur libello de euchymia his verbis. *ἔτυθ δὲ οὐνομάζω τὸ ἐν τῷ σπλῆνι καὶ ἐν τοῖς νεφροῖς καὶ ἐν τοῖς σπλάγχνοις* &c. Verum quod sequitur in codice *καὶ τὰ πικρὰ τῶν λεγόντων*, hoc est, & pinguiore carnes, vbi legendum censeo *καὶ τὰ πικρὰ τῶν λεγόντων*, quod est, & copiosiores carnes, scilicet fabarum. Nam ex leguminibus hæc commemorat Paulus. Non sum autem ignarus, pinguiore carnes, vt est suilla aliorumq; animalium vomitum posse excitare. Verum Orbasius nobiscum sentit & contextus requirit.

Empirici nostræ ætatis.

Polybus.

Quando vomitu vtendum. Collatio sententiarum. Quomodo totum corpus purgari debet, & quomodo pars corporis.

Humores ne crescant per opposita reuellendi. Quando vomendum.

Neglexit Oroscius.



Chyli legu-  
minum.

Verum non solum. Hoc quoque superiorem lectionem confir-  
mat. Nam χύλοι hoc est, succi seu cremores non de carnibus animalibus  
dicitur, si quid iudico, sed de leguminibus aqua maceratis: aut de her-  
bis, si mentio earum fuisset facta. Dixi autem cremores, secutus Var-  
ronem & Celsum, qui vocant cremorem ptisana, aliorumque grano-  
rum, ac leguminum.

Irrites. Parum absolute dixit irrites, digitis eo perunctis: intelli-  
ge & in os demissis.

Instaurata  
lectio.

Ne cesset vel intermittat. Manca videtur sententia græca:  
ἐμεινὸν δὲ καὶ τὸ μὴ ἀνέναι καὶ διαλείπειν ἐπὶ τοῖς ἐμέτοις, quod  
est: Eum qui vomere debet, non oportet cessare, nec intermittere. Quid  
hoc est, nisi ponatur aliquid, quod terminum eius signet? Nā hoc pa-  
cto perpetuus, vomitus, aut simile quippiā intelligi possit, quod quā-  
sit absurdum, omnes eruditi norunt, addendum ergo in codice græco  
ἀχρεῖς ἄν ἀπαύσει λυπῶνται ἐνβάλλει. id est, Donec omnia, quæ infestāt,  
eiecerit. Ut est in Oribasio, quod Oroscius & Gemusæus prae-  
runt.

Oroscius &  
Gemusæus  
nimium in  
aliorum er-  
ratis occu-  
pati.

Epithymi  
dosis: non ani-  
maduersa ab  
Oroscio.

IN XLIII. CAPVT.

**M**Ane epithymi drachmam. Nusquam inuenio minus epi-  
thymi pondus ad aluum ducendam. Alij drachmas tres pro-  
pinant, alij quatuor, alij quinque. Nec opinor drachmam vnā quip-  
piam proficere, eoque mendum forte est. Item Paulus in septimo dra-  
chmas quinque præbet. Auicenna vsque ad quatuor.

IN XLIII. CAPVT.

Varietates  
clysterum.

**C**LYSTERIBUS vtendum. Quemadmodum balneorum præfecti,  
lapidum sordes, lutumque abluunt, ita clysteres ventriculi &  
intestinorum pituitam & bilem detergent, qui pro humoris diuersi-  
tate etiam variari solent: alij præterea lenes, alij acres habentur. Itē  
triplici liquoris mensura constant. Summa est, tres heminae, media,  
duæ, minima, vna. Si Oribasio credimus, eoque miror Paulum hic se-  
miheminam ponere, quod fere apud nos dimidia libra est: quæ pa-  
rum adeo euacuabit.

Mensura.

IN XLV. CAPVT.

ἀρεῖς.  
παράλυσιν  
ἀρεῖς.

**V**Timur etiam gland. Et hoc & superius caput ex primo Ori-  
basij transcriptum est. In calce habetur græce παρὰ τοῖς αἰδοῖς  
quasi remissionibus, aut relaxationibus, vel resolutionibus. Sed πα-  
ρὰ τοῖς & παρὰ λυοῖς, ita differunt, quod illa partem aliquam corpo-  
ris obsidet: hæc vero totum corpus. Dicuntur etiam παρὰ τοῖς resoluti  
in aliquo membro.

IN



**H**VMORES in capite. De medicamentis agit quæ materiam ex capite tum per os, tum per nares detrahunt, ac potius detrahendi modum præscribit. Ac primum Græco vocabulo ἀποφλεγματισμὸν appellat. Scribonius compositione nona exponit his verbis: Si per os magis detrahere materiam visum fuerit, suadebimus pyrethri radiculam commanducare: atque subinde hiantem pati fluere saliuam. Celsus etiam lib. 4. cap. 1. explicat: Gargarizare his, quæ saliuam mouent, inquit: Nam aut manduntur ea medicamenta, aut in gargarismata adhibentur. Recte igitur interpretabimur, & Latine ἀποφλεγματίζειν, saliuam mouere. Alterum medicamentum quod per nares caput purgat, ἐρρινον vocatur. Solet enim hoc per cornu, quod εἰς ἐρχόμενος dicitur, naribus infundi. Ibi paulisper commoratur, materiam ex capite detrahit. Tertium ab illitu διαχειρόν nuncupatur, quod palato, columellæ, & narium foraminibus applicatur. Verum hoc in vniuersum intelligi debet, nullum ex comprehensis modo medicamentis esse adhibendum, nisi toto prius corpore purgato.

Sapa. Græci hoc vocant σίγαρον, & ἑψήμα. Galenus libro 3. λιγνὰ γίνν. cap. 11. ἀνείς οὐκ ἔνα τῶν φοχίωνων ἢ λυκλίσκων, ἢ ὅπως ἀνὸν μάσειν ἐθέλοι τις, ὥς ἐστὶν ὁ γὰρ λιγνὸς πολυειδὴς ἢ ἑψήμα, & ἢ σίγαρον. ἢ γὰρ ἢ τὸ τοῦ λιγνῶς ὡς ἀνὰ τοὺς βαλάντιος θίξω σοι &c. Solutio igitur vno pastillorum aut orbiculorum, aut quomodocunque vocare libet, è quorum numero etiam est qui Polyidæ ascribitur, ex Sapa, quam Græci ἑψήμα vel σίγαρον, vel quomodocunque hanc quoque velis, appellant. Est autem seræum vel hepsēma, vel sapa, ingenij non naturæ opus, musto ad tertiam vsque partem mensura decocto. Quod ubi factum ad dimidiam est, defrutum vocamus. Hec Plinius libro decimoquarto cap. nono. Idem libro vigesimo tertio, cap. secundo: Vno cognata res sapa est: musto decocto, donec tertia pars supersit. His consentit Leontinus agricultura scriptor Græcus, in hunc modum inquit: τὰ δὲ ὑπὸς λιγνίστου ξίτας ἢ, διὰ λιγνίστου ξίτας. Ἐν ῥίτῃς ἑψῶν ἢ ἀπαρτίστον. θιγέιστο ποτὶ σέκας. Hoc est: musti optimi sextarios octo, vini nobilissimi sextarios centum, ad tertiam coquens, despumansq; eximiam sapatam conficies. Columella refert quosdam partem quartam eius musti quod in vasa plumbea coniecerunt, nonnullos tertiam decoquere. Verum id ex aliorum sententia recenset. His accidit aliud sapatæ nomen Latinum, Calenum scilicet, quod deprauatum est in Palladio, mutatumq; in Caroenum, quod vir quidam non mediocriter in literis versatus putat ex Palladio

ἀποφλεγματισμὸν.

Materiam per os detrahente. saliuam mouere.

ἐρρινον.

διαχειρόν.

Sapa.

Defrutum.

Leontinus.

Calenum.



Voces confunduntur.

di seculo manasse, apud veteres tum Græcos, tum Latinos in usu non fuisse. Verum rem penitus introspectanti Calenum apud Strabonem urbs est Campanie, in cuius agro vinum optimum & dulce nascitur. Plinius libr. quartodecimo, cap. 16. ijs præponi solebant Calena. Legendum itaque censeo apud Palladium: Modus his & virtutem mutabit, & nomina. Nam defrutum à deferuendo dictum, ubi ad spissitudinem valde despumauerit, effectum est: Calenum, cum tertia perdita, duæ partes remanserint: sapa, ubi ad tertias redacta descenderit &c. Quemadmodum igitur οἰσάριον ἐψήμα, & ἐψήριον apud Hippocratem inter se confunduntur, ita apud Latinos sapa, & defrutum. Cum ipse Columella lib. 12. scribat, mustum quando dulcissimi saporis decoquitur ad tertias, & decoctum, sicut supra dixi, defrutum vocatur.

Lectio corrigitur.

Hoc non aduertit Orosius.

Quod autem ori illinitur tale est: sapo. Hoc sumptum est ex libr. 2. de Compositione medicamentorum secundum locos ad calcem: verba ita sonant: ἄλλο διαχρίσιν στόματι & σάπωνα διὰς τὸ στόματι χυλῶ χρίσας, τὰ ἑαῖα τὸ σπένδιον, καὶ τὸν λιβύα το στόματι & τὸ δ' αὐτὸ τὸ τοῦ ἑρπύωνος ἑστίν. Id est, aliud quod ori illinitur. Saponem betæ succo dilutum palati regionibus & columellæ illinito. Idem vero hoc etiā per nares infunditur &c. Deinde sequitur paulo post, ὑπορίσας δὲ πολλὰς ἐχρησάμενος φαρμάκων ἐγχέμενος τῇ ῥίνι μελανθίω, ὥστε μὴ ὀξὺν ἀραιῶ διαβρίχωμεν πρὸς μᾶλλον ἡμέρας, ἅτα τῇ ὑστέρα οὐκ ὀξὺν πάλιν λείωμεν, καὶ ἐν χέει εἰς τὸν ῥίνα διὰ τῶν μυελῶν. Hoc est, facili autem paratu subinde usus sum medicamento melanthio, quod naribus infunditur, interim sane aceto acri pridie macerans, deinde postero die ex aceto rursus lenigans, infundensque narium foraminibus &c. Ex priore igitur contextu Galeni, Pauli lectio corrigenda venit, legendumque pro σίνιπτι, quod est sinapi, σάπων, hoc est sapo. Cui lectioni astipulatur etiam Oribasius lib. 1. Est autem teste Plinio Sapo gallorum inuentum rutilandus capillis, ex seuo & cinere, liquidus & spissus. Hoc non aduertit Orosius, tam seuerus aliorum castigat.

#### IN XLVII. CAPVT.

**Q**uæcunque vrinæ ciendæ sunt. Omnia ex Oribasio pene descripta sunt, nisi quod post rutam, addit Oribasius, aut anethi radices vstæ, aut cinis earum cum melle. Caterum quibus de causis menses retineantur interim, tertio libro abunde condiscēs.

Vulvæ subiiciuntur. Græci vocant medicamenta proprie, quæ lana excepta naturalibus conduntur, ὑπερδίστα, quales sunt pessi disti, aut penicilla, collyriæque, ut apud Aristotelem in 2. de generatione



ione: τὰς δὲ γυναικας βασανίζου τοῖς τε προδίοις, καὶ διῆνῶνται  
 εἰς οὐμὰς πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ δύραθεν λιάνων ἀνω: καὶ τοῖς ἐγχρίστοις.

Hoc est, mulieres autē ijs quæ vuluæ insinuatur, explorant, nūc odores  
 ad spiritū qui foris aduenit, ab infernis partibus sursum perueniant:  
 tem ijs quæ illinuntur &c. quod Hippocrates ex suffitu aromaticum  
 ad nares & os delato cognosci tradit. Ceterum προδία veniunt à προδία.

verbo προσθιδαι, quod priuatim signat, subijci naturalibus mu- προσθιδαι  
 lierum. Dioscorides lib. I. cap. I. προσθιδαι ὅς ὡς κολλύριον μετὰ μέ-

λιτ & ἐμβρυα λιάνοι. Hoc est: radices iridis collyrij modo cum

melle naturalibus foeminarum subiecta foetus excutiunt. Hinc etiam

προδία derivantur, idem quod πρόδία, significantia Dio-

scorides de costa loquens, δύναμις δὲ ἐχθιμύων ἀγῶν, καὶ τῶν

πρὶ πλὴν ὑστέρων παθῶν ἀγῶν, ἐν προδίασι, λιάνοι.

καὶ τοιαῖοι, quod Latine sonat: Menstrua vero educit, & vuluæ

affectibus medetur, in pesis subiecta, supersusionibus & fomentis.

Quemadmodum igitur προσθιδαι apud Græcos usurpatur, ita

subijcere, apud idoneos Latine scriptura scriptores. Id quod ex Celso

licet deprehendere, lib. 5. cap. 21. ubi habet: Sed alia quoque utilia sunt,

ut ea quæ foeminis subijciunt: τῶν οὖν Græci vocant.

Aut allium. Lege in codice Græco ἡ οὐρόδου λέων προσθιδαι, non ut

habetur impressum ἡ οὐρόδου λέων προσθιδαι. Id nec O-

roscius, nec Gemusæus aduertit.

Subiicere.

Oroscius hoc  
 neglexit.

## IN XLVIII. CAPVT.

Sudorem eliciunt. Quemadmodum aluus quotidie respondens,

& vrina, aliaque recrementa reddita sanitati faciunt, ita sudor

etiam cum opus est, effusus, non mediocriter corpus conseruat. Ex ci-

bo igitur dum concoquitur, duo recrementa generantur, alterum,

quod crassius est, crassioribus intestinis transmittitur, alterum quod

tenuius, cum chylo adhuc fertur. In iocinore chylus in sanguinem con-

uersus, ad cauam venam transit. Quem ubi serosi illi humores, quod

excrementum tenue appellauit, eò traduxerint, non conuenit, ut diu-

tius in corpore maneant, ideoque renes cauæ venæ non procul à iocino-

re adherent, qui illos recipiant, pauco sanè adhuc aquoso humore san-

guini permixto, vehiculi causa, qui & ipse purgari per cutis meatus

debet, vocaturque sudor. Si itaque copiosior successu temporis collectus

fuerit, ut iam onus venis existat, artificio elici debet, natura videli-

cet cessante, vel ob meatuum densitatem, vel ob aliam causam. Scri-

bit itaque remedia quedam Aegineta, quæ ex Oribasio omnia mu-

tuatus est.

Recrementa.

Sudor quo  
 modo gene-  
 retur.

Simi



Orosius nō  
aduertit.

Similiter inspersa. Codex impressus uterque habet ἐμπλασμένη, quod est emplāstri modo adhibita pro ἐμπασμένη, id est, inspersa. Non enim simplicia enumerata, materiam habent, quæ illini possit. Orosius & Gemusæus præterierunt, in aliorum erratis castigandis occupati.

## IN XLIX. CAPVT.

**L**audatissimus. Quemadmodum vino, escis exercitatione, vigilijs, somno ac venere, alijs alias vti pro ratione et aetate expedit, ita de aëre quoque iudicandum, quem optimum in pulmones trahere, omnibus iuxta salubre est. Transcriptum est hoc caput pene ad verbum ex Gale. i. de sanitate tuenda, & Oribasio.

Pestilentem auram exhalante. In codice impresso habet ἀγλην τήν αὐραν ἀναπνέοντα, hoc est exitialem perflatum sursum mittente. Galenus vnde hac mutuatus est, ἀποπνέοντα habet, quod est, respirante, exhalante: quanquam parum refert, hoc, vel illo modo legas.

Nota morbo-  
rum publice  
grassantiū.

Hoc igitur modo. Hippocrates iudicium hoc maximū in morborum causis cognoscendis tradit: nempe si omnes, cuiuscumque aetatis ac temperaturæ fuerint, morbis conflentur, aërem autorem esse intelligemus: ut postea in secundo volumine discas.

## IN L. CAPVT.

In lib. de eu-  
chymia & ca-  
eochymia.

**A**quarum. Ex eodem Galeni loco hac transcripta sunt. Autor autem hic noster ad sanitatem tuendam etiam aquæ bonæ vsum facere testatur. Si quidem fit interim, ut alibi Galenus memoria prodit, ut totus exercitus prauæ aquæ usu de vita periclitetur.

ἀτέραννα.

ἀτέραννον  
ὕδωρ.

Aegræ concoctionis. In Græco ἀτέραννα male pro ἀτέραννα legitur. Quæ dictio proprie de leguminibus dicitur: nempe concoctis difficilibus ob duriciem. Galenus in libello, quomodo boni maliq; succi generantur, in hunc modum ait: ἐνία δὲ τῶν ἀνικνύοντων σπέρματων, ὅς ἐστιν ὁ κῆδος τῶν φασφάντων ἐφ' ἑαυτὰς ἀνικνύοντες ἀτέραννα τὰ τοιαῦτα τῶν παλαιῶν ἑλλήνων τινές, id est: Nonnulla vero cerealia semina nequaquam solent intumescere, cum coquuntur, vocarunt autem eiusmodi ex veteribus Græcis nonnulli ἀτέραννα, quasi dicas rebellia, peruiaciaq;. Aristoteles ἀτέραννον ὕδωρ pro cruda aqua dixit in quarto de generatione animalium διὸ καὶ ἀτέραννα ὕδατα, καὶ ψυχρὰ, τὰ μὲν ἀτεκνία ποιεῖ, τὰ δὲ θηλυγονία. Hoc est: Quare etiam cruda aqua, & frigida partim sterilitatem, partim sœmellatum procreationem efficit. Ceterum ἀτέραννον habet  
contr



contrarium, τέραμον. Theophrastus in octauo: τὸ δὲ τέραμον, καὶ τέραμον.  
τέραμον λέγεται ἐπὶ ὀπίων μόνον. Quod est: Teramum & atera-  
um de leguminibus tantum dicitur.

Aut terram colatur puram. Paulus non habet, puram, sed  
Galenus vnde hac transcripsit, integra sententia sic habet: ὡς δὲ οὖν  
πρὸς τὰς ἀνατολὰς ἐρρώγασιν αἱ πνεύματα, καὶ διὰ τὸ οὗτος τινὲς  
γῆς διηθῶν λίαν ἀρᾶς. &c Hoc est: Ut quarum ad Orientem solem  
ons erumpit, & per meatum quendam aut terram puram colatur.

Instaurata

lectio.

Non aduer-

tit Oroscius.

## IN LI. CAPVT.

Rigidam lauationem. Hoc est in aqua frigida lauationem,  
quam Græci ψυχρολουσίαν vocant. Celsus libro primo frigide  
lauiam lauationis meminit. Aestate aptissima sunt & caro, & olus,  
motioq; dilutissima, frigida lautio. Hac non omni conuenit etati,  
sed ubi iam corpus iustam impleuerit magnitudinem. Nam in adu-  
lescente, incrementum eius remoratur. Hoc quoq; ex Oribasij libro  
citato transcriptum est.

Frigida la-

uatio.

Iis qui nullo victus. Qui enim cibis crassi succi, maliq; vfi sunt,  
statim ex frigida meatus occluduntur, per quos discuti, euocariq;  
debeant. Græce est πρὸς ὑχόν quod signat, ut contigerit, nulla ra-  
tione habita, quemadmodum faciunt, qui nec debito tempore, nec pro  
nature modo, aut exercentur, aut cibum sumunt. Exacte autem vi-  
uunt, qui exercitationes ante cibum moderatas subeunt, & quam-  
diu libet, ut ait Galenus dormiunt, ad concoctionem scilicet obeun-  
dam, nec balneis à cibo vtuntur, postremo qui cibos medij tenuium,  
crassorumq; ordinis assumunt, quales sunt exquisitissimi, maximeq;  
inculpati, tanquam in symmetria excessuum constituti. Huius ge-  
neris sunt panes optime elaborati, carnes gallinarum, gallorum, a-  
uium, phasianorum, perdicum, columbarum, attagenarū, turturum,  
turdorum, merularum, omniumq; passerulorum, praterea piscium  
saxatiliū. Quauquam qui plurimis exercitationibus vtuntur, ut  
agricole, nautæ, aliq; id genus tam exacto victu opus non habent,  
quippe caloris beneficio qui laboribus excitatur, etiam crassi succi ci-  
bos tuto assumunt.

Exacte viuē-

tes qui,

Porro multis. Qui nimirum sole feruente iter fecerunt, aut la-  
boris quid subierunt, totum corpus stipule modo aridum habentes, q;  
ubi in aquam frigidam se proiecerint, iuuantur: potissimum qui va-  
lentibus sunt viribus, & frigido soli assueti.

## IN LII. CAPVT.

Naturalium balneorum. Vocantur balnea naturalia, quæ Balineæ na-  
sua sponte talia proueniunt: alia calida per se, alia calefiunt. turalia.

Galen



**Differentia.** Galenus libro primo de simplici medicina illorum mentionem facit. Plinius lib. 31. cap. 6. ubi in hunc modum habet: Est autem utilis sulphurata nervis, aluminata paralyticis, aut simili morbo soluta. Bituminata, aut nitrosa utilis est bibendo atque purgationibus. Plerique in gloria ducunt plurimis horis perpeti calorem earum, quod est inimicissimum: namque paulo diutius quam balneis uti oportet. **Hactenus**

**Vsus.** Plinius. In Germania certe plurimis horis quotidie utuntur, nec a cibo potuque interim abstinent, corpore etiam nullam antea euacuationem per medicamenta experto, quod contra omnem rationem est, praeterea vno balneo et paralytici, et sanguinem spuentes et lienosi, alijque affectibus obnoxij utuntur.

**Aquarum naturalium.** Sola aqua potabilis teste Galeno humida est. Ceterarum nulla humectare potest, quod videlicet non sint exacte aqua, sed mixta et adulterata, accepto nimirum aut alumine, aut chalcitro, aut sale, aut id genus aliquo.

## IN LIII. CAPVT.

sic etiam Polybus de ratione priuationum.

Quaestio cur hyeme laborandum magis.

**N**on alienum est. Celsus ex Hippocrate eleganter transitulit eandem fere sententiam: Eo tempore anni inquit, calidis omnibus potius utendum est, vel calorem mouentibus.

**Pluribus uti laboribus.** Querere aliquis possit, cur pluribus utendum laboribus per hyemem, cum calor ipse genuinus sit amplior tunc quam alio tempore, testimonio etiam Hippocratis, qui ait ventres hyeme et vere calidissimi sunt. Ex calore autem concoctio optima, inde probus sanguis, ex hoc autem omnes corporis partes aluntur. Quare paucioribus laboribus hoc tempore quam alio utendum est. Si quidem calor naturalis per se copiosus, et efficax, non opus habet ut plus nunc excitetur quam in ipsa aestate, aut alia anni parte.

**Solutio.**

Huic quaestioni sic respondere non dubitem. Calidissimi quidem ventres hyeme existunt, naturali calore, hoc est, temperatissimi. Particulae autem corporis magis refrigerantur hyeme, ac nonnullis ad ventris usque regiones penetrat. Quapropter etiam si probe concocti sint in ventriculo cibi, non tamen exactam in iecinore mutationem recipiunt, sed aliquatenus ea frustrantur. Praeterea totius corporis venae ab aere circumfluo refrigeratae haud similiter ipsos transmutant. Accedit ciborum copia, quam tunc una cum pituitosioribus qualitatibus assumunt: unde etiam humor crudus colligitur, qui laboribus et exterioribus particulis recalefacientibus concoqui, digerique debet.

**Polybus.**

Plus esse. Hippocrates, aut Polybus eius discipulus ait: το

μᾶλλον



ὅτι χαμῶν & ἰδίον ὡς πλεῖστα, πίνειν δὲ ὡς ἐλάχιστα. εἶναι δὲ  
 τὸ πῶμα ὀνυρ ὡς ἀνγυτέσσον. quod Celsus in hunc modum in- Celsus,  
 terpretatur. Hyeme plus esse minus, sed meracius bibere conuenit.

Vere autem ineunte. Vide libellum Galeni, cui titulus est,  
 quos & quando purgare oportet.

A laboribus conquiescendum. Intellige ὅς quibus per hyemem  
 usus fueris. Semper enim exercitatio corporis necessaria, verum mi-  
 nor nunc, & facilior, ne calor naturalis, qui à sole tunc euocatur,  
 etiam per hanc magis dissipetur.

At in autumnō. Celsus eadem fere habet: per autumnū, inquiens  
 propter cibi varietatem, periculum maximum est. Itaq; neq; sine ve-  
 ste, neq; sine calciamentis prodire oportet, præcipueq; diebus frigidiōri-  
 bus, neq; sub diuo nocte dormire, aut certe bene operiri.

Poma. Græce est ὀπώρας. Nam pomum generale vocabulum est, ὀπώρας.

& quicquid apud Græcos opora continet, complectitur. Discrimen ἀκρόδρυα.

ponit Democritus inter oporas & acrodrya. Quicquid herbaceo fru-  
 ctu viret lignosi nihil exterius habens, vt duracina, pyra, mala dama-  
 scena, pruna, opora, apud Græcos dicitur. Acrodrya verò contra no-  
 minantur, quæ putamen exterius, lignosumq; fructum continent, vt  
 malum punicum, castanea, pistacea, nuces, vtrunq; genus Salgami

nomine complectuntur latini, à quo Salgamarius originem duxit.  
 Celsus eodem loco iam citato: poma inquit, nocere quidam putant: quæ  
 immodice toto die plerunq; sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo  
 remittatur, ita non hæc, sed consummatio omnium nocet. Galen. opti-

Celsus,  
 Poma.

Galenus,

me vtriusq; vocis significatum exprimit Commentario περὶ ἐνχυ-  
 μίας καὶ λιποχυμίας, in hunc modū: τῶν δ' ἄλλων οἱ μὲν ὠρεῖται  
 λιποχύμιοι λιάρποι, λιποχύμιοι πάντες. ἰὰρ δὲ διαφθαρέσιν ἐν τῇ  
 γαστρὶ φαρμάκων ἀλλήλων πλεονέχοντες, ὥστε καὶ τὰ μῶρα. ἢ  
 δ' ὀνομάζουσιν ἰδίως οἱ Ἕλληες ὀπώραν ἐν σῶματι καὶ σαφελῶς ὄντα,  
 ἀμείνων μὲν ὅτι τῶν εἰρημένων. & τὰ δ' ἄλλα τὰ ἀκρόδρυα ἐλθὼν  
 λιποχύμια ὄντα &c. Hoc est, aliarum vero arborum fructus fugaces,  
 omnes, maligni sunt. Sin autem in ventre computruerint, medicamē-  
 ti venenosi naturā induunt, sicut & mora, &c. Quam autem Græ-  
 ci proprie nominant oporam, ficubus & vuis comprehensam, prædictis  
 est potior. Plinius compositionem quandam Oporinen appellat ex  
 fructibus generatam, vt confundat differentiam quæ inter oporam  
 & acrodrya existit. Tu igitur si voles oporam fructus omnes appella-  
 bis ὠρεῖταις λιάρποις, horarios fructus.

Post æquinoctium. Intellige autumnale, quod ad octauum ca-  
 lendas Octobres, vel ad sextum incipit, vt Florentinus Agricultu-  
 X



Quando pur-  
gandum,

re scriptor memoriæ prodidit. Consultit itaq; Paulus, ut si forte humores vel melancholici, vel adusti in corpore redissent, ante hyemem in autumno purgentur. Siquidem bis corpus in anno recte euacuatur, si plethoricum sanguinis dimissione: si malis scatet succis, purgatione. Vere, humorum qui ex hyeme sunt contracti: autumno, qui ex æstate reliqui retentionem sunt experti. Quare in duobus æquinoctiis fere, sani corporis euacuationem moliemur, ad futurorum accidentium præcautionem.

## IN LIIII. CAPVT.

Omnis mutatio subita  
noxia est.

Consuetis  
aliquid tri-  
buendum.

Dens.

Rari.

ἐν δὲ ἀπὸ τοῦ  
ἐστίν.

**F**acili præditus. Hoc caput ex libro primo Oribasij sumptum est. Vult autem Paulus in omni vitæ genere, ut semper consuetis utamur. Quod enim contra consuetudinem est, nocet. Neque enim ex nimio labore, subitum ocium, neque ex nimio ocio subitus labor sine graui noxa est. Qui igitur in laboribus vitam agunt, si facile ferunt, mutationem non consulit. Qui in otio degunt, sani neq; hi ad labores sunt cogendi. Siquidem natura consuetis gaudet. Verum ut mediocris exercitatio summum corpori præsidium conciliat, ita ocium, extremum adfert malum, ut alibi Galenus ait, præsertim si corpus densum, quod non ex facili diffletur, contigerit: sin autem natura est rarum, perspiratu non impedito, aptisque nutritur humoribus, etiam si non exercitetur, vix morbis est opportunum. Siquidem per meatus, quicquid fuliginosum viscosumq; fuerit, diffletur, expelliturq; ac qui talem corporis constitutionem, fabricationemq; habent, à græcis vocantur ἐν δὲ ἀπὸ τοῦ ἐστίν. Exercitium hoc loco intelliges, ex præscripto institutum, quod multi ante cibum, uti expedit, subire nequeunt ciuilibus negotiis, aut alijs etiam districti. Quis igitur si meatuum cutis raritas et amplitudo fauet, etiam sine exercitio, sanitate aliquandiu fui licet.

Imo nec eos. Hippocrates hanc sententiam in aphorismorum secundo confirmat: τὰ ἢ ἐν πολλῇ χρόνῳ συνήθεια, λέειν ἢ χεῖρω τὸ αὐτὸν ὑποῦν, ἢ αὐτὸν ἐν οὐχέῳ εἶναι. Hoc est: Quæ longo tempore consueuerunt, etiam si insuetis sint deteriora, minus molestare solent. Nec ea de exercitijs tantum, sed omnibus quæ ad corpus attinent, accipienda veniunt.

Necessitas  
purgationū  
contra eos  
qui nunquā  
medicinā  
docent.

In omnibus autem his. Galenus id libello περὶ ἐνχυρίων, καὶ λενοχυρίων probat in hunc modum: Multi eiusmodi vitæ institutum sequuntur, ut ipsis non liceat, vel ante cibum probè exercitari, vel satis opportune cibum sumere, vel alimenta feliciter concoquere: qui sane à morbis immunes permanere non possunt, nisi ex intervallo  
alii



si subductione sibi prospiciant: interim purgatione, cum tempestiua  
anguinis detractioe etc. Quamquam Paulus etiam intelligit vt  
quotidie aluus bis, aut certe semel respondeat inculpate pro assum-  
ptorum ratione. Id nisi fiat, certe sollicitandam esse docuimus.

## IN LVI. CAPVT.

**V**omitionibus. Quandoquidem plerisq; necessitas incidit, nauis  
gio per mare proficiscendi, Paulus etiam hic remedia malis ob-  
uenientibus enumerare voluit; Oribasium secutus libro quinto: facit  
vini mentionem, quod maxime stomacho vomitionibus turba-  
re conuenit. Vocat autem graece διδάριον quasi dicas villum, sicut etiā  
διδάριον τὸ ἀπὸ μέλιτος & pro oxymelite.

Polentae polline. Hoc est tenuiore parte farinae ordeaceae tostae. Pollen po-  
toco autem pollinem cuiuscunq; partem subtiliorem, non tantum fa-  
rinae triticeae, vt putat Orosius. Nam Celsus, Scriboniusque thuris  
pollinis meminit. Plinius preparationem eius lib. 18. cap. 7. docet: Po-  
tentam quoque graeci non aliunde praefertunt. Pluribus fit haec modis.  
Graeci persusum aqua ordeum siccant nocte vna, ac postero die fri-  
gunt: deinde molis frangunt. Galenus libro primo de alimentis, de no-  
uello ordeo tosto intelligit. Graeci pollentam ἀλφιτον nominant: tenuio  
rem eius partem, ἀλφίτου παύλην.

## IN LVII. CAPVT.

**Q**uam immodice corpus. Ex Oribasio quinto, methodi vero  
Galenī decimoquarto haec fere transcripsit. Caterum medici  
officium est, vt intemperies corrigere, continui diuortium, committe-  
re, ita quoque amputare, & praescindere, quod magnitudine, vel nu-  
mero redundat, reficere autem, & fingere quod desit. Verbi causa,  
cum corpus ex corpulentia eò deuenit, vt nec ingredi sine molestia,  
nec sedem propter ventris molem contingere, nec respirare libere possit,  
hanc liquare & tollere, aequae nimirum, vt quando corpus ali desi-  
nit, huic quoque reficiendo prospicere. Paul. graece dixit ἐταρ εἰς πο-  
λυσαφ-  
λυσαφίαν ἀμείψον ἐν παύλῃ τὸ σῶμα. Hoc est: Cum corpus in cor-  
pulentiam immodicam deuenierit. Celsus plenum corpus dicit & obe-  
sum.

Calidior & siccior. Graecus codex non habet καὶ ξυπότιστα, id Lectio casti-  
est & siccior. Ex Galeno autem addendum venit, quod Gemuseus gata.  
praeterit.

Citas exercitationes. Graece dixit Paulus ὁξεία γυμνάσια, quod ad ὁξεία.



*ταχέα.* verbum sonat, acuta exercitia. Galenus in commentario libelli de ratione victus privatorum interpretatur fere quod decimoquarto docuit: ἡ ταχέα λίγυσις τὸν δρμασίαν ἐπιπλεον ἀνξάνουσα τίνες τὸ σῶμα. Quod est: Velox motus calorem amplius augens, corpus liquat. Idem igitur est ὀξία, & ταχέα. Celsus cursum, multam obambulationem, omnemq; vehementem exercitationem ponit.

*λεπτασάρκους.* Iuuat itidem crassos insolatus. Crassos hic intelligo, quos graeci λεπτασάρκους, πολυσάρκους, παχείας nominant. His opponuntur λεπτοί, ισχυροί, λεπτοίς, ισχυροί, & λεπτοί, ισχυροί, & παχέες. Celsus contrarios inter se vocat, plenum, & tenuem, gracilem & obesum. Insolatus autem, graece dicitur ἡλίωσις, quod Celsus interpretatus est sol inurens: & omnis calor, quanquam Oroscio id non placeat, homini in bonis authoribus parum versato.

*Fallitur Oroscius*

Præbire autem non debent. Hoc intelligendum est nimirum, ne cibus statim in corpore distribuatur. Contrariam plane sententiam habes apud Polybum: quam Celsus deinde interpretatus est: sed non nihil euariat. Graece primum sic habetur: καὶ τοῖς σιτίοισιν ἀδικοῦσιν, προπεπνυμένους δὲν λεπτὰ μένουν, καὶ μὴ πρὸν σφόδρα ψυχρόν, hoc est: Et cibos ag gredi, vino prius temperato, & non admodum frigido assumpto. Celsus inquit, semel die assumptæ epulae, & vini non perfrigidi potio ieiuno in consuetudinem adducta. Galenus autem sententiam corrigens, dicit legendum μὴ ὅλως δόρυμόν, quod est, neq; omnino calidi.

*μονοσιτήν.*

Semel tantum die. Graeci hoc vocant μονοσιτήν. Galenus autem in commentario nuper citato locum hunc quasi corrigat, ἀλλοιοῦ, inquiens ἂν ἢ ἐπὶ ὁδοῦ πρὸς αὐτῷ μὴ μονοσιτήν, ἀλλὰ ὀλιγοσιτήν, hoc est: Præstaret dictum ab eo fuisse, non semel epulas assumere, sed modicas. Quidam enim ex ijs qui semel tantum cibum sumunt, multo plus ingerunt, quàm qui bis capiunt.

*ὀλιγοσιτήν.*  
Galenus non  
semel modice.

#### IN LVIII. CAPVT.

*Vina crassa.* **Q**Uum extenuatos. Hoc caput ex decimoquarto Methodi Galeni sumptum est. Commemorat autem victus rationem extenuatis accommodam, primum quidem vinum crassum, cuiusmodi sunt nigra & fulua Italica vel Asiana, aut etiam Hispana. Linacer autem methodi interpres vertit δινον παχόν, vinum pingue, qua ratione, vel quem secutus autorem nescio. Dicuntur autem vina crassa, quæ succum crassum habent, multumque alunt. Cibus autem crassi succi, qualis est, alica, porcina caro, panes furnacei, & textuacei, tragus, oua, lac, caseus, magnaq; piscium pars. Qui cibi crassi,

*Linacri locus.*

*Crassi succi  
cibus.*



crassi, omnes ad nutriendū sunt valentissimi: & si probe in ventriculo ac iocinore concocti fuerint, sanguinem benignū generare solent.

Exercitatio modica. Omnia exemplaria Pauli impressa habent γυμνάσια δὲ βραδύτα. Hoc est, exercitia autem lenta: & optime quadrat lectio superiori sententiae, quae de crassis extenuandis habetur, nempe huic, Citas exercitationes. Galenus autem in Methodo, omnibus codicibus attestantibus, legit βραχέα, hoc est, modica. Celsus in simili sententia de replendis tenuibus dicit conuenire, modicā exercitationem. Rursus Galenus in commentario superius citato dicit extenuatis eadem fere ex usu esse: οὕτω γάρ, inquit, ἢ τὰ γυμνάσια, βραχέα τε γυμνάσια, ἢ βραδύτα, ἢ μετὰ ῥοφήν. Quod est: Ita vero etiam exercitia, & pauca, & lenta, & post cibum habebit. Sume igitur vitramus lectionem. Ego secutus sum Galenum in methodo, unde haec sunt descripta.

Contrarij 163  
ci.

A pud Poly-  
bum.

Deinde frictione dura. Haec sententia & mutila, & deprauata existit in Paulo. Quid enim per haec verba intelligas: λιπαρὰ σκληρὰ μὴ πολλὰ πιδύσας τὸ δέριον &c. Corrigenda instaurandaq; est ex Galeni libro sexto de sanitate tuenda, in hunc modum: λιπαρὰ ῥιψὶ σκληρὰ μὴ πολλὰ πιδύσας τὸ δέριον. Hoc est: Et postea frictione dura non multa cogentes cutem, quo densa, duraq; euadat. Haec Orosius & castigator Basiliensis non aduerterunt.

lectio emendata.

Orosius.  
Castigator  
Basiliensis

Iis qui pallido. Iram, motusque animi praecipit decoloratis, ut videlicet inde sanguis in exteriores partes irahatur: sicut alij quibusdam medicamentis eo alliciunt.

## IN LIX. CAPVT.

Extenuantur plerunq; vide Galenum in decimoquarto Methodi medendi, ubi etiam horū curationem plenius persequitur. Picationis mentionem facit, quae πικρῶς dicitur graecis, hoc est, pice membris oblita: hyeme bis, aestate semel, idq; frigidis & humidis, aut utroq; temperamento simul donatis. Nam siccis & calidis eiusmodi medicamenta adhiberi non debent.

πικρῶς

## IN LXI. CAPVT.

Dentient, incrementq;. Hoc & superius caput, ex commentario Galeni sumptum est, qui ars medicinalis inscribitur. Deest autem in codicibus Pauli impressis dictio ἡγεῖ, in capitis principio. Lege igitur τοῦτε ὀδόντας φύσει δάκτυλον, ἢ ἀνυβύσσειται. Hoc est: Dentes citius producent, & augebuntur.

Instaurata  
lectio.

Is ob consuetudinem. Puta liberaliorem cibum sumptum cōtinue, ocii, totamq; deniq; victus rationē: quod apud Galenum λήττα συμβέβηκός, hoc est, secundum accidens, contrarium huic vocat λάρτα.

Consuetudo  
acquisita na-  
tura.



φύσει, ex natura. Veluti alij nati grandioribus venis, corpore ad gracilitatem idoneo ex ocio diuturno, cibisq; tum validis tum copiosis crassescunt, alij exilibus venis praediti ex labore assiduo, curis, vigilijsq; & cibis extenuantibus vsi in obesitatem prolabuntur.

Instaurata  
lectio.

Hoc etiam  
aduertit  
Orosius.

Nigri ipsis pili existunt. In codicibus Pauli impressis haec tota sententia desideratur: planèque ut adsit, necessaria ad disputationem de temperaturis videtur. Nam altera diuisionis pars existit. Repone igitur ex Galeno in arte medicinali in hunc modum post οὐκ ὀλίγω θέρμότερον. μέλαινα δ' αὐτοῖς αἱ φίχες, καὶ ἡ σὰρξ ἀπίμελη. αἱ δ' ὀλίγω μὲν αἰὲν θέρμότερα, παμπόλῳ ἢ ὑγρότερα, μαλακὰ τούτοις ὅτι ἡ σὰρξ καὶ πολλὰ, καὶ τὸ χροῖμα συμμιγὲς ἐξ ὀρυθρῆ καὶ λευκῆ. καὶ ψαρόντων ὀλίγω θέρμότερα.

Restitutus  
locus.

Color autem & capilli. Hic quoque mutilus est codex graecus, habetur enim: τὰ δὲ τῶν φυχῶν τὸ χροῖμα, pro τὰ ἢ τῶν τευχῶν, καὶ τὸ χροῖμα. Nec aduertit hoc Gemussem. Color itaq; totius corporis, hoc est albus, maxime erit, si illud vehementer fuerit frigidum, capilli quoq; rarissimi enascentur, si illud tale fuerit: sin minus, minus illa quoque erunt intensa. Hoc itaque est pro proportione.

#### IN LXII. CAPVT.

EXiguum sane caput. Haec quoq; ex arte medica Galeni transcripta sunt. Pravam, inquit, cerebri structuram indicat. Nam quod in tentorijs praestant pali quos graeci λιάμανας appellant, & in aedibus parietes, id nimirum in animalibus ossium substantia. Quippe ad huius imitationem cetera omnia in animante solent effingi, mutariq;: ut si caluaria sit rotunda, necessario cerebrum tale fuerit: quemadmodum etiam si oblonga sit, talem quoq; figuram cerebrum induet. Si itaq; paruum est caput, ea quae ossibus adherent, exigua, aut mutila esse conijcimus.

Figura perfecta.

Figura. Nempe quae ad oblongae sphaerae potissimum similitudinem structa est. Alia vero capitis figura vertice acuminato, qualem Thersites habebat apud Homerum, deprauata est. Naturalis itaque, priorem ac posteriorem partem prominentiorem habet. Deprauata, altera eminentiarum caret. Interim utraque: quare etiam suturas praeter naturam habet.

Si optime sit disposita. Galenus dicit: Si validam habet ceruicem, alijsq; ossibus optime sit constituta.

Plerumq; igitur. Retuli ad eminentias. Nam figuram non potest. Vult itaque Paulus nonnunquam etiam fieri, ut capita etiam bona existant, quamuis eminentiae à naturae modo recesserint.

#### IN LXIII. CAPVT.

Min



**M**inimeque ab omnibus exteris. Ex eodem Galeni commentario sumptum est: dicit autem exteris, quod idem sibi vult ac si dicas, extrinsecus accidētibus quæ calefaciunt, refrigerant, siccant, & humectant. De pilis etiā in libris de facultatibus naturalibus comprehensa à Galeno reperias.

Summatim circa. In fine capituli hæc clausula habetur. Sonat autē græce ταχύνηροι τὰ πρὶ τὸν κεφαλὴν ἀπὸ τῆς εἰσῆς. Hoc est ad verbum: Cito senescunt in ijs omnibus quæ circa caput sunt. Quasi dicas: Omnes capitis partes potissimum, mature senium testantur.

## IN LXIII. CAPVT.

**F**luctuationes. Sic interpretatus sum græcam dictionem κλύδωνες λυδωνες. Ventrliculi est parum ea quæ ingesta sunt, comprehendētis, concoquentisq; fluctuationes experiri. Male impressum est in Galeno græco nuper edito Basileæ, λυδωνες pro κλύδωνες.

Calidis cibis. In impresso codice erat, πολλοῖς pro δέμοις. Nec aduertit Gemusæus, tot manu scripta exemplaria iactans. Gale- Castigatus  
locus  
num vide in arte medicinali.

## IN LXV. CAPVT.

**N**on modo ventriculus. Ex eodē Galeni libro, eodēq; fere loco transscripta sunt. Post hæc autē verba: Cor, pulmo, et iecur, sentētia Pauli manca videtur, quidquid Gemusæus dixerit de epitome. Quid enim est, quinetiā bibētes, nō cessant, vel vt græce dicā, οὐ μὲν δὴ καὶ πίνοντες οὐ πίνοντες, nisi alia præcesserint? Integra igitur sentētia apud Galenū sic habet: ὁ μόνον ἢ λυδὼν τῆς καὶ ἀδύ-  
φας ὁρᾷ, καὶ ψυχρὰ καὶ θερμὰ πίνοντες, ἀλλὰ καὶ τὰ  
κατὰ τὸν σπλάγχνα κατὰ τὸν πνεύμονα: ἀλλ' οἷον διὰ τὸν  
τόντον θερμότης καὶ ψυχρότης, εἰσπνέουσι τε πλεον, ἐκφυσσοῦσι τε μα-  
κρόν, αἰδανόντες τε κατὰ τὸν σπλάγχνα το καύματι, ὅτι ὅσοι οἱ  
διὰ τὸν γαστέρα κατὰ τὸν σπλάγχνα, καὶ οἱ πίνοντες, ὅτι οἱ οἱ  
συχάσσοι. Hoc est vt interpretatus sum, restitue igitur, si videtur cō-  
dicē: Prius tātū erat: Nō solū, vētriculus sitim vel adfert, vel arcet,  
ac frigide calideq; potionis appetētiā facit, sed etiā quæ in thorace cō-  
tinētur viscera, cor, pulmo, & iecur. Quinetiā si biberint, nō statim  
sine desinūt etc. Quā integra hæc sit oratio, doctis indicādū relinquo,  
meo certe iudicio apponēda videtur, quæ ego textui inserui ex Gale-  
no. Miror Oroscium hunc locum præterisse: Gemusæū autē non casti-  
gasse ex veteribus exemplaribus quibus se abundare sepius triumphat.

Recrementa ipsi interueniunt. Hoc est, crassæ humidi-  
tates & pituitosæ arteriam asperam, per quam vox editur, inter-  
cipiunt. Græcum verbum est ἐν σπλάγχνα τοῖς. Aliis signat, insidet, ἐν σπλάγχνα



inherescunt, si Græcorum grammaticis fidem accommodamus

## IN LXVI. CAPVT.

Omisit  
Orosius.

Lectiones ca-  
stigate.

**A**C præcordiorum regio. Hoc est qua præcordia incipiunt. Græcus codex habet: καὶ τῶν ἡαβ' πρὸ χένδεον ὅσα τούτοις πλῆσιον, quasi dicas ad verbum: Et præcordiorum quæ his propinqua sunt. Hoc est, & partes præcordiorum his pectoribus vicinæ hirsutæ sunt. Mox sequitur: Magna vero ex parte quod textus græcus in impresso tantum his verbis continet: ὡς ἐπιτοπολὺ καὶ τὸ, pro ὡς ὑδιτοπολὺ δὲ καὶ, atq; sic corrigitur. Paulo post: Quinetiam, in græco impresso est καὶ μὲν γὰρ καὶ ἔτι, tu corrige ex Galeno καὶ μὲν τοι καὶ ἔτι, requirente id sensu. Rursus pusillanimes, negligentes, pectore glabro, codex græcus plane deprauatus est. Habet enim ἀτολμοι, καὶ μάλιστα εἰς φίλον αὐτοῖς τὸ ἔρπον, pro ἀτολμοι καὶ ἀμέληται, καὶ φίλον. Hæc Gemusæus castigatorem non aduertit, sic nec superiora Orosius.

## IN LXVII. CAPVT.

Locus casti-  
gatus.

**H**oc caput etiam ex eodem Galeni commentario, ut superiora quæ de temperaturis agunt, quasi transcriptum est. Ceterum in clausula venæ duriores, græcus codex deprauatus est. Habet enim αἱ φλέβες ξυραὶ, quod est venæ sicca, pro αἱ φλέβες σκληρότεραι. Hoc est venæ duriores.

## IN LXVIII. CAPVT.

Lectio casti-  
gata.

**P**orro si humiditas calori fuerit coniuncta, hispidos quidem minus, tales. Vtrunque exemplar impressum mutilum est, desideratur enim ἡ τῶν. Nam legendum est, σωματικῶς δὲ ὑγρότητι καὶ τῇ θερμότητι, λάσιον μὲν ἡ τῶν οἱ τοῖστοι. Hoc Gemusæus præterijt.

## IN LXX. CAPVT.

Motus cele-  
res.

**Q**uum itaque calida. Totum hoc caput ex sexto Galeni de sanitate tuenda iuxta principium, & Oribasij quinto sumptum est: conuenit autem recte ut postquam temperaturarum notas descripserit, intemperierum remedia subiungat.

Solicitude & vigiliæ. Post has dictiones, καὶ λυγίστων ἀπα-  
σῶν ὁξέων. Hoc est, & omnes celeres motus. Sic enim verto ὁξέων, quod est acutum. Recte autem dixit celeres motus: ut qui corpus calefaciant impensius.

Instaurata  
lectio.

Humidæ & calidæ natura. In græcis codicibus impressis, tantum humidæ, habetur. Legendum autem ex Galeno, sensu id requirente: αἱ δὲ ὑγραὶ καὶ θερμαὶ τῇ φύσει. &c. Quod est: Humidæ vero & calidæ natura. Nam ubiq; apud Galenum habes, humidæ & calidæ



lida natura, putredini sunt obnoxia, quod lib. I. de febrium differen- Calida & hu-  
tijs hisce verbis confirmat: τοιούτοις αὖ οὐκ ἔστιν ὅσα θέρμα, mida.  
ἡγεῖν ὑγρὰ. Hoc est: Nam omnia quæ calida & humida sunt, facilli-  
me computrescunt.

Rheumaticis, plethoricisque. Vfus sum græcis dictionibus ope-  
ra dedita, quod medicis admodum sint familiares. Poteram autem di-  
xisse, fluxionum & redundantie morbis, quemadmodum Linacrus.  
Sed nescio quid energia habent voces græcicæ.

Porro defluxionibus. Recte quadrat. Nam superius dixit, rheu ἀπὸ ῥοιῶν.  
maticis patent morbis. Vocantur autem græcis ἀπὸ ῥοιῶν corporis de-  
fluxus, nunc in hanc nunc in illam partem: quales experiri sepe so-  
lent humidi temperamento & calidi.

Lauacris, multa exerc. Trifariam hæc lectio apud autores va-  
riat: apud Paulum habetur: ἀπορροίων ἢ προνοῶν καὶ διὰ τε λου-  
σίων καὶ γυμνασίων πολλῶν καὶ πρὸ ψαφῶν. Hoc est: Defluxionibus  
prospiciendum est, lauacris, exercitijs multis, & ante cibum &c. Ori-  
basius legit καὶ τῶν ἀπορροίων ἢ προνοῶν καὶ διὰ τε λούσων καὶ  
γυμνασίων πολλῶν &c. consentit fere cum Paulo. Galenus autē in  
hunc modum ait: ὥς τε καὶ τῶν ἀδισταδῶν τῶ τοιούτῳ σώματι τῶ  
ἀπορροίων προνοῶν καὶ διὰ τε γυμνασίων ὥς ἐφ' ἑαυτῶν, καὶ λούσων,  
καὶ ψαφῶν πολλῶν, ἵκεν ὥς τε τῶν δι' ἑσθίων, καὶ γαστρὸς γινόμενων  
&c. Hoc est, Quare qui huiusmodi corpori tuendo præficitur, prospi-  
cere ijs debet quæ ab ipso defluunt, tum exercitijs ut dixi, tum balneis  
& cibis pluribus, tum vero ijs quæ per ventrem & vrinas reddun-  
tur, excernendis &c. In hac oratione mendū plane est: quid enim sibi  
vult, cibis pluribus? cū corpus defluxionibus opportunum, sobriam po-  
tius viuendi rationem requirat, quàm multorum ciborum ingestio-  
nem qui ipsi sæpius fluxiones solent excitare. Legendum itaque exi-  
stimo in codice græco λούσων πρὸ ψαφῶν πολλῶν, quod est: Laua-  
cris ante cibum pluribus. Nam ut exercitatio cibum precedens, ita  
balneum quodq; superflua corporis discutit, subsequens autem cibos, cru-  
ditatem, eoq; prædicta symptomata procreat. Sed cui auctori assentie-  
mur, alius habet pluribus balneis, alius, pluribus, exercitijs. Superius  
semel dixerat, multa exercitatione, eoq; hic etiā referendū puto dictio-  
nē pluribus, ad exercitijs. Hæc nō aduertit Gemusæus nec Orosius.

Lectio nota  
tu digna in-  
staurata.

Omisit  
Orosius.

## IN LXXI. CAPVT.

Inter frigidas. Hoc totum caput ex sexto libro Galeni de sani-  
tate tuenda sumptum est: ex Oribasij autem quinto. Enumerat  
autem tres frigide intemperiei differentias, frigidam & siccam, fri-  
gidam & humidam, frigidam & mediocrem in siccitate & humi-



Iocus refti-  
tutus.

ditate. Harum singularum remedia ordine enumerat. Inter quæ Paulus recenset ἀλσίατε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ λεπτότερα, quod est balnei abſtinentia, exercitia plura, & tenuiora. Vbi legendum exiſtimo ex Galeno, ſenſu id exigente. ἀλσίατε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ διάτῃ λεπτότερα, hoc eſt: Balnei abſtinentia, exercitia plura, et victus ratio tenuior. Hoc præterierunt Oroſ. & Gemuſæus.

I N L X X I I . C A P V T .

Caſtigatōr  
Baſilienſis.

**I**ntemperies ſicca. Hoc autem caput ex ſeptimo methodi ad verbum transcriptum eſt: vbi docet, quæ poſſimum intemperies, ſeu alterationes facilius reparari queant. Enumerat autem ſiccitatis differentias tres: quas etiam alibi comprehendit. Verum Pauli codex græcus ſtatim in principio capitis deprauatus eſt. Habet enim ἡ δὲ ἡ ὑποπαχὺς ὑσσίας πρὸς ταύτας. Quod nihil fere ſignificat. Corrigitur igitur in hunc modum: ἡ δὲ τῶν ἐν ἡ ὑποπαχὺς ὑσσίας σποδωτῶν, καὶ ἐν ἡ ὑποπαχὺς, καὶ ἡ ὑποπαχὺς πρὸς ταύτας. In textu latino ſum interpretatus græca, quæ deſiderabantur. Caſtigatōr Baſilienſis hoc quoque præterijt.

Ex humore concreto. Galenus addit, ſicut caro & adeps, Paulus compendij cauſa omiſit. Cæterum caro & adeps nihil aliud ſunt, quàm humor concretus: caro quidem, ſanguis, vi aſſimilatrice in carnem redactus: adeps autem humor extra vaſa elapſus, ex frigidityte congelat ſcit, concreſcitq;.

Chondrum ptiſanæ modo. Chondrus omnino fit ex χεα, vt in ſequentibus docebitur.

Ptiſana, à πtiſαν duxit originem, quod ordeum vnde præparatur, tundendo deglubatur, ac ſuo cortice caſtratum, vſui ſeruetur. Hordeum mundatū officinæ vocant: tunditur enim hoc, nec molitur.

πτιſανος.  
πτιſανός.

Quo picatores vtuntur. Vnguentum hoc alias dropax vocatur, quod picem recipit. Vide Paulum, in ſeptimo ad calcem. Solet partibus emacraſis adhiberi. Adminiſtratio græcis πτιſανος, quaſi picatio: qui adhibent πτιſανός dicuntur,

Codex Græ-  
cus reſtitu-  
tus.

Omiſerunt  
ariſtarchi.

Iam vero multæ. Græcus codex non habet ἀλφιδῆ, hoc eſt, multæ: verum ſenſus exigit, vt contraria opponantur ſibi ἀλφιδῆς καὶ μέτερον. Sic etiam Galenus habet: μινύδω δ' ἐφ' ἑξὺς ἀλφιδῆς ἐν ἑνὶ τῷ λιθάρῳ πρὸς ταύτας, καὶ πρὸς τὴν πολλὰν θερμότητα. Hoc eſt: Ab hinc vero iuncta ſit multæ ſiccitati vt dictum eſt, non admodum multa caliditas. In ſequenti ſententia, reſtitue græcum codicem, ac lege: ἔτι μὲν ἡ τοιαύτης πικρῆς πλὴν πρὸς τὴν ἀγρωὴν φυλάξουσιν. Quæ Oroſcius, & caſtigatores Baſilienſes omiſerunt.

Tepid



Tepidos lactis modo. In Græco codice est, χλιαρά δὲ τὰ ἐλίσ-  
ματ' αὐτῆς καὶ γαλακτῶδιν. Hoc est, Tepidos autem cibos & lacteos offe-  
remus. Galenus lib. 7 Methodi dictionem γαλακτῶδιν interpretatur,  
χλιαρά δὲ, inquit, τὰ ἐλίσματ' αὐτῆς προσοίσομεν ἅ καλεῖται ἐλίσ-  
τοις ἰατροῖς γαλακτῶδιν, quod est: Tepidos autē cibos offeremus, quos  
medicis vocare lacteos consuetudo est. Idem libro vndecimo Aetij  
τὰ ἀλβὴλὰ καὶ τῇ λιπαρόει γαλακτῶδιν. Hoc est albulae, & tempera-  
mento lacteae balineae, quod est, tepidae lactis iam emulsi modo. Cel-  
sus tales cibos, lib. 4. cap. 11. in hunc modum inquit: Aqua neq; ea  
ipsa frigida, sed potius egelida danda est. Ibidem: Si vero tormina  
sunt, oportet frigidis & humidis fomentis stomachum fouere: vel si  
venter dolet, ἢ sdem egelidus, sic ut venter ipse mediocriter calentibus  
inuenitur.

Quæ sint ga-  
lactode.

Egelida.

Quod si ad vomitum sint idonei. In Græco codice mutilatus  
locus est, in hunc modum: εἰ δ' ἰδιότητος ἔχῃ. διὰ ῥα φανίδων ἐμέ-  
τω, adde post ἔχῃ dictiones duas πρὸς ἐμέτην, quod Gemusæus ca-  
stigator non aduertit, volens in compendio eiusmodi intelligi.

Restitutus  
locus.

## IN LXXIII. CAPVT.

**Q**Uæ igitur attenuandi. Olim veteres maiore vim in victus  
ratione ponebant, quàm in medicamentis: vbi vel humor vi-  
ciosus emendandus, vel morbo venienti erat prospiciendum: alia ni-  
mirum ratione, quàm huius seculi Medici facitantes: qui statim  
cum quis de particula aliqua conqueritur, ad valentissima etiam  
medicamenta confugiunt. Caterum Paulus noster hæc ex commenta-  
rio Galeni cui titulus est, de ἵς quæ bonum malumve humorem gi-  
gnunt sumpsisse videtur. Habet ille in hunc modum: καὶ διὰ  
τὸ τοῖς ἰατροῖς εὐρίθην τὰ κληθέντα πρὸς αὐτῶν ὑγιενὰ φάρμακα  
καὶ λεπτοῦς ἀπαῖα διωάμεως ὄντα. τοῖς γὰρ ἔργον ὅτιν, ἐν-  
φράττει μὴ τὰς σφαῖρας διεξίδῃς, ἀπορροῦν δὲ τὸ προπλάττει-  
νον γλίσχρον ἐν τῇ χυμῶν τοῖς ἀγείοις, τίμνει δὲ καὶ λεπτοῦν τὰ  
παχέα τῶν ὑγρῶν, ἀλλ' ἔαν πλεονάσῃ τε ἐν αὐτοῖς, ὁρῶδες, ἢ πι-  
κρόχολον ἐν τῷ χρόνῳ, ἢ μελαγχολικὸν ὁρῶσται τὸ αἷμα. Hoc est:  
Quamobrem medici salubria ab ipsis vocata medicamenta inuene-  
runt, omnia facultatis attenuatorie: siquidem munus ipsorum est ar-  
ctos transitus patientiores reddere, succorum lentorem vasis adhare-  
scentem abstergere: humorum crassitiem incidere atq; extenuare. Sin  
autē serosum quippiam in eis redundet, vel sanguinem biliosum tem-  
poris interuallo, vel melancholicum efficiunt &c. Sunt autem medi-  
camenta salubria, cibi loco medicamentorum sumpti, quibus per sani-  
tatem utimur.

Salubria me-  
dicamenta  
quæ.

Porro



Porro quæ incrassandi. Ex eodem commentario transcripta sunt, ubi in istum modum habet: τὰ ἢ τὸς παχῆς ἢ γλισχρὸς γυνῶν ἴατε χυμὸς ἰσχυρὰ καὶ ῥοφίμωτά τε πάντ' ἔστι, λίαν πεφθῆναι δὲ ἴσως ἐν τῇ γαστρὶ, καὶ τῷ ἥπατι, καὶ τῷ αἵματι γυνῶν πεφθῆναι, ἀμυμπετότατα δὲ τῶν ἰσχυμάτων ὑπάρχοντα τὰ μεταξὺ τῶν λεπτωτέρων τῶν παχυτέρων. Quod est: Cibi vero crassos, viscososq; humores generantes, omnes & valentissime sunt materia, & si probe in ventriculo, & hepate fuerint concocti, benignum generare sanguinem assolent: verum inculpatissimi inter cibos sunt, qui tenuium, crassorumq; mediū habentur.

Qui sese exercent, & quantum libet. Galenus hæc ita habet: ὅσοις μὲν καὶ ἀνθρώποις δύνανται ἐν γυμνασίοις τε πελάσει καὶ ἵππῳ, καὶ ἡμιμάδαι μέχρις ὅτε ἂν ἐθέλωσι, καὶ βίον ἐξω τῶν πολιτικῶν ἀσχολιῶν ἡρώτων τούτοις ἐγχαρῆ, καὶ τὰ παχύχυμα καὶ γλισχρὰ τῶν ἰσχυμάτων ἐδίδου. Hoc est: Quibus itaque exercitijs pluribus uti licet, & quam diu libet dormire: ad hæc qui vitam civilibus negotijs vacantem degunt, & cibos crassi succi, & viscosos tuto assument.

Porro quemadmodum. Ad verbum ex eodem loco transcripta sunt. Galenus autem addit rationem: neutiquam enim, inquit, aliquis agrotabit, si opportune prospiciat, ne concoctione nunquam frustretur, nec exercitatio, ne a cibo validam quandam ambulationem subeat. Quippe sicut exercitatio cibos præcedens, plurimum conseruanda sanitati cōducit: sic qualibet secundum cibos commotio, nocentissima est. Nam alimentum antequam sit concoctione elaboratum, ex ventriculo distribuitur. Vnde crudorum humorum copia in venis collecta, omnigenas morborum species procreare solet, nisi protinus labore assiduo fuerint discussi, vel concocti, ac in sanguinem commutati.

Varia ciborum genera. Plinius lib. II. c. 52. Homini cibus utilissimus simplex. Aceruatio saporū pestifera, et cōdimēta perniciosiora.

#### IN LXXIII. CAPVT.

**L**actuca. Ex libris de alimentorum facultatibus fere mutatus est omnia Paulus. Itaq; cum dicit, eoq; somnum accersit, intellige, vesperi commanducata, ut Galenus uti solebat. Valenter nutrit, græca dictio est ῥόφιμ, quasi dicas, nutriens valde, sic enim docti interpretantur vocem istam.

Ita boni succi. Galenus, cum alia omnia olera paucissimum sanguinem generent, sola lactuca non multum quidem nec viciosum gignit, non tamen absolute ὑγροῦς, hoc est boni succi, laudabilem & benignum.

Intybum. Alias græcis σέπλις dicitur, in satium & agrestem diuiditur. Quamquam græci per cichoreum tam domesticum quam agre



egrestem intelligant. Sativus intybus duplex, vnus latioribus folijs, Intybus.  
lactuca similia, quem nos endiuia, corrupto nimirum vocabulo ap-  
pellamus. Alter, folijs strictioribus, multis capillamentis per radi-  
cem transeuntibus. Hoc loco intybum, intellige potissimum, quā vul-  
go Endiuia nominamus, in acetarijs vsitatam.

Endiuia.

Brassica marina. Forte ea est herba, quam officinae soldanellam  
vocant circa maritima nascentem, nisi Dioscorides folia longa bras-  
sica huic attribuisset, quæ in Soldanella non sunt: aut longitudo de fo- Soldanella.  
liorum ordine venit intelligenda.

Blitum & atriplex. Blitum olus rubrum quod in cultis se attol-  
lit, cuius folia iuribus incocta sic ea inficiunt rubore, vt nigelli vini  
dilutum colorem representet: à quo rubrum olus etiam ab olitoribus  
vulgo vocari. Radice non vna nititur, sed contra ceterorum fere ole-  
rum morem multiplici, proluxa, non in rectum tendente, betaceis fron-  
dibus, sine acrimonia satuis, semen corticeum profert racematim sin-  
gulis ramis insidens. Atriplex flore aureo prodit, caule interdum  
purpureo, interdum candicante, ramoso, folio bliti, cum pubescit her-  
baceo, cum senescit, flammeo, nonnunquam in luteum languescente,  
semine foliaceo, simplici radice in altum ascendente, ex quo multæ se  
promunt. Dicitur etiam Dioscoridi Chrysolacanium.

Chrysolaca-  
num.

Scolymos. Paulus & Aetius scolymon à cinara diremunt:  
hanc officere stomacho, illum prodesse iudicantes. Idem etiam Gale-  
nus, ex quo sua mutuati sunt illi, in 2. de alimentorum facultatibus  
testatur. Alij tamen Greci nullum aliud inter hæc discrimen po-  
nunt, quàm quod scolymos serus sit, & syluester: cinara vero, domi-  
ta cultu, feritate exuta, mitior & altis: cuius cibus, licet stomacho sit  
grauis, non protinus à scolymis natura, viribusq; degenerauit. Ve-  
rum ex coctura noxam, quam prius referebat, amolitur: ijs additis  
quæ etiam Galenus enumerat.

Atractylis. Hæc duas habet species, vna mitior est cnico satiuo  
similior, caule rectiore ac rigido, exili. Itaque pro colo antiquæ mu-  
lieres utebantur, atque hanc proprie atractylida nominabant, semi-  
ne candido, grandi amaro. Ab officinis dicitur hodie syluestris car-  
tamus. Quibusdam sanguinea virga nominatur quod vulso ramu-  
lo cruorem modicum profundat. Altera species hirsuta caulibus son-  
chi, torosis, humi reptantibus, semine minuto, frequenti, amaro, &  
pilis barbato, flore luteo, vt prior. Cruor etiam ex vulnere secti exit:  
hæc officinis vocatur cardus benedictus.

Syluestris  
cartamus.Cardus be-  
nedictus.

Apium hipposelinum, sion, smyrnion. Quum apium absolute  
apud autores ponitur hortense venit intelligendum, quod vulgo Pe-  
trose



roselinum dicitur. Semina quæ à pharmacopolis passim venduntur, eleoselini sunt, id est, palustris apij. Hipposelinum à Romanis olus atrum dicitur, non autem ab equis nomen sumpsit, ut quidam voluerunt, sed à magnitudine sua. Nam apud Græcos ἵππος in compositione solam magnitudinem signat, in ijs maxime rebus, quibus nihil peculiare habet. Id quibusdam putatur apij, quod Galli, Ache, Germani eppich nominant, Ferrariæ vulgo appellant apium Macedonicum. Dissentiunt autores in Hipposelino & Smyrnio. Alij Hipposelinum, olus atrum nominant, alij smyrnion, quidam diuersa olea hæc iudicant, quidam eadem. Nam Plinius ait: Olus atrum hipposelinum Græci vocant, alij smyrnion. Theophrastus idem videtur cum Plinio dixisse. Galenus smyrnion olus atrum vocat, Romanorum secutus nomenclaturam. Dioscorides & Plinius de ijs priuatim ut genere diuersis egerunt. Forte ea herba est, quam Galli leuechram nominant. Sion, Latinis dicitur Lauer, frutice pusillo, in profluentibus aquis emicante, habitu subrecto, pinguiq; latius ac luxuriantibus folijs, olus atro similibus, minoribus tantum, odoratisq; Officina berulam vocant.

Berula.

Eruca. Notissima herba est, in acetarijs utimur, ob gustus acrimoniam. Græci ἐρσμορον, Galli Raquetam appellant.

Ocymum. Recentiores Græci, qui de re herbaria scripserunt, basilicum, hoc est, regium appellant: quod nomen apud omnes fere nationes hodie usurpatum videmus.

Gingidium.  
Chærefoliū.

Gingidium simile est scandici. Gingidium forte est herba eam quam vulgo Chærefolium appellant: non autem quam Plinius Chærephyllon nominat. Olus fuit Pauli & Gal. temporibus tritissimum in usu. Scandix syluestre olus est, ac vilissimum, si Plauto credimus.

## IN LXXV. CAPVT.

Asparagus.

Asparagus. Per hanc dictionem intelligi volo, quæ primum in lucem prodeunt olerum germina, priusq; in folia explicentur, recentissimosq; turiones qui edendo sunt. In summa, primos cauliculorum partus comprehendo.

## IN LXXVI. CAPVT.

Bulbi.

Bulbi. Bulborum facies, ut olim veteribus fuit cognita, ita nunc maxime cum officinis, tum medicis, pace eruditorum dixerim, incognita est. Sunt autem cepæ modo tunicati, & fronde cepicia, tereti, angusta, in mucronem desinente, cauliculo dodrantali, in cuius fastigio flos emicat purpureus, ut in scilla circumactus. Agri Gallici, appetitus appellationem indiderunt, quod merā excitent cibi auaritatem. Verum genus hoc quod in hortis copiosiore coma viret, nucleis  
graci



gracilioribus nunc porretam, nunc vnionetam à porri, vel vnionis, tum sapore, tum forma vocant. At non solum propria cuidam plantæ bulbi nomen inditum est, verum etiam rotundæ radices suis membranis tunicatæ Bulbi nominantur, siue pluribus capitulis coagmententur, vno folliculo omnes ambiente, siue quadantenus distinctæ separantur, quales sunt croci, liliorum, narcissi, scyllæ, &c.

Pastinacæ vero, dauci & cari. Ad verbum ex Galeni libro citato transcripta sunt. Pastinacæ species satis sunt cognitæ. Dauci vero & cari non item. Sunt porrò tres Dauci species à Dioscoride descriptæ: quam hodie in officinis habemus, syluestris pastinaca est, vt sapor, odor & tota delinatio ostendunt. Nulla autem dauci species apud Dioscoridem pastinaca syluestris est, sed tertia tantum huic comparatur muscario. Verus Daucus ex Creta exportari debet. Huius semina & radices in vsum medicum veniunt: aliarum specierum semina tantum. Quia vero Dauci & syluestris pastinacæ eadem propemodum vires existunt, ea pro dauco vti licebit.

Officinarū  
daucus.

Verus Dau-  
cus.

Cari. Officinæ carui dicunt Serapionem suum, aliosq; Barbariæ scriptores secutæ. Non tamen semen hoc carui quod Pharmacopola vendunt, respondet Serapionis descriptioni, quippe crassius hoc esse dicit quàm cyminum, officinarum autem multo minus cymino est. Caros igitur forte vna ex nostratibus dauci speciebus erit, si semē etiam à Dioscoride exiguum descriptum, respiciamus.

Cari.

Ampeloprasum. Caule prosilit bicubitali, folijs porraceis, sed angustioribus, flore candido, radice bulbosa. Provenit in vinetis, unde à natalibus ampeloprason quasi viti gineum porrum Græcis nominatur. Nostrates officinæ vineale porrum appellant.

Porrum vi-  
neæ.

## IN LXXVII. CAPVT.

**T**Vbera. Hæc ex terræ sagina conglobantur, sine medulla, vena, cortice, solo vndiq; circumdata, nullis fibris, nullisq; capillamentis nixa, nec extuberante loco in quo gignuntur, aut rimā agente, nec ipsa terræ coherent. Galli hæc trusla nominant. Itali Zuneſta tarenſola. Vere effodiuntur, nec vltra annum durant.

Fungi. Istorum origo prima è limo & acescente succo madentis terræ, aut radicis ferme glandiferæ. Initio spuma lentior, dein corpus membrana simile, mox partus. Cortice, medulla, neruo, vena carent.

## IN LXXVIII. CAPVT.

**C**Hondrus. Magna scriptorum recetiorum dissensio est, & adhuc sub indice lis est. Num scilicet chondrus & halica diuersa inter se sint, cum apud Paulum distinctim scribantur, an idem, cum apud autores Græcos chondrus, pro halica Romana sæpius ponatur.

Chondrus.  
Halica.

Apud



Apud recentiores autem Græcos ambæ dictiones coniungantur: Vt in Aetij sermone 9. cap. 10. in hunc modum: Ποπὺν δὲ διδόναι χόνδρον ἄλιν & μετ' οὗτος λόγος. Quibus verbis præcipit cibum dari chondrum alicæcum vino albo. Item disceptatur, an hæc semina sint naturalia per se, an potius res facticia. Certe quantum ad primam controuersiam attinet, collatis multorum autorum scriptis, chondrus videtur antiquorum in usu fuisse, si Galeno de victus ratione in morbis acutis credimus, quanquam libr. 1. de alimentis nomen eius apud antiquos perrarum fuisse prodat, ut fere sibi ipse contrarius videatur. Alicæ vero teste Plinio, res Romana est, neque Pompeij magni etate in usu fuisse traditur, nec pridem excogitata. Paulus noster ambo quasi consimilis usus ac facultatis, frequenter coniungit, ut lib. 3. cap. 31. ἕτοιμα δὲ σοὶ ἄλιν & πλῆθος ἐν ψυχρῷ, ἢ ἄλιν, ἢ χόνδρον &. Id est: Panis tibi esto lotus è frigida, vel alicæ, vel chondrus. Sic itaque colligo, ut secunda quoque discordia dirimatur, chondrum & alicæ eisdem fere modis fieri, non autem semina, aut fruges esse per se. Paulus autem dicit alicæ chondro in omnibus respondere, nisi quod ventrem magis astringat. Nimirum propterea quod chondrus fiat ex Zea, quæ Italis & quibusdam Germanis spelta nominatur hodie. Frumenti genus inter triticum & hordeum mediū. Alicæ vero ex tritico fiat, quicquid dicat Palladius de hordeo seminaturo. Ea hodie nobis puls frumentacea vocatur: ptisanæ cremori colatitio similis. Errant qui alicæ ex Zea, chondrum ex tritico fieri autumant. De chondro consulant Dioscoridem & Constantinum libr. 3. de re rustica. Interim videas apud veteres hæc duo confundi, ut quod alicæ tribuendum sit, chondro tribuant. Inueniasq; varias vel chondri, vel alicæ conficiendæ rationes. Non etiam audiendi sunt, qui far apud Romanos dictum, chondrum esse arbitrantur: cum & ipsum far testimonio Archigenis frumenti quedam sit preparatio, ex Zea nimirum & frumento. Plinius testatur populum Romanum farre tantum ex frumento tercentum annis usum fuisse.

**Panes.** Inter panes firmissimus. Usus sum dictione Celsiana, firmissimus, pro eo quod est alimenti plurimum præstans, quanquam in comparandi gradu Ποπιμώτερον habeatur.

**Syncomistus.** Syncomiston. Hunc alio nomine Galenus autopyron appellat, quod ex omnibus suæ farine partibus citra ullam detractionem constet, inter furfuraceum & similageum mediū, syncomistos quasi confusaneus dictus, quoniam castratus non sit, sed omnia simul trilerit, furfures, vtriculos & similam.

**Polenta.** Vide Galenum lib. 1. de alimentis, ubi polentam quam Græci



Græci ἀλφίτα nominant, recenset, ex hordeo nouello mediocriter to-  
sto fieri. eamq; veteres militibus panis loco dare solebant.

Maza. Cum polenta liquore conspergitur, atq; subigitur, maza Maza.  
appellationem assumit: Hinc quidam eruditus offam appellat.

Oryza. Hoc frumenti genus Gallicum, Germanicumq; vulgus Oryza.  
detrahta priore litera Riζon appellant.

## IN LXXIX. CAPVT.

EX leguminibus. Legumina, inquit Galenus ea ex cerealibus Legumina.  
seminibus appellant, quæ panificio non accommodantur, vtpu-  
ta fabæ, pisa, cicera olentes lupinum, oryza, eruum &c. Galenus vocat  
ῥόπαλα & χεδόπα.

## IN LXXX. CAPVT.

DE temporariis. Sic interpretatus sum ὥραϊς: quasi dicas hora- ὥρα.  
rios. Nam Galenus cateriq; græci id anni tempus, horā appel- ὥραι.  
lant: in quo medio canicula sidus oritur, ad quadraginta vsque dies Fructus.  
perdurans, quo tempore omnes temporarij fructus, aut tempestiui, vt  
Plinius ait, proueniunt. At Galenus non solum horarios dici cen-  
set, quod eo tempore nascentur, sed vt à conditaneis discernantur. Sic  
etiam Plinius apposite dixit, de persico, quia nō aliud fugacius. Hoc Fructus fu-  
est quod minus duret. gaces.

Omnia poma. Grace est ὄλυ ὀπωρία. Sic antea interpretatus  
sum quicquid herbaceo fructu viret, lignosi nihil exterius habens.  
Proprie vero Galenus oporam nominat libello ὡς ἐν ὀχυμίας ἡγεῖ  
λενοχυμίας, ficus & ruas: vt Paulus sequenti capite etiam indicat.

## IN LXXXI. CAPVT.

EX cerasiis. Galenus commentario iam citato in hunc modum  
de tempestiuis illis fructibus præcepit. Sunt autem arborei pro-  
pe dixerim vniuersi fructus, viciosis succis donati, præter quas vocant  
castaneas. Hæ si quidem exactam in ventriculo concoctionem ade-  
ptæ, nutriunt, verum succis crassioribus: malis nequaquam. Aliarum  
arborum fructus temporarij omnes maligni sunt, nam si in ventricu-  
lo computrescant, medicamenti deleteri naturam fere induunt, sicut  
& mora, licet ea persicis dictis & prunis moderatiora sunt. Tamen  
corruptelam nihilominus illic prauam sustinent &c. De usu horum  
paulo post ait: A viciosis semper abstinendum, nisi cum agroti æsta-  
te totius corporis siccitatem caloremque emendare conantur. Conue-  
niunt enim tunc poma, pira mora, cerasia adsumpta. Cucumer vero,  
pepo, & melopepo, item præcocia dicta, vel persica modice tunc man-  
ducari debent.

Aliquando  
viciosis uten-  
dum.

In vniuersum, astringentia. Vide Galenum lib. 2. de alimen-

T



tis: ubi rationem tradit, cur rei hori cuidam astringentibus sumptis post alios cibos laxantes venter fuerit solutus. Ibiq; hæc Pauli sententia copiosius explicatur.

Primæ mensæ qui cibi conueniunt.

Eoque primum exhiberi debent. Idem Galenus libro supra nominato confirmat in hunc modum. Omnes cibi qui prauum succum cum humiditate, & lubricitate obtinent, ex facili descendunt, eoq; prima mensa sumi debent.

Duracina.

Constantinus.

Druppa.

Pistacea.

Phistica officinar.

Sirica. Vide an recentiores cum veteribus conueniant.

Duracina. Sunt qui lectione hanc deprauatam putant, velintq; legi pro duracina, rhodacina nulla plane ratione valida nitentes. Galen. quidem & alij vetustiores hoc vocabuli non usurpant, verum recentiores graeci, uti Paulus, hoc cum Rhomanis commune habent. Vocantur autem duracina, quod corpus ipsorum pertinacius ossi hereat, quam ut auelli queat. Graeci Δωρακινά, vel Δωρακινά dicunt, latini nos fere imitati. Constantinus li. 10. de agricultura. τὸ Δωρακινὸν ταχέως ὑπάρσνον. Paulo post, ὁ πῦρ δὲ τοῦ αἵματος τὰ Δωρακινά, ὅσα φυτόν τινος τὰ φυτόν.

Druppa. Plinius lib. 13. ca. 26. Oleum & Omphacium est. Fit duobus generibus, & totidem modis ex olea & vite: olea adhuc alba expressa, deterius ex druppa. ita enim vocatur priusquam cibo matura sit, iam tum colorem mutans &c. Graeci Δρυπίτας appellant.

Pistacea. Vide Plinium. Fructus est ex nucum genere, qui è Syria apportatur: Crescit arbore omnino nuda, præterquam ramorum cacuminibus. Hæc enim comantur densiore folio, angustio, maiore tamen quam lentisci, subruffo, surculis dependentibus pineæ nucis similitudine. Lutetiae in quibusdā hortis est videre nunc. Officinae pharmacopolarum vocant fistica aut fisticorum grana.

Sirica. Galenus ita vocat Ζιζιφθα à recentioribus graecis appellata: quæ officinae sephisiariorum iuiubas nuncupant. Recentiores maxime commendant hunc fructum, ut boni succi. Galenus ut prauo donatum reijciendum putat. illi præterea stomachum gratum, hic concoctioni rebellem prædicat. item illi aluo subducende conuenire, hic astringere aluum. Aetius recentior, calore & humore temperata tradit, eoq; sanguinis acrimoniam edomant, probum succum creant, serosum sanguinis humorem eliciunt. Decoctum eorum iussim & difficultatem spirandi lenit, pectori, renibus, vesicæ, prodest.

IN XCII. CAPVT.

Molles. Addidi cute, & paulo post, dura carne, dixi, ne ex simplici vocum interpretatione contraria inter sese posita videri possint. Sunt itaq; pisces hi molles cute si attingas, duri autem carne, ut Galenus habet lib. tertio de alimentis. Nilul in capita præceden



dentia sum commentatus quòd & facilia, & ex Galeni libro iam citato sunt omnia fere decerpta.

## IN XCIII. CAPVT.

**C**artilaginea. Hi pisces superioribus sunt contrarij, nam durā Selache  
habent cutem: mollem autem carnem. Caterum Galenus sela-  
che dictos affirmat, ἀπὸ τοῦ σέλας ἔχον, hoc est, quia splendorem ha-  
beat eorum cutis. Pisces.

## IN XCVII. CAPVT.

**I**Taque somnus. Galenus libro tertio de causis pulsuum in hunc  
modum somni generationem describit: ὁ μὲν γὰρ ὕπνους γίνεσθαι διὰ  
ἐμφύτης θερμότητος ἢ τοῦ διὰ θερμότητος τινος, καὶ ἐξ ἡμέρας πλεονεξίας  
πρὸς τὴν τροφήν ἐπεστροφείας, ἢ διὰ ἀμείλιαν ὑγρότητα & ἀδυνατί-  
σης ἐν τῷ ἀποτρίβειν. ὅστις δ' ὁ μὲν πρῶτος & ὑγιεινός τε καὶ λι-  
τὰ φύσει, ὁ δὲ δεύτερος & φθίσιμος, ὅστις δ' ἐν θερμότητι τε καὶ ἀδυνατί-  
ας. Hoc est: Etenim somnus fit, cum naturalis caliditas, vel ob defatiga-  
tionem quandam & maiorem siccitatem ad alimentum conuersa est,  
vel ubi propter nimiam humiditatem foras nequit extendi. Prior  
sane est salubris, & secundum naturam. Secundus autem dictus, qua-  
lis in comate & lethargo &c. Paulo post: τῶν δ' ὕπνων τῶν κατὰ  
φύσιν, ὡς πρὶν καὶ τῶν ἐκ θερμότητος ἢ γένεσις διὰ πλεονεξίας  
διουμένης μὲν ἀμείλιαν, καὶ ἀποτρίβειν & ὑγρότητα & ἀδυνατίαν τοῦ  
φύσει ἐν τοῖς σώματι θερμῷ, ἢ διὰ τὴν σωματικὴν & ἐν τῷ σπλάγχνῳ,  
ἢ τῷ γαστέρι τῶν ὕπνων γινόμενων. ἀντάρως δ' ἀπολάυσαντες  
ταύτης ὥς ἡδὴ τῷ κατὰ φύσιν ποσότητι ἔχον, τὴν θερμότητα ἀπο-  
τρίβειν &c. Hoc est: Somnorum verò naturalium, sicuti etiam vi-  
giliarum generatio existit qualis antea exposita est, nempe ut somni  
fiant cum naturalis animantium calor indiget quidem simul & de-  
stituitur copiosa humiditate, eoq; ad viscera & ventrem commeat:  
ut autem vigilia, cum idem calor hac humiditate potitus fuerit abun-  
de, ut iam naturalem habeat qualitatem &c. Nam ex alimenti con-  
fectione multa vaporosa humiditas in ipso calore, meatibus, omni-  
busq; particulis intermedijs suggeritur.

Virium animalium requies. Hoc est, ipse quidem non agunt, Mutua viriū  
sed naturalibus subsidium adferunt: eoq; precipitur recte, ut dum fit subsidia.  
concoctio, etiam in vigilantibus, absterneatur à lectione, disputatione,  
aut cogitatione graui, ne vis naturalis alio distrahatur, nam mutuo  
sibi ferunt auxilia, impedimentaq;.

Tempus somni optimum à cibo. Intellige, non statim: nam Tempus so-  
mni statim à cibo, caput replet, ut etiam plethorica dispositiones, si  
Galenus in Aphorismis fidem accommodamus.



Terminus autem somni. Non sunt audiendi qui vnum omnibus terminum somni prescribunt. Nam alij celerius, alij tardius concoquunt: hi plus assument, illi minus. Quare Galenus recte in commentario de euchymia et cacochymia tradit. Quibus itaq; exercitationibus plurimis uti licet, et quam diu libet dormire, et cibos crassi succi, et viscosos tuto assument. Quae ita graece sonant ὅσοις μὲν γὰρ ἀνθρώποις δοῦντ' ὅτι γυμνασίοις τε, πλείοσι χρῆσθαι, καὶ λιμᾶσαι μέχρ' ὅς ἀπ' ἐθέλωσι &c. ut supra dictum est.

## IN XCIX. CAPVT.

Cataphora.  
καταφίγει-  
ται.

**C**ataphora. Dictio graeca est, a verbo καταφίγειν, quod est obdormiscere vehementius. Unde etiam καταφορὸς ὕπνου dicitur. Latine interpretari possumus, grauis aut vehementis soporis impetum. Galenus sub hoc nomine, alios affectus soporosos videtur comprehendere, καταφορὰς inquiens, βαθείας ὁρᾶσθαι, ἀς ὀνομάζουσιν ἀποπληξίας, καὶ λιάρους καὶ λιποχάας. Hoc est, Cataphoras profundas efficit, quas nominant apoplexias, et caros, et catochos.

In epistola Dioclis habetur σωάγχιω νόσῳ. In qua vitium esse puto. Nam quid sibi velit νόσῳ, non satis intelligo. Angina enim omni tempore solet excitari. Nihil itaque mali erit, si legas pro νόσῳ, νοσήλωπα.

## FINIS LIBRI PRIMI

## COMMENTA-

## RIORVM.

\*

COM





## C O M M E N -

## T A R I O R V M I N

P A V L V M A E G I N E -

T A M L I B E R S E -

C V N D V S .

\*

## C A P V T I .



**L**I B E R hic secundus de febribus, & earum acci-  
dentis facili tractat compendio, ex Galeni ope-  
re de medendi ratione ad Glauconem magna ex  
parte transcriptus. Nonnulla vero Paulus no-  
ster ex opere de Crisibus, pauca ex Prognosticis  
Hippocraticis, quaedam ex alijs autoribus sum-  
psisse videtur. Caterum à morbis similaribus auspicaturum se dicit,  
qui quatuor constant intemperaturis. Quia vero calida omnium est  
efficacissima, merito ab hac appellationem desumpsit, febres, morbos  
nominans similares, qui nimirum etiam simpliciores dicuntur. Com-  
positos in tertio quartoq; volumine persequetur.

Oribasij compendio. Iulianus olim Imperator medicinam  
suo tempore vagam amplamque intelligens, praestantissimos ex omni  
regione medicos Romae colligendos magno studio curauit, delegitque  
ex vniuerso illorum numero septuaginta duos, qui diuersis anti-  
quorum autorum monumentis euolutis examinatisque, necessaria  
magis in artem medicam compendiosa ratione comprehenderent. Hi  
igitur omnes, sua prius ratione & via, singulatim explicata, vno  
tandem consensu scribendi prouinciam Oribasio vt facile principi,  
doctissimoq; tradiderunt. Is varia Galeni opera, aliorumque non-  
nullorum perscrutatus in compendium quoddam septuaginta duos



bus libris comprehensum (tot enim fuerant conuocati medici) artificiose redegit. Paulus autem Aegineta opus hoc maius esse animaduertens, quam ut iter facturo circumferri possit: aut ab homine tenuioris fortunæ comparari, in septem tantum libros constrinxit.

Castigatur  
codex.

Ex Galenifane. In græco male legitur ἐν τῶν Γαλλῶν ὡς μὴ ὡς μάλιστ᾽. Hic igitur est superfluum: ac legi debet Γαλλῶν μὴ ὡς μάλιστ᾽. Hos et Orosius, et castigator Basiliensis praterit.

IN II. CAPVT.

ἀθρόως.

Vna vice. In græco est ἀθρόως, quod cumulatim signat, ac vna vice. Celsus dixisset semel. Contrariū huic λέγει μέρους, et λέγει ὀλίγον, quod est, particulatim, et paulatim, multisque vicibus. Quando scilicet morbi in abscessum finiunt pluribus diebus fit crisis.

IN III. CAPVT.

Græcus co-  
dex vicius.

Neque enim capitis. Ex Galeni 1. de diebus decretorijs hæc tractata scripta sunt. Desideratur autem in Paulo vocula, ἃ, habet enim πρὸς τοὺς εἰς βάλλων, pro πρὸς ἃ εἰς βάλλων, quod neglexerunt Aristarchi.

Aliquem latere. Galenus addit emphaseos gratia λέγει ἀναδινύταί τε ἄν, hoc est, etiam si stupidissimus, et ab omni alienus sensus fuerit.

IN IIII. CAPVT.

νεκρῶδες.

Ethales notæ. Subsequentes scilicet facies cadauerosæ, sano quàm dissimillima, ut quæ mortuū imitetur, unde græcis νεκρῶδες dicitur. Nam si ex Hippocratis sententia, similis sit sani præsertim ipsius, qui nunc ægrotat, faciei, optime sperandum est. Porro notæ hæ sunt in morbis acutis, diuturnis, animi defectionibus, doloribus, item omnibus defunctis. In faciei autem, quod imprimis appareant, et rim obtineant maximam. Cadauerosæ, quoniam natura debilitata, non amplius sanguinem et spiritum in hanc suppeditat.

Laurentia-  
nus.  
Nares acutæ

Nares acutæ. Ita Celsus interpretatur. Nescio cur Laurentianus Nasus compressus verterit, quod græcis dicitur ὀφθαλμῶν. Sunt autem nares acutæ, aut ob aliquā causam carnosas animalium partes cōsumētem, corrumpentemque: aut ob debilitatem caloris nativi, qui non magis in extimas corporis partes extendi potest, sed in visceribus solis exiguis remanet. Quo fit, ut non amplius tantum sanguinis, aut spiritus in partes illas affluat. Cum autem in naso osseæ partes et humida carnosæque sint, inuicem commixtæ: deinde quum osseæ propter terrestrem ipsarum substantiam similes permaneant, humidiores autem consumi facile possint, et in se concidere ob inopiam tum spiritus tum sanguinis, fit ut nasus gracilescat.

Ocu



Oculi concaui. Ob easdem causas fiunt: sed quanto extremo naso humidiores, mollioresq; existunt, tanto citius cauantur. Imo etiā spiritus animalis copiosi participes existunt, & calor is nō pauci, quibus ipsi destituti merito contrahuntur. Cadauerosa igitur facies quæ sequētia apud Hippocratē obtinet, in diuturnis sepe morbis visitur: raro per initia, ob quod & periculosissimū est, & in acuto morbo prorsus lethale: inquam ne occasionem quidem habuerit à tempore. In morbis autem longis non adeo lethale: ita nec in frigido loco, hyeme, statu aeris frigido, & senectute: quia morbus nature respondet.

Si hæc neq; . Aut tali aliqua manifesta causa, minus periculosum est, quā si ob morbi maliciā, etsi præstaret, neq; ab eiusmodi causis virtutē prorsus debilitari. Celsus optime hæc sententiā lib. 2. exprimit latine. Si hæc, inquiens, ita sunt, vt neq; vigilia præcesserit, neq; venter resolutio, neq; inedia. Dixit autem Hippocrates neq; ex vigilia: quia ex hac oculi, veluti chorda ex siccitate tenduntur.

Vacuatio. Intellige per alui profluuiū, & mordicationem, vt Vacuatio. Galenus apud Hippocratē interpretatur. Verum Hippocrates habet τὰ ῥινοειδῆς βυγιομεύα ἢ σφοδρῆς, quod est: Aluius vehementer humectata. Celsus dixit ventris resolutio. Paulus vtiur dictione ῥινοειδῆς.

Aut inedia. Hippocrates dixit λιμὸς ὁ τῆς, quasi famelicum aliquid, aut fames quedam Paulus ex Galeno ἄνιξις, hoc est, inedia, Caterum & alui resolutio vehemens, & inedia corpus succant, adeo quandoque, vt per se emortuam hanc faciem inducant.

Si oculi lumen refugiunt. Hoc est, auersantur, ob visoriae facultatis imbecillitatem. Quæ quum propter instrumentorum affectionem laborat, quemadmodum in lippitudinibus, aut ob alium quendam fluxum præter naturam quidem est, non tamen mortale: cum autem per se afficitur, lethale.

Illachrymant, non ex quadam. Hippocrates habet ἢ ὅτι τὸ ἄνιξις φθύνει, ἢ δακρύσει ἀποκαίεται. Hoc est: Si enim lumen refugiunt aut illachrymant citra voluntatem: nimirum ob facultatis retiorie imbecillitatem. In Hippocrate additur: ἀποσφύζει, quod est, peruertuntur. Celsus simpliciter dixit, si præter hæc oculi quoque lumen refugiunt, & illachrymant. Paulus autem pulchre distinguit, causa tum exterior tum interior, quæ sane vtraque lachrymas sepe in oculis mouet.

Ad hæc si alter ex his minor. Quæ nota facultatem ipsam dispensatam emori significat.



Quæque in iis alba. Sicut in lippitudinibus quibusdam & e-  
 briosis nonnullis. Iudicium vero est plenitudinis in cerebro, eiusque  
 membranis: interim & inflammationis. Vtque enim modo sanguis  
 Albū oculi. ad oculorum venas exprimitur. Album oculi pars est pupillam am-  
 bientis, pericranij extremitas.

Aut nigricent. Refrigerata scilicet. Refrigerantur autem emor-  
 tua. Idcirco mali colores perpetuo apparent.

Crassior pituita. Græce λήμυς, quod Plinius libro vigesimotertio,  
 capite primo dixit, græco vsus vocabulo, vel, inquiens, si lemæ in ocu-  
 lis erunt. Nos Celsum imitati libro secundo, de indicijis mortis, quod  
 Pituita apud Celsum in oculis pro græcorum λήμυς. caput ex Hippocrate trāstulit, diximus, pituita. Habet ille, pituitaque  
 in ijs innatans nouissime angulis inhaerescit. Caterum Galenus Le-  
 mas exponens, dicit semicocti alimenti esse recrementum. Nam facul-  
 tas oculum dispensans imbecilla allatum nutrimentū nequiuit con-  
 coquere. Iam fiunt etiam lemæ in lippitudinibus tum ob humidita-  
 tis præter naturam copiam, tum ob instrumentorum viciū.

Per somnum alba. Ex 14. cap. prognosticon Hippocratis sum-  
 pta videntur. Ita vero apparent, ob imbecillitatem facultatis palpe-  
 bras mouentis, cum citra causam exteriorem constituitur.

Stridere dentibus. Hippocrates adiicit, quibus à pueritia con-  
 suetum nō est. Fit autē ex cerebri offensione, & per se delirium signi-  
 ficat: cum delirio autem, mortem. Caterum fiunt stridores dentium,  
 Stridor ex quibus cau-  
 sis. cum temporales & masticatoriij musculi modo conuulsorio mouen-  
 tur. Quibusdā accidit, ipsis tantum musculis affectis, vel ab origine,  
 vel postea ex quadam causa. In nonnullis principio neruorum in eius  
 modi affectionem deducto, vnde potissimum illorum quæ ab eo nata  
 sunt, conuulsiones fiunt, vt hic neruorum musculus insertorum.

Aut in veste floccos legere. Hoc græce dixit Paulus vnico  
 verbo λεγοννδίζην, quod Hippocrates τὰς λεπονύδας ἀπὸ τῶν ἰμα-  
 τίων ἀποτίλλειν dixit capite vigesimo octauo. Celsus hoc interpreta-  
 tus libro secundo: ait: Si in veste floccos legit, simbriasque deducit. Id au-  
 tem fit corporis humoribus ad caput exhalantibus. Quorum vapore  
 purus ille pupillæ humor inficitur, vnde prædictæ oriuntur imagines,  
 vt in suffusis. Vbi enim niger aliquis, aut crassus antestat, lumen  
 visorium prohibens foras excedere, pro humoris subsistentis natura,  
 imagines generantur.

Si æger supinus. Hoc à decubitu iudicium sumptum est. Gale-  
 nus in prognostica Hippocratis capite septimo scribit, id neque ad sa-  
 lutem, neque ad mortem habere momentum, sed medium esse, aut  
 parum ad alterum declinare. At si consuetum agro est, ita cubare,  
 & me



Et medicum ingredientē non reuereatur, ex bonis signis est. Sin autem consuetum non est, Et medicum reuereatur, malum est.

Veluti resolutus. Græce est εἰς παρὰ μένους. Nam πάρεσις πάρεσις. idem quod παρὰ λυσις. Sed illa incertis quibusdam partibus, hæc in toto corpore obuenire dicitur. Sit igitur, veluti artubus resolutis.

Forte idem est quod dixit Hippocrates: καὶ χεῖρας καὶ πόδας, καὶ σκέλη καὶ χεῖρας ἐκτεταμένα. Hoc est, Et manus Et ceruicem Et crura habere extensa: non contracta. Celsus dixit, ubi supinus aeger iacet porrectis manibus Et cruribus.

Vel si etiam deorsum. Hoc inquit Galenus facultatis corpus gubernantis abolitionem testatur. Celsus dixit, ubi deorsum ad pedes subinde delabitur.

Spiritum. Hoc est, totam respirationem: frigidum, ob extinctionem caloris natiui. Græce est ἀναπνέειν, quod est, respirare, Celsus secutus dixi spiritum elidere.

ἀναπνέειν.  
spiritum elidere.

Item pulsus languidus. Hippocrates pulsus non meminit. Languidus autem, quem alij obscurum vertunt, imbecillitatem virtutis fatetur. Creber magnam necessitatem, deficiens per intervalla, aut ut percipi vix possit, extremam debilitatem.

Sudore digeratur. Græce est ἰδρῶν συνηπνέειν, quasi dicas sudare ad syncopen. Vide Hippocratem. Celsus in Cardiaco dixit: Id autem nihil aliud est, quam nimia imbecillitas corporis, quod stomacho languente immodico sudore digeritur.

Pulsus vegetior. Græca dictio est ἐν σφύξιν, quasi dicas, bona pulsa tio. Hoc est mediocris magnitudine, frequentia Et celeritate: equalis sibi per omnia

Bene erga cibum. Paulo aliter sonant verba græca, ἐν ἐχθρῷ πρὸς τὰς προσφορὰς. Hoc est: bene habere ad oblationem intellige sibi.

## IN V. CAPVT.

SI quatuor particul. Quum nimirum materia est extra vasa. Sicut autē morbus totus quatuor, habet tempora: principium, augmentum, statum, Et declinationem, ita quoque particulares accessiones. Vide Galenum de morborum temporibus, Et de totius morbi temporibus, quem librum nos latinitate donauimus.

Cuius extremus. Hoc est, longissimus, quasi dicas: Si longissime producat, in septimana iudicatur. Nam teste Galeno exacte peracutus is est, qui quartum diem attingit. Non exacte, qui ad



septimum usque producitur. Ita inter acutos, alius exacte acutus, qui ad usque diem quartum decimum producitur. Non exacte vero, qui usque ad vigesimum durat, quanquam & ipse acutus sit.

Sin autem inde in quadragesimum incidit, acutus ex decedentia, quem greci *λεῖψα μεταπρωτον* appellant.

Quarto die crifim. Nam quarto plerunque solvunt, aut occidunt. Si multum, ad septimanam perdurant.

Sed duodecim. Quae accessionis longitudo maxima est, tertiana exquisita dicta, quae intra quartumdecimum, hoc est, antequam omnino praeceat, solvitur.

Longus.

Talis morbus longus. Ut est quarta, & semitertiana, tertiana non exquisita.

At si particulares. Galenus libro 2. Duplex autem horum acutorum quoque natura est. Vel enim accessionum remissiones in exactam integritatem finiunt, vel continua, semper febris manet, quae particulares accessiones non habet, materia in maioribus viscerum vasis subsistente.

Corrigitur  
codex graecus.

Si quidem facies, & totum. Intellige primis diebus. Nam fieri potest, longo tempore ex parva febre, ut corpus modice collabatur. Mo dice autem dixit: quia nimium consumi & prae rationem facultatis retentoria imbecillitatem testatur. In codice graeco, superflua est particula *εἰ*. Nam legi debet: *τὸ πρόσωπον, καὶ τὸ λοιπὸν* &c. non autem *τὸ πρόσωπον εἰ καὶ τὸ λοιπὸν*, nam *καὶ* hac vocula sententiam pervertit, quod nec Orosius intellexit, nec Basiliensis corrector.

*ἀσύνητον*.

Si prorsus nihil. Graece est: *εἰ δὲ πᾶσι πᾶσι ἀσύνητον*, quod est: Sin autem omnino non collapsum est. Celsus latinus lib. 2. cap. 4. de signis loquens valetudinis dicit: Vbi ager pro spatio parum emacrescit.

Pulsus.  
Magnus.  
Citatus.

Ex arteriarum motu. Magnus pulsus, qui in omnem distantiam attollitur, fit ob magnum refrigerium usum. Citatus, ubi magnitudo pulsus non sufficit, additur Celeritas. Sicuti cum qui magno incedit passu, non potest iter institutum tempestivius absolovere, nisi eundem gradum acceleret. Creber, celeritatem adhuc adiuvat, dum brevem facit ab opere quietem. Veluti qui nunquam intermitit, verum semper iter repetit, quod celeriter perficit atque maximum usum refrigerium indicat. Vehemens, robustis viribus, natura strenue se ad fuliginosa excrementa expellenda accingente.

Parvus.  
Tardus.  
Rarus.

Contrarius longum. Hoc est: Parvus, tardus, rarus, languidus. Parvus quia tantus color non est, qui refrigerari valde requirat, aut viribus imbecillis, materiae oppressis.

Quatenus calidae, & virentes. Subaudi ad tactum. Hec sum pise

ex



ex libro primo Galeni ad Glauconem capite de curatione doloris capitis.

Delitescentes. *διορ σμυχόμενοι*, græce est. Interpretantur autem grammatici *σμυχόμενοι ἀφανίσόμενοι*, quod est, non apparentes. Galenus utitur hoc verbo, præterquã in libro supra citato, secundo etiam de indicatorijs diebus. Qui nanque inquiring, ad quartumdecimum, aut vigesimum diem morbi prorsus acuti exciderunt, hi plane inceperunt tanquam *σμυχόμενοι*, lento motu. Nihil refert etiam si inter- *σμυχόμενοι* præteris, mitiores & languide. Habetur in codice Græco ante *σμυχόμενοι* dictio *μαλθακώτεροι*, fac tu *μαλθακώτεροι*.

## IN VI. CAPVT.

**M**agna ex parte. Recte dicitur, magna ex parte, quoniam plurimi longi affectus teste Galeno libro secundo de diebus decretorijs, etiam excretionibus finiuntur, sed non manifestis. Potissimum autem abscessibus, & concoctione. Qui enim ad quartumdecimum crudi sunt, non ante quadragesimum soluantur.

## IN VII. CAPVT.

**D**ierum decretoriorum. Antequam dies ipsos enumeremus, apte prius dicetur, cur ita appellentur, Græci vocant, *λεησιμὰς* quasi iudicijs dicatos. In quibus natura cum morbo pugnante, iudicium expectatur, natura ne morbum sit superatura, an morbus naturam. Hoc autem fit, quando facultas alicui siue qualitate, siue quantitate, siue utroque corpus offendentis, operi suo valentissime se accingit: quæ vere Crisis dicitur. Hæc autem singulis diebus potest accidere, teste Galeno, sed non æque frequenter, nec æquali fide. Hinc Paulus noster inquit: Dierum decretoriorum alij de agris frequenter, cum fide, nempe cum excretionem quadam copiosa, aut abscessu non obscuro. Post quæ morbi recidua timenda non est.

Dies decretorij qui.

Salubriter. Græca dictio est *ἀγαθὸς*, quod est bene: quo die morbus ad sanitatem desinit, eoque dixi salubriter.

Perfecte. *τελειὸς* interpretatus sum perfecte, iudicat autem is dies perfecte, qui nihil amplius in morbo facit reliquum.

Manifesto. Hoc est: Quo cum excretionem, aut abscessu quodam euidenti morbus solutus est.

Insigniter. Paulus dixit græce *ἐπισήμως*, Galenus *ἐνσήμως*, quasi cum bonis signis. Hoc est, qui prius à contemplatorio iudicatus sit.

Iam



Natura motus  
tibus ordina-  
tis gubernatur.

Iam intelligendum venit, natura motus proportionibus definitis fieri, & circuitibus ordinatis, cum morbi materiam superauerit: prohibetur autem quum non plane superauerit. Septenarij igitur circuitus validissima sunt virtute praediti: mox quaternarij: quaedam vero extra hos excidunt: quos coincidentes seu intercalarios nominare licet. At perfectus circuitus est, ex tribus septenarijs compositus, qui nimium viginti constat diebus. Vnde liquet non omnes septenarios inuicem separari, sed nonnullos coniungi, ut etiam quaterniones. Nam hi teste Oribasio in ipsis partibus à precedente numero incipiunt: post ipsas vero partes absq; precedente numero procedunt. Porro secundus sextenarius circulus à primo disunctus est, testimonio Hippocratis ex Aphorismo quarto decimo libri secundi, secundi septenarij, octauus dies initium est: tertius septenarius circuitus secundo cohaeret. Vnde fit ut non eadem proportio post quartumdecimum diem seruetur. Nam ab ipso quartodecimo, qui finis secundi est, tertius incipit: post vigesimum diem, idem circuituum ordo perpetuo consistit. Hinc est quod apud Hippocratem probetur maxime, post septimum, quartumdecimum, vigesimum, vigesimuseptimum, trigessimus quartus, quadragessimus. Respondebit ergo trigessimus quartus, quartodecimo, quippe qui ex duobus septenarijs sit coniunctus. Et quadragessimus, vigesimo, ut qui tertium septenarium coniunctum expleat. Eadem ratione commendat sexagesimum, octuagesimum, centesimum, centesimum vigesimum, ut perfectos circuitus. Iam quaterniones ita habent. Secundus & primus coniunguntur: tertius à secundo separatur. Quartus autem tertio, & quinto coniungitur: quintus iterum sexto. Atq; ita quoq; post vigesimum, ut in septenarijs proportio seruatur. Concidunt eis nonus, quintus, & tertius.

Sunt itaq; potentes ad indicandum septenarij: mox quaterniones. Quartus enim dies morbos qui primo non desinunt, soluit. Vndecimus quos septimus non discussit. At si maior morbus sit, quam ut quarto die crism subeat, certe solutio ipsius in eodem preparatur: septimo autem finis morbi adycitur. Qui vero morbi septimo die non finiunt, vndecimo natura soluere molitur. Atque sic in ipso vel decernit, vel quartodecimo preparat. Ac omnibus pulchre euenientibus, nullo admissio errore, ad quaternionum circuitus iudicia omnino perueniunt. Erratis autem quibusdam admissis, in coincidentes, seu intercalarios recidunt, quanquam in facta iam crisi indicanda, praestat eam in nono factam esse, quam octauo, ut quae sit tutior, & fidelior: Itaq; differunt quaterniones ab intercalarijs, natura & usu: natura ut dictum est: usu, quod ad futurae crisis cognitionem sufficiant.



ficiant. At morbi acuti impari dierum numero, longi pari iudicantur. Inuadunt quidam morbi secundum diem priore grauiorem habentes: quartum tertio, & totas acceſſiones in diebus paribus, qui longorum morborum iudices sunt. Protinus autem ut acuti propter acceſſionis vehementiam finiuntur, hi etiam secundo die interficiunt, & quarto: verum sexto plurimos. Caterum dies intercalarij, tertius, & quintus, non minus quam quartus decernunt. Nam perturbationis euidentia naturam ea quæ moleſtant, etiam ante tempus propulſare compellit. Proinde primariam decernendi virtutem non habent, sed per acciſſens aliquod ſic eueniunt. Quoniam enim natura non conuenienti ſemper tempore de morbis decernit, ſed concitata plerunque aliàs alijs de cauſis, à quibus acceſſio in morbis acutis maxime continua redditur, in imparibus acutorum iudicia fieri ratio eſt.

Exiguum naturæ impetum. Hoc eſt, ſi vel modicè natura ad expetendum aliena ſe accinſerit. Ex primo Galeni libro ad Glauconem de curatione doloris capitis hæc transcripta ſunt, ubi ita habetur: ἡ μὲν γὰρ ἰσθμὸς ἡμέρα, καὶ ἡ αἰὶς τὰς βραχέας παρασυνάει τὸ φύσιν ἐξομασθὲς τὸν διὰ τὴν φύσιν λόγον. Hoc eſt: Nam ſeptimus dies etiam ex paruis naturæ apparatus ad criſim quæ per euacuationem conſiſt, erumpit. Itaq; ad quartumdecimum uſq; diem valentiſſima. Græce erat ἀγωνιτικώτατα, hoc eſt, maximo cum certamine, & impetu naturæ. Ex libro ſecundo de diebus decretorijs.

ἀγωνιτικώ  
τατα.

Prorſus elanguescunt. Superius dixit de diebus poſt vigefimum ſuccedentibus: quod ſcilicet vehementiam in iudicando remittant. ita hic eos qui poſt quadrageſimum ſunt, prorſus elanguere in naturæ motibus. Græce eſt τελευτῶς εἰς ἡλυτοί, quod eſt, omnino ſunt reſoluti. Male autem in codice Græco impreſſo eſt ἡλυτοί pro τελευτῶς. Nec hoc aduerterunt Oroſcius & Gemuſeus.

Lectio codi-  
cis Græci ca-  
ſtigatur.

## IN VIII. CAPVT.

Concoctionis ſigna. Galenus libr. i. cap. 3. de Criſibus eadem plane habet. Dicit autem ſigna decretoria nonnunquam male euenire, propterea quod apparentibus ſcilicet decretorijs citra concoctionem, natura ob perturbationis violentiam, quæ aliàs ab alijs cauſis acciſſit, ad expellendum coacta, criſis vel bona, vel mala fiat.

Neque igitur per initia. Ex eodem Galeni libro capite octauo ſumptum eſt: ſequitur autem in Paulo Græco: ὅτι ἐν ταῖς ἀρχαῖς, οὐτε ἐν ταῖς ἀναβάσειν αὐτὰ φαίνονται καὶ, ἀλλ' ἐν τῷ παρακμῆς χρόνῳ. Hoc eſt: Neque igitur per initia, neque in augmento ipſa apparere, ſed declinationis tempore conuenit. Galenus

autem



Lectio codi-  
cis Græci vi-  
tiata.

autem habet: ὅτι γὰρ ἀναβάσει, ὅτι ἐν ταῖς ἀρχαῖς, ἀλλ' ἐν ταῖς ἀνιμαῖς αὐτὰ ἐπιφαίνεσθαι χρὴ. Quod est: Neque enim in augmento, neque principio, sed in vigore ipsa apparere oportet. Cui lectio-  
ni ego assentior. Nam testimonio Galeni libro tertio de Crisibus, ca-  
pite quinto: Exquisita concoctio status tempore confit. Ergo si mor-  
bus ante statum iudicatus fuerit, malo est. Mutandum itaq; in Pau-  
lo ἐν τῷ ᾧ παρακμῆς ἐν τῷ ᾧ ἀνιμῆς. Hoc non intellexisti Oro-  
sci, nec tu Gemusæ aduertisti.

Si accessiones vrgeant. Galenus libro tertio de Crisibus, capi-  
te quarto inquit, in hunc modum: εἰ μὲν γὰρ ἐπείγειντο, καὶ προ-  
λαμβάνουσιν αὐτὴν ἡ συνήθης ὥρα &c. Hoc est: Si enim vrgeant,  
præuertantq; horam consuetam. Paulus habet: εἰ μὲν ἐπιτρέποντο,  
hoc est, si intrudantur, quod postea explicatur per hanc clausulam:  
Et vehementiores multo fiant. Quare cum Galeno etiam legendum  
censeo, ἐπείγειντο, non ἐπιτρέποντο, quanquam non adeo refert, v-  
trum malis. Galenus certe paulo post eodem verbo eadem in re uti-  
tur: πρὸς δὲ τοῦτο ἐπείγειντο ἐπείγεται &c.

Item iis qui ob rigores. Nempe ijs qui febribus laborant inter-  
mittentibus. Parum proprie dixi rigores, nam hi proprie de frigori-  
bus vehementibus, aut duritie ex frigore contracta, aut etiam sine fi-  
gore dicitur. Ut apud authores idoneos est inuenire. Græca autem di-  
ctio ῥίγος, totius corporis concussione[m] significat. Celsus eam vo-  
cabulo horroris qui Græcis φρίκη dicitur, interpretatus est. Plinius  
tamen libro septimo capite quinquagesimo scribit: Certis pestifer ca-  
lor remeat horis, aut rigor. Capiamus itaq; hoc loco rigorem, pro vehe-  
menti horrore, ut Galenus est autor.

## IN X. CAPUT.

**A**Nte quamlibet iudicationem, agrotus grauer ex-  
cruciat. Caput hoc ex primo Galeni ad Glauconem li-  
bro, sumptum est. Excruciat autem grauer, quia natura in to-  
tum contra morbum insurgit, ad expellendum ea quæ præter natu-  
ram sunt. Græce est ἀντιπολεῖν τὸν νόσον. Hoc est ad verbum: Dif-  
ficilis tolerantia præcedit. Nam ἀντιπολεῖν verbum, signat agre mor-  
bum ferre, inquietum esse, exagitari & affligi.

Atque his obuenientibus. Galenus libro citato: εἰ γὰρ ἐν τῷ  
τοῖς ἀπασιν. Hoc est: Si enim præter hæc omnia. Sublimius attol-  
lantur. Galenus libro tertio de prænotione ex pulsibus sumpta, inquit  
pulsus sublimem omnem excretionis indicem esse.

Ad



Ad hæc si dies decretorius indicetur. Hoc est si prædicatur ab alio contemplatorio, ut septimus à quarto, quartusdecimus ab undecimo, &c.

Exilientem. Subaudi è lecto. Galenus in commentario quem inscripsit  $\omega\sigma\tau\iota\ \omega\pi\omicron\rho\iota\nu\omega\sigma\eta\epsilon\nu$ , in hunc modum habet: Cùm natura incumberet in ea quæ gravabant, expellenda, æger erexit se tanquam vellet è lecto exilire: Rogatus cur id vellet facere, respondit se videre serpentem rubrum ex tegula emergentem, ac vereri ne in via ille aberrans, super ipsum caderet, eoque fugere in locum quo decumbebat.

Si qua partium ipsius palpitet.  $\epsilon\iota\ \tau\iota\ \omega\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\iota\tau\omicron$  Græcus codex habet, ut etiam Galeni primus ad Glauconem. Signat autem  $\omega\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\mu\alpha\iota$ , idem quod moueor, concutior, palpito. Vide libellum Galeni de palpitacione, quam alij tremorem interpretantur. Libro primo de crisibus pro  $\omega\acute{\alpha}\lambda\lambda\omicron\iota\tau\omicron$  habetur,  $\sigma\alpha\iota\epsilon\tau\varsigma$ , quod est, mouetur, additurq;  $\eta\gamma\epsilon\iota\ \rho\omicron\mu\acute{\upsilon}\lambda\lambda\omicron\varsigma\ \gamma\iota\nu\epsilon\tau\varsigma$ , id est, & tremulum fit, ut labrum.

Venæ in temporibus. Quod signat sanguinem ad superiora erupisse, & calidissimum, cum alioquin proprium sit arteriarum pulsare.

## IN XI. CAPVT.

SI euacuatio. Ex Galeno de Crisibus. tertio, cap. 3. fere omnia transscripta sunt. Meminerint autem lectores, aliquando me dictione Græca crisi scilicet  $\nu\tau\iota$ , quod medicorum familiæ sit & visita, & familiaris. Aliquando interpretor iudicium, vel indicationem: quod ut mihi liceat post alios, oratos ipsos volo.

Crisis.  
Iudicium.  
Indicatio.

## IN XII. CAPVT.

PULSUS. Hoc caput ex varijs Galeni libris de pulsibus transcriptum est. Primum itaq; Paulus definitionem ponit, qua dicit cor & arterias attolli, & deprimi. Attolluntur autem, longis fibris in se coeuntibus: alijs omnibus relaxatis. Submittuntur, hoc est deprimuntur, astringuntur, longis relaxatis, latis in se coeuntibus. Græce est  $\delta\ \mu\epsilon\lambda\eta\ \sigma\phi\upsilon\gamma\mu\omicron\varsigma\ \lambda\acute{\upsilon}\nu\eta\sigma\iota\varsigma\ \delta\epsilon\gamma\eta\ \lambda\alpha\phi\lambda\acute{\iota}\alpha\varsigma\ \eta\gamma\epsilon\iota\ \alpha\pi\tau\eta\epsilon\iota\omega\eta\ \lambda\iota\alpha\tau\alpha\ \delta\iota\alpha\sigma\tau\omicron\lambda\eta\eta\ \eta\gamma\ \sigma\upsilon\sigma\tau\omicron\lambda\eta\eta\ \gamma\iota\gamma\eta\sigma\mu\acute{\epsilon}\nu\eta$ . Hoc est: Pulsus sane motus est cordis, & arteriarum qui fit secundum diastolen & systolen.

Pulsus partes.

Fuliginosa. Quæ ex functione obita collecta sunt. Nam hæc teste Galeno, non aliter calorem natium, quàm flammam ignis extinguunt.

Primo pulsum genus. Hoc ad verbum ex Galeni libello ad canda



candidatos medicinae sumptum est. Habetur enim: Ex ijs quae proprii motus sunt, celeritas existit & tarditas: alius vrgens motus, alius resolutus.

Διάστασις.  
Interuallū.

Quoniam enim. Hunc syllogismum ex primo de differentijs pulsuum mutuatus est. Verba ita sonant: Quia vero & arteria tria interualla sortita est, sicut aliud quoduis corpus, longum, latum, & profundum, necesse est omnino in singulis distantijs quantitatem distantes, & sistoles metiri. Verti autem interuallum, διάστασις, quod neoterici dimensionem interpretantur. Celsus libro tertio dixit: Si venae non aequis interuallis mouentur, arterias intelligens.

Humoris infusi. Galenus libro de dignoscendis pulsibus quarto etiam ex infusione humoris differentiam pulsus constituit. Nam aliàs plus, aliàs minus in ea continetur, nunc crassior, nunc tenuior, nunc aquosa, nunc aërea humiditas.

Pulsus plenior.

Plenior. Verba sunt Archigenis apud Galenum lib. quarto de dignoscendis pulsibus, admodum obscura, ut lectores facile iudicabunt. Caterum plenus pulsus habet tria genera, ut summatim dicā: Primum, quod ipsum corpus arteriae, quo statu sit declarat: alterum quod qualitatem substantiae quam continet: tertium nativi spiritus facultatem indicat.

Corrigitur  
exemplar.

Quoniam vero caloris. Hic locus ad verbum ex libro primo de differentijs pulsuum desumptus est. Verba ita sonant: ἐτι λέγει τὸν ὅτι ἀρτηρίας τέτον, ἐν ὁργίῳ ἔχον γυναικόμενης ὅτι τὸ πυρετὸν ὁρμήσῃ & διὰ τὴν ἑστῆν, ἢ ἐκ λεπτῶν ἄλλοι μείον ἀπλοῖο, πῶθεν ἰδοῦν ἂν αὖ τισὶν ἢ τοῖς τοῦ γένος σφυγμῶν συνωρεθῆναι τοῖς ἄλλοις. Ex qua lectione videtur addendum in Paulo τινὲς, ut sit ἡξίωσας τινὲς καὶ τὸ τοῦτο &c. quod praeterierunt Aristarchi.

Nam cum arteria. Galenus primo de differentijs pulsuum in hunc modum habet: ὅτι ἀρτηρίας σώματι & ὅς ἐστιν λεῖον, καὶ μακρὸν καὶ περιφθόρον, λιγυρὸν τε διὰ πᾶσας διπλὴν λιγύσιν ἐν αὐτῇ οὐκ ἐπιτορμώων: ἢ γὰρ εἰς αὐτὴν συνίσταται πᾶσα χόρδον ἢ διαστέλλεται πανταχόσε, καὶ τὰς διπλῆς λιγύσεως ὀνομαζομένης σφυγμῶ, διτλῆς ἀναγκᾶν αὐτῇ συμπίσσῃν ἡρεμίας ἐφ' ἡνάτορα &c. Hoc est, ut Graecae linguae ignari intelligant. Cum arteria corpus sit cauum longum, & teres, moueaturq; perpetuo duplici motu, ex contrarijs composito particulis (vel enim in se vndiquaq; subsidet, vel in omnem partem attollitur, qui motus duplex appellatur pulsus) necesse est, ut duplex ei quies in utroq; coincidat. Deinde pergit, atq; has duas quietes exercitata manus cognoscit, & ratio demonstrat. Pauli lectio videtur corrigenda. Habet enim codex impressus ὅτι



ἡ ἀρτηρία διπλὴν κίνησιν ἔχει ἐν αὐτῇ συνειμένῳ κίνησιν. Quod est: Cum enim arteria duplici moveatur motu, contrarijs composito motibus, pro ἡ ἐν αὐτῇ συνειμένῳ κίνησιν. Sic itaque tu corrigo. Oroscius & Basiliensis corrector hoc sponte sua scilicet omiserunt.

Corrigitur  
codex græ-  
cus.

Differentiæ rhythmī. Ex primo de differentijs pulsuum Galeni transcripta sunt. Quare qui omnia planius fusiúsque explicata desiderabit, ad eos se commentarios conferat.

Ac cum secundum magnitudinem inæqualitas, id quod maturius, aut tardius assumpserit. Hoc est, ut apertius interpreter: quanquam sic habeant, ac cum inæqualitas ex magnitudine sumpta, inæqualitatem quæ celeritatis, aut tarditatis ratione constat, assumpserit. Sed malui esse obscurior, quàm non fidelis Aristarchis nostris videri.

Ac si id quod in situ est. Eadem locutio. Idem intelligo, ac si dicas: Si eam differentiam inæqualitatis sumpserit, quæ ex situ arteriæ capitur.

Porro opportunum erit. Sequentia Pauli dicta, ex Galeni libris de causis pulsuum, & de prænotione miro artificio, compendioque sunt decerpta.

Magnus igitur pulsus. Galenus primo τῷ προγνώσει σφυγμῶν, in hanc sententiam ait de magno pulsus ἦτοι ἡ διὰ τὴν ἰσχυρότητα τὸ σῶμα, ἢ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς θερμότητος, ἢ διὰ τὴν ἐπιπλησίαν κίνησιν. Hoc est: Vel enim fit ob corporis (intellige arteriæ) gracilitatem, aut temperamentī calorem, aut motum acquisitum.

Causæ ipsius naturales. Paulo post Galenus habet: ἀλλ' αἱ μὲν ἐπιπληστοὶ κίνησεις, αὐτὰς ἔχουσιν, παραμένοντες δ' ἐτι διὰ τὴν ἰσχυρότητα, καὶ τὴν θερμότητα, quod est: Verum motus asciticij statim subsidunt, qui autem ex gracilitate, & temperamento proueniunt, adhuc perseverant.

Ut etiam manu admota. Galenus ὅς' ἐν ἐστὶ σοι τῶν σφυγμῶν ἀφαμένῳ, ἡ ἀπὸ βραχὺ διαλείποντι, καὶ πάλιν ἐφαμένῳ σαφὲς ἂν διαγνῶναι τὴν μεταβολήν. Hoc est: Ut liceat tibi pulsus tangenti, & deinde paululum intermittenti, rursusque iterum attingenti, mutationem manifestissimam dignoscere &c. Habetur autem in codice græco Pauli bis τὰ αὐτῶς, tu igitur postremum expunge, quod neglexerunt nostri mastiges.

Textus græ-  
cus castigatur.

Qui sane ob balineas. Hæc fere & sequētia lib. i. iam citato inuenies. Nisi quod Galenus verbis nonnihil immutatis eadem dicat.

Ex humorum putredine magnus, ad magnitudinem, ad-



Causæ pul-  
sum & eo-  
rum differen-  
tiæ.

huc submissionem magis citatam. Galenus libro secundo προ-  
γνώσεως σφυγμῶν hanc sententiam interpretatur in eum modum:  
διηλώσει τοι γάρ τὸ μὲν τάχους & συστολῆς ἀξιόλογον τι πλεονέκτη-  
μα ἀνθρώπων περιττωμάτων ἀθροίσεσθαι ἀμὰ καὶ ἐκκρίνεσθαι. Et  
statim: πολλὰ μὲν γὰρ ἀθροίσεσθαι κατὰ τὰς ἐνέργειας τῶν χυμῶν &c.  
Hoc est: Indicabit igitur, celeritas quidem systoles, eximiam quan-  
dam fuliginosorum excrementorum copiam colligi simul, & excerni  
&c. Per multum enim ex humorum putredinibus colligitur. Iam li-  
bro primo de causis ita habet: Cum refrigerantem causam attrahit  
corpus arteriarum distenditur: cum fuliginosum excernit, comprimi-  
tur. Superat autem aliàs diastole, cum scilicet maior refrigerij usus  
est. Systole, cum plura recrementa expelli desiderant.

Verum ad magnum pulsum. Galenus primo de causis: Con-  
uenit igitur tria causarum genera sibi mutuo opitulari, ut pulsus  
magnus aut celer fiat: nempe usum generationis ipsorum urgentem,  
virtutem robustam, arteriarum tunicas molles, aut non omnino  
duras.

Celeritas accedit. Eodem libro: Copiosiore calore in corpore  
collecto, necesse est animal maiorem desiderare respirationem: pulsus-  
que maiores. Qua autem ratione maiores, hac etiam velociores &  
frequentiores. Ut enim sitientes non solum multum, sed etiam cito, &  
frequenter potionem assumunt, ita qui refrigerantem substantiam  
requirunt, multam simul hanc, & celeriter & frequenter attra-  
hant. Quare proprij sunt copię caloris pulsus magni, celeres, & fre-  
quentes non tamen necessarij sequentes, verum si nullum ex predictis  
impedierit.

Dubij solu-  
tio.

Non amplius id quod in. Primo de causis Galenus. Fortassis  
videbuntur pugnare ea quę apparent tum inter se, tum vnā cum  
causis propositis. Conuenit enim, ut in caliditate, primum sane ma-  
gnitudo, mox celeritas, deinde frequentia erat, ita etiam in frigidi-  
tate, primum sane oriri paruitatem: mox tarditatem: tertium ra-  
ritatem. Quę igitur solutio? Quoniam virtute robusta, & si usus  
paulo minor fuerit, primam sane actionem neque exiguam, neque  
tardam necesse est fieri, secundam vero post longius tempus, si usus  
urget, ratio est absolui. Sicut enim cum urgebat stimulabatq;, & im-  
pellebat virtutem ad actionem, ita cum non urget, diutius conque-  
scere permittit.

Sin autem tarditas paruitasque accreuerint, ē contraria  
raritas in crebritudinem. Quod sit cum non totum arterię spa-  
cium absoluit pulsus, sed medium duntaxat, unde saepius repetere co-  
gitur:



gitur: alioqui in magno vsu cum frequens est, totum spacium peragat, crebro id repetens. Si verò maior frigiditas oborta, sit, eoque vsus abunde solutus fuerit, vnà quidem cum eo motus etiam celeritas ita soluetur. Minor autem erit & diastole si plurimum fuerit aucta frigiditas, rarissimos quidem, non tamen & tardissimos, & minimos pulsus fieri necesse est: sed tardiores semper, & minores sufficit. Quippe virtute robusta absolute tardi, aut parui nunquam fient, etiam si vsus admodum fuerit solutus.

Itaq; latitudo. Latos omnino pulsus post criticas excretiones fieri docet Galenus libro secundo de pulsum causis. Paulo post: Frequenter lati fiunt ob humiditatem, & praesertim cum ipsa corpora arteriarum irrigua fuerint, vt in hydrope, aliquando ob pondus, quod extrinsecus arterijs accidit. Id autem pondus plerumque cutis ipsius rugositas est.

Quemadmodum sublimitas. Sublimis in ira & ante crises, scilicet cum natura ipsa quae molestant, expellendis incumbit.

Longus. Cum quo reliquarum duarum distantiarum quantitas existimatur, ob tenuitatem corporis aut peculiarem magnitudinem talis efficitur. Nam aliquando motus quatuor digitis occurrat arcus sane & gracilis adeo vt chordam tenuem representet. Siue enim veluti gracilis cuiusdam chordae, siue vt pili occursum appareat, ex hoc ipso magna quaedam tunica arteriarum duricies apparet.

Non enim extrema. Idem Galenus habet primo πρὶ πρὸς νόσους σφυγμῶν, hisce verbis: ἀσφυγία καὶ τὰ μὲν τῶν ἀλβίων ἔστι πόνος, τὰ δὲ τῶν σωματῶν γίνετ'. Hoc est: Pulsus defectio reuera quidem nunquam in corpore viuo accidit.

Corpore emaciato. Hanc sententiam & superiorem in libello de pulsibus quem ad candidatos inscripsit.

Vires dissoluuntur. Vide libellum iam citatum, & prognosticis.

Durum pulsum. Galenus lib. 3. de differentiis pulsum in calce: & 1. de dignotione: Durus inquam, & vehemens esse possunt, sed non vehementissimus, & durissimus. Vide etiam primum de praesagij pulsum.

Reliqua pituitae vicia. Alia quae arteriarum tunicas humiditate multa, & praecipue pituitosa irrigant. Primo de causis ad calcem.

Rhythmus. Vide secundum Galeni librum de praesagij, & tertium de causis pulsum.

Deficientes. Alij vocant intermittentes. Fit quando facultas grauatatur humorum copia, & impeditur, quo minus motu conuenienti

Pulsus deficiens vnde.



tempore auspicietur: vel ob craſſitudinem, vel copiam humorum ora arteriarum cordi vicinarum obſtruentem.

Coincidents  
pulsus.

Coincidentes. *Fiunt hi teſte Galeno ob frequentiam inaequa- lem: quod cor ſepe functionem minus ac uſus exigit, obierit. Hoc au- tem ipſum rursus fit, vel grauato corde humorum copia, vel inſtru- menti obſtructis, vel coactis: quæ & deficientium cauſa erat. Diſſe- runt autem inter ſe, quod coincidentes virtutem teſtentur repugnan- tem, & contendentem cum ijs quæ moleſtant. Deficientes, detrectan- tem id ſubire. Coincidentes ſepe criſim intulerunt. Deficientes illis periculoſiores. Vtriq; accidunt in febribus ardentibus.*

Inclinans,

Inclinantes. *Cum virtus imbecillis erit, corpora autem arte- rias ambientia, emaciata & colliquata. Multæ ſunt cauſæ, Inſlam- mationes, ſcirrhi, abſceſſus, phymata cruda, omnis tumor præter natu- ram, duricies ſqualida, frigidity nimia. Galenus primo de cauſis.*

Caprizans.

Caprizans. *Fit cum virtus quantum ad ſe pertinet, naturale robur ſeruat, ſed à motu impeditur, vel propter copiam immodicam vel obſtructionem, vel inſtrumentorum compreſſionem. Vide ſecun- dum de cauſis pulſum.*

Dicrotus,

Dicrotus. *Hic & caprizans bis feriunt, ſed dicrotus duritiã inſtrumentorum habet, & intemperiem.*

Vndofus & vermiculans. *Hi duo quantitate ſola differunt, vna ſpecies exiſtens. Sunt autẽ in diuerſis particulis, ſed vno in pul- ſu, cauſa eſt, imbecillitas virtutis, aut copia humorum, aut mollicies inſtrumentorum extrema: cũ robur vitale arteriam nequit attollere.*

#### IN XIII. CAPVT.

Aluus,

**A**Luus optima. *Hoc caput partim ex prognôſticorum ſecun- do, partim ex primo de Criſibus libro Galeni ſumptum eſt. Dixi autem aluus, pro deiectione, ſecutus Celfum, qui libro ſecundo eandem fere ſententiã habet. At venter ei qui à periculo tutus eſt, reddit modo mollia, figurata, eodem fere tempore, quo ſecunda vale- tudine aſſueuit, modo conuenientia his quæ aſſumuntur. Caterum qui cauſas omnium vult intelligere, commentarium ſuprà citatum le- ctet.*

Leuiter ruffa. *Sic interpretatus ſum ὑπερπύρρον quaſi dicas ſubruffa: hoc eſt, quã bilis ex iocinore leuiter tinxerit.*

Conuenienter ſpiſſa. *Grece eſt ἀμὰ τῇ ἀποσπινδοῦ οὐσάου, quod eſt cum conuenienti ſpiſſitudine. Apud Galenum de Criſibus*

οὐσάου.

*non eſt, quod ſatis in verbo οὐσάου, hoc eſt, coherens, intelligatur.*

Non



Non nimis foetida. Hippocraticum esse dixit Galenus, quod Celsus aliquando interpretatus est, mali odoris, aliquando si magna foetitas odoris accessit.

Non exuccata. Hoc est: Ex qua humiditas chyli aquositasq; nō sit per venas mesaraicas iecori distributa. Ut fere idē, sit quod alius li- quida aquosaq;. Cum enim distributio parū absolute peragitur in ventre, extremēta liquida, tenuia & aquosa permanēt, si Galeno & rationi credimus. Græca dictio est ἀχύρωτον, quam Leoniceus vir ἀχύρωτος Leoniceus alioqui in Italia habitus maximus in re medica, vertit, humoris ex- pers, quod quā sit ad rē, eruditi iudicent. Est autē ἀχύρωτον, id quod Galenus libro octauo de compositione medicamentorum secundum lo- cos, ἀνενχύρωτον dixit, in hac nimirum sententia ὅταν μὲν δὲ ἐλ- κειν ἐν τῇ κοιλίᾳ τε καὶ τῶν ἐντέρων πῶς ποτὶν ἀτονίῃ τὸ ἥπαρ ὑγρὰ, καὶ ἀνενχύρωτα ἐκκρίνεται διὰ τῆς ἰσθμῆς. Hoc est: Cum igitur iecur alimentum ex ventriculo & intestinis præ debilitate ne- quiuerit attrahere, liquida, & non exuccata per sedem excernuntur &c. Ex hisce verbis liquet non debere accipi pro ἀχύρωτον, aut ἀχύ- λωτον, sicut nonnulli interpretantur. Nam deiectio liquida, & tenuis esse potest, etiā si venter pro munere suo sit functus. Necesse au- tē est & circumpositas partes à vicio immunes esse, et distributionē pro- be in iecur fieri, vt alimentum concoctum esse, ex aluo iudicemus. Cæ- terum ἀχύρωτον videtur contrarium fere esse verbo σπυγερὸς. Nam hoc tā est substantia moderatum, vt vndiq; cohereat, simulq; existat molle. Illud contrā tam liquidum vt vndiquaq; diffuat.

At mere ruffa. Iam ad tertium deiectionū genus descendit, quod nonnihil ex recrementis à toto corpore in ventrem confluentibus: non ex ciborum confectione iudicare potest.

Viridis æruginosa. Aeruginosa in ventre gignitur & por- tate alia bilis differentia in venis procreantur teste Galeno in com- mentario de atra bile.

Animantis particularum consumptionem. Græce est σύν- τμησις ἀνδοῖ τῶν τοῦ ζώου μορίων, quasi dicas colliquationem animan- tis particularum indicat: Intellige autem solidarum: quæ absolute σύντμησις particule dicuntur.

## IN XIII. CAPVT.

Virina igitur. Ex libro primo de Crisibus omnia mutuatus est Paulus. Ceterum vbi de exacte aquosa agit, Galenus fufius pleniusq; persequitur. Habet autem Paulus: τὸ δὲ ὁχάρως ἀπε- πησὶ, ὅπερ ὅτι τὸ ὑδατῶδες ἀνελίβει, ὅτι ὁ ἀπὲρ πῶς πῶς οὐ πῶς



*Vrina cruda* μα το φλεβώδες γένος ὑπάρχον. Hoc ut interpretatus sum. Galenus autem τὸ τοίνυν ὁχάτως ἀπείσιν ὑπὲρ ἀπαιῖα ταύτ' ὅτιν. εἴη δ' ἂν ὑδατῶδες ἀκρίτως τὸ τοῖστον, ἔτ' ἢ δὴ περὶ ὁμοιοῦς, ὡς τὸ δολορὸν ἔτε μέλλον, ὡς τὸ μετ' ὀλίγον ἀναθολούμενον, ἀλλ' ὅτιν ἀπεγνωσμένους τ' ὑψέως σύμπλωμα, τὸ τοῖστο το φλεβώδες γένους ὑπάρχει πάλ' ὅτιν ἀκρίτως ἀπείσιν γαστρός. Quod est: Itaq; extreme cruda præter has vniuersas existit. Talis autem erit exacte aquosa, ut quæ nec modo coquatur ut turbida, nec coquenda est, ut quæ paulo post turbatur, verum ut desperata concoctionis accidens. Talis venosi generis affectus existit, qualis exacte ventris crudititas.

*Aduerte.* His vicina est. Recenset ordine crudarum differentias, quas etiam Galenus breuiter hunc in modum commemorat: χειρότερον μὲν ἢ εἰς ἔργα διάρροια, μοχθηρόν δ' ἰκανῶς καὶ τὸ λεπτόν ἐν τῷ καὶ λονῶν, ὅτιν καὶ τὸ ὑδαρ. τοῦτω δ' ἐγγύς ὅτιν ἔτ' ὅτιν ὅτιν ἐν πολλοῖς τῶν νόσων φαίνεται, ὡς δὲ ὅτιν ἰκανῶς λονῶν καὶ λεπτὸν μεμυγμένον ἐκ τῶν ἰδιῶν. Quod est: Deterrima quidem in vrinas profluxio. Iam verò praua admodum est tenuis adeo ὅτι alba, qualis ὅτι aqua existit. Huic autem vicina est alia vrina, quæ in multis morbis apparet: ὅτι vini albi admodum ὅτι tenuis mixtam habere speciem videatur ὅτι. Paulus fere eadem habet, nisi quod δὲ hoc est, vini, nullam mentionem faciat. Tu igitur apud te considera, num Galeni scripturam malis, an intelligere ἐγγύς ἰκανῶς το λεπτὸν καὶ λονῶν, quod est: Alteram vrinam esse admodum propinquam tenui ὅτι albe vrina, quæ aquam representare dicebatur. Oroscius locum hunc nimia sua diligentia intactum præterijt.

*Castigantur græca.* Tantum vero crassicie ipsam ab aquosa. In græco codice est το ὑδαρ, hoc est, ab aqua: ubi legendum sit ὑδατῶδες, id est, ab aquosa, nec hoc aduerterunt Aristarchi.

## IN XV. CAPVT.

*Sputa.* Sputum subflauum, subrusum. Ex eodem Galeni loco, ὅτι Orisbasij sexto libro collecta ista videntur. Hippocrates in prognosticon secundo prius omnia est complexus.

Etenim præter sanguinem. Hac periodus libro secundo prognosticon à Galeno sic scripta est: πλὴν γὰρ το αἵματι, ἵς ἂν ἀνταρῶν ἢ μοχθηρὰν ἐνδείκνυται διάθειν, ἐπὶ δὲ μάλιστα φλογώδης πλὴν γένεσιν ἔχων, ὃ μὲν ξανθὸς, βρογχίμενος αὐτῆς τ' ὁρρώδες ὑγρότης, ἢς ἰδιμυγμένους ὡχρὸς ἐφάνετο, ἢ ἡ ἰώδης ἐξ ὑπ' ὁρρῶδους ταύτης. ὃ ἡ μέλας, ἢ τοι τ' αὐτῆς ὑπ' ὁρρῶδους, ἢ πρὸς δὲ λανίστην τε καὶ διαβρωτικωτάτη γίνετ' ἡ μέλαινα χολή, ἢ το παρ' αἵματος ὁμοίως ξυραυθίνῃ, ἢ λόγῳ νεκρώσεως τε καὶ ψύξεως. Hoc est: Nam præter san



sanguinem, quicunque syncerus humor fuerit, prauam indicat affectionem, ex flammea caliditate trahens originem. Flauus sanè, serosa ipsa humiditate retorrída, qua admixta, pallidus apparebat. Erioginosus autē, hac nimis adusta. Niger, vel eadē supra modū adusta, quae efficitur atra bilis et pessima, et maxime erodēs, vel crasso sanguine similiter resiccato, vel ratione tū mortificationis, tū perfrictionis.

Cruenta igitur. Galenus loco iam citato in istum modum habet: τὰ μὲν γὰρ αἰματώδη καὶ φλεγματώδη, μέτρια, τὰ δὲ αἷμα ξανθὸν καὶ μελαίνον χολεῖς, χαλεπὰ διαβρωτικὰ μὴ γὰρ ὄντι ἀμφὶ τὸ σωματικόν, καὶ τῶν αὐτῶν λιπῶν. Hoc est: Etenim cruenta et pituitosa moderata: Flauae autē, aut nigrae bilis sputa difficilia. Quippe ambo corpora erodūt, atq; hoc ipsis est cōmune. Paulus non habet φλεγματώδη.

Nam si prompte excreentur. Hoc est ex Hippocrate: εἰ γὰρ ἐν πετεινῷ ἀναψύοιτο. Galenus interpretatur dictionē ἐν πετεινῷ, quod nos vertimus propter, hoc pacto. τὸ δὲ ἐν πετεινῷ ἀντὶ τοῦ ῥαδίως τε καὶ ἐτοίμως οἱ ἐλλωθεύονται. Rursus: ἐν πετεινῷ ἀναγὰρ ὡς τοῦ, τὰ τε σπέρματα καὶ τὰ ἐκ τῶν ῥαδίων γίνονται, μήτ' ὁδύνῃς ἰσχυρᾶς ὄντος καὶ τὸν δόρακα.

Valde crassum. Graecus codex habet ὑπερπαχὺ quod est subcrassum, pro ὑπερπαχὺ, hoc est, supra modum crassum, ex pituita nimium affata nimirum. Praeterijt Gemusaeus.

At si expuatur quidē. Codex graecus deprauatus est, habet enim εἰ δὲ μὴ ὡς οἰοῖτο μέλαν, ἀλλὰ, pro εἰ δὲ μὴ ὡς οἰοῖτο μὲν, ἀλλὰ ὥς.

Castigatur  
codex graecus.

Emendantur  
tur graecae.

## IN XVI. CAPVT.

Diarias febres. Hoc principium sumptum est ex primo Galeni libro ad Glaucōnem circa principium. Dicuntur autem ἐφήμεραι graecis, quasi dicas ad diē durantes: ἀμφήμεραι autem, circa singulos dies infestantes, quotidianae vno verbo latinis appellantur.

Diarias

Opportuni sunt. Ista cum sequentibus ex octauo Methodi Therapeutices huc translata sunt. Paulus ἐφ' ὧν αἱ ἀπὸ ῥοίαι τοῦ σώματος εἰσὶν ἐν ἀτμώδεσ, ἀλλὰ ἀρμητι καὶ διορ καὶ πνέμενον ἐν ἀτμώδεσ, ὥς. Galenus autē habet: ἐν οἷς ὄντι τὸ διαπνέμενον ἐν ἀτμώδεσ, διορ καὶ ἐν τοῖς ἐν χύμοις. ἀλλὰ διαπνέμενον, καὶ ἀρμὴν, καὶ καπνὸν ὡς ἀπὸ ῥοίαι καὶ λινῶν ὥς.

Lauare quidē nō subindē. Paulus graece habet λούειν μὲν μὴ πλύνειν, hoc est vt verti. Galenus autē οὕτως ῥησιν, ὅτι καὶ ὡς δύνειν τὴν πολλῶν, quod est: Neq; frictionibus, neq; balneis multis indigent.

Conferuntur  
loci.

Vehementer refrigerata. Graecus codex deprauatus est. Habet enim ψυχρὸν τὰ δὲ αὐτὰ σφοδρῶς καὶ ὡς ὥς. Vbi sit legendum ψυχρῶς δὲ αὐτὰ σφοδρῶς, vt nos etiam vertimus.

Græca  
viata.



Viſtus dulcibus. Hoc eſt bonus. Nam bonus in corpore ſuccus aut ſanguis, dulcis eſt, & dicitur: malus autem, amarū, acidam, aliāve qualitatem extraneam habere oſtenditur. Perperam igitur nos corripuit Oroſcius, quod dulcis ſucci γλυκύχυμα & verterim: cum idem ſit dulcis & bonus in probi ſanguinis ſignificatur. Male habet Codex græcus viciatus. græcus codex γλυκύθυμα &. Vide Galeni octauum circa principium.

Aliquos horum nutrire. Codex græcus eſt deprauatus habet, τὸ τῶν τινὰ τρέφειν, pro τῶν τινὰς φέφειν. Vide octauum Galeni de morbis curandis. corrigenda ſunt omnia exemplaria impreſſa.

Sed vlceri quod. Plenius in Galeno hac ſententia habetur in hunc modum: ἀλλὰ τὸ ἔλκος ἐφ' ὅπῃ ἂν ὁ βλάβῃ αὐτοῖς ἐν γέγονε μὲν &, αὐτὸ τε το βλάβῃ & προνοοῦμενοι λείοντες ἡμῶν τὴν παρορμήν το γονομένου παροξυσμῶ. Hoc eſt: Sed vlceri ob quod Bubo ipſis fuerit excitatus, ipſiq; buboni proſpicientes in acceſſionis declinatione lauuant.

Cæterum à vino. Hæc clauſula ad verbū ex primo ad Glauconem ſumpta eſt. Vbi etiam dictio πρὶν accipitur pro μεχρὶς οὖν, hoc eſt donec: aut ſic dicendum: Cæterum priuſquam inflammationes fuerint ſolutæ, arcendi à vino ſunt egroti. Atq; hoc pacto ſeruabit dictio communem ſignificatum.

## IN XVII. CAPVT.

**P**utridæ febres. Hoc caput ex primo Galeni de febribus libro totum transcriptum eſt: ſed varijs ex locis. Textus autem in græco Pauli codice deprauatus eſt. Habet enim τὸ ἐπὶ σφόδρα πυρετῶν διάγνωσις, τὸ μὲν δὲ προκαταρτίσιν αἰτίων προσηγῶσθαι, καὶ τὸ μὴ ἀπὸ πίπτειν δὲ ἀρξῶσθαι τὸν πυρετὸν. Hoc eſt: Februm ex putredine contractarū dignotio eſt, quod nulla cauſa primitiua præceſſerit, & quod non à rigore febris inceperit &c. Quæ ſententia plane falſa eſt. Nam proprium plane februm putridarum eſt à rigore inchoare. Oroſcius & caſtigatōr Baſilienſis, clariſſimi & medici, & philoſophi, vt ipſi audire volunt, hæc opinor tanquā parua neglexerunt. Tu autem quiſquis veritatem amas in hunc modum corrigito: τῶν ἐπὶ σφόδρα πυρετῶν διάγνωσις τὸ μὲν προκαταρτίσιν αἰτίων προσηγῶσθαι, τὸ δὲ ἀπὸ πίπτειν ἀρξῶσθαι τὸν πυρετὸν, ἕτ' ἐγναύσεως &c.

Corrige græcū. Hoc enim ſingulariter. In codice græco ſuperfluum eſt τὸ, poſt μέρτερον adde δὲ particulam. quia noua incipit oratio.

Similiter ad ipſas. Græce eſt ἰδιὸν δὲ μάλιστα τῶν τοιούτων πυρετῶν. Galenus habet: ἰδιὸν δὲ τῶν τοιούτων μάλιστα. Si voles, ita legito.

IN



## IN XVIIII. CAPVT.

**S**I vires sint validæ. Ex Galeni vndecimo Methodi sumpta sunt ad verbum. In nono libro circa principium, ait in eundem fere modum: Nam si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre venæ sectionem iubebis, quantum satisfacere, tum ad eorum concoctionem, tum vt excrementa descendant, videbitur.

Putrida per vrinas. Et hæc ex vndecimo, sed paulo ante, mutatus est Paulus. Oportet enim id quod putruit, omni ratione vacuare, quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu, ad exactam symmetriam reducere &c.

Si vero febris magnitudo. Galenus addit ad planiorem intellectum, vt in continuis. Hæ enim magis hominem affligunt, quam intermittentes.

Vires inuvalidæ. Græcus codex Pauli habet *ἡγεὶ τῶν δυνάμεων ἰσχυρῶν*. Hoc est: Et vires validæ, cum sit legendum *ἡγεὶ τῶν δυνάμεων ἰσχυρῶν*. Hoc est: Et vires non validæ. Præterijt hoc Gemusæus. Textus græcus viciatus.

## IN XIX. CAPVT.

**T**ertiana febris cum sit. Ex secundo libro de crisibus, capite tertio hoc transcriptum est iisdem plane verbis. Ceterum Galenus post illa, in hanc quoque sententiam habet: *τὸν δὲ ἄνευ τῆς τετραῖος ἡ ἐν δέχεται μὴ ἔμετα πύους σφοδρῶς γινέσθαι*. Quam orationem Leonici- Leonici error. cenus vertit. Tertianam itaque febrem fieri contingit sine rigore vehementi &c. Cum sit dicendum: Exactam itaque tertianam non licet nisi cum rigore vehementi fieri.

## IN XX. CAPVT.

**E**xquisitam tertianam. Ex primo ad Glauconem hæc Paulus transcripsit. Nonnihil autem à Galeno variat, breuitate sermonis intelligo, quæ tamen sensum nonnihil obscurum reddit. Verba ad Glauconem ita habent: *ἡγορεῖται δὲ ἡ χρεὶ τὸν μὲν εἰς τὸν γαστέρα σφύριοντα ἡνέσθαι δι' ἐμέτων. τὸν δὲ ἑλκὶς τῶν ἰόντων ὡσάυτως διὰ τῆς ἑλκὶς ἐκπίπτους*. Quod est: Humorem itaque in ventriculum confluentem, per euomitiones euacuare oportet: inferius autem descendentem similiter per internam excretionem. Paulus autem in istum modum: *ἡγεὶ τὸ μὲν εἰς γαστέρα σφύριον, ἡνέσθαι δι' ἐμέτων τε καὶ ἑλκὶς*. Hoc est: Et quod sane in ventrem confluit, euacuare per vomitum, & inferna &c. In Galeni verbis γαστέρα pro ventriculo: apud Paulum pro toto ventre positum esse existimandum, si concordet alio qui intelligas.

Vinis autem admodum vetustis. Lectio in codice impresso



plane mutila & deprauata est. Habet enim ἀπέχου διέμελιτ & ;  
 ηὐτὶ νάπυ & ἢ ταρίχας, ηὐτὶ τῶν φύσει δρῦων ταῦτα μὲν ἐπὶ πάλαιον. Ex Galeno & Oribasio legendum: ἀπέχου διέμελιτ & τε  
 ηὐτὶ νάπυ & ἢ ταρίχας, ηὐτὶ δὲ δειμίων ἀπάντων, ἢ δινῶν διέ τῶν  
 φύσει δρῦων, ηὐτὶ πάλαιον ἰκνῶς. &c. Atq; sic nos reddidimus  
 latina: In priore enim lectione nulla vel acriū, vel vini facta est me-  
 tio. Orosius & castigator Basiliensis non aduerterunt.

## IN XXI. CAPVT.

**L** Auare in tertianis spuris. Hæc quoq; ex eodem loco sunt huc  
 trāsata. Dictio autem τὶ in græco exemplari desideratur. Le-  
 ge igitur: ἀλλὰ τὶ ηὐτὶ τῷ τριήκοντι. Quod ceu paruum Aristar-  
 chi nostri contempserunt.

## IN XXII. CAPVT.

**Q**uartana. Ex primo etiam ad Glauconem & sexto Oribasij  
 hæc sumpta sunt. De rigore autem quartanæ febris, Galenus  
 cum alibi, tum in libello de tremore & palpitatione inquit: τὸ δὲ τὴν τε-  
 ταρταίων οἱ περιελόντες ἀχρὶ ηὐτὶ τῶν ὁσῶν φασὶ δινῶν, ὅταν ἢ σφο-  
 δρόν. Hoc est: Rigorem quartanarum qui experti sunt, etiam ad of-  
 fa usque penetrare affirmant, cum vehemens fuerit.

Nec bilis vomitus. Sed pituita intelligas, comitatur etiam lie-  
 nis inflammatio, tumor, interim fastidium, intesa interim cupiditas.

Pulsus exiguus ac rarus. In hac febre inæqualitas pulsum in  
 uno ictu manifestissima deprehenditur. Multo enim velocius prin-  
 cipium motus finemque inuenies quàm medium.

## IN XXIII. CAPVT.

**Q**uartana. Ad verbum omnia ex Galeni libro iam sapius  
 nominato, compendiose transcripsit. Quanquam id antea fe-  
 cerit Oribasius libro sexto

Castigatur  
 codex græ-  
 cus.

Qui refrigerant corpus siccantq; . In græco codice erat ὑγρα-  
 νόντων, hoc est, humectantium, pro ξηρανόντων, quod est, siccantium.  
 Miror tā apertū viciū indices nostros adeo oculatos nō deprehēdisse.

Restitutus  
 codex græ-  
 cus.

Tum per dies aliquot. Male est in exemplari græco διήμερων  
 τριῶν. Quod est: Per dies tres, pro διήμερων τριῶν. Id est: Per dies:  
 aliquot. Basiliensis corrector hoc quoque neglexit.

Quod succum Cyrenaicum. Galenus hoc medicamentum ma-  
 xime etiam commendat libello de Tremore, ceu ad rigorem, quarta-  
 nosq; circuitus, vtilissimum.

## IN XXIII. CAPVT.

**Q**uotidiana. Ex quinto capite secundi libri de crisibus excer-  
 pta sunt. At Galenus libello de Typis, latius accidentiæ

enit



enumerat in hunc modum : ἀμφιμερὲς δὲ παρέπειθ' ὑγρότης ἔξως, καὶ φλεγμῶδες ἐμετοὶ, καὶ δαΐψ' οὐκ ἰδίτετα μέλον, καὶ βαρυσμός το σώμα' ὅλης, καὶ ὕπνος λαγῶδης, καὶ λαταφορικὸς καὶ σφυγμὸς μέγας, καὶ ἀραιὸς καὶ χαῦνος τὸ πρόσωπον ὑποπέδιλον, καὶ χαῦνον, καὶ πεπονῶδες, καὶ πολὺν ἰμφᾶνον πλὴν τ' ὕλης λαχέξιν, καὶ ῥοπήν &c. Hoc est, ut ignari linguarum intelligant: Quotidianam vero comitatur habitudinis humiditas, vomitus pituitosi, sitis non intensa, grauitas totius corporis, somnus soporosus, veternosusq; pulsus magnus, rarus, laxus, facies subliuida laxa, peponum modo tumida, quæ magnam materie prauitatem, & mutationem representet.

Aquosiora. Gal. addit lib. iam citato: καὶ φλεγμῶδες καὶ ἰκνῶτερα, quod est: pituitosiora, quæ ipsam febris causam ostendunt.

## IN XXV. CAPVT.

**Q**uotidianam curantes. Ex primo ad Glauconem libr. Galeni Paulus hæc descripsit.

Oxymelite. Simplici intelligendum, ut quod omnes meatus artus aperiat, ne crassus alibi humor, vel glutinosus adhærescat. Conuenit autem cum etatibus, tum naturis vniuersis.

Primis diebus. Græce est κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας. Male autem in Galeno ad Glauconem μετὰ τὰς πρώτας ἡμέρας habetur, castigatus. quod etiam castigator Basiliensis non mutauit.

Ventriculi. Sic verti γαστρός, quæ dictio nunc pro ventriculo, γαστήρ. nunc pro toto ventre accipitur. Galenus libello de typis febrium ait: συνίσταται ἡ μάστις ἐπὶ τοῦ ἁγίου κακοπραγῶν. Quod est: Constituitur autem potissimum ob stomachum male affectum. Propterea Paulus recte dixit ventriculi, & oris ipsius rationem esse habendam, quāquam accadat interim, ut in hac febre etiam lien scyrrhum contrahat.

Idq; tam diu, quā. Græce est: κατὰ πολὺν ἔως οὗ πάνθ' ἤ. Hoc paulo secus sonat, quā reddiderim. Galenus non habet: Εὐq; multi, à quodam alio quā Paulo fuisse adiectum putant.

Nota.

## IN XXVI. CAPVT.

**S**i vitrea pituita. Ex Oribasij sexto sumptum est. Vitrea autem spituita à Galeno libro secundo de febrium differentiis explicatur, in hunc modum: ὑαλώδης δὲ μοι δονεὶ προσκατορεύει ὁ πρᾶξις τὸν χυμὸν τοῦτο, οἱ νεώτεροι δὲ οὐκ ὄντι καὶ φίλιππ' ὡμὸν ἀπλῶς. Item in commentario de Tremore in hanc sententiam: οὐ μόνον δ' ἐπὶ τῇ ξανθῇ ἢ μελαίνῃ χολῇ ῥίηται, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῷ ψυχρῷ φλεγματι φίλῃ γίνεσθαι. κατὰ δὲ ὑαλώδης τὸν χυμὸν τῶτον ὁ πρᾶξις γίγνεται, &c. Hoc est: Non solum autem ob flauam, aut

nigram



nigram bilem rigor, sed etiam ob frigidam valde pituitam fieri solet, vocat autem humorem hunc Praxagoras, vitreum. Subiungit autem: Verum hic rigor non adeo vehemens est: quāquam pluribus nonnunquam diebus subsequētibz perseveret.

## IN XXVII. CAPVT.

σωηχῆς.  
σωωχὸς.

**C**ontinentes. Ex sexto capite libri secundi de Crisibus excerpta sunt. Interpretatus sum hic febres continentes, quas Graeci σωηχῆς appellant: continuas autem, quas σωωχὸς. In Latina quoq; lingua duas voces usurpemus. Ceterum Galenus intelligit continentes, quarum materia in vasis subsistit: vbi enim ea per totum corpus delata fuerit, intermittentes appellatae, fiunt.

Acumine. Graece est ὀξύτης. Nam vt ὀξύς acutus morbus dicitur, ita derivatiuum ipsius ὀξύτης, acumen, celeritas, aut precipitantia, aut quocunq; modo libet appellare.

## IN XXVIII. CAPVT.

Restituitur  
codex.

**C**ontinuarum. Vide nonum Methodi, & sextum Oribasij. Per continuas autem hic intelligo σωωχὸς, qui ex sanguine potissimum constituuntur. Male in Graeco codice legitur τῶν σωηχῶν pro σωωχῶν. Neglexit hoc Gemusaeus. Nam σωηχῆς vocabulum generale de omnibus febribz ex quocunq; humore continue affligentibus. σωωχὸς autem de febre ex sanguine vel putrido, vel effervescente usurpatur. Barbari hanc faeminino genere synocham nominarunt.

Emendantur  
Graeca.

In vigesimo nono capite codex Graecus habet παχῆα pro παχῆα. Non enim crassa lingua, sed aspera, vel scabra dicendum est, hoc in loco, quod castigato Basiliensis in codice suo aliqui emendato non aduertit. Ceterum caput hoc & inferius ex sexto Oribasij descriptum est. Praecipit autem ardenti febre laborantes non sola aqua, sed mulsa aquosa nutriendos esse. Cuius rationem Galenus in commentario Hippocratis de morbis acutis: Aqua, scribens, natura frigida, tardè penetrat, & quā plurimo tempore in praecordijs subsistens, in acutis morbis corrumpitur: mel bile scit, ob id mulsa aquosa dari debet: vt aqua nulla in superiore ventre facta mora à melle mixto ad distributionem trahatur. Non autem aqua cruda, sed cocta esse debet.

διατῆν.

Sustinere. Ita sum interpretatus διατῆν, hoc est, nutrire, alere. Celsus ait, cremore ptisanae sustentandi sunt. Atq; hoc loco proprie dicendum est, Sustinere. Quia tantum cibi hic porrigitur, quantum viribus sustinendis sufficit.

IN



## IN XXXII. CAPVT.

**D**Vplex hecticarum. Galenus libro primo de febrium differentijs, Oribasius sexto eadem plane habent. Leoniceus & Laurentianus parum recte in translatione Latina se gerunt. Quid autem sibi velit Orosius interpretando ἢ ἡγεῖ μὲν οὖν οὐκ ἐστὶ συχνὴς, vel etiam si humiditatis aliquid continuum permaneat, eruditi iudicent. Cum melius dixisset, vel etiam madore adhuc copioso, aut multo permanente. Nam συχνὴ non tantum συνεχὴς significat, si Hesichio credimus, sed etiam πολλὴς. Præterea sensus hunc significatum requirebat. Caterum Hectica dicitur, quod stabilis sit, ac solutu contumax, vel quod totum corporis habitum occupet.

Aduerte.

## IN XXXIII. CAPVT.

**H**ECTICA febre. Vide Galenum libro decimo Methodi medendi: ubi paulo manifestius curationem hecticarum persequitur.

Moderato. Græcus codex habet aduerbium μεμετρημένως, quasi dicas mensuraliter. Nam Gal. 10. magnam curam habendam esse dicit mensuræ, frigida febricitantibus exhibenda.

μεμετρημένως.

## IN XXXIII. CAPVT.

**Q**VANDO quidem tertiana. Hec Galenus in secundo fere de febrium differentijs, Oribasius in sexto tradidit. Caterum nomenclaturæ rationem in libello de Typis interpretatur. Est autem semitertiana triplex: Parua, media, & magna. Parua viginti quatuor horas absoluit. Media triginta sex. Magna quadraginta octo, atque continuæ proxima est. Porro ætati mediæ accidit, & tempore potius autumnii, cum etiam valde periculosa est, non solum stomachum, sed etiam nervosam partem, & ut summam dicam, media attingens.

## IN XXXIV. CAPVT.

**P**UBLICÆ grassantes. Vide Oribasium sextum, Hippocratem in commentario περὶ ἰδιότητων, & de natura hominis. Caterum morbos publicæ grassantes voco, quos Paulus πανδημίας & λοιπὸς sua lingua appellat. Opportunū autem hic est explicare, quos nam Græci ἰδιότης, ἐνδημίας, sporάδες, πανδημίας, nominent. Galenus itaque commentario primo in primum ἐπιδημίων in hunc modum scriptum reliquit: μεμνησθαι καὶ τούτων εἰς τὰ μέλλοντα λεγέσθαι γινώσκουσιν, ὥς ἐνία μὲν τῶν νοσημάτων λοιπὴ πολλὰς λατὰ λαμβάνει, ἃ δὲ λέγεται λοιπὰ. Hoc est: Meminisse convenit horum ad ea quæ post dicuntur, sciendumq; nonnullos sane morbos communiter multos corripere: qui sane vocantur communes. Statim subdit: τῶν δὲ λοιπῶν τὰ μὲν ἐνδημια εἰσι, τὰ δὲ ἐπιδημιατε καὶ ἐπιδημια.

τῶν



τούτων δὲ τὰ χαλεπώτατα λοιμώδη λεγέται. Id est: Ex communi-  
 bus alij vernaculi sunt, alij aliunde in populum ingruunt. Horum  
 periculosissimi, pestilenciales appellantur. Item ἐνία δ' ἐκαστον ἰδίαν  
 τὰ σποράδην προσαγορεύοντα. Nonnulli singulos priuatim in-  
 uadentes dispersi, ac erratici nuncupantur. Paulo supra: πολλοὶ δὲ  
 ὡς ἐν τοῖς γένεσι τῶν ἐπιδημίων νοσημάτων ὅσα λεγόμενα εἶναι γίνονται,  
 καὶ λοιμώδη λεγέται. τὸ δὲ τῶν ἐπιδημίων ἐν τοῖς τῶν πνεύματι καὶ  
 πνεύματι γένεσι εἶναι τῶν σποράδην νόσους ἀντιλαμβανέται. Hoc  
 est: Itaque constat ex popularium morborum genere eos esse, qui mali-  
 gnissimi generantur, & pestilenciales dicuntur. Populares autem  
 illorum genere comprehendi, qui undique, & communiter in omnes  
 grassantur. Quod genus morbis priuatim, & inter se dissimilibus op-  
 ponitur. Habes fere omnium appellationes explicatas: quo autem di-  
 lucidior fiat interpretatio, pauca ex primo Hippocratis de victus ra-  
 tione in morbis acutis subiiciam. Verba sunt Galeni in commentario  
 primo: πολλοὶ δὲ διὰ τὸ λόγος τούτων, τὰ μὲν τινὰ πολλὰ γίνεσθαι  
 νοσήματα λεγόμενα ἐν χρόνῳ, ἅπερ ὅταν μὲν ὀλίγη γέννηται, λοιμὸν  
 νομίζουσιν, ὅταν δ' ἐπικρίσῃ, τότε τινὶ προσγορίᾳ δηλοῦν, ἐπὶ δὲ  
 καὶ λεγόντες, ὅτι εἶναι τὸ μὲν ἐπὶ δῆμον νόσημα τὸ λεγόμενον χρόνον τι-  
 νὰ πλεονάσαντι τινὶ χωρίῳ, τὸν δὲ λοιμὸν ἐπιδημίων ὀλίγων. ὅτι  
 καὶ ἄλλο γένος νοσημάτων λεγόντων πολλοῖς ὅτι τὸ λεγόμενον χῶ-  
 ρον ἐπιγινώσκον, τὰ ἐν δὲ καλούμενα. τούτοις δὲ ἀντικρίνεται  
 πᾶσι αἱ σποράδες νόσοι, διαφύοντες ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐν  
 λεγόμενον χρόνον ὅταν σωστὰ εἶναι. Hoc est: Indicat autem in  
 hac oratione, multos sane quosdam morbos uno tempore fieri, quos,  
 cum perniciosi fuerint, pestilentiam nominant: cum mitiores, alia  
 quadam appellatione significant populares aut vulgares nuncupan-  
 tes. Ut popularis quidem morbus sit, qui certo tempore in regione qua-  
 dam dominatur. Pestilentiam vero morbum popularem perniciosum.  
 Iam vero aliud quoque morborum genus est, multis commune, quod  
 ex loci natura superuenit, vernaculum appellatur. His autem omni-  
 bus opponuntur, priuati morbi, diuersa ratione egrotos infestantes,  
 non communi modo constituti &c. Haec lenius Galenus noster: cuius  
 sententiam ita interpreto. Morbi qui undique populatim, nul-  
 lo non tempore anni grassantur, nulli, nec sexui, nec aetati, nec corpo-  
 ris statui parcent, πνεύματι, & πνεύματι appellantur Graeci, ex  
 aëre infecto trahunt originem. Qui autem certo tempore in regione  
 quadam publice dominantur, ἐπιδημίων, quasi dicas populares, aut  
 vulgares nuncupant, similiter ex aëre, aquae viciatae potu, stagno-  
 rum, paludumque graui halitu procreantur. Qui autem perpetuo in re-  
 gione



gione quadam incrudescunt, ἡδύμυξ Græci, patrios nostri & ver-  
paculos nominant, simili fere ex causa oriuntur. Porro fit interdū,  
ut morbus regioni peculiaris, & generalis vno tempore simul inua-  
dant, pro aëris, aliarumq; circumstantiarum ratione. At morbi pri-  
uati cuiq; inter se dissimiles, σποράδες vocauit Hippocrates, ex vi-  
ctus ratione trahunt originem.

Cibi que igitur communes. Non solum aër teste Galeno com- Cibi commu-  
munes morbos efficit. Siquidem qui in Aëno dum fames grassave- nes.  
tur, leguminibus vescabantur, crurum impotentes euaserunt. Item  
qui Eruo genuum dolore cruciabantur. Nouimus autem nonnullos,  
qui etiam triticum semiputridum fame coacti ederunt, in commu-  
nem incidisse morbum ex causa communi. Et alibi exercitum totum  
praua vsu aqua similiter in omnibus militibus noxam sensisse.

Afflictiones corporis. Cum Hippocrates dicit alios morbos ex  
victu procreari, intelligit etiam vitæ studia. Nempe exercitia, otium,  
vigilias, tristitiam, iram, perfractionem, insolatum, balnea quoque  
non suo tempore vsurpata, morbos excitare, saltem ratione secun-  
daria.

Hæc quidem non. Græcus habet: τὰ ὅτι μὲν ἐν, quod sonat: Castigandus  
Hæc quidem igitur. Verum mea sententia legendum videtur τὰ ὅ- Græcus.  
τι μὲν οὐ, negatur, id quod tum autoritate Oribasij, tum ipsa ratio-  
ne probare possum. In primis enim Oribasius sexto libro hanc lectio-  
nem confirmat: deinde in eodem capite statim Paulus dicit: Si qui-  
dem in alias causas nec omnes simul incidimus, neq; eis toto die im-  
moramur: aër autem quoniam omnibus circumfusus est, & inspiratus  
attrahitur, ut animalium quoq; corpora afficiat, est necesse. Non di-  
co quod Galenus primo commentario in Hip. Epidemia, vnde ista  
partim sunt excerpta, in hunc modum habeat: τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἐστὶν  
ματῶν καὶ τοῦ αἵματος πάγια ἐστὶ. Hoc est: Qui autem ex cibo aut  
potu fiunt, rari sunt &c. Gemusæus noster vituperandi studio, da-  
minat hanc meam lectionem, nullam adferens vel autoritatem vel ra-  
tionem. Quis amabo ignorat populares morbos continenter quidem  
ex aëre procreari, aliunde autem rari? Sed inquit Gemusæus, ex  
euaporatione lacuum frequentius accidere: cui in hoc respondeo, nul-  
lum vel stagnum, vel paludem morbum communem generare, nisi  
τῷ θερμότητι τὸν αἶρα, ut ait Galenus. Aër autem ipse vel ca-  
lidior, vel frigidior, humidiorve sepe nobis circumdatur. Qua-  
re etiam is morbos potius, quam Solæ paludum vaporaciones, ef-  
ficat. Quæ ut dixi, nunquam corpora humana afficiunt, nisi  
prius

Gemusæus  
natura ma-  
ledicus.



prius aërem ipsum corruerint. At rursus obijciat Gemusæus Galeni sententiam commentario secundo in libellum de natura humana, verba hæc sunt: πολλάνις μὲν γὰρ ἀναθυμιάσεις τινὲς ἐξελθὼν ἢ λιμνῶν, ἢ τελευμάτων, ἢ γῆς τοιαύτης αἰτίας γίγνουσιν τὸ τοιούτων νοσημάτων. Hic dico Galenum velle indicare non solum ex aëre intemperato huiusmodi morbos procreari, quod Hippocrates videtur innuere, sed etiam ex aëre, evaporationibus paludum infeclo. Non tamen negat ex aëre frequentius contrahi. Ad hæc omnia, ex oratione Pauli opinionem meā possum aſtruere. Nam conferens ille aërem cum alijs omnibus supra nominatis causis, raro nos omnes simul in eas incidere pronunciat: non autem fieri posse, ut aëris usum effugiamus. Adde quod aëris tantum remedia enumeret, ubi intemperies aliqua subesse videtur, reliquarum causarum, non item. Vide ergo candidè lector, quid faciat procliuius hominum quorundam ad maledicendum natura.

Nota.

Præterea lignorum. Galenus hoc etiam confirmat libro de Theriaca ad Pisonem in eam sententiam: διόπερ ἐπ' αὐτῷ καὶ τὴν θαυμασιώτατον ἱπποκράτην ὅτι τὸν λοιμὸν ἐκείνου τὸν ἐκ τῆς αἰθιοπίας εἰς τὰς ἑλλήνας φθάσαντα ἢ ἄλλω ἐθελήσαντος, ἀλλ' ἢ φέψας τὸν αἶρα, καὶ ἀλλοιώσας, ἵνα μὴ ἐτι τοῖς ὄντι ἀναπνεύσῃ. λελεύσας ἢ ἀνὰ τὴν πόλιν ὅλῳ θάψεσθαι τὸ πῦρ, ὅχι ἀπὸ τῆς ἀνάφωστος τὴν ὕλην ἔχον, ἀλλὰ σιφάνωνσι καὶ τῶν ἀνθρώπων τὰ ἐνὸς ἀετάρια, τοιαύτα συνειθύνουσιν εἶναι τὸ πρὸς τὴν τροφήν, καὶ ἐπισπένδον αὐτῶ τῶν μυρῶν λιπαρώτατα, καὶ ἰδῆσαν τὴν ὁδὸν ἔχοντα ἵνα οὕτω λευθαρόν γονόμῃον οἱ ἀνθρώποι ἀναπνεύσωσιν εἰς τὴν ἀπαλλαγὴν τὸν αἶρα. Quod olim sic Latine reddidimus: Quamobrem etiam Hippocratem illum, multis admirandum laudo, qui luem illam pestilentie ex Aethiopia Græcos inuadentem, non aliter curauerit, quam aërem mutando, alterandoq; ne talis amplius inspiraretur. Cum igitur ignem per totam Athenarum urbem incendi iussisset, non simplicem lignorum materiam, verum ferta, floresq; suauissimos, fomitem ipsius esse consuluit, vnguentaq; pinguisima, & odorifera ipsis superfundi, ut aërem purum hoc modo redditum homines in mali subsidium inspirarent.

#### IN XXXVI. CAPVT.

**N**Ares destillant. Galenus in commentario Prorrhethici Hippocratis scriptum reliquit: ἀπασῶν δ' ὁσῶν τὸ ἀπὸ ῥίνος τὰ ξερὰ χαλεπῶν ὅταν παχέα ἢ μέλαινα ἀπόσταξιν, ταύτας ὀλεθροτάτας ἐν ῥίσις. Id est: Cum autem omnes è nare stillationes sint periculose, cum crassæ, & nigra fuerint, has perniciosissimas reperies.

Venter



Venter colliquata. ἢ γὰρ τὰς σωτήρας habet græcus codex. Est autem σύντηξις colliquatio, consumptioq; nempe cum particulis quotidie aliquid decedit, nec alimentum recipiunt. Plinius libro vigesimo secundo, cap. vicesimo quinto hac voce utitur, Tali, inquit, sorbitionis genere emendantur syntexes, hinc syntectici eodem autore dicuntur. Licebit igitur interpretari hanc sententiam, venter Tabida, & quæ ex ipsius substantia decesserunt, humore undiquaq; in ipsum confluyente, emittit, partim vomitu, partim inferius.

Aloës partes duæ. Hæc est descriptio pillularum communium: quæ in Nicolao illo præposito viciosa & deprauata habetur. Nam is Catapotra. ponit aloës uncias duas, croci & myrrhæ vtriუსq; unciam vnā, in peste addendum consuluit, bolum armenum. Primum vetus scriptura croci non meminit, deinde thymiamatis ammoniaci, non boli armeni unciam præcipit. Id genus permulta monstra in officinis nostris pertinaciter regnant.

Theriacen ex viperis. Hoc etiam Galenus libro de Theriaca ad Pisonem confirmat in eum modum: τὸν αὐτὸν λόγον νομίζω καὶ τὴν διεξακτὴν, ὥσπερ τι καὶ αὐτὴν ἴσασιν ὡς καθάρσιον, τὰς μὲν προπίνοντες αὐτὴν ἐν τῇ λοιμικῇ κατὰσάσει, μὴ δὲ ὥς ἐὰν ἀλισκεῖσθαι τῷ λακνῷ. τὰς δὲ ἡδὴ φθασάσας παθεῖν βιάσθαι δύνασθαι, ἀλλισθαι, καὶ ῥέψασθαι τὴν τοῦ ἀναπνέειν & αἵρος & πονηρίαν &c. Hoc est: Simili modo Theriacen, seu ipsa quoq; ignis quidā purgatorius existat, præsumentes in pestifero aëris statu, neutiquam malo corripi sinere nouimus. Correptis autē mederi posse, aëris inspirati maliciam in alterando mutandoq;. In Galeni codice græco, qui Basilea nuper impressus est perperam legitur ἀναπνεύσας αἷρος &c. Quasi dicas: Aëris reformati, positum est pro ἀναπνεύσας &c. Quod est, inspirati. Nam qui correpti peste sunt, malum aërem attraxerūt respiratu, non reformatū aut refectū, aut quomodocunq; dicere libeat.

Codex græcus vicius.

## IN XXXVII. CAPVT.

Nonnulli febricitare. Galenus lib. 12. omnia hæc ad verbum habet. Variat autem nonnihil lectio græcorum codicum. Gale ni habet ἐν ὄγκῳ τι μέγιστον τοῦ κατὰ φύσιν ὅλου τοῦ σώματος ὅτι. καὶ ἡ χροιά τοῖς μὲν &c. Hoc est: Et totum corpus vastiore mole quam pro natura modo cernitur, & color &c. Pauli τὸ σῶμα τὸ γαστρὸς, quod est, os ventriculi vastiore mole cernitur. Mea sententia cum Galeno legendum esse censeo. Nota codicū varietatem.

Vt potequos. Apud Paulum impressum est οἱ δὲ καὶ χροῖς τὰς τῶν, pro αἵματι &c. Sic etiam Galeni exemplaria omnia habent. Corrigere græca. Nam ratio datur cur missionem sanguinis, aut purgationem non su-

Αα



stineant. Signat igitur hoc loco, si quidem, dictio ἀγ. Praterijt Orosius, castigatior Basiliensis neglexit.

Sin autem robore mediocri. Galenus, si autem pulsus mediocri robore sit, & magnitudine paulum ad egrotantem refert, cuius tamen vires ex pulsu cognoscuntur.

Ergo si æstas. Galenus non habet, ἡγεῖ δὲ τοῦτος, quod ego interpretatus sum, calidi temperamenti. Nō enim referri potest ad δὲ γ, ut Grammatista putat.

Balneum his aduersissimum. Galenus addit, & aer ambiens vel nimium calidus, vel frigidus.

IN XXXVIII. CAPVT.

**H**istoria. Vitenuium humorum. Ex eodem loco Galeni, & 6. libro Oribasij transcripsit. Dicit aut paulatim & continue alendos huiusmodi humoribus laborantes: praterea fructus, quos ὀπώγες greci nominant, exhibendos. Supra verti poma, quod nihil refert. Nā fugaces, seu horarios, seu tempestiuos, ὀπώγες greci appellant. Hoc remedium olim Lutetiae in quodā adolescente continua febris laborante sum expertus salutare. Nam quoties ille vel aluum deicere, vel vrinam reddere extra lectum volebat, aut etiam quoties pedibus tantillum consistere, aut in sella, quousq; ei lectulus sterneretur sedere, in sincopen solebat incidere: ac videntes hoc aliquot medici, de salute minus sperare cœperunt. Ego videns iuuenem natura biliosum, tenuiq; sanguine præditum, cogitavi illi quoquo modo virium dissipationem impedire: ac statim quum è lecto in sedem esset collocatus, porrexi ei vrinam recentem nondum exacte maturam: nam initio Augusti accidit morbus: qua assumpta, paulatim per dimidiam horam seruauit hominem extra lectum citra animi defectionem, quod feliciter successisse animaduertens, sequenti die idem facere decreui: exhibitaq; paulo maiore portione, ad vnam vsq; horam sine vllō incommodo ut prius seruauit. Factumq; est tandem diebus insecutis, ut tuto iam extra lectum in cubiculo obambulet, daretq; occasionem reliqua auxilia exhibendi. Hoc te nolui celare lector. IN XXXIX. CAPVT.

**R**eliquæ occasionēs. Ex eodem Galeni loco sumpta hæc sunt ad verbum. Enumerat autem Paulus syncopæ causas, dolorem vehementem, siue ex intemperie, siue humoribus, siue vtriusq; vel etiā ex continui diuortio ortum, vigilias nocte dieq; affligentes, nam somno mediocri vires recreantur, immodica inanitio aut per ventrem, aut vomitu, aut sudoribus, aut vrina, aut sanguinis profluvio. Ac in ijs qui aliena loquuntur, hoc est, qui mente non constant, qui delirant, desipiuntq; Nam παραπαιεῖν verbum signat παραφρονεῖν, ἀλλὰ



ἀλλοφάσαι, cerebro scilicet affecto, adeo ut functiones suas peculia- ἀλλοφάσαι  
res, nequeat edere. In ijs si motus quandoq; corporis fiat, vires collabi  
necesse est. Ad quas conseruandas, & ad syncopen vitandam, singu-  
lare est praesidium, temperamenti custodia. Ante omnia vero trium  
principiorum: mox reliquarum partium, quaecunq; illa in consortium  
affectus principia secum ex facili trahunt.

## IN XL. CAPVT.

**I**Taque dolor. Hec magna ex parte Galenus in secundo de lo-  
cis affectis habet. Reliqua in duodecimo Methodi medendi.

Dolor stupidus. Graece est ἡ μὲν νάρκωσις ὁδύνη διὰ ψυχρὰν γί- ναρκωσις.  
νεται διάθειν. Quod interpretatus sum ad verbum in Paulo. Ga- ὁδύνη.  
lenus libro iam citato ait. καὶ τοίνυν τὸ νάρκωδον ἀλγος διάθειν  
ὁρᾷται ψυχρὰν τε, ἀμὲν ἡδὲν ὁδυνην, quod est. Itaq; stupidus do-  
lor affectionem frigidam simul & dolorificam parit. Aduerte le-  
ctor, Paulus hic dolorem ut affectum, Galenus ut affectus causam  
interpretatur. Verum sequentia in oratione Galeni eos conciliant.  
Nam stupor, inquit, frigiditas quaedam est non exigua, eoq; membris  
hac occupatis difficilem & motum, & sensum parit, atq; ita stupidus  
dolor, non indicat doloris speciem, verum dolorem simul & vel affe-  
ctionem frigidam, vel difficultatem sensus, motusq; ab ea particula  
obortā. Ceterum non solum in neruis, sed alijs omnibus partibus accidit.

Pulsatilis autem dolor. Graece dicitur σφυγμώδης, & σφυμα-  
τώδης πόνος, quasi interpreteris, pulsorius, & pulsatilis labor, vel πόνος σφυ-  
dolor: insignium inflammationum proprius, arteriarum quidem sem-  
per, primario affectu, aliorum vero corporum sensilium omnium, con-  
sortij lege. Ceterum vocem gracam πόνος Galenus sit exponit: ὁ γὰρ  
τοῖς πόνος ἀιδήσις ἔστιν ἀνίαρὰ, καθάπερ ἡ ἡδονὴ πρὸς ὡς ἀιδή-  
σις. Hoc est: Siquidem dolor, sensus est molestus, sicut voluptas est  
sensus suauis, quod Cicero eleganter dixit. Omne id quo gaudemus,  
voluptas est, quo offendimur, dolor.

Sin autem tanquam à palo. Colicorum dolor est, qui in imo vē- Colicus do-  
tris ea potissimum parte vrget, qua vrinarij meatus ex renibus ad  
vesicam exporriguntur. Atq; hinc non ita ex facili discerni à ne-  
phritide potest.

Pūctorius autē. Galen. habet: ἀγξίμιθ' ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῆς νυγματῶ- Pūctorius.  
δὲς ὀνομαζομένου, συνιστάμενου πρὸς τὰς ὑμνὰς μάλιστα. οἷον ἵψος  
τοῦ πάθους καθὰ τὸ νύττωται δὲν ἐν ὁρᾷσι μὲν, ἐκίσχυόμενος δ' ἐπὶ  
πλείον ἐν λύκῳ ἐπὶ τῷ ὁδύνης. Hoc est, ut Copus noster vertit:  
Igitur iterum incipiamus à pūctorio vocato dolore, ac videtur quidem  
veluti ipsius affectus inter pungendam circa membranas potissimum.



verum dolor circa locum punctum ad magnum spacium extenditur. Nos autem, pace illius dictum sit, in hunc modum vertendum putamus. Incipiemus itaq; rursus à punctorio dolore dicto, circa membranas potissimum constituto, cuius affectus veluti radix in eo quod pun-  
gi videtur defixa est, dolor autem longius orbiculatim ad id extendi-  
tur &c. In pleuritide hunc dolorem esse nemo ignorat, acri humore  
membranam costas succingentem pungente.

Pertundens.

Pertundens, vehemensissimis. Hic dolor græcis dicitur διαίρων, quod idem est, ac si dicas διορμῶν, id est, cum impetu perrumpens. Cop-  
pus vertit turgidus dolor, qua ratione, ignoro. Certe in Cephalea, caluaria ipsa perrumpi, pertundi ve dolentibus videtur. Id autē tūc acci-  
dit, quando veluti à radice incipiens, ad vicina transit, ut ait Gale.

Viciatum  
exemplar.

Membrana quidem. In græco codice deest μὴ particula. Le-  
gendum enim ὁ μὴ τὸ τῷ διαμαῖ, ut respondeat sequenti, ὁ δὲ, quod omnes nostri Aristarchi nō aduerterunt. Nec impressum exe-  
plar à Gemusæo castigatum habet. Caterum membrana cuti subie-  
cta quæ sit, audi. Continetur ea cute & corporibus subiectis per fibra-  
rum tela modo subtilium traductus: quam vena cutem nutriendas &  
nerui sensum communicantes permeant.

Viciosus co-  
dex.

Diuellentes cruciatus. Impressa omnia exemplaria habent διορ-  
μαῖς pro διαορμῶν: quanquam Orosius hoc & casti-  
gator Basiliensis non annotarint.

Profundi sunt. Hoc est in alto delitescentes, unde quibusdam  
ἐφόνοποι quasi osium dolores appellantur.

Si igitur sanguinis sit copia. Ex 12. Methodi medendi Gale-  
ni, & 6. Oribasij sequentia sunt transcripta.

Auxiliantes. Miror cur Gemusæus hunc locum deprauatum re-  
liquerit in suo codice, cum plane ad sensum nihil faciat dictio πρὸς  
παρῶν, lege igitur πρὸς βοηθῶντες ex Galeno, ut nos etiam antea  
vertimus.

Castigatur  
græci codicis  
lectio.

Irrorationibus. Hoc est, asperisionibus. Nam λιταίνω est λιταῖν  
ἐλάω, quod signat superfundere. Linacer vertit λιταίνωσις ἢ τῶν  
εἰσέσιον, humidis & siccis fomentis. Quanquam non parum diuer-  
sa nomina sint, variâsq; res significant. Nam λιταίνωσις est asper-  
sio irroratioq; ut Celsi more loquar, ex oleo potissimum ad rem propositam  
idoneo facta, veluti cū multa pituita in ore ventriculi heret, oleum  
in quo absinthium ebullierit, id superfundimus τῷ γίαις quæ & τῶν  
πίαιμα, & τῶν πικρὰ, & δέμασμα græcis dicitur, triplex est. Nēpe hu-  
mida, sicca, & mixta, si Hippocrati & Galeno credimus. Humidū  
δέμασμα. fomentum, spongia mollis magna; ex aqua calida expressa, applica-  
taq;.

τῶν πικρὰ.

τῶν πικρὰ.

τῶν πικρὰ.

δέμασμα.



taq̃. Huius generis est aqua calida, aut oleum in vtriculos, aut va-  
sa area, fictiliaq̃; aut in vesicam coiecta, partiq̃; dolenti admota. Sic-  
cum fomentū est, miliū, sal, harena in sacculos coniecta, aut solū lin-  
thrū. Itē lateres & titiones pāniculis inuoluti, & sic circumdati. Pa-  
ce cuiusdā docti viri dixerim apud Celsum li. 2. nō esse viciū scriptu-  
ra in dictione, titionibus. Nā tertio eandē repetit, fomentisq̃; inquit, in-  
prolinus validioribus totū corpus circumdare cōuenit, maximeq̃; inuo-  
lutis extinctis testis & titionibus. Mixtum fomentum est, hordeum,  
eruumq̃; prius cōtusa, aceto & aqua macerata, vel etiā farina simili  
modo preparata, & in sacculis apposita. Caterum humida fomenta  
conueniunt inflammationibus ex bilioso humore suscitatis. Sicca ūs,  
quae ex tenui & aquoso sanguine proueniunt. Mixta crassus, visco-  
sisq̃; humoribus incidendis, conficiendis, dissipandisq̃; expediunt.

Sin moles. Quidam parum versati in medicina vertunt dictio-  
nem ὄγκου in græco codice positam, tumorem, nullo plane sensu, quan-  
quam id quoq̃; hac voce significetur. Voco autem hoc in loco molem,  
corpus, quod ab externo supercecidit: quod vel durum, vel magnum,  
vel graue, vel simul ambo fuit. In fine capitis male legitur in codice  
impresso ἔνδον pro ἔνδον.

## IN XLI. CAPVT.

**Q**Uum per ventrem. De hoc accidenti Oribasius li. 6. eadem  
tradit. Caterum syntexin, seu vt latine dicam, colliquationē  
corporis facies illa cadauerosa comitatur. Quod in marcore quem μα-  
ρασμὸν græci nominant, videre est, aut etiam in hectica marasmode.

Ex fonte. Huius loci castigationem Orosius exemplari suo de-  
bet, & Oribasio. Nam omnia exemplaria quae mihi videre contigit,  
habent, ἀπὸ γῆς pro ἀπὸ πύλης, quanquam aqua ex terra intelligi  
possit, aqua ex fonte. Hoc praeterit etiam Gemusaus.

Castigatus  
codex græ-  
cus.

## IN XLII. CAPVT.

**N**onnunquam palpebras aperire. Hoc Galenus confirmat  
lib. 1. de febribus: ὅ μιν inquit, ὁ ἀνατὰς ἐπιπλεον δυνά-  
μις ἐστὶ τὰ βλέφαρα, παραπλησίως τοῖς νύκτασι ἀνδράσιν ἀνδράσιν, καὶ  
μύστοι μύστοι ὡς τὰ πολλὰ, λαβὰρ ὑπὸ τῆς δυνάμεως. ὅτι δὲ ὁ ὕπνῳ  
αὐτῶν τὸ πᾶν, ἀλλ' ἐγρηγόρεως ἀδυναμία. Hoc est: Nec vero  
palpebras diutius attollere possunt, similiter nictantibus perpetuo af-  
fecti. Quinetiam plerunq̃; conuiuent oculis, veluti dormitantes. At  
affectus ipsorum somnus non est, verum vigilandi impotentia &c.  
Hæc quidem de hectica Galenus pronunciauit: nos autem de cuni  
febri, in qua vigilie vrgeant.

Si conuiueant. Male in græco codice ἢ μύστοι, quod est vel con-

Restitue ex  
plar.



niuerere, legitur pro  $\epsilon\iota\ \mu\acute{o}\sigma\alpha\iota\sigma\upsilon$ , quod etiam Orosius annotauit: Basiliensis autem corrector neglexit.

Cibus quodāmodo sit magis accuratus. Ita reddi dictionē græcā  $\omega\epsilon\iota\sigma\gamma\acute{o}\tau\epsilon\alpha$ . Nam verbū  $\omega\epsilon\iota\sigma\gamma\acute{\alpha}\nu$  in bonā partē acceptum est, quod accurare. Id signat ex cura & cōsilio aliquid gerere. Aliquādo in malā partē sumitur, pro eo quod est  $\omega\gamma\acute{\alpha}\tau\epsilon\alpha\ \tau\alpha\ \omega\epsilon\iota\tau\acute{\epsilon}\alpha$ . Galenus alibi  $\delta\iota\alpha\epsilon\iota\tau\epsilon\alpha\ \alpha\eta\epsilon\iota\beta\acute{\alpha}$  in eodē significatu protulit, hoc est victu ac curato, exquisitoq; non de tenui intelligens, sed ex delectu sumpto.

Linctus ex papaueris. Hanc compositionem etiam hodie officinæ vocant diacodyon. Dixit autem Paulus ex sapa, quia duplici modo fieri solet, scilicet ex sapa, & ex melle. Quæ sapa recipit ad somnum conciliandum utilis est. Quæ vero mel, ad sputi reiectionem.

In quibus autem caput. Contrario supradictis modo affectos recenset. Nam illi ob tuſim ex defluxu capitis pulmones infestantem dormire nō possunt, eoq; diacodyon ex sapa assument, quod tennes humores incrasset. Hi autē quibus caput defluxionibus obnoxium non est, suffitu inuabūtur. In sequēti sentētia pro  $\omega\alpha\pi\alpha\chi\mu\acute{\alpha}\iota\varsigma$ , legitur  $\omega\alpha\pi\alpha\chi\mu\acute{\alpha}\iota\varsigma$ . Itē pro  $\lambda\iota$ , quod signat librā pone 7, quod notat drachmam.

Arnabo. Recentiores quidam modo carnabum, modo carnabadium, alij Zarnabum, & Zarnabadium. Odoramentis expetitur. Vide Paulum in septimo. Sunt qui Doronicum in officinis appellatum esse pronuncient. Non salicis folia, id esse putes, ut quidam grammatista hesitabundus exponit. IN XLIII. CAPVT.

$\lambda\alpha\tau\alpha\phi\omicron\rho\acute{\alpha}$ . Soporis noxij. Ita sum interpretatus dictionem  $\lambda\alpha\tau\alpha\phi\omicron\rho\acute{\alpha}\nu$ , quam si penitus introspicias, & ex etymo interpretari libeat, impetus somni vehementioris merito dicitur, & inexpugnabilis pene dormiendi necessitas, ut Celsi more loquar. Dixi autem, noxij, quia sopor etiam bonus est. Lactis modo repenti. Tantiū valet  $\gamma\alpha\lambda\alpha\kappa\iota\acute{\omega}\delta\delta\epsilon\varsigma$  quasi dicas, lactosa. Galenus multis in locis hac voce utitur pro tepido. Non autem pro eo, cui lac sit admixtum. Si vero morbus. In codice græco deest particula  $\delta\epsilon$ , ac legendum est  $\epsilon\pi\iota\mu\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\omicron\upsilon\varsigma\ \delta\epsilon\ \tau\acute{\iota}\nu\omicron\varsigma$ . Noua enim sententia incipit, quod miror Orosium & Basiliensem correctorem voluisse præterire, cū alibi etiā minora à me prætermiſſa ceu capitalia clamat. IN XLIII. CAPVT.

Castigato  
græcum exē-  
plar.

Nonnullis etiam cum igneus sensus, Hoc est, cum comburi videntur nimio calore febris, pulicaris herba, quam græci psyllium nominant, conducit.

Permulceriq; Græce est  $\delta\iota\alpha\psi\iota\lambda\alpha\phi\eta\tau\acute{\iota}\sigma\iota\varsigma$ , à  $\delta\iota\alpha\psi\iota\lambda\alpha\phi\acute{\epsilon}\nu$ , quod Celsus latine dixit, corpus eius leuiter ex oleo veteri permulceatur, &c. hic autē manibus tantū permulceri debet, somni cōciliandi gratia.

IN



## IN XLV. CAPVT.

**E**X absinthio. Hoc est, vt Galenus ait, in quo absinthij coma sit feruesfacta. Siue autem oleum, siue vnguentum, dicas, nihil refert. Quamquam Orosius olea in quæ etiam aromata coniecta sunt, vnguenta dici nolit. contra veterum sententiam. Olei vox

Nardino. In græco codice est  $\nu\alpha\rho\lambda\alpha$ , quod signat nardo: eadem ni  $\nu\alpha\rho\delta$ . mirum locutione qua vsus est Celsus, & Scribonius Largus aliq; veteres. Celsus lib. 3. vngi rosa debet, pro rosaceo. Vt in compositione 210. apud Largum. Idem rosa dilutum explet concava vulnera. pro rosaceo dilutum. Sin autem inflammatorium quiddam. Codex græcus habet  $\phi\lambda\epsilon\rho\mu\alpha\tau\omega\delta\epsilon\tau\epsilon$  pro  $\phi\lambda\epsilon\rho\mu\alpha\tau\omega\delta\epsilon\tau\epsilon\tau\iota$ , quod omnes castigatores Pauli, ceu momenti exigui neglexerunt. Emendato  
codicem græcum.

## IN XLVI. CAPVT.

**R**igori. Medici hodie dictione rigoris vtuntur pro græca  $\rho\acute{\iota}\gamma\omicron$ : quamquam non ita latine Celsus Hippocratis sententiam aliquando veritens pro  $\rho\acute{\iota}\gamma\omicron$  horrorem reddit. Verum nos  $\rho\acute{\iota}\gamma\omicron$  horrorem vocamus. Inopia itaq; linguæ,  $\rho\acute{\iota}\gamma\omicron$  febrium, quasi ad verbum, rigorem interpretamur.

Concertatione naturæ. In græco codice est:  $\delta\delta\iota\iota\epsilon\lambda\upsilon\epsilon\upsilon\tau\epsilon\tau\epsilon\alpha\gamma\omega$ .  $\alpha\gamma\omega$   $\nu\alpha$ . Quod Paulus  $\alpha\gamma\omega$  dixit, ego concertationem naturæ exposui. Nam in crisi natura certat cum morbo. Si eo fit superior, bona crisis est: si morbus vicerit, mala. Quamobrem si natura se accingit ad ea quæ offendunt, expellenda, vt in rigore accidit, meliendum nihil est. Dixi igitur concertationem naturæ dissoluere, vel certamen vel pugnam quam cum morbo habet. Natura quidem in græco non est, sed sententiæ clarioris gratia addidi.

## IN XLVII. CAPVT.

**A**diutareq; calfactu. Recenset hic Paulus, quibus modis sudor per crism erumpens, etiam adiuari debeat, nempe fotu medicri, quiete, calido clystere, adeoque in quiete manere egros vult, vt sudorem non abstergant.

Recreare. Græce est  $\alpha\nu\alpha\psi\upsilon\chi\epsilon\upsilon$ , quod verbum duo significat, refrigerare, & recreare, seu reficere. Hesychius grammaticus dicit idē esse quod  $\rho\acute{\iota}\pi\iota\varsigma$ , euentilare, &  $\alpha\nu\alpha\psi\upsilon\chi\epsilon\upsilon$  interpretatur  $\omega\alpha\rho\alpha\upsilon\mu\acute{\iota}\alpha\upsilon$ , hoc est solatium. Congruit magis id hoc in loco, nempe vires sudorum copia lassas, oppressasq; recreare.

Tenui velamine.  $\omega\epsilon\gamma\epsilon\theta\lambda\alpha\upsilon\omega\upsilon\lambda\epsilon\tau\omicron\upsilon$  in græco codice est. Celsus  $\pi\epsilon\gamma\epsilon\theta\lambda\alpha\upsilon\omega\upsilon$  ait: Veste leui, madida, interpretatus sum  $\epsilon\mu\beta\epsilon\theta\epsilon\tau\epsilon\mu\epsilon\upsilon\alpha\upsilon$  ab  $\epsilon\mu\beta\epsilon\theta\epsilon\chi\omega$  quod est irrigo, madefacio.

Ambæ liquidem. Ad calcem & floces vini referuntur. In



græco neutrum genus est. ἄμφω ἀναβαλλόμενα. ambo ad fouendum applicata, genuino corporis tepore siccantur: siccata meatus per quos sudores erumpunt, obstruuntur.

Qui per validam expressionem. Græce est, λυτ' ἐκβαλῖν, quæ fit natura quasi necessitate quadam oppressa. In doloribus vehementissimis & anima sæpe deficit & sudores frigidi erumpunt. Hi dicuntur fieri per expressionem, validam addidi, significantiæ gratia: Quidam pro ἐκβαλῖν, legunt ἑλκεῖν, quod est animi defectum, quod non male etiam hic quadrare potest. Eruditi indicent.

## IN XLVIII. CAPVT.

ὕπερλωττία

**H**ypoglottia. Formule quedam medicamentorum sunt, quæ in tussi, thoracis arteriaq; vicij assumuntur. Hodie bechicas officina, & penidias appellant. Fiunt autem potissimum ex radice dulci, tragacantho, terebinthina, Zaccaro, alijsq; ad rem propositam congruis. Ceterum Galenus vocat ὑπολωττίας.

Lana sulphure imbuta. Græce est ἐλίου τε θύου μέλον, ad verbum sonat: Lana sulphurata. Orosius corripienti studio potius quàm veritatis, vertendum clamat, sulphure suffita. Quomodo autem lanæ suffiantur, nusquam me legisse fateor, homines suffiri sulphure in tussi lego. Lanam autē vt pice, aut alio pingui, ita sulphure imbui. Imbutas sic applicari. Nam suffitus parū in lana proficit.

Pingue. Græcus codex habet ἡγεῖν ἢ λιπὺς, pro ἡ λιπὺς, accipimus pro pinguitudine, aut oleo, aut quacunque re pingui.

Permulceri. Hoc est, molliter contrectare, supra interpretatus sum διαψιλαφᾶν permulcere, ex Celsi more.

## IN XLIX. CAPVT.

**S**ternutamenta. Vide sextū Oribasij, quomodo autem fiant: Galenus tertio de symptomatū causis explicat. Hic autē Paulus remedia persequitur sternutationis, quæ in febribus molesta esse solet.

ἀλγών.

λεονίων.

Corrige græcum  
cum codicē.

Ilum intentio. Græci λαγῶνα & λεονῶνα eam partem esse volunt, quæ latinis dicitur, Ilia. Quidam vero male ἐποχόνδρια vertunt Ilia, in bonis autoribus parum versati. In codice impresso est ἐνταῖς lege ἐνταῖς. Neglexerunt Aristarchi.

Castigato  
codicem.

Summarum partium. Hic Orosius debet exemplari suo. Nam omnia quæ mihi videre contigit habent, τῶν ἀνθρώπων μυσῶν, quod est, summorum, muscutorum pro τῶν ἀνθρώπων μερῶν.

Mollis contrectatio. Quod ante dixi permulcere, hoc molliter contrectare interpretor Nam idem esse puto. Græca vox est διαψιλαφί.

Spongia ex mari vacuæ. Quidam in codice græco legunt pro λενοί, quod est vacuæ, λεανοί, hoc est, recentes. Vtrunque instituto co-

uenit:



venit: quam tu malis lectionem sequere.

## IN I. CAPVT.

**V**el attemperatos. Cibi fastidium aliàs ex humore pituitoso, aliàs ex bilioso nasci solet. Si pituita in stomacho redūdat, vomitu educenda est. si bilis supernatat, deorsum euocanda. Vbi vero totū corpus purgare vultis aliter faciendū docet Hippocrates. Quod si in primis venis crudi humores, semicoctiq; habeantur, dissecandi, cōcoquendiq; quod Hippocrates πεπασμὸν, quasi mutationem. Huius autē πεπασμὸς. Nota. seculi medici. perperam digestionē appellant. Si in extremis venis corporis habitu sunt infixi, relaxandi veniūt. At biliosi humores, & melancholici, qui vltra sanguinis terminum processerunt, caloris violentia expelli prorsus debent: Si in stomacho nausēā excitēt per inferiora: si in toto corpore biliosi, quod estate potissimum accidit, vomitu purgari debēt: melancholicus aut infra semper. Porro cū iā educūtur, necesse est eos infrenare, coercereq; ne transitu partes afficiant. Itē meliores hoc agendo in locum restituere. Quā rationē, seu potius, vt Galenus ait, cacochymiae curationē greci ἐπιπρασιμὸν nomināt. Verba Galeni nono Methodi in hunc modū habent: χρεὶ γὰρ διανοῶντι κατὰ τὰς τοιαύτας ἐναρτώσεις τῶν ἐνδεξίων κατὰ βραχὺ μὴ ἐκκινῶν τὸ μαχθρὸν, κατὰ βραχὺ δ' αὐτ' αὐτὸ τὸ χρεῖστον ἐνίσθεναι. καλεῖται δ' ἐπιπρασιμὸς ὑπὸ τῶν ἰατρῶν, ἡ τοιαύτη θράσεια τ' ἐκκοχυμίας. Paulus igitur recte etiā dixit: ἢ τοι ἀπορρῦψαι καὶ ἐκκινῶν, ἢ ἐπιπράσσειν τα βελτίους ὁρῶσιν. Quod est: Vel abstergendo excernunt, vel attemperando, coercendo, mitigando furorē illorum, obtundendoq; meliores in locum restituēt. Hippocrates libro de ratione victus in morbis acutis materiā eorum quae attemperare possunt, commemorat. Galenus autem eius interpres paulo apertius in hūc modum differit: de torminibus orationē instituens: σκοπὸς ὃ ὅταν αὐτοῖς, τὸ μὲν τοι καθάρσαι ἐκ ἐκκοχυμίας, τὸ δ' ὑδινεράσαι, τὸ δ' ὑδιξηράναι, τὸ δ' ἐμψύσαι. τὸ μὲν γὰρ τὸ ὄνειρον, καθαίρειν δύνανται, ἢ ἐπιπράσσειν, τὸ δ' ἐμψύσαι τὸ σπέρμα ξηραίνευσιν ἢ ψύξιν, τὰ δ' ἐν τῷ πυρὶ ἄλφειτα, τὸ ὑδινεράσαι ἢ ξηραίνευσιν δ' αὐτοῖς ἀναμίμνηται ἢ τὰ λιπιδίνα, ξηραίνευσιν τε καὶ ψύξιν. οἱ δὲ Αἰγυπτιοὶ λιναμοὶ μεδίως ψύξιν δύνανται. τὰ δ' ὅσα καὶ ἡ σιμίδαλις, ἢ ὁ χόνδρος παχύχυμα καὶ ἐνχυμα, καὶ ὑδιπρασιμὸς. Hoc est: Eo ipsi spectant, vt viciosum humorem partim purgēt, partim attemperent, partim desiccant, partim refrigerent. Lac itaque a sinu purgare potest, & attemperare. Lini vero semē siccare, & refrigerare. Triticea polenta, attemperandi facultatē obtinet. Recte ipsis & ordeacea admixta est, quae & siccet, & refrigerat. Aegyptia autem faba, mediocriter refrigerare potest. Oua, similago, &

Αα 5



Aduerte.

Caligato  
exemplar  
græcum.  
Restitue  
exemplar.  
Emendato  
græca.

chondrus craſſi boniq; ſucci, & attēperatoria exiſtunt &c. Vides igitur, quomodo Galenus utatur diſtinctionibus ἐν τῇ ῥάσει, & ἐν τῇ ῥαυ-  
ρῶναι. Item ἐν τῇ ῥασίν, & ἐν τῇ ῥαίνᾳ. Galenus duodecimo metho-  
di de vinis ſulis agēs ſcribit ἐν τῇ ῥασίν, ὅτι ἐστὶν ἡγεῖν δρεπῆσιν, quod  
poſtea interpretatur ῥεφροι δὲ μᾶλλον, καὶ λιανοχυμῶν ἐν αὐτοῖς δὲ  
ῥα. Hoc eſt: Nutriunt magis, & prauitatē humoris corrigūt, emen-  
dantq;. Linacer ſuperiorem ſententiā nescio quo modo exponit, certe di-  
ſtinctionis vim ignoraffe videtur. Nā quid ſibi vult, præterea miſtibilia  
ſunt, & nutriencia? Dicere enim oportebat, attēperatoria autē ſunt  
(intellige malorum humorum, bonos in locum reponendo, & qui nō-  
dum longius terminos concoctionis exceſſerūt, reducēdo, acrimoniam  
iſorū obtundendo.) Ne autē putes bilem abſolutā, aut ſlanā, aut ni-  
gram meliorem reddi poſſe: imo nec ſalsam pituitā: eoq; nemo doctus me-  
dicus hos humores alterandos, concoquendosq;, vel ut barbari dicunt,  
digerendos dixerit. Sed purgandos potius, meatibus per quos transi-  
būt, ad apertis, medicamentis in id efficacibus. Ne autē acrimonia ſua  
& roſione inſeſtent, ut in torminibus docuit Hippocrates, cibi & po-  
tus ἐν τῇ ῥασίν, quibus potes etiam ſyrupos quosdā mi-  
tigatorios annumerare. Ceterū male in codicibus græcis ἀπορρίψαν-  
τα, quod eſt, proijcientes, pro ἀπορρίψαντα, quod ſignat abſtergentes.  
Præterierunt id Oroſcius, Gemuſeus & alij. Potiſſima vero  
polenta. Codices græci omnes male congruam habent lectionē hanc,  
περατίον ἀναμίξαι τῶν ὀρεξιν, μάλιστα δὲ ἀλφίτων, pro μάλιστα  
δὲ ἀλφίτων, aut μάλιστα δὲ διαλφίτων. Nō tamē ab iis multū.  
Hic quoq; deprauatus eſt codex græcus. Habet enim μὴ τὸ ῥῥω μίμ  
τοι τοῖς τῶν πυρετῶν χροίας, pro μὴ τὸ ῥῥω μίμ τοι αὐτῶν πυρετῶν  
χροίας.

## IN LI. CAPVT.

**S**I vero in grandē famē. Apud græcos vna diſtictio grādē famē  
ſignat cōpoſita ex βῆς & λιμός. Quicquid enim grādē illi volūt  
ſignificare in vna diſtictione, per ἱππ, et βῆς, quod eſt apud nos ſi ver-  
bū ex verbo in terpreteris, equus & bos, explicāt, ut ἱπποειδινον, βῆ-  
λιμ, &c. Ceterū eadē fere habes remedia bulimi apud Gal. lib. 8. de  
cōpoſitione medicamentorū ſecundū locos. In ſequentibus verti ὁξυτάλας  
pro ſeuitia furore, ad verbum ſonat acumine.

## IN LII. CAPVT.

**Q**Voniam igitur à pituita. Galenus de ſymptomatiū cauſis li-  
bro primo ſcriptum habet. Canina appetentia fit, cum vel ob  
acidi humoris vicium ventriculus inſeſtatur, vel vbi totum corpus  
immodice digeſtum diſſipatumq;, continua nutritione indiget &c.  
Ceterum in Aphoriſmorum libri ſecundi commentario, cap. 20. in-  
rationem hanc ad verbum perſequitur.



Incident, abstergeantq̃. Superius & hic male in codice Gra. Aduerte.

το ῥίπτισιν, pro ῥύπτισιν habetur, vnius literae mutatione: quod ceu nullius momēti castigatores Pauli neglexerūt. Quāquā ad sensus puritatem non parū faciat. Quippe diuersa sunt, proijcere, & abstergere.

Pinguia. Galenus addit, ἢ ὡς ἀνὰ πύλιν, ἐλαϊώδη τῶν ἐδεσμά- των, hoc est, & ut ita dicam oleosa esculenta.

## IN LIII. CAPVT.

Articularum per quas. Hæ sunt, stomachus, os ventriculi, ipse ventriculus. Galenus commentario quarto in opus de ratione vietus in morbis acutis, partes commemorat, quæ aliquando sitim procreare soleant. Idq̃ in hunc modum: πάντων μὲν πρῶτον ἡγεῖ μά- λιστα τὸ στόμα καὶ γαστήρ. ἐφεξῆς δὲ ἡ γαστήρ. ἡγεῖ μετὰ ταύτην ὁ στόμαχος, ἅτα πνεύμων, ἅτα νῆπις.

Prauas autem potiones. Codex Græcus deprauatus est. Hæ- Emendatur  
bet enim μοχθηρῶν δ' ἐπιθυμῶσι ποιοῦν τῶν. Hoc est, prauas autem codex.  
appetunt qualitates, pro πομάτων, quod est, potiones. Orosius cum  
alys Aristarchis negligenter hoc præterijt.

Cæterum siti pressios. Hæc apud Gal. lib. i. de symptomatum causis inuenies. Habet autem ille paulo ampliora in istum modum: ἀπ' αὐτοῖς δὲ δίψῃσι καὶ λαλεῖν θέν- τας, ὅς ὢν πρὸς ἡγεῖ ἀποθανόντας ὀ- δα, τούτῃ καταφαγόντας τὴν ἐχιδνα (ἢ δ' ἄρα δίψας) ἡγεῖ τοὺς ἐν τῷ δίνου πίνοντας ἐν περιτάσεως διεστῆς, ἐν ᾧ τοῖς τὸν τὴν θέρειον ἐν ἀπο- τεθνήκει, ἡγεῖ τὸν ἐν δίνου παλαιῶ. μεθυδέντας, ἡγεῖ τὸν ἀποκαρπῆσαν ἀποβλήσαντα, ἡγεῖ τὰς ἐν τῷ πλοῖω ἐπιπλέοντας τοῦ ὕδατος ὡς ἔσοι τὸ δαλάσσης ἐτόλμησάντι πῖναι ἀμειβοτῆρας διψήσαντες τῷ ἄλλω, καὶ τινες μὲν αὐτῶν ὑπαχθέντες τὴν γαστέρα, ἡγεῖ ἀνχθέντες σφοδρῶς ἐξύτρου ἢ κατὰ τὰς λοιπὰς ἀπέθανον, &c. Vide igitur an ex hac lectione, Pauli codicem in quibusdam velis castigare. Ego sa- ne, saluo aliorum iudicio, legerem δίψῃσι δ' ἀπ' αὐτοῖς καὶ λαλεῖν θέν- τας, ὅς ὢν πρὸς ἡγεῖ ἀποθανόντας ὀδα τοῦτε φαγόντας ἐχιδνας διψά- δας, ἡγεῖ τὰς ἐν πλοῖω μεθυδέντας, ἡγεῖ τὰς ἐν τῷ, &c.

Rosaceo cum impetu salietis modo. Græce est μετὰ ῥαπτο- μῶ γινόμενῃ, hoc est: Cum crunisimo facta: à verbo ῥαπνίσιν, quod ῥαπνίσιν.  
est, cum impetu decidere. Gal. lib. 8. Methodi vtitur verbo καὶ ῥαπνί- ζειν in hac sententia: εἰ δ' ὕγρον εἴη τὸ προσφερόμενον, ὅς ὑψηλῆς αὐτοῦ βάλλοντες, ἡγεῖ δύνῃ καὶ ῥαπνίζοντες, id est: Sin autē id quod adfertur, liquidum fuerit, ex altiore loco deijcientes, & in salientis modū fun- demes. Ibidem vsurpat dictionē ῥαπνός. ἐπεὶ δὲ μάλλον εἰ ῥαπνός ἢ ῥαπνός.  
δατῶ ψυχρῇ καὶ ῥαπνίτῃ τοῦ ἀγρίου ψυχρῇ τὸ ὕγρον. Hoc est: Præter- ea magis humore refrigerat, si desiliens aqua frigida vas illidat, &c.  
Cæterū superfundimus aliquādo liquores, ut in hoc symptomate, syn-



capiti sublata in altum manu, per mediocrem lana hapsum.

Dilutum.

Iam dilutū. Sic vocamus humorē in quo aliquid maduerit, aut maceratū per horas aliquot sit. Recētiore medici infusionē appellāt, vt ἀπόδερμα. infusionē rheubarbari, agarici, cotoneorū Graci ἀπόδερμα dicunt.

IN LIIII. CAPVT.

**M**elius autem facit myxion. Myxion vel myxa, vel myxilion fructus est pruno similis. Galenus sericon appellat. forte hodie officinis dicitur sebesten.

Salem indicum. Hic sal nimirum est saccharum quod nos candum appellamus, natura non arte, proueniens, quanquam hodie Venetys & alibi artificio naturam imitentur. Auicenna interpretatus hunc locum Pauli, saccharum tabarzet ponit.

IN LV. CAPVT.

Textus græcus vitiatus.

**I**mbibito. Similia apud Galenum lib. 7. medendi Methodi. Eadem vero apud Oribasium sexto. Sed perperam hic in Codice impresso legitur ἀναπίμπω, quod est sursum misso, pro ἀναπεπωμένος quod valet imbibito ab ἀναπίνομαι, inde ἀναπεπωμαι. Sic habet Galenus loco supra citato, ἐν ὧτε inquiēs, ὅτι αὐτὸς τὰς χιτῶνας, ὡς ἂν εἴποι τις, ἀναπεπωμένον ἢ ἐμπεπλασμένον. Hoc est. Nō nunquā vero in ipsas tunicas imbibitus, vt ita dicā, vel impactus.

IN LVIII. CAPVT.

**P**orro vbi concoctrix facultas. Ex hac sententia opinio quorundam de remedijs spina applicandis in ventriculi affectibus, satis refellitur, etsi euidentia ipsa quæ in confectionibus apparet, quid in hac re faciendum sit, aperte doceat.

Vel manna vino macerata. Non in dādi casu, legenda sententia est sed nominandi. Corrige igitur codicem græcum ita. ἢ μάλιν ἐν οἶνῳ φυραθεῖσα.

Agathium. Pastillus est, qui retinendi suppressendiq; potestatem habet. Vide septimum.

IN LX. CAPVT.

Typhe.

**T**yphe. Specie filigini nō dissimilis, simplici culmo, grano multiplici, tunica velato, atq; lenissimo, radice numerosa, largior eius in Asia prouentus regione, vt vult Galenus, quæ super Pergamum sita est. Hanc agricola, quod triticum in oppida conuehi soleat, ad panificium vsurpant. Huiusmodi igitur arista, hoc est, spicæ apice narium foramina pungere interim precipit Paulus, vt irritatus sanguis largius profluat.

FINIS LIBRI SECVNDI

COMMENTA-

RIORVM.



C O M M E N -  
T A R I O R V M I N  
P A U L V M A E G I N E -  
T A M L I B E R T E R -

T I V S .

\*

**T**ERTIVS hic liber de omnibus totius corporis affectibus particulatim agit: & singula unicuique particula convenientia remedia complectitur. Primum autem cuiusque morbi curandi Methodum artificiosam exponit, quæ ex causarum notitia, partis temperamento ægrique natura, & alijs indicationibus sumitur. Deinde sic ad ea veniendum auxilia præcipit, quæ ipsis locis affectis induci debeant, Græci τοπικὰ nominant. Quod Galenus lib. 14. Methodi pulcherrime docet. Cæterum hic liber Pauli partim ex Galeni opere de compositione medicamentorum secundum locos, partim ex octavo Orribasij transcriptus est: admixtis interim remedijs quæ Paulus ipse usu comprobavit.

I N I . C A P V T .

**Q**uemadmodum stirpium. Ex primo capite Galeni de compositione medicamentorum secundum locos ad verbum hæc sunt transcripta. Iam quartodecimo Methodi pene eadem habentur.

ἀσκή-  
δῃ δ' ὅτι τῶν διαπνεομένων χυμῶν ἴσον ἰσχυρότερον ἔστιν ἐξ ἀρχῆς τε  
ἐνθέως, τὰς φρίκας ἐγοννῆσαι, καὶ τοῦ λόγου κατ' ὑπόφυσιν ἀνξάνει.  
τῶν δ' οὐκ ὅταν ἦτοιγ' ἀπόλλυται παντάπασι ἢ μοχθηρὸν γοννῆθῃ,  
φθέρειν τὰς φρίκας ἀναγκασίον ἔστι. καὶ γὰρ οὐκ ἢ τὰ φυτὰ κατὰ  
διττὴν αἰτίαν ἀπόλλυται, ποτὲ μὲν ἀπορροῖα δι' ἀφροσύνης ὑγρότη-  
τος. ὅτι δ' ὅτι ἐκ διείας χρώμεθνα. τιλίως μὲν ἀπολλυμένων τοῦ φέ-  
ροντος

Pilorum ori-  
go & nutri-  
mentum.



φον] & χυμὸς τὰς φύχας ἢ φαλάκρας γίνεται, μοχθηρὸς δ' ἀποτελε-  
 διν] & αἱ τ' ὀφιάσεις λαλόνμεναι, καὶ αἱ ἀλώπενες. Hoc est, ut ru-  
 diiores intelligant: Ostensum vero est ex humoribus, qui per latentes  
 meatus perspirant, limosum quicquid est, id, & statim ab initio pilos  
 producere, & reliquo sequenti tempore, veluti materiam suggerendo  
 augere. Hoc igitur, cum vel in totum perit, vel prauum generatum  
 fuerit, pilos corrumpi necesse est. Quandoquidem etiam stirpes dupli-  
 ci ex causa pereunt, interim sanè humiditate quæ ipsas nutrit, desti-  
 tuta, interim non propria vtentes. Vbi humor pilos nutriendus prorsus  
 interijt, caluicium prouenit. Cum autem viciosus est redditus, & o-  
 piases, & alopecia excitantur, &c. Celsus hæc duo postrema vicia  
 communi vocabulo *Areas* appellat, quod nimirum loca pilis vacua  
 eos in capite representent. Orosius reprehendit hic me quod Celsum  
 imitatus dixerim de areis, hoc est alopecia & opiasi. Recte facit lite-  
 rator, interpretandi muneris imperitus.

Nonnullæ vero alienis. Græce est ἀλλοφίσις ἑαυτῶν, quod ad  
 verbum sonat, succis alienis à seipsis. Galenus paulo clarius dixit:  
 ὑγροῖς ἀλλοφίσις τῶν ἑαυτῶν φύσεως, quod est: Humoribus alienis à  
 sua ipsorum natura. Atq; ita nos reddidimus, potius indicâtes esse,  
 dictionem sententiæ addere, quàm rem obscurare. Quemadmodum igi-  
 tur quedam alimenta sunt homini, quedam sturno propria, ita herbe  
 quoq; idoneum, familiaremq; naturæ suæ humorem quo alantur, at-  
 trahunt, alienum respuunt.

Castigatur  
 codex Græ-  
 cus.

Inter se. Deprauatus codex est Græcus, tū Venetj, tum in Ger-  
 mania impressus. Habet enim διαφύρα τῶν ἄλλων, pro διαφύρου-  
 σα τῶν ἄλλων. Rursus hic Galenus apertius dixit: ὀνόματα δ'  
 ὁμοειδῆ διαφύρουσα παρὰ τὸ σχῆμα. Hoc est: Nomina autē secun-  
 dum figuram diuersa habentes.

Græcus mu-  
 tilus instau-  
 ratur.

Quoniam in Ophiasi. Codex Græcus hic mutilus est. Quid  
 enim sibi vult ὅτι παραπλήσιον ὄφει τὸ βεβλαμμένον φαίνεται μό-  
 ειον, nisi addatur in quo affectu. Addendum igitur necessario ex  
 Galeno non nihil est, legendumq; in Paulo ὅτι κατὰ τὰς ὀφιάσεις  
 παραπλήσιον, &c. Orosius & Gemusæus non animaduertunt,  
 tam bonis aliquin ut ipsi gloriantur, exemplaribus vsi.

Orosius.

Deinde loco viciato. Hoc ubiq; obseruandū præcipit Galenus,  
 ut semper totius corporis vacuatio præcedat, nisi admodum exiguus  
 sit affectus. Dixi loco viciato auxilia inducemus, pro τοῖς τοπινοῖς  
 ἀποθεραπεύομεν βοηθήμασι, quod est, localibus persanabimus re-  
 medijs.

Si igitur color ad nigrius. Hoc est, si nigrior, albidiorve con-  
 spiciat



icipiatur. Nam quod Paulus εἰ μὴ ἐν τῷ μελάνθῳ ἢ λου-  
 regon ἢ χρῶα παρὰ παρὲν dixit, Galenus in methodo in hunc mo-  
 dum: εἰ μὴ γὰρ λευκότερα τοῦ λευκοῦ, ἢ εἰ μελανότερα. Quod  
 est, si albidior quàm pro natura habitu sit, & si nigrior.

Antidoto Hiera. Intellige, hiera diacolocynthidos, cuius descri-  
 ptionem habes lib. septimo Pauli, Archigeni ascriptam. Scribonius  
 autem Largus eandem pene ad verbum habet. Officina vocat Hie-  
 ram compositam Galeni: verum in multis adulteratam. Quae vero  
 ex aloe, & alijs sex rebus, nempe cinamomo, xylobalsamo, asaro, spi-  
 ca nardi, croco, & chiamoastiche, constat, simplex dicitur. Et haec in  
 officinis, non parum ab illa Galeni discrepat. Primum sane præter  
 medicamenta quae ab illo numerantur, duo insuper adiecta habet, pu-  
 ta xiloaloe, & castiam, vnum supposititium carpobalsamum, loco  
 xylobalsami. Deinde pondera etiam diuersa continet. Nam omnium  
 partes aequales habet. Galeni autem hiera, aloës centū, aut cum præ-  
 stantiorē fieri cupit, aloës drach. nonaginta, aut etiā octuaginta reci-  
 pit, reliquorū vero sex: ubi de capite sollicitudo est, croci tantū quinqs.

Catapotia ex aloe. Haec recipiunt cucurbitae syluestres, quam  
 colocynthida vocant, partem vnam aloes, & scammonij singulorum  
 partes duas. Galenus hic absinthij succi partem vnam admiscere so-  
 lebat: antea quoq; mastichen chiam, & bdellium. rediguntur in gra-  
 nula Ciceri similia. His fere respondent Pilula nostrae Cochiae à Ra-  
 si descriptae.

Dein ad praesidia. Cum iam purum ex purgatione corpus fue-  
 rit, humor qui in cute continetur medicamentis digerentibus discuti  
 debet: diligentia adhibita, ne adeo calida, acriq; admoueantur, vt  
 cutis exulceretur. Ad haec ne nimium siccent, prouidendum est. nam  
 talibus non tantum viciatus, sed etiā utilis qui confluit, absimitur.  
 Graece erat ἐν τῷ τοπικῷ χροεῖ ὡς μὲν εἶναι quod ad verbum so-  
 nat, ad localem veniendum curationem, sed Latinius est vt reddidi.

Primae asperitatis. Locutio est Varronica pro asperissimo. Graece  
 erat τὸ σπυρτάσιον.

Aliud experientia prob. Hoc medicamentum in Codice Ioan-  
 nis Lascaris manu scripto, non habetur: nec compositio plane cohaeret,  
 ac peregrina plane videtur.

Vnciae octo. habebatur in Graeco & pro ὧ sicut alia pleraq;  
 absurda. Miror Orosium in tanta veterum exemplariorū copia hoc  
 non monuisse lectorem, cum tamen in sequenti medicamento adnotes  
 legendum μὲν pro λευκός.

Euphorbiae, thapsiae, baccarum lauri. Male in Codice Gra-  
 co ha-

Hiera diaco-  
 locynthidos.

Methodus  
 curationis.

Additum est  
 hic vt curio-  
 sis fiat satis.

Orosius.



Viciata le- co habetur λαφύριον quod est laurim pro λαφύριον. ut Galenus ha-  
tio Græca. bet. Nam postea mentio laurini fit. Præterea Galenus in eodem me-  
dicamento à Paulo ratione ponderum dissentit. Legit enim Euphor-  
bii, thapsiæ, & baccarum lauri, singulorum drachmæ duæ, sulphuris  
vivi, hierati singulorum drachmæ: ceræ drachmæ sex, &c. Neglexe-  
runt Aristarchi.

Orosius, & Nasturcij. Impressus Codex tum Venetj, tum Basileæ habet  
corrector Ba λαφάριον. Sed Galenus & ipse sensus requirit λαφάριον quod im-  
fileæ. petigines & lepras discutit, eadem vi præditum qua sinapi. Nec hoc  
Orosius, & à castigatōribus animaduersum.  
Gemusæus.

Recinini aut veteris. Paulò ante etiam deest particula disjun-  
ctiua in codice Græco. habet enim λινύς & αλάειν ἐλάειν: cum le-  
Orosius, & gendum sit ex Galeno λινύς ἢ πικραλὲς ἐλάειν. Nam si ricininum  
Gemusæus. deest, etiam commune vetus oleum eadem præstare potest. Omiserunt  
correctores.

Leporum ventriculi quinque. Ex Critone hæc sunt, citante  
Gal. à Paulo Galeno. Verum scriptura illius à Paulo variat. Galeni codex ha-  
variat. bet λωιδίας ἕξ hoc est ventriculos sex. Paulus tantum habet τῶν τε.  
Vide utrum malis sequi.

His adiiciantur. Græci Codices omnes deprauati sunt hoc in lo-  
Castigatur co. Nam habent. πρὸς τοῦτοις λάμβανε τὸ σίτον, μυρσίον, ἀνραι-  
codex Græ- μόνων, ἀκανίας λαφύς, &c. Quid quæso hinc colligi possit? Legen-  
eus. dum igitur cum Galeno censeo in eum modum: πρὸς τοῦτοις λάμ-  
βανε μυστῶν, μυρσίον, ἀνραιμόνων, ἀκανίας λαφύς, &c. Pondere  
nonnihil apud Galenum variant.

Quolibet oleo aromatis imbuto. Sic interpretatus sum ὃ  
ῥέλειν ἢ δύσματα. Celsus dixisset, quolibet vnguento. Nam Græca  
ἵδυσμα. vox ἵδυσμα nihil aliud signat quàm vnguentum ex oleis succisve  
preparatum, cui ex aromatis iniectis, odor suauior, & gratia acces-  
serit. Non autem sum ignarus ἵδυσμα apud alios quosdam aliter  
accipi, ut apud Plinium libro tertiodecimo, capite primo, ubi habet in  
hunc modum: Ratio faciendi duplex, succus & corpus. Ille olei fere  
τύμματα. generibus constat, hoc odorum, hæc stymmata vocant, illa hedyismata,  
&c. In qua oratione planè à Galeno, ceterisq; Græcis dissentit. Nam  
olea ipsa quæ in vnguentis sumuntur, hedyismata videtur appellare:  
stymmata vero aromata. At Galeno & Dioscoridi stymmata, alia  
medicamenta aromatica, nempe quæ spissitudinem vnguento conci-  
lient, appellantur, vnde etiam spissamenta possis nuncupare, alia ve-  
ro hedyismata, nimirum quæ gratiam odoris & suauitatem eis impri-  
mant. Vide Dioscoridē in vnguento cinamomino, & Nardino alijsq;  
cum



cum paucis. Galenus voces Hippocraticas interpretans, hedysmata, inquit, pro ipsis aromatis apud Hippocratem accipi.

Anemonæ flos tritus. Oroscius hic in græco codice legendum censet, ἀνεμώνης τὸ ἐν τῷ μέλῳ φέψας μετ' ἐλαίου μυρσίῳ, hoc est: Anemonæ interior pars nigra, cum oleo myrteo trita, ut habetur apud Archigenem, citante Galeno libro primo de compositione medicamentorum secundū locos. Vide quid reprehendendi libido faciat. hunc locum adfert, de medicamentis nigrescentibus, ab Archigene comprehensum, cum paulo superius singulare caput extet de fluidis capillis, de remedijs illos conseruantibus, vnde Paulus hanc orationē ad verbum planē transcripsit. Habet enim Galenus ex sententia Heraclidis: ἀνεμώνης τὸ ἀνθ' ὃ φέψας μετ' ἐλαίου, καὶ ἄλλοις. Iam flos ipse non aduersatur aliqua ex parte pilis promouendis.

Stercus caprillum. Apud Græcos proprie dicitur stercus caprillum σφύραθ, teste Galeno libro decimo de simplici medicina, ubi habet σφύραθ αἷα μὲν ὄνυ χρώμετα ταῖς τῶν αἰγῶν λίπασιν, (σφύραθ δ' ἰδίως ὀνομάζονται.) Quod est: Frequentissime igitur caprarum stercoribus utimur, sphyrathi autem proprie nominantur. Oroscius nouus interpres, aliorū autem, si dūs placet, corrector, filum caprillum exponit.

## IN II. CAPVT.

**E**Cinere lixiui. Paulus libro septimo lixiuium, quod græci λῶιον appellant, cineris lotionem esse dicit: enumeratque eius differentias. Aliud enim ex cinere fici, caprifici, sarmentorum, & tithymallorum confit, quod vim absterfioriam maxime, siccantēque, & exedentem propemodum obtinet. Si calx admisceatur, vrentem, πρῶτος αἷθ, dicitur, quasi primum lixiuium. Interim ex sola fit calce. Iam quoddam ex sapone preparatur, vnde σαπωναεὶν λῶια nuncupatur. At nomen λῶια plura signat, nempe calcem ipsam, & lixiuium, cinerēque. Solet autem alijs adiungi, quæ ipsum, quædere intelligi debeat, interpretentur, utpote λῶια τῶν αἰγῶν, pro lixiuioliquido, λῶια ἀοβῆς, pro calce viua accipitur, cum ἀοβῆς per se calcem non extinctam signet, ut τῖταιος ἀοβῆς. Porro cum λῶια ἀοβῆς ponitur, hoc est duo substantiua, alterū in nominatiuo, alterū in genitiuo, lixiuium calcis intelligendum venit. Caterum apud latinos scriptores lixiuij vox alijs atq; alijs dictionibus iuncta, diuersa etiam significat. Primum apud Varronē, Columellā, Pliniū frequenter habetur Cineris lixiuia, cineris lixiuij, è cinere lixiuium, pro simplici lixiuiio. Deinde apud Largum, vnde Galenus aliquot medicamenta transcripsit, compositione. 228. Hac terere oportet ex

Lixiuorum genera.

πρῶτος αἷθ.

αἷθ.

σαπωναεὶν λῶια.

λῶια.

λῶια τῶν αἰγῶν.

λῶια ἀοβῆς.

λῶια ἀοβῆς.

λῶια ἀοβῆς.

λῶια ἀοβῆς.

λῶια ἀοβῆς.

λῶια ἀοβῆς.

λῶια ἀοβῆς.

λῶια ἀοβῆς.

λῶια ἀοβῆς.

λῶια ἀοβῆς.







**P**ORRIGO. Sic interpretatus est Celsus πυτυλασις. Plinius etiā πυτυλασις  
furfures secundum græcæ dictionis etymologiam appellat: quem-  
admodum interpres Auicenna. Vide Galenum libro primo de com-  
positione medicamentorum secundum locos.

Resoluuntur. Græce est: ῥῖν ἀπότυξις, quasi dicas, esto particula-  
rū eliquatio, vel particula eliquantur. Celsus resoluuntur, quē imita-  
tus sum. Nā quædā veluti squamulæ surgunt eaq; acutæ, resoluuntur.

Creta sutoria. Sic interpretatur Largus μελας πυλας, composi-  
tione 218. Aluminis iniquens rotundi, melanterius quæ creta suto-  
ria dicitur, qua ligulæ calceorū denigrantur. Diuersum est ab atra-  
mento sutorio si Dioscoridem consulas, quanquam Orosius exponat  
atramentum sutorium.

Cerusæ singulorū drachmæ. In græco codice habebatur το.ιβ.  
quod est Vncia duodecim. ego autem legendum censeo > ἰβ hoc est  
drachmæ duodecim. Itaq; etiam habet Alexander, & magis cōuenit.

Ex quibus sanies. Græce est: ἀφ' ὧν ἰχώρες ἀποτίνονται. Inter-  
pretes latini mirum in modum cruciantur, dum græcam vocem ἰχώρ  
explicare student. alij namq; imitantes Plinium ubiq; saniem inter-  
pretantur, alij serosos humores & acres, tenuēsq; quidam sanguinis  
cruorem. quidam vt Celsus ipsum sanguinem. Aristoteles ἰχώρ δὲ,  
inquit, ῥῖν ἀπὸ τῶν αἱμάτων, hoc est Ichor autem est sanguis crudus.

Ex hac tanta varietate, certi aliquid adferre conabimur, quod in  
authoribus exponendis tuto sequi possis. Itaq; ἰχώρες aquosæ, serosæq;  
& superflue sanguinis humiditates existunt nunc acres & calidæ,

nunc pituitosæ & frigide. Galenus lib. 6. de sanitate tuenda ita scri-  
ptum reliquit. ὅταν μὲν γὰρ ἡ μὲν ὅλου τοῦ σώματος ἡ ὑγρότης ἢ χολώ-  
δες ῥῖν, τὰ δὲ κατὰ τοὺς αἰσθητῆρας, περιέσθαι δὲ τὴν διὰ τοῦ  
ἐντομάχου, μὴ γονομενὸς δὲ τῶν κατὰ τὸν ἰχώρ ἐκ αὐτῶν,  
ὅς ἐστι τὸ σῶμα πρὸς τὴν. Paulo post, ἔαν δὲ μὴ μόνον ἡ λευκὰ  
δρυσὶς ἰχώρας ἐπιτίμῃ τοῖς λευκοῖς γαστρίαι χρωδαῖς. Rursus de fri-  
gidis in hunc modum. ὅταν ἡ τοῦ ἐκ δρυσὶς γαστρίαι κατὰ τὸν ἰχώρ  
ἐκ λευκῶν δὲ ψυχρῶν καὶ φλεγματῶδους ἰχώρες &c. Hippocrates li-  
bro quarto de ratione victus in morbis acutus ἀρρυθμίας καὶ χαλῶδους  
ἰχώρας dixit, quod Galenus interpretatur in eum modum, ὅτι δὲ  
ἰχώρας ὀνομάζει τὰς λευκὰς ὑγρότητας ἐνδον. Galen. autē libro se-  
cundo de elementis: ὡς ἐν τῷ γάλακτι τὸ μὲν ὄσμυ ὀρρῶς, τὸ δὲ τυ-  
γῶς, οὗτω καὶ ἐν τῷ αἵματι τὸ μὲν διορ ἰχώρ αἱματὶ & ἀνάλογον ὀρρῶ  
γάλακτι, τὸ δὲ διορ ἐκ τῆς καὶ φῶς &c. Quādiu igitur in corpore  
adhuc sunt ἰχώρες aquosæ serosæq; humiditates sanguinis, vel aquo-

Melanteria.

Orosius.

Viciatus co-  
dex græcus.

ἰχώρες quid.

Calidæ.

Frigidæ.

Interpreta-  
tio ἰχώρ &  
apud Gale-  
num.



sanies,

si humores sanguinis latinè dici poterunt. Nam ipse Galenus eosdem nunc pituitosos, nunc biliosos χύμους, quod est, humores nominat. Vbi verò extra corpus aut viuum, aut mortuum eruperint, sanies appellari debent. Vt apud Galenum tenue in vlceribus excrementum ἰχθῆρ, nobis sanies non incommode exponitur. Item in capitis vicij quæ ἰχθῆρς nuncupantur, ἰχθῆρς sanies recte dicuntur. Plinius in assati iecoris saniem appellauit: humorem, qui abs iocinore, vel pulmone, vel alia parte dum assatur, emanat. Ceterum Paulus hoc in loco apposite dixit ἀπορινούσας, hoc est, eliquantur, sicut in corporibus mortuis per solis æstum fieri solet. Atq; hæc sanies crassa viscosaq; existit.

Medicamentum ex charta, xerion. Huius descriptio est in septimo. Vocatur autem xerion quod aridum sit, & in puluere accommodatur.

Ad Achoras, recrementum. In impresso codice habetur τῶς ἰχθῆρς, hoc est, ad eos qui saniem habent, ego autem puto legendū τῶς ἀχῶρς, hoc est: Ad eos qui Achoras experiuntur. Nam titulus idem habet, nempe ad Achoras, non ad ἰχθῆρς. Quamquam Orosius ἰχθῆρς legendum censeat.

## IN IIII. CAPVT.

Orosius.

Capitis dolor. Hæc ex libro secundo Galeni de compositione medicamentorum secundum locos transcripta sunt. Paulus autem αὐτῶν τῶν δόσεων dolorem esse refert, ubi Galenus διὰ θέρμην ponit. Ille hunc superuenire intemperiei, hic affectum ipsum esse pronunciat. Rursus apud Galenum plures causæ commemorantur, una sane, simplex intemperies citra humores, altera, horum qualitas, tertia ipsorum copia, item obstructions humorum, vaporumq;. Alia adhuc, quarundam capitis partium imbecillitas, interim externa quedam causa, quam græci τῶν ἀκαταρσιῶν nominant: ego sæpe primariā interpretatus sum.

Causæ dolorum capitis.

Addendum græco.

Nisi caliditati aut. Deest particula in codice græco impresso. Tu igitur lege μετὰ θερμῆς ἢ ψύξεως, quod est, cum caliditate, aut frigiditate. Deerat enim ἢ.

Prodest fronti & temporibus. Recte hoc dicit, nam per initia spinalis medulla dolorem non experitur, eoq; posteriora capitis vngi non debent.

Pastilli ad cap. Alexander medicus hunc pastillum describit. Sed pondera nonnihil in quibusdam medicamentis variant. Commendat enim ad diuturnos dolores, omnibus alijs remedijs nihil proficientibus. Vbi Paulus, ex somniferis aliquid, dicit, Alexander opij momentum iniiciendum præcipit.

At si



At si frigus. Ad verbum ex Alexandro hæc vt superiora mutatus est Paulus. Facies non concidit, hoc est, non macrior est reddita, vt ex calore, sed colorē decorēq; amisit, pallida effecta. Sic ἀχρῆς, ἀχρῆς quod est sine colore, ex Celso interpretatus sum. Sanguis enim ob frigiditatem partes externas relinquens, intro refugit, vnde pallor necessario superuenit.

Præsertim si recrementa. Hoc est, si ex crassis glutinosiq; humoribus dolores sint excitati. Græca sunt ἡ γὰρ τῶν αἰμάτων γλίσχρα καὶ τῶν πύματων ἐν. Quæ verba satis obscura in hunc modum intelligi debent, si humores crassi viscosiq; in capite tenacius hærentes, dolorem excitant.

Locus obscurior.

Si biliosus humor. Hæc & sequentia ex Galeni secundo de compositione medicamentorum secundum locos, nullo verbo mutato, habentur. Caterum ambo præcipiunt, tum Galenus, tum Paulus primum balneum temperatum, inunctionem, cibum potumq; refrigerantem. Deinde offerunt medicamenta bilem educentia: quod sane Alexander medicus suo seculo clarissimus in hunc fere modum exponit. Conuenit igitur, vt superflua medicamentis bili ducende idoneis educantur. Verum vt hoc secundum rationem fieri possit, corpus antea preparari humectariq; debet, cibis temperatis, balneis & inunctionibus. Huius enim probe contemperatus, resolutus, & quasi imbecillior effectus humor, facilius expurgabitur.

Quomodo biliosus humor præparari debet.

Absinthii diluto. Hoc est, vt officina vocant, infusione: tunc mirum cum pauca bilis stomachi tunicas imbuerit, irrigaritq;.

Vel aloë. Scammonia nunquam exhiberi debet, nisi maxima bilis copia dolorem excitarit, nec alia violenta medicamina. Picra autem prodest, vbi crassi aliqui succi bili sint permixti.

Si caput confortij lege. Græce est συμπαρόχθις, hoc est compatitur. Celsus lege confortij, alij per consensum patitur, exponunt. συμπαρόχθις namq; est, cum pars aliqua corporis, alterius malo, vel consensu, vel connexus, vel communicationis gratia condolescit. Huic contraria ἰδιοπαρόχθις, vel ὡς τοῦ παρόχθις cū per se, & suo vicio tantum afficitur: quem affectum primum nominare licet, & ἰδιοπαρόχθις, primario affectu laborare.

συμπαρόχθις quid.

Lege confortij. Consensus.

Emoliamur. Verbum græcum est ἐμμοχλεῖσθαι quod de pertinaciter hærentibus proprie dicitur, vt de viscosis, crassiq; humoribus partē aliquā tenaciter obsidentibus: item de induratis affectibus. μοχλεῖσθαι idem est quod λυοῖσθαι, libro septimo ait ἡνὸς τὸ μοχλεῖσθαι διὰ θέρμην ὁ κληρὸς μίλω, de medicamentis efficacioribus sermonē habens. Propterea mihi visum est, emoliri verbum non incommode hic usurpare.

ἐμμοχλεῖσθαι.



**V**Terque hic affectus. Ad verbum è Galeni secūdo de compositione transcripta sunt, nisi quod pro hac dictione, permanēs, *παράμουνος*. Paulus *παράμουνος*, Galenus *χρόνιος* καὶ *διούρνιος*, hoc est, diuturnus, & solutus contumax, habeat. Celsus acutum & pestiferū morbum appellat *λεπιδαιμόνιον*.

Hiera quam exacueris. Scammonio, aut veratro adiecto hiera vehementior redditur. Atq; id per *ἐξοναύτας* intelligitur. Nam *ἐξοναύτας* idem est quod acutum reddere, intendere, vehementiorē efficere.

Vnguenti irini. Ad verbū habetur hoc in Alexandro. Apud Galenum variat nonnihil hoc modo. Vnguenti Irini expressionis, castorei, singulorum pars vna, baccarum lauri pars vna, viticis seminis pars vna, rosarum siccarum, pars vna, ruta summitatum partes quatuor. Aceto resoluta excipiuntur cerato &c.

Dum intabescerent. Sic reddidi *ὡς τὰ λεπιδαιμόνια*, Celsum imitatus Oroscius improprie vsq; ad eliquationem dici iubet.

Partem affectam irrorabit. Lege in græco *λεπιδαιμόνιον* pro *λεπιδαιμόνιον*, quod est, *λεπιδαιμόνιον* *λεπιδαιμόνιον*, superfundebat, aspergebat, non in-

aspergebat ut vult Oroscius.

Dropax. Huius descriptionem habes in septimo Pauli ad finem, ubi etiam sinapis mus exponitur. Hæc sunt medicamenta noxios humores in summam cutem euocantia, *μετασυνεστινά* græci nominant. Sic etiam Celsus verbum hoc videtur interpretari, ubi summā cutem, inquiens, relaxari, euocariq; corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit.

Malagmate, quia liquidum est parygron. Galenus lib. 7. de compo. medicamentorum secundū genera, inter malactica ponit, quod recipit adipem suillum curatum, ceram, & argenti spumā. Eoq; merito interpretatus sum dictionem, contra opinionem Oroscij. Male est in impressis *παραύγιον*.

Sani. Lege in codice græco *ὡς μετὰ τὰ πόρον ὅτι καὶ γίνονται πονε- λῶς τοὺς λεπιδαιμόνιους*, ut habet Galenus libro secundo iam sapius citato, ad calcem.

Apophlegmatismus. Nūc verto medicamentū, quod pituitā per os educat, nunc quod saluā moveat. Ut hoc in loco, Celsum imitatus in capite de Cephalæa, cap. 4. Caterum in græco codice habetur *ρο.ιβ.* quod est, *uncia 14*. ego puto *ιβ.* legendū. sicut interpretatus sum.

**A**T quæ mentis alienatio. Quia multe in hoc caput velle incidunt, idem propemodum significantes, non abs re fuerit.



vit, eas curiosius in utraque lingua distinguere. Mentis igitur alienatio verti pro graeca dictione  $\omega\alpha\pi\alpha\lambda\eta\sigma\iota\varsigma$ . Nam in febris vehementis statu, ut ait Galenus, accidit egros  $\omega\alpha\pi\alpha\lambda\eta\sigma\iota\varsigma$ ,  $\omega\alpha\pi\alpha\chi\lambda\eta\sigma\iota\varsigma$ ,  $\omega\alpha\pi\alpha\chi\theta\eta\sigma\iota\varsigma$ ,  $\omega\alpha\pi\alpha\lambda\eta\sigma\iota\varsigma$ , &  $\omega\alpha\pi\alpha\phi\phi\omega\iota\sigma\iota\varsigma$ , quae latini exponunt, mente alienari, mente non constare, aliena loqui, delirare & desipere. Si autem hoc continuè accidat, phrenitis dicitur. At si in statu dementia superveniat in declinatione autem cesset, delirium, non phrenitis est appellanda. Celsus eadem ponit distinctionem libro tertio cap. 18. Phrenitis, inquiens tum demum est, cum continua dementia esse incipit.

$\omega\alpha\pi\alpha\lambda\eta\sigma\iota\varsigma$  de  
 $\omega\alpha\pi\alpha\chi\lambda\eta\sigma\iota\varsigma$   
 $\omega\alpha\pi\alpha\chi\theta\eta\sigma\iota\varsigma$   
 $\omega\alpha\pi\alpha\phi\phi\omega\iota\sigma\iota\varsigma$   
Phrenitis.  
Dementia.  
Delirium.

Vel laemis, hoc est. Orosius male exponit  $\lambda\alpha\mu\acute{\iota}\nu\alpha\varsigma$ , id est lippientes. Non enim Lame lippitudinem signat alioqui omnes quibus Lame in oculis innatant, ut hectica vel potius marasmo confecti, lippitudine laborarent. supra dixi Plinium dictionem graecam usurpare. Celsus pituitam interpretatur.

Laemae.  
Orosius.

Coma. Galenus commentario in primum  $\tau\acute{\omega}\nu \omega\pi\acute{\omicron}\rho\acute{\omicron}\nu\tau\iota\kappa\omega\upsilon$  refert, Coma & Cataphora, apud Hippocratem idem esse. Sed Coma duplex inuenitur pro humoris ratione. Nam cum per se est, ex pituitoso generatum humore, gravis sopor, & quasi inexpugnabilis dormiendi necessitas. Quod si biliosus humor mixtus praevalleat, vigilans coma dicitur. Quo qui detinentur, nequeunt vigilantium munia subire, sed ium palpebras claudere cupiunt, tum dormire sperant.

Comae.

Commodum incident. Hoc est, opportunitate & occasione sumpta se ingerent. Hoc enim apud graecos  $\omega\gamma\omega\phi\acute{\omicron}\varsigma \iota\upsilon\tau\upsilon\chi\acute{\alpha}\nu\tau\upsilon$  significat.

$\omega\gamma\omega\phi\acute{\omicron}\varsigma$

Panis quoque aqua lotus. Galenus panis eluendi rationem inuentam esse scribit, ut obstructionem in cibo impedirent. Nam hic panis lotus quam minimum habet crassicie, glutinisque, utpote ex terrestri ac graui, aereus, levisque factus.

panis lotus

Peponis duracini. Sunt qui non duracini legendum censeant, sed rhodacini, quanquam Palladius, Paulus, alijque recentiores graeci ut Cōstātinus  $\rho\acute{\omicron}\delta\acute{\alpha}\kappa\iota\upsilon\alpha$  legant, quos Palladius ubique imitatus, duracina conuertit, quicquid sit siue rhodacina, hoc est, à Rhodo nominata, siue duracina à duritie, persica proferas, non multum interest. Plinius etiam cerasa, & ruas duracinas nuncupat. Tu utrum malis sequere.

Duracina.  
Rhodacina.

Hordeacea farina. Graece est  $\omega\mu\acute{\iota}\lambda\iota\sigma\iota\varsigma$  quasi dicas cruda solutio, vel cruda farina ordeacea, ad differentiam polentae quae torretur. Verum latini interpretes crudam omittunt, lectori id intelligendum relinquentes. Aliquando etiam de aliorum farina  $\omega\mu\acute{\iota}\lambda\iota\sigma\iota\varsigma$  dicitur, verum tunc apponitur frugis nomen, ut  $\omega\upsilon\gamma\iota\upsilon\alpha \omega\mu\acute{\iota}\lambda\iota\sigma\iota\varsigma$  à  $\lambda\upsilon\sigma\iota\varsigma$   $\pi\acute{\epsilon}\gamma\mu\iota\varsigma$ . Saepe ex superabundanti  $\lambda\epsilon\iota\sigma\iota\upsilon\gamma\iota\upsilon \omega\mu\acute{\iota}\lambda\iota\sigma\iota\varsigma$  nominatur.

$\omega\mu\acute{\iota}\lambda\iota\sigma\iota\varsigma$



ἀσθ.  
Oroscius.

**M**ltus angor. Caput hoc ex octauo Oribasij transcriptum est. Grace habetur πολλὴ ἀσθ, quod interpretantur plerique, sicut etiam Oroscius, fastidium, cum verè hoc loco sit dicendum multus angor. Nam adeo torquentur, vt nesciāt quid ipsis sit agendum. nunc lecto se erigunt, nūc rursus decumbunt, vitæ quasi pertasi. Morbus hic intra septimum sæpe iugulat.

οἰδημα.

Tumore molli. Sic reddidi οἰδημα, qui tumor, prementibus digitis cedit, eoque dixi, molli. Tu si libet dicas, cum œdemate.

Emisicij. Hoc est, qui foras propelluntur, dolore nimio exprimente. Græcè est ὑποπτεῖν γίνεσθαι.

Porro vtitor. Post totius corporis vacationē derivationēque per propinquiores particulas ad topica venit remedia. Primum aspergines ex hydrelæo, aut vino & oleo, vt in alijs partibus inflammatis conueniunt: deinde cataplasmata ex pane, aut farina hydrelæo subacta, quæ ad maturationem perducunt. Id enim verbum πεπαισμένον significat.

## IN IX. CAPVT.

**L**Ethargus. Oribasius lib. 8. omnia ad verbum habet. Galenus commentario in primum prorrheticon, in hunc modum scriptum reliquit: προῖτις μὲν γὰρ ἡ ἀκρεβὴς, καὶ ἀμύνει τὸ ἐπὶ τοῦ νοσήματι γίνεσθαι, καὶ οὐκ ἐκτρέφει τὴν νόσον, ἀλλὰ τὸν τόπον ἐν ᾧ τὸ νόσημα γίγνεται, καὶ οὐκ ἐκτρέφει τὴν νόσον, ἀλλὰ τὸν τόπον ἐν ᾧ τὸ νόσημα γίγνεται, καὶ οὐκ ἐκτρέφει τὴν νόσον, ἀλλὰ τὸν τόπον ἐν ᾧ τὸ νόσημα γίγνεται. Consentiunt hæc cum Paulo, nisi quod ipse pituitam frigidiorē habeat.

Cari species.

Caros. Vide Galenum secundo commentario Prorrheticorum, vbi refert tres quasi species Cari, nempe morbofi, quo de hic agitur, mediū vt ex vino contracti, & boni, qui post longas vigilias solet accidere. Caterum arteriæ Carotides à caro nomen habent, quanquam si intercipientur, non statim mutum animal, aut soporosum euadat, sed omnes arteriæ quæ supra vulneratas partes habentur, pulsus amittunt. Interpretari licet, soporem veterinosum.

Oroscius.

Febrium accessionibus. Emenda codicem græcum, ac pro παρὰ φύσιν & lege παρὰ φύσιν, quod Oroscius & castigator Basiliensis studio, opinor neglexerunt.

Membrana custode. Sic interpretatur Celsus libro octauo, capite tertio: Quomodo os excindatur. Hæc autem sunt ipsius verba: Factis foraminibus eodem modo media sæpe, sed multo circumspēctius excidenda sunt, ne forte angulus scalpri eadem membranā violet, donec fiat aditus, per quem membranae custos immittatur, καὶ οὕτως γὰρ

λαλε



αυα græci vocant &c. Nunc quid sit membranæ custos, audi. *La-* Membranæ  
 mina, inquit, aenea est. firma, paulum resima, ab exteriori parte *le-* custos  
 is quæ demissa est, ut exterior pars eius, cerebro propior sit, subinde ei *μλουγγα-*  
 subicitur quod scalpro discutiendum est, ac si excipit eius angulum, *φύλαξ.*  
 ultra transire non patitur, eoq; & audacius, & tutius scalprum mal  
 oleo subinde medicus ferit, donec excisum vndiq; os eadem lamina  
 euetur, tolliq; sine vlla cerebri noxa potest &c.

Quæ cito transeunt. Hoc est, quæ cito per totum corporis habi-  
 tum rapiuntur, quale est quod etiam Diacalaminthes inscribitur.  
 Habes vtriusq; compositionem apud Galenum libro quarto de sani-  
 tate tuenda. Grace est τινὸς τῶν ὀξυπύρων. Non intelligit hic Pau-  
 lus, quæ per aluum cito transeunt.

Nota.

Iis autem qui in vetustatem. Id est, quibus morbus in vetusta-  
 tem incidit, quiq; tremuli sunt. Nam postea ob diuturnitatem mor-  
 bi externarumq; partium imbecillitatem, tremor accidit.

Angusti oris vasculis. Sic interpretatus sum βομβύλια. Nam βομβύλια.  
 Hesychius ait: βομβυλίδος ποτίρις γένεσθαι λέγεται μικρὸν πότον τῶν ἁγίων  
 ἵππων διὰ τὸν ἥχον ὅν τω λεκλῆσθαι. Conuenit igitur ut eiusmo-  
 di poculis dulcis aliqua potio ita affectis instilletur.

## IN X. CAPVT.

**I**Nterim rubore tincta est. Grace erat ἰσχυρὸν αὐτοῖς ἐπαυθεῖ.  
 Hoc est, rubor eis efflorescit, viuidus est. Auicenna hoc caput ut  
 alia pleraq; in suum librum quasi transcripsit, mutato ordine tan-  
 tum, vocatq; affectum Subet asahari.

Qui vero malo victi sunt. οἱ δὲ λεπταὶ ἵπποι. Celsus vertit ma-  
 lo victi. Opponuntur ijs qui mediocriter habent: qui morbo, possunt  
 resistere.

In iis autem periculum maius est. Reddidi sic græca hæc χά-  
 λητοι δὲ μάλλον εἶναι, quod est, difficiles autem magis sunt curatis  
 scilicet, quibus vigilie sunt continuæ.

## IN XI. CAPVT.

**C**Ausam habent communem. Subintellige, mentis noxa, & *Causa pru-*  
 memoriae iactura. Fatuitatis causam Galenus commentario in *dentia.*  
 libellum Hippocratis de natura hominis ita memoriae prodidit: τὸ *Stultitiæ.*  
 μὴν ὁξὺ καὶ σικετόν ἐν τῇ ψυχῇ διὰ τὸν χολώδη χυμὸν εἶναι. τὸ δὲ  
 ἰδρωτὸν καὶ βέλαιον διὰ τὸν μελαγχολικόν. τὸ δὲ ἀπλὸν καὶ ἡλιθί-  
 ον διὰ τὸ αἷμα, καὶ δὲ φλέγμα. καὶ ἡ φύσις αἰς μὴν ἡθοποιῶν ἀχρη-  
 σται. Quæ verba olim sic reddideram: Atumē ingenij & prudentia  
 ex bilioso humore nascetur. Constantia vero & firmitas ex melan-

Bb 5



Vitiatus co-  
dex græcus.  
Oroscius.

cholico: simplicitas stoliditasque ex sanguine: pituita vero natu-  
ra ad mores fingendos inutilis &c. Caterum communem causam  
refert Paulus & mentis noxæ, & memoriæ iacturæ. Male habeba-  
tur in græco codice ηγεῖν ὑμῶν pro λοινῶν, ut annotavit Oroscius quo-  
que. Sed hoc sane debet exemplari suo. Quod autem τὸ οὐρανὸν  
verterit, illic consistentem, cum dicendum esset, constituentem, effi-  
cientem eruditioni suæ & ingenio debet. Nam si consistentem, hoc in  
loco Paulus dicere voluisset, non opus erat articulo τὸν, qui veluti  
autorem & epificem demonstrat. Sic etiam Galenus intelligit lib. 3.  
locis affectis, unde hæc partim descripta sunt.

Vel utique in humiditate inspersa. De ea nimirum dicit humi-  
ditate, quæ per totum corpus cerebri dispersa est. Galenus tertio loco-  
rum affectorum habet sententiam eandem, sed paulo apertius.

div.

IN XII. CAPVT.

**V**ertiginum affectus. Vide Galenum libro tertio de locis affe-  
ctis. Alibi autem refert causam inordinatam flatuosi spiritus  
motionem, qui vel in cerebro generatur, vel ab inferioribus sursum  
fertur.

Rotas, vorticæve. Græce est ῥοιὰν ῥόχους ἢ διῶας. Galenus ῥό-  
χας ἢ διῶας ἐν ποταμοῖς, hoc est, rotas vel vortices in fluminibus.  
div. Nam διῶν οὐτραφὴν ὑδάτων. At div. ait Galenus, ἐνομάζεται,  
ὅτι αὐτὴν ἡ κεφαλὴ περιφέρει δαί, φασί, ἄζεται, ὅτι αὐτὴ δὲ σποτῶδης ἢ ὀφθαλμοῖς ἀ-  
μα τῷδε φαίνεται σποτῶδης διῶν καλεῖται &c. Apud latinos vertigo  
alterum nominari potest, alterum si ad verbum interpreteris. Teni-  
bricosa vertigo.

div.

Vertigo.

Medicamentis quæ odore mouent. Hoc est, quæ naribus odo-  
randa adhibentur, atq; ita cerebrum commouent, græce dicuntur  
ὁσφραῖα. Celsus, quæ odore mouent, conuertit.

ὁσφραῖα.

IN XIII. CAPVT.

**M**orbus comitialis. Vide Galenum libro tertio de locis affe-  
ctis, & Oribasium in octavo, unde Paulus hæc ad verbum  
transcripsit. Græci vocant ἀδυναμίαν, quæ dictio comprehensionem, re-  
tensionem, obturationemq; significat. Nam spiritus animales hoc in  
morbo detinentur, adeo ut in membra corporis distribui nequeant.

Vel certe aliis quoq; Græce est ἵγουν ἢ ἀναδύσας ἐν ῥοῖς  
μορίων, ad verbum sonat: Vel etiam ex aliarum partium distributio-  
ne, quod est, vel etiam alijs particulis cerebro communicantibus.

τάσις.

Voluntatis & consilij expers. Τάσις ἀπροαίρετος in græco co-  
ἀπροαίρετος dice habetur, quod est: Status qui citra voluntatē & proposuū, sit, ve-  
luti



in angustia, aut tristitia. Aristoteles distinguit *προαίρεσις* ab *εὐσείῳ*. Illa enim fit cum ratione & intelligentia, *ἀνοήσιον* contra. Orosius itaq; dicere, inuitus corporis & animi status. Galenus libro suo à nominato ait: Dormientes spirant, quamuis nulla alia accedat officio, quæ voluntate & consilio regatur. Item *μυῖτι παρὰ νοῦν* *παρὰ νοῦν* *ἐν ἑαυτῷ*, quod est: Non amplius constare mente & intelligentia: ad *θεῶν ἑαυτῷ*. Verbum vero sonat, seipsum assequi.

Eorum quæ perceperant. In græco duæ tantū dictiones habentur, *τῶν προσεχῶν λήθη*. Suidas *προσεχῶν* interpretatur *προσοχήν* hoc est, meditationem, perceptionemq;. Sunt qui malint *τῶν προσεχῶν λήθη* exponi, propinquorum obliuionem, vel necessariorum.

Menstruis purgationibus. Græce est simpliciter *κατὰ τὰς λευγαίας*, mox addit *κατὰς λευγαίας*, hoc est cum in utero habere cœperint Celsus apte dixit, In pueris, veneris, in puellis menstruorum initium tollit. Paulus hoc pubertatis vocabulo comprehendit. Vide Aphorismum septimum libri quinti, eiusq; commentarium Galeni.

Si infans adhuc fuerit. Galenus exiguum quidem, sed elegantem puero comitali commentarium dicauit: in quo morbi huius omnem curandi methodum & rationem est complexus. Reliquarum ætatum meminit etiam libro tertio de locis affectis.

Mane passum auferetur. Codex græcus habet *λεπασχίλα*, pro *λεπασχίλα*, quod Orosius annotauit. Gemuseus ut exiguum nimis præterijt.

Sinapismus. Nempe ut noxi humores ex alto corpore in extima euocentur. habes autem sinapis oblinendi rationem libro septimo Pauli abunde & eleganter expositum.

Iam etiam acrium ciborum esus. Græce est *ἀγρυμπαγία*. Celsus de eodem morbo verba faciens, acria, inquit, assumat. Marcellus Dioscoridis interpres, male conuertit vomitionem acrium ciborum esu concitatam.

Vidi autem quandoq; puellum. Galenus hoc commemorat libro sexto de simplici medicina, ubi de herba Glycyfide disputat. vidi inquit puerum totis octo mensibus, morbo liberum & cum forte fortuna radix à collo cecidisset, rursus conflctatum &c.

Inuasuro quidem symptomate. Addidi ad euidentiore intellectum, communicare morbum aliàs obscura nimis esset sententia, *ἐπειδὴ ἀποδύωνται μορίον*, id est ubi senserint particulam, intelligendum affici, vel à particula morbum excitari. Hæc dixi ne Aristarchi nostri aliquid me præter sensum Pauli assuisse clamitent. *ἀποδύωνται* *πύων*.

Cum autem remitti. Græce est *ἐν δὲ ἀνίσταται ἀποδύωνται*.

In re



In remissionibus autem apothepia uti. Est autem ἀποθεραπεία corroborare & firmare corpus. nec non vindicare à lassitudine. Sequitur autem omnium exercitationem magnam ne corpora in lassitudinem incidant. Hic autem post accessionem corpus ante agitatedum recreare nonnihil oportet, vel particulam, unde morbus excitatus est. firmare caustico medicamento, quod calorem in eo excitet, ne amplius in eam humor frigidus, aut supernacius confluat, & inde ad cerebrum feratur.

ἀποθεραπεία.

Inconniuens è sublimi conspectus. Sic exposui ἡγεὶ τὸ ἀποθεραπεία, quod ad verbum sonat inconniuenter conspiciere ex alto. Celsus vertit clarè è Græcis, loci præcipitis conspectus.

IN XIII. CAPVT.

**M**elancholia. Galenus de hac multa libro tertio de locis affectis. Oribasius eadem libro octauo habet. Caterum vno omnes consensu dicunt insaniam, mentem ipsam occupare, nunc cerebro ipso peculiari vicio laborante, nunc totius corporis affectionem simul experiunte.

Per se ægrotante. Ita interpretatus sum Græcam dictionem, ὡς ἑαυτὸν ἀσθενῶν, & quasi primario affecto exponas. Idem vero est, per se apud idoneos scriptores, quod nimirum, nullo alterius consensu.

Homines auersantur. Misanthropia est eiusmodi animi affectio, qua quis in solitudine viuere cupiat, vitet hominum consortia, ut Homerus de Bellerephonte scriptum reliquit.

Qui miser in cæpis mærens errabat Aleis,

Ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans,

μισανθρωπία.

ut Cicero vertit. Dicimus etiam μισανθρωπία, & apud Hippocratem ἀπανθρωπυνέειναι, hominum consuetudinem auersari.

ἀπανθρωπυνέειναι.

ἀπανθρωπυνέειναι.

Inane violenter tractent. Ita exposui ἀνὰ χεῖρας εἰσάγειν Celsum secutus in capite de phrenitide, ubi habet: Alij consurgunt, & violenter quadam manu faciunt. Non sum ignarus ἀνὰ χεῖρας εἰσάγειν ab Hesychio exponi φονεύειν, quod est occidere, verum hoc non semper contingit. Tractant quidem violenter eos, tum feriendo, tum mordendo, tum alia faciendo. Neque hic debebat Oroscius nimium esse grammaticus.

Oroscius.

Qui igitur ex primario. Hæc ex libro tertio de locis affectis ad finem transcripta sunt. Reddidi ὡς ἑαυτὸν ἀσθενῶν primarium affectum, qui non ex alterius partis dolentis consensu oritur. Caterum omnia remedia melancholice Galenus loco supra citato enumerat præter hoc, vñ cum decenti animi delectatione, quæ Græcis dicitur δυνάμει.

δυνάμει.

Aut



Aut gestandi grabato intra lecticam infanientibus pecu-  
 nare. Celsus etiam inquit, maxime suspensi lecti motus. γύργα- γύργαθον.  
 teste Suida, ἡ λινὴ ἐν ᾗ τὰς παρῆτους ἢ δαυμονιώδης τροβῶσι.

## IN XV. CAPVT.

**E**Phialcen. Hunc affectum appellavi Incubonem secutus Scri- Incubo.  
 bonium compositione centesima, ubi inquit: Facit hæc compo-  
 sitione ad suspirium, & ad vocis abscissionem, & subitas præfocaciones ex  
 qualibet causa ortas, & ad eos qui sæpius existimantur ab Incubone  
 deludi. Plinius nocturna delubria nominat.

Nocturna  
delubria.

## IN XVI. CAPVT.

**Q**ui lycanthropia detinentur. Hic morbus apud Latinos  
 nomen nullum habet: si ad verbum interpreteris, Lycanthro-  
 pi sonat lupini homines, hoc est, qui lupos imitantur. Auicenna in  
 egrum caput de Cutubut hinc transcripsit.

Oculi ad videndum imbecilles. Græce est, ὀφθαλμοὶ ἀδρανῆς,  
 quod sonat, vident imbecille. Nam ἀδρανῆς idem quod ἀδυνῆς. Aui  
 cenna: Oculi ipsorum sunt debiles & submersi.

## IN XVII. CAPVT.

**A**Mores. Barbari vocant amor ereos, quasi dicas, amor amo-  
 ris. Nam ἔρως Græcis amor appellatur. Auicenna iſci nun-  
 cupat, ex Paulo multa transcripsit. Habet autem diuersum de ocu- Nota.  
 lis, & sunt, inquit, omnia membra arefacta, præter oculos. Paulus  
 refert: Et cum reliquæ corporis partes non collabantur, soli hi aman-  
 tibus concidunt.

Pulsus propriè nullus. Vide Galenum in libello περὶ προγινώ-  
 σκειν, ubi se mulieris amorem ex pulsu deprehendisse testatur.

Balnei abſtinentia. Oroscius legit pro ἀλσείας, hoc est balneo- ἀλσεία.  
 rum abſtinentiæ, ἀλσείας, hoc est, vinculis vt exponit: quasi aman-  
 tes in vincula sint coniungendi. At sequens sententia Pauli facit, vt  
 ἀλσείας legendum censeam. Nam prudentiores inquit, ad balnea,  
 computationemq; eos ducendos præceperunt. Tu autem candide lector,  
 vtram malis scripturam sequere. Nam haud ita multum refert.

## IN XVIII. CAPVT.

**Q**uando commune quidem. Ex tertio Galeni libro de locis  
 affectibus, & deinde ex octauo Oribasij hæc collecta sunt. Ga-  
 lenus autem non meminit dictionis, hemiplagias, quæ idem signat ἡμιπλάγια  
 quod paralyſis. Ad verbum si interpreteris, sonat semiplexia, hoc  
 est in dimidia parte percussio. Nam verbum πλάττω, vnde apo-  
 plexia, & hemiplagia deriuantur, serio, percussio apud nos significat:  
 vnde non omnino male tali percussos affectu, attonitos Celsus nomi-  
 nat,



nat, quorum scilicet, & mens, & corpus stupet.

Quomodo  
fiat apople-  
xia.

Commune neruorum principium. Cerebrum omnium neruorum tam sensilium, quàm mouentium fons & origo existit. Medulla vero secundario neruorum mouentium principium dicitur. Nam & ipsa à cerebro propagatur. At in hoc affectu primum anteriores ventriculi, deinde medius, postremo ū qui in cerebello habentur, obturantur adeo, vt ne paucillum quidem spiritus animalis ad medullæ spinalis neruos deriuentur. Vnde sensus, motusq; intercidat, aboleaturq; necesse est.

Ita vt pariter principis animæ. Tres sunt secundum Platonis, Aristotelis, & Galeni sententiam in humano corpore animæ species. Vna θυμοειδής, altera ἐπιθυμητική, tertia νηγεμονία, vel in neutro genere τὸ θυμοειδές, τὸ ἐπιθυμητικόν, τὸ νηγεμονικόν, ἢ λογικόν, ἢ λογιστικόν. Prima in corde sedem ac domiciliū habet. Secunda in iocinore. Tertia quæ aliarum dux & princeps est, in cerebro. Merito igitur ea impeditur, ventriculis omnibus obstructis, præsertim medio, vbi ratiocinatio consistere dicitur.

Sin autem in altera. Hoc est, si alterius partis cerebri tantum, sinus, aut ventriculi, aut quomodocunq; appellare velis, impediti, obstructiq; fuerint.

Voce intermortua. Græce est ἀναῶδος, quod ad verbum sonat, sine voce, vt apud Hippocratem ἀναῶδους. At Galenus interpretatur, ἀλόγως, quod est sine sermone. Nam ἀνδὴν etiam λόγος dicitur. Intellige igitur voce intermortua, pro sermonem edere non valentes, quippe omnes nerui, tum sermonis, tum aliarum actionum duces, spiritu animali sunt destituti.

Toruli eleuantur. Hoc est, ipsæ venæ attolluntur, quod capitis repletionem testatur. Græce est τῶν σφαγιτίδων ἐπαγµα.

Oroscius. Ipsi inhærescunt. Haud scio cur Oroscius ἐνηέμενα molesta verterit. ἐνηέμεαι enim ab ἐν & ἡέμεαι venit. Nec pituita solum ori molesta est. Imo non adeo molesta est ūs quibus sensus omnino perijt. Rectius igitur quæ inhaerent, aut eo decumbunt ex capite, auferantur.

Cibus mollis, distribui facilis. In codice Græco habetur παράληψις πλὴν ἀπαλὴν καὶ ἐν διόκλειον, καὶ χυλῶδην τροφήν, quod est: Assumemus tenerū, & distribui facile, & succulentum nutrimentum. Celsus libro tertio de morbo comitali inquit: Neque sorbitiones autem his, aliq; molles, & faciles cibi, &c. At per χυλῶδην quod nos reddidimus succulentum, intelligit cibum ex cremore, vel ptisanæ, vel chondri, vel alterius frumenti. Nam χύλος cremorem signi



gnificat, qui in sorbitionibus dari solet.

Vnctioni vero accommodata. λιπάσματα τε σύγχευσι τοι-  
ῦτα. In Græco exemplari est, quod Celsus expressisse videtur: Vn-  
ctione vero, inquit, aptissimum est vetus oleum. Ad verbum sonat  
Græce, pinguedines quæ illini queant, huiusmodi sunt.

In quo scilla intabescit. Græce est ἐνταριχεύειν verbum, ἐνταριχεύει-  
ν quod signat proprie agros abstinentia immoderata exiccare. Ita scil-  
icet in Sole eliquescit, consumiturq; Celsus etiam dicit: In quo scilla  
intabescit.

Attendentes. Male in codicibus Græcis legitur πρὸς χοῦσας, pro  
πρὸς χοῦσας, hoc est aduertentes. Deinde in eadem sententia: διὰ  
τὸ μὴ συναιδάνεσθαι ἐμὴν ὑπὸ λιανθώσιν pro διὰ τὸ μὴ συναι-  
δάνεσθαι μὴ ὑπὸ συνανθώσιν. Quo in loco dum Orosius alios repre-  
hendit, nec locum Græcum emendat, & male vertit ὑπὸ συνανθώσιν,  
ne vehementer vrantur: cum Paulus velit vehementer quidem, sed  
non nimium, non supra modum, nec magis quàm conuenit.

Cutis ruborem. Sic interpretor τὰς φοινιμοὺς, Celsus habet: φοινιμοί.  
Prodest etiam torpentis membri summam cutem exasperasse, vel vr-  
ticis cesam, vel impo sito sinapi, sic vt ubi rubere cœperit corpus, hæc  
remoueantur.

Feculæ. Græce est φέκλιν quæ fex combusta dicitur. Gal. lib. i.  
de compositione medicamentorum secundum locos ad Achoras in-  
quit, πυρὸς δίνου λιανωμένους, ἢ ῥωμαῖοι φέκλιν λιανώσιν. Latina  
itaq; dictio est fecula, quam Græci imitantes φέκλιν nominant.  
Largus etiam vititur pro fece vini combusta. Hoc ignorabat Oro-  
scius, dum alios reprehenderet.

Canum more conuelluntur. Verbum è verbo reddidi. Largus  
autem interpretatur quid sit spasmus caninus, his verbis: Facit ad  
λιωνὸν σπασμὸν, cum in utramlibet partem deprauata est facies.  
Celsus libro quarto habet: Circa faciem vero morbus innascitur,  
quem Græci λιωνὸν σπασμὸν nominant. Is cum acuta febris est, os  
cum motu quodam peruertitur, ideoq; nihil aliud est, quàm disten-  
sio oris.

Per narium clysterem. Græce est διὰ ρίνας, hoc est διὰ ρίνας.  
ad verbum per narium infundibulum, per quod medicamenta in  
nares infunduntur. Quemadmodum ἐνταριχέτης, clyster auricu-  
larius, & ἐνταριχέτης uterinus. Celsus libro quarto, capite secun-  
do, fere eadem.

Per rectos siphones. Sic videtur Galenus significare, qui λι-  
ανθώσας libr. 5. Methodi ἐν τοῖς ῥήτοις, quasi recto foramine præditos  
canal

Vitiatus co-  
dex Græcus.

Orosius.

φοινιμοί.

Orosius.

Canina con-  
uulsio.



Oroscius. canales interpretatur. Oroscius rem medicā ex Celio maluit discere. Lentisci. Male in utroque exemplari habetur σχοίνου, quod est iunci odorati, pro σχίνου, nam astringentia in hoc morbo requiruntur.

Codex Græcus deprauatus. Vitulinumque & oleum. In Græco codice deest particula ηγεῖ. Nam habetur tantum, ἑκαρ βείου, ηγεῖ χύνιον ηγεῖ μολόχινον ἔλαιον. Corrigere Græca. Cum sit legendum: ηγεῖ ἔλαιον in fine. Nam molochinum oleum nullum dicitur.

Cum communi curatione. Hoc est præter communem resolutorum curationem, quæ medicamentis extrinsecus adhibitis, alijsque absoluitur, etiam hæc quæ sequuntur, facies.

Nostri ætate. Quod Paulus suo tempore accidisse in morbo colico commemorat, nos quoque nostri ætate frequenter videmus. Nempe ex magno, diuturnoque colico cruciatu artuum resolutionem, præsertim brachiorum, quanquam & crurum imbecillitas summa adfuerit. Iam ex febris quæ humoribus ad intestina confluentibus, ibique dolorem vehementem excitantibus finita fuerit, secuta est artuum resolutio, quod nuper in Canonico quodam, sed non iuxta regulam viuentis, sum expertus.

## IN XX. CAPUT.

Cum particulae corporis in anteriora. Hoc Celsus paucis comprehendit: Cum mentum inquit, pectori annectitur, emprosthotonos, cum scapulis opisthotonos: cum rectam & immobilem cervicem intendit, Tetanus dicitur.

Optimum itaque præsidium. Hippocr. lib. 4. Aphorism. sectione 57. Qui convulsione, aut distentione nervorum tenentur, febris superueniente liberantur.

Rifus Sardonicus.

Nonnunquam & rifus ipsis Sardonicus oboritur. Dioscorides lib. 6. sardona ranunculi genus esse testatur, quæ rescentibus mentem adimat, & quadam nervorum distentione, dehiscere in rictus ora cogat, ita ut imaginem ridentium prabeant.

Cucurbitulas admouere cum lacinatu. Græce est μετὰ ἀμυχῶν, quod sonat cum vibicibus excitatis. Sic intelligo hoc loco lacinatum scalpelli.

Oroscius. Abstergere, ne imprudentes. Dum Oroscius alios reprehendere instituit, ipse corrigendus venit, qui tam impure, & nullo sensu penitus vertit, ne perfrigerati occultentur. Videtur autem lexicarius adhuc esse interpret, μὴ λάθωσιν ψύξαντες, quod ad verbum sonat, ne lateant refrigerantes, hoc est, ne imprudentes, nescij, ac non advertentes, refrigerent particulas.

Hydromeli spissius. Sic exposui ὑδρομέλι λιπαρόν, hoc est ad verbum,



verbum, hydromel pingue. At nulla pinguetudo in eo habetur. Sit itaq; λιπαρὸν ad pinguetudinis crassiciem incoctum. Nam ad dimidias coqui precipit.

Et laserpicij radices. Nescio cur hic Oroscius succum laserpicij intelligi velit, cum apud Galenum Dioscoridemq; ipsum, ubi liquoris mentionem facit, ὀπὸς ponitur. Adeoq; in opisthotonicis. At radicem in puluerem redactam, tum decoctam saepe & in his, & in alijs affectibus dari legimus, ut plane non sit, quod Oroscius in hoc loco versionem nostram reprehendat. Quin potius in exemplari græco legendum putet ἐμπλαστῶν pro ἐμπλαστῶν & ἀφελύμα αὐτῶν pro ἀφελύμασι, ut sit decoctio ipsius radices. Quid enim est, silphij radices cochlearia duo, aquæ mulsæ cyathis tribus inspersa, vel decocto ipsius dari? Quorsum referri debet, decocto? ad mulsam ne? quæ iam cocta est, quantum opus est. Itaq; ad radicem magis competit. Ea enim vel pulueris modo inspersa, vel decocta exhiberi potest.

Myrrhæ drachma ex mulsâ, hyssopiq; decocto. Hic rursus codex græcus deprauatus est, habet enim ἢ σμύρνῃς < α. μελιράτω ὑσώπῳ τε ἀφελύμα. Cū nimirum legendum sit ἢ σμύρνῃς < α. σὺν μελιράτῳ, ὑσώπῳ τε ἀφελύμασι, quod Oroscius & Basiliensis castigatores non aduerterunt.

Nardi. Dictum est pro nardini, ut apud Celsum & Scribonium aliquando Rose pro rosaceo, nardi pro nardino usurpantur.

## IN XXI. CAPVT.

**T**Remoris origo. Vide libellum Galeni de Tremore, quæ nos aliquando latinitate donauimus, ubi habet: ῥόμος ἢ ὅτι γίνεται τὸ δόσος ὑπὸ τῶν συνεισδιδόντων ἀρρώστια. ὃ γὰρ ἐκ τῆς ἀνιπτοῦ τὰ μέγιστα τῶν ζώων ὕψος ὄντα βαρὺ καὶ ἰσχυρὰ φέρεται πεφυκότα, τὰς εἰς ἀπώλησιν τὸ πορὶ ἔχοντες συνεισδίδοντες. ἀλλ' ἢ διὰ τῶν νοσούντων τοῖς μυστέρι ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπιπεμπομένη δύναμις, διὸν δ' ἔχει, καὶ τῶν ἰσχυρῶν αὐτοῖς ὄντων, ἢ ὅτι αὐτῶν ἀπολείπει τὴν ἀπώλησιν ἀπὸ τῶν παραλειπόμενων, καὶ ταφύρεται καὶ τῶν ἰσχυρῶν ἀπὸ τῶν ὀσφύων. ὃ δὲ ἐκ τῶν ἰσχυρῶν ἀπολείπειται τοῖς ὕψους παρὰ τὸν. Hoc est ut linguarū rudes intelligant: Tremor itaq; fit imbecillitate facultatis, quæ corpus vehit, mouetq;. Quippe animalium particulae, tam graues cū sint, & deorsum ferri natae, non ex seipsis nimirum motiones, in omnem locum habent. Verū facultas quæ a principio per nervos musculis transmittitur ceu vehiculum quoddam, & ala motionis ipsis existit, quam cum prorsus perdiderint, perdunt autem resoluta deorsum feruntur, caduntq; auis pennis destituta modo, unde nullus motus ita affectis relinquitur.

Cc







e elotam esse oporteret.

Xerophthalmia. Celsus lib. 6. interpretatur arida lippitudine.

Est enim, inquit, genus arida lippitudinis, ξηροφθαλμία, græci ἀ- ξηροφθαλ-  
bellant, neq; tument, neq; fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum do- μία.  
lore quodam grauescunt, & noctu præ graui pituita inarescunt.

Ertropion. Hoc viciū est inferioris palpebræ, quod parum sur- Ertropion.  
sum attollitur, sed pendet & hiat, neq; potest cum superiori committi.  
Id interdum accidit ex mala curatione, interdum ex senectute.

Aegilops. Est veluti parua fistula maioris anguli, per quam pi- Aegilops.  
tuita assidue distillat. Nonnunquam etiam exeso osse vsq; ad nares  
penetrat.

Lixiuio quod ex cinere & calce. Græce habetur absolute πρω-  
τοάνισ, quasi dicas, primario lixiuio. Paulus lib. 7. habet: αὐτὸ πρῶ-  
τοάνισ καὶ τιτάνου ἢ τέφρα λεοστίνης ὀρυγέτης τὴν κοιλίαν ἢ ἀν-  
τιπρῶτοάνισον ὀνομάσσει. Que verba Orosius non videtur in- Orosius.  
tellexisse, dum interpretatur cinerem lixiuum, qui primus distillaue-  
rit, secutus Hermolaum. Recte igitur quis interpretetur lixiuum,  
quod per cinerem & calcem distillauerit.

Cum manus opera. Hoc remedium in exemplaribus vulgatis  
non est, sed in Lascaris codice manuscripto additum inueni. Si itaque  
placet ascribere, aut expungere, per me certe licebit.

Chalazion. Celsus sic appellari dicit, quod mobilia, & digi-  
to huc, illuc impellantur curationem manu præstandam docet libro  
sexto.

Encanthis naturalis. Varijs de causis hoc viciū gigni solet. Encanthis.  
Interim ex vngue parum exciso, vel ob tuberculum, quod palpebras  
parum diduci patitur. Quod si vngue caruncula nimium abscindatur  
putrescit foramen per quod postea humor descendit, ac viciū superio-  
ri contrarium nascitur, quod græci πρῶδα nominant.

Terra samia. Duplex ea terra apud Dioscoridem habetur, vna  
simpliciter terra samia dicitur, altera γῆ ἀστὴρ, hoc est, terra aster, πρῶτα.  
quasi dicas, terra stellata. Celsus itaq; vbi posterioris mentionem fa- Terra samia  
cit: Terra, inquit, samie, quæ ἀστὴρ dicitur. Non vt Orosius vole- duplex.  
bat, terræ asteris, obscure nimium. Ceterum ante hoc medicamentum  
in græco exemplari est διὰ μύλης perperam, pro διὰ ἀμύλης, quod etiā  
Orosius annotauit. Orosius.

De oculis purulentis. Duae sunt apud Græcos dictiones, quæ  
fere in omnibus sibi respondent, nempe ὑπόπτιον, & ὑπώπιον. Pri- ὑπόπτιον.  
ma significat pus subesse membrana cornea. Largus & Celsus vo- ὑπώπιον.  
cant oculos purulentos: altera dicitur, teste Galeno, quasi ὑπὸ π



*Orosius.* ὠπας, hoc est, sub oculis. Ac veteres latini hoc vicium appellant, sugillata, genere ecchymomatum comprehensa. Parum prudenter Orosius, dum in aliorum erratis castigandis occupatur, ipse in grauissimum incidit, qui πύον, quod est, purulentum, conuerterit sugillatum.

*Arida medicamenta,*  
*ξηρά.* Floris æris. Hoc medicamentum in impressis non habetur, sed in manuscripto codice Iani Lascaris scriptum inuenitur.

Contritis ad læuorem aridis. Hoc est, aridis in tenuissimum puluerem reductis. Græce est λεύκας τὰ ξηρά, hoc est, læuigans arida. Celsus autem de Aridis mentionem facit libro quinto, capite vigesimo secundo in hunc modum: Quadam mistura medicamentorum sunt, quibus aridis, neq; coactis vitimur, sic ut inspergamus aut cum aliquo liquido mista illinamus. Alia medicamenta sunt his opposita, nempe, quæ liquari possunt. Hæc græcis τικτὰ nominantur. Vbi itaq; Galenus aliq; habent τὰ τικτὰ τήνων, τὰ ξηρά ἢ λεύκας δὲ ἢ λεοπίδην. Latini scriptores exponunt, quæ liquari possunt, ad ignem eliquentur, arida conterantur: Celsus inquit libro quinto, arida ex eo conteruntur. Rursus arida medicamenta contrita humore non pingui coquuntur. Item arida ex aceto teruntur. Largus simili vititur locutione, & verbum λεύκας δὲ læuigare oportet, interpretatur.

*Orosius.* Quæ cum ita sint, immerito Orosius nos reprehendit, negans latine, & fideliter dictum, aridis contritis, cui magis placet, pulueribus dilutis. Et si apud nullum idoneum scriptorem huiusmodi locutio inueniatur.

Sublinimus medicamentis. Hic quæso candide lector animum aduertat cavillationi Orosij. Damnat me quod verterim ex græco τοῖς πρὸς τὰς παλαιὰς διαβίσεις, medicamentis quæ ad veteres affectiones inscribuntur, ipse enim mauult dici collyrijs. Quasi vero collyria non sint medicamenta. Certe ego à preceptoribus meis olim didici, substantiam collyriorum, esse & dici medicamenta: ipsum vero nomen collyrij, formam medicamenti indicare. Celsus li. 6. ita inquit: A secundo die graui quoq; lippitudini per medicamenta recte succurritur. Item in collyrio trygodes. Quo grauior quoque inflammatio est, eo magis leniri medicamentum debet.

## IN XXIII. CAPVT.

**A**N ob exteriorem causam acciderit. Ex octauo Oribasij hæc mutuatus est. Exterior autem causa, est ventus frigidior, aut lauacrum aque frigide, similiaq;. Hæc itaq; solent interrogari,



an egrotus in ambiente frigido obambulauerit, vel lauacionem frigidam expertus, vel alio modo fuerit affectus. Graecus codex habet το λάμνον & ἀνακρίσας, ubi ἀνακρίσας idem valet quod ἱετακρίσας. Nonnulli autem lexicarij interpretes contemperamentum vertunt. ἀνακρίσας

Cucurbita ex aqua calida. Idem Galenus commemorat ex Apollonio, lib. 3. de compositione medicamentorum secundum locos in hunc modum: σπιγίαις ἀκρίσας τὰς διὰ τῶν σπογγῶν εἰς δὲ μὲν ὕδωρ ἀποβιβάζουσιν, τὸ τῶν ἰατρῶν τὴν τεθλιμμένην, καὶ τὰς διὰ Fomenta: αἰσινύας. Hoc est: Fomentis autem utendum est, quae per spongas sunt, in calidam aquam intinctas, easque abunde expressas. Item illis quae per cucurbitam adhibentur. &c. Ego itaque σπογγίων μὲν in Paulo, verti fotu prius facto. Quanquam possis dicere, cucurbita prius aqua calida concalfacta.

Per specillum lana. Graece est διὰ μολώτιδ & quasi dicas specillum auricularium, ut Celsus etiam exponit. Nam eodem capite meminit specilli lana inuoluti, specilli auricularij, & clysteris auricularij, strigilisque.

Vel etiam arundine. Apollonius etiam fomentum recitat, vapore per arundinem perforatum elato. Erit autem alterum arundinis extremum, concavitati auriculae accommodatum, alterum in ollam cuius operculum foramen habeat, incumbet. Decoquitur in olla absinthium, cuius vapor auditorio meatui insinuat. At hic nullum fotum arundine adhibere praecipit. Verum exugere humorem, si quis, forte in aurem receptus sit.

Fomentum per arundinem.

Sin autem pauca. Graecus codex mutilus est, nec Orosius, nec Basiliensis castigat aduertit. Deest enim ἀδὲ, ad integram sententiam explendam, quae sic legi debet: εἰ μὴ ἐν πᾶσι διὰ τὸ σῶμα τὸ & καὶ τὸ λαλῶν & αὐτὸ ἐν μὲν ἄνθρωπῳ δὲ. εἰ δὲ ὀλίγον &c.

Graeca mutila.  
Orosius corrector.  
Basiliensis

Cardamomi & nitri. Galenus libro iam citato legit καρδάμῳ καὶ νίτρου βραχὺ σύντασιν καὶ τὴν καρδάμῳ ἀνακρίσας τοῖς σπογγίων &c. Quod est: Nasturcij quod satis, & nitri paululum fici carne sine granis exceptum, in penicillum redigito &c. Verum cardamomi & cardami quod est nasturcij, eadem fere potestas est, nisi quod nasturcium sit valentius.

Idque in aurem demittendum. In graeco codice hac clausula quidem non est, verum a me addita, ad sententiam absoluendam. Alexander etiam in hunc modum ex Galeno profert. Hoc te celare nolui.

Notas

Hyssopum medicamentum. Hyssopum & herba & medicamentum appellatur. Verum ubi herba notatur, simplici vocabulo hyssopum dicitur, ubi medicamentum additur ipsa medicamenti di-



Etio. Quamquam in eo nulla sit hyssopi herba mentio, sed lanarum potius succidarum. Nonnulli autem adijciunt hyssopum herbam.

Græca vitia  
ta.

Bulborum, polentæ. Admonuit Orosius græcum codicem esse viciosum, qui habet: βολβων ἀφρώων pro βολβων ἀλφίτων &c.

## IN XXIII. CAPVT.

Linamento-  
rum genera.

σπειρόν.

ξύσιν.

ἐλλυχνιω-

τόν.

πριαπι-

σκούτον.

σφηνίσκος.

λημνισκός.

**L**inamento ex ellychniis contorto. *Varia sunt apud græcos* *μωτόν, hoc est, linamentorum genera. Aliud vocant σπειρόν,* quasi dicas tortile, aliud ξύσιν, hoc est, rasile, aliud τιντόν, quod est conceptum filatim, aliud ἐλλυχνιωτόν ex ellychniis preparatum, aliud πριαπισκώτον à pudendi humani similitudine nuncupatur: aliud, quod cunei formam referat, aut quia cunei modo foramina obturet, aut coniuncta separet, σφηνίσκον & dicitur. Vt Paulus sexto vocat σφηνίσκος & σπειρός ἐν ῥέειν, hoc est, cuneolos intortos ex panniculo. Adhuc aliud est λημνισκός græcis dictum, implicitum in longitudinem linamentum, si Celso credimus, quod alibi vocat linamentum inuolutum & oblongū. Sicut σπειρόν linamentum implicitum, seu intortum simpliciter appellari possit.

## IN XXV. CAPVT.

ῥεγμός.

ἄλστρον

λευάμινον.

ἔτυν.

λέκυνθ.

**P**Tisanæ fresæ. Hoc est confractæ. Græce est ἰγρός ἢ ὠψιδάνος ῥεγμός. Vt ῥεγμός significet omne id quod fresum est, vel ipsam confractionem, omnium scilicet, leguminum, nomine tamen ipsorum appposito, ut λευθός ῥεγμός. Cū verò simpliciter ῥεγμός ponitur, de faba fresca dicitur. Quæ si molam experta sit: ἄλστρον λευάμινον & ῥεγμίνον ἄλστρον appellatur. Ferculum autem ex faba, cicere, & reliquis leguminibus fressis paratum, ἔτυν &, ex fressorum autem farina pulmentarium, λέκυνθ & Galeno cum alibi, tum in libello de bonis malisq; succis generandis nuncupatur. Quoties autē in Paulo alijsq; græcis inuenitur λευάμινον ἔτυν, pro faba fresca elixata ad ferculum intelligito. λευάμινον λέκυνθ &, pro fabæ fresæ farina elixata ponitur. Sic ὠψιδάνος λέκυνθ &, & ὀφελίvos λέκυνθ &, aliorumq; leguminum dicitur. Vbi verò hæc vox λέκυνθ & sola citra alterius adiectionem ponitur, Luthæum cui significat apud medicos. Orosius male ῥεγμός pro lomento tantum usurpauit.

Orosius.

ἰγρός.

Ephelis.

Lenticula.

Ad Ephelidem & lenticulas. Ephelis asperitas quedam & durities mali coloris est in facie lenticula & in alia parte nonnunquam nasci solet. Celsus ineptias putat curare varos, lenticulas, & ephelidas.

Suggillata.

Suggillata. Græci vocant ὑρώπιον ut antea annotavi. Sunt autem



tutem ex genere ecchymomaton, quæ & Hippocrates & alij plerique medici appellant cutis affectum, quo venis in ea tenuibus continuus sanguis inde effunditur, qui ita excretus non vno in loco, nec subito concrevit. Temporis spacio liuescit, nigrescitq; cutis.

Cum melle adiuueto. Galenus habet in eodem medicamento, *ἔξ ἀντιόχου ἀδριανῆος μέλιτος & ὀλίου ἀντιόχου*. Hoc est aceto excepta, mellisq; momento subacta.

## IN XXVI. CAPVT.

**D**entium dolorem. Ex quinto Galeni de compositione medicamentorum secundum locos ad verbum hoc caput est transcriptum, nisi quod ubi Paulus ad inflammationem habet, Galenus & Oribasius ad dolorem dentium medicamenta subscribunt.

Ad parulidas. Parulis græca dictio est, à *παρά* quod est iuxta, *παρῆς* & *ἄν* hoc signat gingiuam. Celsus libro sexto, capite tertio decimo: Solent etiam interdum iuxta dentes in gingiuis tubercula quedam oriri dolentia *παρὸνιδας* græci vocant.

Tonillæ. Glândule quedam sunt in ore utrinq; singule penitus sitæ, spongys similes, quæ humiditates ex capite recipiant ad fauces *παρὶδμῆα*. humectandis *παρὶδμῆα* græci nominant, quæ si post inflammationem *ἀντιόχου* induruerint, *ἀντιόχου* appellantur.

Vua. Grace est *λουῖς*, quod ad verbum sonat columella. Est autem hac carnosa quedam particula, in summa oris parte suspensa vocis plectrum, recipit ea madorem à cerebro quo superiores palati partes humectat. Si plus iusto humiditatis recipiat, interim laxatur, ac fastigiata descendit, interim inflammationem experitur, & ne potus, nec cibus deuorari possit impedit. Veteres græci *παρὰπαρῶνα* & *λουῖα* *παρὰπαρῶνα*, recentiores *λουῖδα* appellant. *παρὰπαρῶνα* vero quasi dicas vuam, partem ipsam appellari non vult, sed affectum. Celsus alijq; latini scriptores etiam partem, vuam nominant.

Vbi æqualiter crassa fuerit. Paulus præter Galeni morem *λουῖα* appellandam particulam censet, ubi in æqualem crassiciem intumuerit. Nam interim tenuis, acuta, albaq; cernitur. Interim ima crassa, summa tenuis, & liuida est.

## IN XXVII. CAPVT.

**A**ngina. Apud recentiores medicos varia sunt anginae nomina nunc per literam u. nunc per c. inchoantia. At Galenus commentario tertio in prognostica Hippocratis parum interesse dicit, modo de re ipsa constet, *λουῖαχλω*, an *ουῖαχλω* proferas. Ibidem etiam tres anginae species enumerat ex Hippocratis sententia: Pessimæ



species anginae.

quiens, agunt, qui vehementer quidem dolent nullum autem in ceruice & faucibus symptoma experiuntur. His succedunt, qui quidem non difficulter spirant, verum dolent grauiter, collum ipsis intumescit, fauces apparent rubicundiores. Postremi neque dolent, neque aegre spirant, ita ut suprema gutturis pars λάρυγξ græci nominant in columnis quidem ipsis permaneat, sed fluxio magna parte biliosior aut in fauces, aut in collum, aut in utraq; descenderit &c. Rursus libro quarto de locis affectis quatuor species recenset. Paulus item noster quatuor enumerat, pro musculorum vel interiorum, vel exteriorum inflammatorum ratione. Ego sane musculos primum intelligendos puto, qui in ore circa linguam ex omni parte habentur: qui superiores palatum versus eam mouent: qui inferiores deorsum. Laterales in latera adigunt, plurimi ex osse 8 græcam literam υ referente prodeunt. Deinde duodecim proprios, summæ arteriæ parti quam λάρυγξ vocant, octo autem cōmunes, qui scilicet laryngem corporibus vicinis colligant: necnon eos qui ceruicem cōstituunt. Iam musculis qui αφοφαγο subijciuntur, inflammatis, angina quedam oriri solet.

φάρυγξ.

Faucium pharinga græci vocant. Magna harum vocum ambiguitas apud authores inuenitur. Vnde fit, ut plerique græcorum librorum interpretes mirum in modum torqueantur & subinde etiam aberrant. Itaque φάρυγξ duo significat, nempe fauces, & asperam arteriam. Fauces dico regionem intra os, ubi tum gulæ, tum asperæ arteriæ extrema concurrunt. Grammatici genere distinctionem faciunt hoc pacto: φάρυγξ δυληκὴς σημαίνει τὴν λυγρίαν φάρυγξ ἢ δὲ ὄσφι ἢ ἀχανέα ἢ μετὰ τὴν ἢ γλωττίης ῥίξιν, ὅτε δὲ ἀρσενικὴς σημαίνει πολλάνισ τὸν λάρυγξ. Quæ verba sonant ita Pharynx fœminino genere prolata, proprie dictam pharyngē, hoc est fauces significat. Hæc autē est oris ampla capacitas post linguæ radicem sita. Masculino autē genere dictus pharynx, laryngē, quod est, arteriæ asperæ summum vel ipsam arteriā signat. Hippocrates libro prognosticon per dictionē φάρυγξ in fœminino genere fauces etiam intelligit, cum ait: φάρυγξ δὲ ἐλυσμένη σὺν πυρίῳ δεινὸν Paulus post, αἱ δὲ λυγῆσαι δεινότερα μὴ εἰσι, καὶ τάχιστα ἀναρῶσιν, ὁπόσα μὲν ἐν φάρυγι μολὲν ἐκδηλον ποιοῦνσι, hoc est: Anginae grauiſsimæ sunt, & cito interimunt, quæ neque in faucibus, neque in collo quippiam manifestum edunt &c. Hanc sententiam Galenus exponens inquit: ὅτι φάρυγξ τὴν προκειμένην χάριτος μάχης τε καὶ λάρυγξ ὀνομάζει, ἀλλὰ ἔστι. Hoc est: Quod pharyngem nominat regionem, gulæ & asperæ arteriæ summo prepositam, nemo ignorat. Rursus φάρυγξ δὲ τὴν ἐν τῷ λαινοῖξαι τὸ τόμα, καὶ πηλοῦ τὴν γλῶ



γλώσσῳ λιάνω φαινόμενον ἐνρυχωρίαν ἐν ἧ τὰ δύο στόματ' ἔστιν τό-  
τε το στόμαχος, καὶ τὸ λάρυγγ. At pro larynge, & aspera arte-  
ria posita, non solum in masculino genere, vt Suidas putat, sed etiam  
in fœminino inuenias: præcipue apud Galenum, vt secundo de placi-  
tis Hippocratis & Galeni: τὸ μὲν γὰρ τὸ φαχέας ἀρτηρίας ἦν πρὸς δὲ  
καὶ φάρυγγα προσαγορεύομεν. Ibidem, ἐπὶ δὲ τοῖς ἀπασιν ἔστι  
ὑποδείξαι σοι τὸ τὸ φωνῆς ἰδίον ὄργανον τὸν φάρυγγα, καὶ τὰς λε-  
γόμενας αὐτὸν μῆς. Hic pro larynge accipit: de qua ita scribit, octauo  
de vsu particularum: καὶ τό γε πρῶτον τε καὶ λευγώτατον ὄργανον  
τὸ φωνῆς ὃ λάρυγγ ὀνομαζέται, τὸ ἄνω μέρος ἔστι τὸ φαχέας ἀρτηρίας ἦν  
δὲ καὶ φάρυγγα λεγόμενον ὁμωνύμως τῇ πρὸ τοῦ λάρυγγος, hoc est:  
Ac primum, principalissimumq; vocis instrumentum, quod larynga  
nominant, superior pars asperæ arteriæ existit, quam sanè etiam pha-  
rynga vocant, eodem nimirum vocabulo quo pharynx (id est, fauces)  
ante arteriæ asperæ caput, nuncupatur. Atque hic in fœminino ge-  
nere vt superius in masculino positum est nomen pharyngis, contra  
grammaticorum opinionem. Pollux audiendus non est, qui τὸν φάρ-  
υγγα masculino genere prolatum, pro gulæ extremo accipiat.

Pueris raro talis. Pueris interim vertebrae colli è loco suo exci-  
dunt propter ligamentorum quæ eas connectunt imbecillitatem, Unde  
de angina periculosissima oritur, quæ nullis cedit remedijs, quare ei  
admonenda manus non est. Intelligenda autem sunt hæc, Pueris ra-  
ro talis. Raro quidem, sed tamen interdum angina hæc accidit, idq;  
in pueris magis quàm adultis, ob causam superius dictam. Hippo-  
crates huius meminit libro secundo περὶ ἐπιδημιῶν in istum fere mo-  
dum: ἦν δὲ τῶν λιωαρχικῶν παθήματ' αὐτὰδε, τὸ φαχέας οἰσπόν-  
δυλοι εἶσω ἔρρεπον. τοῖς μὲν ἐπιπλέον, τοῖς δὲ ἐπ' ἐλάττω.

Porro ex strangulatis. Hippocrates lib. 2. aphorismorum hanc  
profert sententiam τῶν ἀπαρχομένων καὶ λιανόμενων μὴ πω δὲ  
τεθυμώτων ἐν ἀναφύσει οἷς ἂν ἀφρὸς ἢ πρὸς τὸ στόμα, hoc est, Qui  
bus strangulatis, solutisq; nondum vero mortuis spuma circa os ex-  
titerit, non restituntur.

Discussis autem colli. In græco codice est λιανόμενων δὲ τῶν  
πρὸς τὸν φαχέον ἐρυθμαίων, quod antea verteram, Simulatq; ve-  
ro colli impedimenta dissoluntur, intelligens nimirum vincula qui-  
bus strangulantur.

## IN XXVIII. CAPVT.

GRAUEDO. Celsus libro quarto dictiones græcas eleganter expo-  
nit, λοιπὸν grauedinem nominans, λιανώματα, vel vt Pan-  
lus habet, λιανώματα desillationes.



Aquiloniis diebus. Græce est ἐν βορείοις καὶ ἀσθενέσι quod est aquilonis aeris statibus seu constitutionibus. Ego Celsum secutus sum.

Tussis.

Tussis. Tussis varijs de causis excitatur, nunc ob intemperiem, nunc ob humores, vel tenues, vel crassos ex alto descendentes. Interim ob iocinoris inflammationem: interim ob pulmonis affectum.

Anaphotici.

Anaphoticos. Interpretatus sum eos qui agrè reijciunt, scilicet qui crassa glutinosaq; ex pectore reijciunt, hi enim difficulter propter crassiciem educunt. Sunt qui ad sanguinem reijcientes referant, mea opinione, incommode.

IN XXIX. CAPVT.

**Q**ui febris. expertes. Galenus libro septimo de compositione medicamentorum secundum locos copiosius hæc, Aetius item & Oribasius ante Paulum pene eadem tradiderunt: non autem eo compendio quo Paulus, vsi sunt. Caterum ἀόδμα suspirium vertit: quod latine etiam dici possit anhelatio.

Acetum scilliticum. Valentia hic commemorat medicamēta, purgationemq; fortissimam, ea nimirum ratione, quod multas numero partes pertransire oportet, antequam ad pulmonem perueniant, nempe os, gulam, stomachum, ventriculum, tenuia intestina, venas meseraicas, venas in sima parte iocinoris, item eas, quæ in gilda habentur, hinc venam cauam, postremo pulmonem.

IN XXX. CAPVT.

**T**unica oculi ceratoides. Ex octauo Oribasij hæc sunt transcripta. Dixi autē in pinguedinē languescit, pro modice aut leuiter pingues sunt. græce est πονηραὶ φαίνονται, hoc est subpingues apparent. Locutio est Pliniana in pinguedinem languescit.

Explicata  
sententia.

Suffragantibus qui huc req. Græce est ἐν πενόντων μὲν τῶν αἰσ τῶτο ἀριθμῶν. hoc est ad verbum, permittentibus quidem ad hoc numeris. Quæ sententia obscura quibusdam videri possit. Hoc autē sibi vult, omnibus quæ huc requiruntur, indicationibus cōsentientibus: nempe viribus, morbi natura, ætate, & alijs id genus reliquis.

Hydromalo. Hoc est portione dulci ex malis Cotoneis, melle & aqua confecta.

Hydrorofatum Aetij  
iunioris.

Hydrorofato. Huius etiam misturam Paulus libro septimo exponit, ex rosas, aqua & melie. Recentiores autem græci, vt actuarius paulo delictatiorem compositionem hydrorofatum appellant. ea recipit aquæ libras decem, Zuccari libras quinq;, hæc feruescunt vnâ donec spissitudo fiat: postea additur succi rosarum libra. Febribus conuenire dicunt.

Iri



Iridem insparfam. In Græco codice est ἰρεὺς ἐμπειρασμένης. Oroscius. Castigator mutare noluerunt.

Epithema. Hæc dictio quidem in Græco non est, sed intelligenda venit. Nam Aëtius eam apponit. Ceterum per resinam, intellige terebinthinam, Per medullam, ceruinam. Nam ista sunt excellentia vocabula, Per oēsypum quod in Græco est, ὠσώπω, intellige medicamentum liquidum in septimo descriptum. Aëtius legit οἰούπω ὕγρῳ, hoc est oēsypi liquidi. Ceteris iridem siccam mandi de- tritam, ac in puluerem redactam.

## IN XXXI. CAPVT.

**C**Ruentum sputum. Tribus potissimum de causis sanguis per-  
 cos educitur. Vel enim exesa parte aliqua venosi generis, vel ru-  
 pta, vel ore alicuius venæ patefacto. Primam διαβρωσις, secundam  
 ῥήγις, tertiam ἀναστόμωσις Græci appellant, authore Celso libr. 4.  
 At sanguis vel cōfertim vel paulatim erūpit. Vase quidē eroso sen-  
 sim educitur, nisi magna adeo sit iactura, vt etiā pars aliqua pulmo-  
 nis, vel eius Cartilaginis reijciatur, aut si casus ex alto, vel compressio  
 vel aliud id genus superuenerit. Rupto autē cumulatim prorūpit, vt  
 in aperto quoq; ore fieri solet. Paulus à Galeno dissentire videtur. cū  
 ait, εἰ ἢ διαβρωσις ἢ ἀθρόως, ἀλλὰ καὶ βραχὺ τοῦ αἵματος  
 ἀναγωγὴ γίνεται. Nā ille quarto de locis affectis libro inquit, εἰ δ'  
 ἀναβρώσεως ἀθρόα ἡ νόσος αἵματος ἐπὶ τῇ πνεύματι γίνεται  
 βραχέας πύσεις ἢ τοῖς εἰς τὴν πνεύμονα ἀρῶσι πνεύμασι. Hoc est:  
 At cumulata sanguinis euacuationes ex erosione post pauca fiunt  
 sputa, & acres in pulmonem fluxiones &c. Quomodo igitur hæc cum  
 Pauli verbis cōsentient? Aëtius lib. 8. in istum modum litem diri-  
 mit: Quibus ex erosione venarum pulmonis,eductio sanguinis contin-  
 git, his per intervalla modica sigillatim expuitur. Mox subiicit. Fieri  
 etiam potest vt ex erosione sanguis coacervatim erumpat. Cum enim  
 præcedenti tempore paulatim quis expuerit sanguinem, nec diebus in-  
 secutis vel casus, vel alia quadam causa violenta superuenerit, san-  
 guinis tamen eruptio multa prodierit, magnam subesse erosionem opor-  
 tet. &c. Itaq; primis diebus paulatim ex erosione sanguis reijcitur. Si  
 acriores fluxus in pulmonem destillarint, quæ magnam erosionē pe-  
 pererint, confertim prorūpit. Non possum satis hoc in capite Oroscium  
 demirari, qui pro dictione Græca πλῆθος multitudinem verterit,  
 tantus medicus vt ipse videri vult.

Quercus mēbrana. In Græco est ἄρως τὸ ἰνὼδες, καὶ τὸ πρὸ τῆς  
 μεμβράνης



Membranae  
quercus.

κελύφει ἢ βαλάνx. In septimo tantum, ὑμνῶδδδ. legitur. Diosco-  
rides habet τὸ μεταξὺ τοῦ φλοιῦ καὶ τοῦ ὡρίμενου ὑμνῶειδης. Prima  
est interior & subiecta cortici tilia quæ ligno membranacea coheret,  
altera tunica putamini glandis subiecta. ὑμῶδδδ-itaq; sit ὑμνῶδδδ.  
Vtraq; astringendi vim obtinet.

Lectiōnem  
obserua.

Phagi autem & ilicis membranæ præstantiores sunt. Gal.  
lib. 6. de simplici medicina eadem fere habet. σφοδρότ' ἔστι δ' ἐν τῷ ὡρίμενῳ  
φυλὸς καὶ τὸ πρὶν &. Intellige τὸ ὑμνῶδδδ.

ἰπόδα.

Cochleare vnum. Exemplum Græcum Basiliense habet λο-  
χλιάεια. ἃ hoc est cochlearia undecim. quæ mensura magna est ni-  
mis, eoq; legendum λοχλιάειον. ἃ.

Fructibus. In Græco erat ὀπώρωρ. aliàs verti, poma, quod sci-  
licet lignosi nihil habeant. verum hic recenset etiam malum puni-  
cum extrinsecus durum. ob quam causam, fructibus, dixi, quia la-  
tius patet, fructus quàm pomum. Et differentia superius exposita  
nonnunquam confunditur.

#### IN XXXII. CAPVT.

ἰμπύημα.

Puris illuues. Sic interpretatus sum ἰμπύημα: quasi dicas pu-  
ris in parte aliqua collectio. ἰμπυοι Purulenti Plinio vocantur.  
alij exponunt, pectore suppurati.

#### IN XXXIII. CAPVT.

Inguľ præ-  
cordia.

Pleuritis. Celsus interpretatur laterum dolorem libro secundo,  
& quarto. Huic, inquit, accedit febris & tussis. In Græco ver-  
bum est σπυγνέται, quod signat, simul accedit, assistit, ac quasi  
individa est.

Vsq; ad ingulum & præcordia. Alij dicunt vsq; ad clavi-  
culā, & hypochondria. Ego Celsum imitor, qui claviculam seu λεγδῶ  
inguľ exponit, & ὑποχόνδρια, præcordia. Distinguit autē postea,  
quando ad ingulum dolor, quando autem ad præcordia pertingit.

Pulsus fer-  
ran.

Pulsusq; durum & ferræ modo inæqualem. Hæc pulsus  
species secundo libro exposita est. Galenus eam aperte interpretatur  
libro quarto de pulsum causis in hunc modum: ἐν λόγῳ δ' ὅτι σκληρό-  
τ' ἔστι ἀπ᾽ αὐτοῖς ἐπὶ φλεγμονῇ πύρετον οὗ σφυγμοῦ γίνεται, καὶ  
προσέτι γὰρ διὰ τὴν δυσουρασίαν τὴν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ἀνώμαλῶ  
καὶ μίαν προσβολὴν, καὶ διὰ τοῦ ὡς ἀμφοῖν σπυγνέται τὸ εἶρημέ-  
νον ὑπὸ τινῶν αἰδῶν τῶ σφυγμοῦ, τὸ διὸν ἐμπρίον τὴν ἀφύρῳ-  
τον γὰρ ἀνάγκη φαῖσασθαι τὸν ἀπὸ μὲν οὐδ' ἄννου σκληρὸν τὴν  
προσβολὴν ἀνώμαλον ἔχοντα. Hoc est: Bona itaq; ratione omni-  
bus qui ob inflammationem febricitant pulsus oboritur durior. Pre-  
terea ob intemperiem arterias obsidentem inæqualis in uno istu, &  
nimirum



nimirum ambobus coeuntibus pulsus erit species à quibusdam dicta, veluti serra tangentis manum secans. Ita enim necesse est imaginari eum qui tanget durum instrumenti quod occursum habet inaequalē.

Quæ nihil emolitur. Hoc est, qua nihil exspuitur. Sic Celsus loquitur libro quarto.

Atque si tumor purulentus. Hoc est ex inflammatione musculorum externorum collectus, nisi dissipetur, in exteriorem partem scalpello incidi debet. Græce est ἐν τῇ ἐκτὸς ἀδιδυμῶναι παρυί-  
ναι, quod ad verbum sonat, ad exteriora incidi comodo est. Nā παρυί-  
ναι signat βοηθεῖν, ἐκινεῖν, κερῖναι. Hoc Orosius in Al-  
bano quem ferè in singulis verbis reprehendit, non adnotat.

Illam nanque nisi vel extra, vel intus. Hoc est, nisi per os, vel per aluum fuerit expurgata. Foras enim per cutem purgari non potest.

Remedium est sanguis dimissus. Non dicit qua ex parte mit-  
ti debeat. Hippocrates sane lib. 4. de victus ratione in morbis acutis  
manifesto docet his verbis: ἢ μὲν ὀδύνη ἄνω παρὰ τὴν πρὸς ληνίδα ἢ  
πρὸς μαστὸν ἢ γὰρ βραχίονα τέμνειν καὶ τὴν ἐν τῷ βραχίονι φλέβα τὴν  
ἑσώτην ὀνότρου ἢ τὴν μεσώτην καὶ τὴν τοῦδε. Hoc est: Siquidem do-  
lor sursum ad ingulum, aut circa mammam, aut brachium pertingat,  
internam brachij venam secare oportet, illa nimirum parte, qua do-  
lor fuerit. Galenus exponens hæc ait: Cubiti internam incidere con-  
uenit illius partis, qua dolor fuerit. Oribasius capite de sanguinis mis-  
sione habet: Pleuriticis autem ex ipsa parte quæ dolet auferendus est  
sanguis. Hæc obiter posui candidè lector, ut isti Arabum sectatores  
videant, veteres illos ex eadem parte per initia semper, non ex aduer-  
sa sanguinem detraxisse.

Pleuriticis  
vnde mitten-  
dus sanguis.

Solidiore vtetur cibo. Græce est καὶ τῇ ἀδύοτρου. Nam λεπτό-  
τερον, hoc est tenuior, seu qui extenuet, ut est, mulsæ sorbitio ex ptis-  
sina chondro, alijsq; opponitur ἀδύοτρου, qui recte dicitur solidior, qui  
videlicet magis nutrit. Gal. interpretatur ἢ παρὰ τὴν πρὸς ληνίδα, quod  
est adaugens alimentum, quod Celsus dicit valentis materiæ. Vt  
enim tenuis cibo corpori parum adijcit, aut nihil, sed vires tantum  
conseruat pro tantillo tēpore: sic solidior plus corpus alit. Non est quod  
Orosius alios reprehendat, vertentes ἀδύοτρου solidius. Non nego  
aliquando plenius posse dici.

Cibus soli-  
dior.  
ἀδύοτρου.

## IN XXXIIII. CAPVT.

**C**ordis affectus. Gal. cum in quinto de locis affectis, tum vero  
secundo in librum Hippocr. de ratione victus in morbis acutis  
commentario de cordis affectibus pene eadē tractauit. Principia itaq;  
tria in humano corpore existunt, cor, cerebrum, hepar. Hæc autem in-  
terim



terim per se afficiuntur, interim ex consensu tum mutuo, tum aliarum quarundam partium. Corde itaque affecto per se, praesens est periculum: secundum locum obtinet cerebrum, postremum iecur. At si ex ventriculi dolore, cor afficiatur, syncope oritur, si cerebrum consentiat, delirium, vel convulsiones.

syncope dif-  
ferentia.

Syncope appellatam. Syncope totius habitus est resolutio. Sunt autem aliquot eius species, cardiaca scilicet, quae intemperiem cordis, vel inflammationem, vel erysipeles sequitur. Stomachica quae ob oris ventriculi affectum, corde simul consortij lege dolente generatur. Flatuosa, ex cruditatibus constituitur.

παλμός.  
Palpitatio.

Noui inquit. Lib. 5. de locis affectis hanc historiam commemorat Galenus, unde etiam haec sunt transcripta. Est autem palpitatio quam Graeci vocant παλμός, qui est teste Galeno περί πόρου καὶ παλμός, καὶ σπασμός, καὶ κρίσις: διάστασις καὶ συνήστασις παρὰ φύσιν, ac omni parti accidit palpitatio, etiam immobili. Causam eodem libello Galenus ostendit his verbis πνεῦμα παχὺ καὶ ατμώδες ἐν ἵχνυ ἀέξοδον, hoc est spiritum crassum, & vaporosum qui non habeat exitum. Cordis autem palpitationem humor aliquando generat, in ambiente cor tunica quam pericardion Anatomi vocant, collectus.

#### IN XXXVII. CAPUT.

Nam si sola. Ex octavo Galeni de compositione medicamentorum secundum locos, & ex Oribasio haec sunt translata. Paulus dixit, sola, ubi Gal. habet ἀμικτὸν τὸ τοῦ τοῦ τοῦ διωκόμενος hoc est, non admixto corroborante presidio.

Orosius.  
Castigatur  
codex.

Omphacij drachma. Omphacium est vuae acerbe succus: quem Barbari agrestem vocant. Male in Codice Graco legitur ὀμφακίου pro ὀμφακίου. Orosius neglexit.

Orosius.  
Deprauatus  
codex.

Augendus autem. Vtiose legitur in Graco exemplari παρὰ ξίφιν pro παρὰ ξίφιν, quod etiam vterque Aristarchus praeterijt.

Aloe trita inspargitur. Gracus Codex perperam habet ἐπιπλάσσεται pro ἀδιπλάσσεται nec hoc aduertentibus Aristarchis, sicut etiam paulo post ἐμπλάσας pro ἐμπάσας habet.

#### De cibi fastidio.

Si cibus quodammodo praeter voluntatem. In Graco Codice est, εἰ βιαδύνῃς τὴν φαγῆναι τύχην. Huic respondet Gal. hoc ad Glauconem primo: οἱ δὲ ἐνθὺς τὸν ὀλέμαχον φαύλως ἰσχυοῦν ὥστε ἀποσφριεῖσθαι τὰ σπύγια, καὶ εἰ βιασάμενοι λάβοισιν, ἢ μὴ λαΐξουσιν, ἢ μὴ πείθουσιν λαλῶς, hoc est, quidam vero statim os ventriculi habet affectum, ut cibos auersentur, & si coacti assumpserint, aut non retineant,



reant, aut male concoquant.

Quam Romani Melcam. Constantinus Cæsar Melca præpa Melca.  
rationem lib. 18. de agricultura tradit. Est autem lac in feruentes ol-  
las, quæ iam acetum incalescendo absorpserint, reconditum acidumq;  
redditum, ut species eius quod oxygala dicitur, videri queat.

Conditum. Constantinus Cæsar libr. 8. conditi præparationem in Conditum.  
hunc modum tradit: *πεπρωτος πεπλωμενος, ηγε ελκυμενος, φιδου-  
μου επιμελω; γκαμμαλα η μελιτ & ατλινδ ξ.ο.]. α. diva παλεις ηγε  
λαυδ ξ.φας η.*

Maloplacuntion. Hoc est placentula ex malis Cotoneis. Pau-  
lus lib. 7. latius exponit.

Sorbtionibus ex oleo. In Græco codice *επες* male legitur pro Castigatur  
in *τω ιδαίου*. Gemuseus vitiosum reliquit exemplar. codex.

Aloe, masuchæ. Masucha compositio, non simplex remediū exi-  
stit. habes eius descriptionem libro septimo Pauli expressam.

## IN XXXVIII. CAPVT.

CVm tormine intestinorum. Græca dictio est *οσφου*, quæ  
Largo tormina intestinorum significat. quamquam & dolorem  
stomachi haud absurde interim interpreteris licet.

Exigua caliditate. In Græco est, *τω οσφουτι] & χλιαρæs*, qua-  
si dicas caliditate tepida. Aetius mediocri dixit.

## IN XXXIX. CAPVT.

Cholera est immodica. Cholera commune stomachi & inte-  
stinorum vitium videri potest. Nam simul & deiectio, & vo-  
mitus est, præterq; hæc, inflatio, intestina torquentur. Bilis supra, in-  
fraq; erumpit.

Hydromalū. Hoc est aqua ex malis Cotoneis preparata. scriptu  
rā eius habes li. 7. Pau. sumitur aut et per se potui, & cū micis panis.  
Horarios seu fugaces. Alias exposui qui sunt horarij quos Plin.  
vocat tēporarios & tēpestinos. Sūt aut hi qui diu asseruari nequeāt.

Suum petunculi. Hoc est suum pedes. Celsus alibi Trunculos  
videtur nominare suum pedes inter ea quæ boni sunt succi.

## IN XL. CAPVT.

Lienteria. Celsus ad verbum interpretatur hanc vocem, leui-  
tatem intestinorum nominans. In hac cibus non continetur, &  
quicquid assumptum est, imperfectum protinus redditur. Læuitas inte-  
stinorum.

Cerata ex myrteo. In græco legitur *λερωτα δία μυρσίως* pro  
*λερωτα δία μυρσίως* quod est, Cerata ex oleo myrteo. Sic etiam  
Aetius habet.

## IN XLI. CAPVT.

Implacabilis desidēdi. græcè erat *ἀπαράτη] & προθυμία προς ἀπαράτη-*  
*ληναισι.* Celsus ponit frequēs desidēdi cupiditas: *ἀπαράτητ & τ.*



signat inenitabilis. Melius sonat hic implacabilis, frequens & asidua est. Quidam τεινισμὸν scribendum putant à verbo τείνω, quod est tendo.

## IN XLII. CAPVT.

**L**Atini tormina. Celsus lib. 4. ita inquit, Proxima his inter intestinorum mala tormina esse consuerunt, δυσκοιλία Græcis vocantur. Vide Galeni librum sextum de locis affectis, Oribasij librum nonum.

Tenesmi mutatione. Græce est ἐν μεταπύσσεως τινισμῷ, quasi dicas ad verbum ex decentia tenesmi, cum videlicet Tenesmus in dysenteriam degenerat, transit, mutatur.

Corrigitur  
codex.  
Orosius.

Deinde leniter subcruenta. In Græco malè habetur εἴτα πρὸς γέγον ἀμαρτώδης pro εἴτα πρὸς ὀλίγον ἀμαρτώδης. Celsus etiam quodam loco interpretatur, Leniter subcruenta. Orosius & Gemusæus non annotarunt.

Cochlearum integro tostarum. Græce est λοχλῶν ὅλων quod sonat cochlearum totarum, quod nostri dicunt, cum toto.

## IN XLIII. CAPVT.

**C**olon. Hoc intestinum apud Latinos scriptores varia sortitur nomina, nunc intestinum crassum, nunc pleniùs, nunc laxius appellatur, Paulus dicit, cum pars sit intestini crassi, hoc est, recti. Nam rectū octo fere digitos longum, statim colon vocatur, quod tenuibus est crassius. A sinistro rene ad dextrum super ventriculi fundum fertur, donec sæpenumero & lienem, & iecur attingat. Quid dicet aliquis, quod Paulus contra Galeni sententiam à dextra ilium regione procedere colon pronunciat. Huic respondeo, Si à tenuibus intestinis numeremus, per dextra ilia prius superuectum colon ad sinistra prodit. Sin à recto incipiamus, à sinistra parte incipit, in dexteriores obliquum conuertitur.

Dolor coli  
qualis.

Ex cruciantur præsertim sensu. Græce est ἡ ὀδύνη γίνεται, μάστιγα δὲ κατὰ δέσιν τοῦ κόλου ὑπανώδης συναισθήσεως γινόμενος. quod ad verum sonat. Color oritur, maxime vero iuxta situm Coli, terebrali (ut sic dicam) sensu excitato. Galenus hanc doloris speciem lib. 2. de locis affectis exponit his verbis. ὁδὸν δὲ ἡγεῖται μαντῶ ποτὶ συμβάσαν ὀδύνῃ σφοδρὸς ἄττω, ὡς ὑπὸ πᾶσι δονεῖν διατιπᾶσθαι κατὰ τὸ βάθος αἰσθησίας. Rursus in eodē capite, τὰ μὲν δὲ τοιαῦτα τῶν ἀλγημάτων ὡς τὰ ὑπὸ πᾶσι φαίνεται γινόμενα.

Brassicæ caule probe polito. Græce erat λεγμῆς λευκῆς λεγμῆς ὁσμίνης. Orosius intelligit per ὁσμίνης, coclo, quod ἰσμίνης potius significasset. Præterea Dioscorides leniter feruefactam, si edatur,



tur, aluo idoneam: percoctam vero, aluum sistere.

Iubebis vt lauent, incalescantq; laconico. Ad humorem pituitosum concoquendū consulit naturales balneas, & Laconicū. Est Laconicum. autem Laconicum etiā hodie adhuc in vsu, testudo illa thermarum, quæ igne concalsacta vaporem siccū excitat: qui deinde sudorē mouet in corporibus. Columella meminit his verbis, quotidianam cruditatē laconicis excoquimus, & exusto sudore sitim quærimus. Græca sunt *πυρρὰ δα ἐν Λακωνικοῖς τοῖχοις*, quasi dicas de sudare intra ignitos parietes. Non opus erat ponere ignitos parietes, cum Laconici vox hoc comprehendat, sed vt sciolis quibusdam fiat satis, apposui.

Cucurbitæ quā maxime cū flamma. Sic interpretatus sum *οὐράϊος ὡς μέγισται Λακωνικοῖς*, quasi dicas cucurbitæ quā maxime ignitæ. Celsus cum flamma dicit, quem imitatus sum.

Tanquā in crisi, causa. Paulo pluribus verbis reddidi hanc sententiā: *ὥσπερ ἐν λυγρῇ μεταστάσει τ' αἰτίας*, hoc est ad verbum, tanquam Crisi causa mutata. Is autē sensus est, Colicus hic morbus tandem ex intestinis materia tāquā per crīsim expulsa in alias partes finitus est.

## IN XLIIII. CAPVT.

**I**leos. Morbus hic nomenclaturam ab ipsa parte affecta, vt superius, colicus, accepit. Nā tenue intestinū, vt ieiunum etiā, dicitur. Incipit, si ab imo incipias, à cæco, & desinit in ieiunum, in varios implicatum orbes. Quidam recentiores morbum vocant Voluulum.

Colica affectione. Hoc Paulus superius dixit vbi habet: Inter colicas affectiones hæc est grauissima, quæ in Ileū trāsitionē minatur.

## IN XLV. CAPVT.

**C**olicis in dexteriore potius ilium. Quia per dextra ilia superuectum, ventriculi fundo incumbit lienem & iecur attingens: deinde ad sinistra prodit, si de superiore ipsius initio, cæco intestino, dici intelligas. Nam infra sinistram magis partem occupat.

Eiusdem lateris ac è. Hoc signat græce *λεῖτον* & *λεῖτον* si Galeno credimus. Hippocrates prior his dictionibus vsus est.

Hoc inspergi potest. In codice græco perperam scriptū est *λεῖτον* *πλάστων*, pro *λεῖτον* *πλάστων*. Nam de puluere, non emplastro mentio est. Aristarchi libenter omiserunt.

Phyllique momento ex mero & melle. Hoc est, phylli modico cum mulso. Nam *ἀντατόμελι* nihil aliud est quā *διόμελι*. Contrarium est *μελίπαστων*, quod videlicet ex aqua & melle confit. In græco erat *ἐν ἀντατόμελι* & pro *ἀντατόμελι*.

Iniectione recti syphonis. Lib. 7. hanc rationem indendi canali recti in vesicam habes expositam. Vocant *λεῖτον* ab instru-



mento *λεθετῆς* &c. Solent autem quassationes corporis simul adhiberi, ut calculus facilius excidat.

Ex vino & oleo rosaceo, vel ex aqua & oleo. Græce est *ἔξ οἴνου καὶ ὀλέου ῥοσάκτου*. Quidā de vino rosaceo, & aqua rosacea intelligunt: male nimirum: quia *ῥοσάκτου* per se oleum rosaceum significat. Hermolaus barbarus in corollario suo. pace illius dixerim, oxyrhodinum interpretatur, acetum rosaceum, pro aceto & oleo rosaceo, ut Galenus, & alij græci accipiunt.

Deprauatū  
exemplar græ-  
cum.

Archigenes in epistola. Idem refert Aëtius sermone undecimo. Ad finē deest particula: in græco habetur enim *οἰνὸν καὶ ὀλέον* cum legendū sit, *οἰνὸν καὶ ὀλέον* *ῥοσάκτου*. Paulo post, amyli cochlearia duo. Perperā character *κ*. qui heminā signat, ac legēdū est *κοχλ.* ut sit cochleare. Iterū: *οἰνὸν ὀλέον* *ῥοσάκτου* *καὶ* pro *οἰνὸν ὀλέον* *ῥοσάκτου* *καὶ*.

Nonnihil ex vena laxant. Hoc est ut latius exponit Aëtius, ex vena cana propter amplitudinem osculorū remittunt. Interim per circuitus hoc mali repetit. Per initia egri nihil mali sentiunt, eōq; nihil tentandum. Sin autem perseueret, occurrendum, aliās gravissimæ symptomata solent provenire.

Aut lixiuium. Simplici verbo dixit Paulus *ἔξ ὕδατος*, quod antea quoq; annotavi.

Diabetes.

Diabetes. Multa nomina hic affectus habet, vide Galenū de locis affectis libro sexto. Venit à verbo *διάβημι*, quod signat, pertransseo. Potus enim quā primū assumptus est, statim transit.

Nota.

Rosato. Forte legendum in græco pro *ῥοσάκτου ὀδοντοσάκτου*. Nam apud Paulum in septimo nulla est mentio rosati, sed hydrorosati, ubi etiam Rodomelon exponit.

Ex anatome  
constant.

Musculus qui ceruicem. Musculus hic transuersis constat fibris, variāq; habet officia. Primum quidem vesicam claudit, licet sine illo claudi possit. Deinde post emissionem vrinae cōtractus undiquaq; id quod in meatu est, propellit. Præterea quicquid eo exprimente in urinarium meatum incidit, id ne diutius immoretur ibi efficit, sicut cum vrina mordax est.

Resolutionem repræsentat. Græcè est *παράλυσις ἐμφανὴς* *ἐπὶ τῇ*, quasi dicas, resolutionis emphasi efficit. *ἐμφανὴς* autem est representatio rei cuiusdam, aut adumbratio.

χυλοποι-  
εῖν.

In succum quidem conuersa. Hoc est in chylum medici dicunt, & ut latinam dictionem per græcam interpreter. Habet autē Paulus *χυλοποιεῖν*, quod est in succum seu chylum redacta beneficio ventriculi. Simile verbum Galen. lib. 8. de compositione medicamen-  
torum



torum secundum locos habet, ut antea quoq; annotavi. nempe ἐκχύ-  
μωτα quasi dicas exuccata. sed hoc plus signat, chilum scilicet à ieci-  
nore attractum ita ut liquidior pars sit distributa. siccior veluti re-  
crementum relicta. Dicimus itaq; Chilum ἐκχύμωτον cum & ven-  
triculus probè concoxerit, & iecur attraxerit. ubi vero ille quidem con-  
coxerit, iecur autem attrahendi vim habeat infirmam, ἀν' ἐκχύμωτα  
& liquida excernuntur.

Bilis insigniter colorata. Hoc est bilis colore suo abunde exaturata per alium descendens vel deiectio mera bilis. Nam Gale. apud Hippocratem interpretatur  $\lambda\alpha\chi\nu\omicron\rho\acute{\iota}\alpha$ , τὰ ἀντατοχολὴ διαχωρήματα.

Quādo iecoris substantia. Græce est ἰσχυρὸν ἢ ἰσχυρὸν ὁσίων ἀντὶ τοῦ  
 πυρὸς, ἡ δὲ ἰσχυρὸς, quod ad verbū sonat, Iā verò etiā iecinori sub-  
 stantia cum ea colliqueſcente: Cum ea, intellige bile. Nā vbi humor  
 fermè consumptus est, corpus ipsum contabescit cuiuscunq; partis.

Flammeus ardor. Sic fere ubiq; sum interpretatus dictionem  
φλόγωσιν. Inflammationem vero φλεμμονήν, secutus Celsum.

Chamæpyteos radicis. Pondus apud Galenum & Alexan-  
dram medicum variat. Nam Chamæpyteos drachmæ octo ponuntur.  
Verum Aetius cum Paulo consentit.

Adhæc intybum, troximum, & sonchus. Troximum hoc est, eris per se esui aptum significat. Sereos autē genera tam hepatis affe-ctibus conueniunt, ut etiam cruda comedi possint.

In quibus calor intenditur. In codice græco habetur τὰ τοῖς  
θεμοῖς pro τὰ διθεμῖς. Basiliensis Corrector hoc non castigavit.

Corruda. Grace est *μυάνωβx*, quæ latinis Corruda dicitur, hoc est asparagus sylvestris.

Illud autem in summa præcipiendum. Hoc Galenus lib. 8. de compositione medicamentorum secundum locos commemorat. iecur & stomachum semper astringentia cum relaxantibus requirere. Aliàs sæpe stomachicis syncope iocinorosis interitus suscitatur.

Copton. Sic dicitur medicamentum quod tunditur. Est autem malagma libro septimo ad duriciem stomachi & iocmeris inscriptū.

IN XLVII. CAPVT.

**C**ottabismi. Cottabismus olim ludus apud Græcos erat, quo vinum ex alto fundebant, strepitum facientes. Hic autem possit accipi pro superfusione in partem aliquam, aut pro ruboris excitatione quo sanguis in exteriora eliciatur, hæc dum meliora occurrunt, boni consule.



**V**T corpus albido, & pituitæ colore. Græce est, ὡς λευκὸν καὶ φλεγματῶδες τὸ σῶμα φαίνεσθαι ad verbum sonant hac, vt album & pituitosum corpus appareat. Dicit autem de externo colore apparente. Eoque albido & pituitoso colore vertendum erat, quanquam parum refert dicere, album & pituitosum apparet, mortui instar. Ex nono Oribasij sumpta sunt.

Codex græcus viciosus.

Coqui autem possit etiam in aqua. Perperam in codice græco legit ὑδασι pro ὑδατι. Ceterū τὸν νεύον de futuro intelligendū est.

φαιμισμός quid,

Ad hæc in arena contacti desudent. Sic interpretatus sum φαιμισμός. Solent autem hydropici in arena à sole excelsa sepe-  
liri. capite excepto, vt humiditas meatibus apertis extrahatur.

τὸ λευκῶδες γον quod vt get.

Quia si cum febris aqua subter cutem. Si duo vno tempore vicia infestent, vehementiori insistentium, altero non neglecto, quod Paulus per verbum τὸ λευκῶδες signat.

πειραπεί-  
τιον.

Calumnia.  
παρὰ τὸν ἴ-  
σον.

Corpus emaciant, colliquantque, releganda. Quidam nasutus propter malè impressum codicem latinum hic me corrigendū censuit, quod liber habuerit eligenda. Quasi vero nescierim quid sit πειραπεί-  
τιον. Gemuseo Luetia indicauit legendū relegāda pro eligēda.

Ad perforationem veniendum. Græcè vocatur hac chirurgie administratio παρὰ τὸν ἴσον, hoc est pertusio & punctio. Nam eos qui ascate laborant, ad peritonæum vsq; imo in ventre diuidunt, sicut lib. 6. de hydropicis comprehensum est.

IN XLIX. CAPVT.

**C**Um lien melancholicus. Galenus li. 9. de compositione medicamentorum secundū locos. Oribasius lib. 9. & Aetius 10. sermone de liene in eandem ferè sententiam tradiderunt.

Centaury. Male habet codex græcus ταυρίον pro λεονταρίον. nec tamen hoc castigauit Basiliensis.

τίφρα χαλ-  
μαίον.  
Orosij er-  
ror.

Ceræ libra, terebinthina, Græcus codex habet λεπίων τρεβινθίνος, pro λίγης λίφας. α. τρεβινθίνος λίφας. α. Orosius cum Basiliensi hoc neglexit. Cinis ex officina fabrilis. Cinis hic est quem ferrū dū in officinis fabrilibus ignit, ac malleo tunditur, abijcit. Verba græca hæc sunt, καὶ ἡ τίφρα τῶν χαλκείων; vbi Orosius interpretū censor, pro χαλκείων legendū putat λευκαίων. At Gale. li. 9. iā citato, primū aquā in qua ferrū ignitū sæpius extinctū sit, potui lenosis præbet. Paulo post Cataplasma ex cinere fabrilis officinae obducentū exhibet, hoc pacto inquit, καὶ ἡ τίφρα ἐν τοῖς χαλκείοις μετ' ὄξους.

Acetabulum cum oxymelito. Lectio codicis græci deprauata est: habet enim ξύβαλον πάλιν ἢ ὀξυμέλιτι & ἀναγχαλλίδι. pro ὀξυβαλον μετὰ ὀξυμέλιτι & ἀναγχαλλίδι.

IN



## IN I. CAPVT.

**S**I enim febricitante ægro. Græca sonant. εἰ μὴ ἂν ἐπὶ τῷ σπέρμινι νόσῳ ἀθρόως γεγυῶς ὁ ἰσθμὸς ἀποπαύσῃ τοῦ πυρετοῦ. hoc est ad verbum. Si enim post febrilem morbum subito ortus arquatus febrim finierit. Vide nonum Oribasij, & decimum Aetij.

Si absq; febri alba deiiciantur. Alba quia bilis in meatibus obstructa ad intestina non potuit descendere, quæ excrementa tingeret. Excrementa alba.

Seminis autem atriplicis scrupuli octo cum Chrysattico, aut alio passo. In græco exemplari habetur. μετὰ χυσαττικῆς ἢ ἀλ-  
λον γλυκῆς. Aetius meminit passi Chrysattici. Alexander item  
sepius citat. dicitur esse coloris aurei. Scribit Dioscorides atriplicis se-  
men cum mulsa Ictericis conuenire.

## IN LI. CAPVT.

**C**Ausam umbelici prominentis. Hoc vitium vno vocabulo  
Paulus vocat libr. 7. ὀμφαλον, quod videlicet aut rupto in ea  
parte peritoneo, prolapsq; aut omento, aut intestino, interim ocioso  
humore umbilicū subeunte, interim carne subnata, aliàs sanguine ob-  
venæ aut arteriæ rupturam concreto aliàs spiritu indidem collecto,  
generatur. Celsus etiam caput facit de umbelico prominente.

Fabæ frææ corticum. In græco est ἐρεγμὸς λεπύρεος. Significat  
autem ἐρεγμὸς fabā fræam seu fractam. Dicitur autem etiā de alijs  
leguminibus confractis, nomine ipsorum appposito. Quamquā hic possit  
simpliciter de faba dici λεύρεος, ut sit fabæ corticum. tu utrū  
malis sequere.

## IN LII. CAPVT.

**A**Sellorum domesticorū qui tacti cōduplicant se in orbē.  
Sic interpretatus sum ex Largo ὀνίσκουρ λοτοινιδίωρ ἢ σφαί-  
ρῳ, ὀνίσκῳ. Ipse autem addit in pilea rotundissima similem. Caterum  
varia habent nomina, πολύποδες enim græcis λοβάριδες. Dioscori-  
di, λύαμοι Galeno appellantur. Nascuntur sub aquarijs vasibus ut ait  
Archigenas, imo etiam omnibus locis humidioribus.

Calcis viuæ partibus duabus. In græco est ἀσβεστον λιονίος. Nā  
ἀσβεστον ἢ λιονία In extinctam calcem significat. Si autem λιονία  
ἀσβεστον ponatur, pro Lixiuo calcis accipiendum est.

## IN LIII. CAPVT.

**A**Qua frigida peruso. Græce est προπατατῆρας ὑδατι ψυ-  
χρῷ. ante hoc προπατατῆρας habetur, videtur legendum προπα-  
τατῆρας, ut scilicet prius intro reprimatur. Nam quid confert prius  
intestinū confricare, quod προπατατῆρας signat. nolui tamen immu-  
tare, quod non haberem quem sequeretur.

Medicamento tam spisso. Sic verti ἀμολύντω χρῶ. Signat au-

Nota.

Amolyntō.



Erratum  
Orosij.

tem ἀμύλωτον non inquinans à verbo μολύνω Coquuntur medica-  
menta nunc, ut liquida permaneant, nunc ut dura sint. Liquida im-  
mittentis digitos inquināt: dura ac spissa non itē. Est itaq; ἀμύλωτος  
spissitudo qua digiti, aut manus nō inquinantur, quāquā Orosius  
verterit, postquam ex coctura recrementa iam separata fuerint.

IN LIIII. CAPVT.

Error Oro-  
scij.

Tenuissimę parti. Sic fere ubiq; τὰ πάλω sum interpretatus:  
aliquando pollinem, quod Orosius reprehendit, mihi vero pla-  
cet, cum alios etiam doctissimos ita vertisse videam.

ἀφθώτης.

Aphthę ulcere pressos ἀφθώτας in græco habetur. quid sit  
ἀφθώτης alibi exposuimus.

IN LVIII. CAPVT.

Priapismus. Galenus ad verbum lib. 10. hæc habet. Vbi male in  
codice græco ἐνιμάτωρ legitur pro ἐμμοτωρ, quod miror corre-  
ctore Basiliensem non aduertisse. Nymphæam igitur. Vulgo  
nenupharim appellant insigni refrigeratoria vi præditam. Duplex  
est eius species: de qua alias.

IN LVIII. CAPVT.

Particulæ.

DE particulis inefficacibus. Hoc loco particulas intelligo, eas  
corporis partes, quę generationi dicatę sunt. Barbari caput fa-  
ciunt de frigidis & maleficiatis.

Priuatim stellio concrematus. Hoc ex Oribasio sumptum est.

Aetius sermone vndecimo mentionem facit: aliorumq; complurium.

Satyriace. Hoc est medicamentum, quod penem erigat, à satyris  
satyri. dictum, qui naturalibus arrectis depinguntur.

IN LIX. CAPVT.

Sin etiam altè descēderint. In græco est εἰ ἢ ἡγεὶ βάθῃ αὐτοῖς  
πικρυν, hoc est: Sin autē profunditas etiā quādā ipsis adfuerit.  
Iuuat resina fricta. Hoc est sicca & retorrída. Duplex resinę

Resina.

species est, sicca & liquida. Sicca preparatur, ut Dioscorides memo-  
rie prodidit. Liquida viribus conditur, quanquam idem autor ex ijs  
dem arboribus alias esse siccās, alias haberi liquidās autumat. Sicca  
græcis φρυγίη nominatur, liquida ἢ ἐν τῶν λιπαρῶν ὑγρῶν, hoc est si  
ad verbum exponas, retorrída, & ex viribus seu dolijs liquida.

φρυγίη.

Puluis inspergitur parti vino prius. Hoc est, ista in puluerem  
redacta. Textus græcus deinde sequens deprauatus est, habet enim  
προαπονήπρω ἀπὶ, pro προαπονήπρω δυνω, ut ego conueriti. Nec  
Orosius nec Basiliensis castigatō animaduertit. Triginta nume-  
ro. Viciosus est codex græcus, ut qui habeat < α hoc est drachmam  
vnā pro λ. quod signat triginta, facili nimirum lapsu. Galenus &  
Oribasius vnde Paulus sumpsit, lectionem hanc confirmant.

Ovis venarum quę quod. Ita simplicē dictionē gręcā ἀμωρότοι  
des



desum interpretatus. Sunt autem venulae quaedam recti intestini, ore <sup>Hemorrhoid</sup>  
hiates, eo quod statotempore sanguinem crassum seculumque; excernunt, <sup>du differens</sup>  
hemorrhoides appellatae: cum autem aperta non sint nihilque; excernunt, <sup>tia</sup>  
sed tumidae apparent, sanguine in eis suppresso, τὸ φλαῖ græcis, Cæcæ, <sup>τὸ φλαῖ</sup>  
quasi foramen nullum habentes, latinis vocantur. Differunt autem situ et  
origine, si Galeno in. Anatomicis fide accomodamus, alie siquidem  
in recto intestino, alie in ano, alie in circulari musculo alium constri-  
gente qui σφιγξίς appellatur, consistunt. Atque hoc est quod Paulus  
dicit, quaedam superius delitescunt, non apparentes, ob loci remotitatem.  
Quantum ad originem attinet, alie videtur ex ramis venae portae, qui <sup>situs hemo</sup>  
omento, lieni, ventriculo communes sunt, propagari: alie ex caua venae <sup>rhoi.</sup>  
diuicatu in crura facto, ubi grandis arteria caua venam con-  
scendit. Haec itaque; vel ex porta, vel ex caua ortae nunc in isto largius pro-  
fluunt, nunc supprimuntur, quando remedia adhibere conuenit. Sin au-  
tem mediocriter fluant, corpus multis morbis liberant.

Infeliciter contabescere. Sic reddidi τὸν ἄποσιτος γινε- <sup>ἀπόσιτος</sup>  
σθαι. Abusus est Paulus verbo ἀποσιτος pro ἀσιτος, hoc est, ἀφ' ὧν  
γινεσθαι, quod signat, cibum non sentire, contabescere.

Quare cum plures sint hemorrhoides. Ex Hippocrate sumi-  
ptum est, apho. li. 6. ubi habet, ἀιμορροΐδες ἰσθμῷ χροναίς, ἢ μὴ μίαν  
διαφύλαχθῆναι λείδους ὕδρωπα ἐπιγορεύσθαι ἢ φθίβειν. Miror cur Ae-  
tius a Galeni sententia, aliorumque; fere omnium graecorum discesserit,  
nullam esse relinquendam censens. Quaedam vero superius. Hoc  
est, quaedam in recto intestino habentur: quae superiorem locum occu-  
pant, quam quae in ano, et circulari musculo apparent.

Cæcæ autem. Hoc est cum aperta venae, dolorem mouent, copia  
humoris melancholici grauatae.

Cretæ sutoriae, aluminis rotundi singulorum. In graeco co-  
dice deest ἀνὰ, et στρογύλως per se signat alumen rotundum, sicut  
σχιστὴν scissile. Aliqui tamen pro μελαγχολία, legunt σφαίριον.

Recrementi plumbi rus syriaci singulorum drachma. In  
vulgatis codicibus graecis habetur unciae octo. Verum Galenus et Ori-  
basius habent drachmas octo, quod non annotauit Orosius.

## IN LX. CAPVT.

Circa statum menstruale tempus. Graeci vocant certum pre-  
finitumque; tempus πρὸθεσμίαν, vel προθεσμίαν τῶν, et τῶν πρὸθεσμίαν.  
μηνῶν ut Budæus etiam annotauit.

Detrahetur autem sanguinis. Hodie sumus timidiore quam  
ut libram integram una vice detrahamus, tantum abest, ut libras  
duas et dimidiam auferamus.



Est autem pessus. *Descriptio pessarij. In græco codice autem superfluum est ἡτοι, vel in hunc modum legi debet: πωρὸς δὲ ὄγιν ἐγιν ἀνέλασμένον ἡτοι καὶ σφαῖρωθεν. Aliqui legendum putant ἡτοι καὶ, hoc est, vel aliquid.*

Amus, sion. Malè in exemplari græco impresso οἶνον habetur, pro οἶνον aut οἶσιν. utraq; vim semina prouocandi menses obtinent. Paulo post λεῖνίδες pro λωγίδες substitutum est.

IN LXII. CAPVT.

ἀπό τεξις τέ  
λεια.  
Erratum  
Orosij.

**O**B legitimum partum. Hoc est, absolutum, perfectumq;. Nam postea dicit, vel ob abortum, illegitimum scilicet partum profuua accidere. Verum quæ ex naturali partu fiunt, sua sponte plurimū cessant. Erat in græco ἐν τῇ τελευτῇ ἀποτέξαι, quod Orosius noster vertendum censuit. In fine partus, quàm eruditè, vel mediocriter literatus iudicare poterit.

Vel combustæ ipsius cinis. *Lege in codice græco pro λουμύλον, λουμύλον αὐτοῦ ἢ σποδὶν, quod castigatores omiserunt. Paulò post λυνίδας βράβν habetur, tu fac lunnidos βράχιν. Quod etiam annotavit Orescius ex suo exemplari.* IN LXIII. CAPVT.

**V**Nctio ex melle. Sic Galenus libello de prænoscendo præcipit  
in uxore Boethi, Romanorum consulis. Ita fere sonant verba  
ipsius: ἐνύκτα τὴν σκωπὴν καὶ διαίτης ποικίλας διὰ τὴν πόματι  
ἐλαχίστου καὶ ψύξεως ἔχον το σῶμα. ἔτιτε χρίσεως ὅντω σκουα-  
ρομένους, καὶ διὰ τῶν τριῶν καὶ ῥυτίων, ἀλλὰ διὰ μέλιτος καὶ μένους με-  
χρὶ πλεονος καὶ μὲν ἐψυθύνους, hoc est vt rudiores intelligant: Conside-  
raui scopum intentionemq; victus inslituere ex potione paucissima,  
ex totius corporis frictione, & praterea vnctione ita preparata, non  
ex pice, & resina, sed ex melle solo diutius incocto.

Corrigitur  
codex Oro-  
scius.

Quercus liber. In græco codice habetur *δρυὸς τὰ ὑπὸ τῷ φλοιῷ τοῦ πρέμνυς τὸ ὑμνῶδες*. Galenus ita legit, *δρυὸς τὸ ἐν τῷ φλοιῷ τοῦ πρέμνυς τὸ ὑμνῶδες*. Dioscorides, *τὸ μεταξὺ τοῦ φλοιῆς καὶ τοῦ πρέμνυς ὑμνῶδες*. In Paulo igitur legendum censeo: *δρυὸς τὸ ὑπὸ τῷ φλοιῷ τοῦ πρέμνυς ὑμνῶδες*. Quod Orosius neglexit, & castigato Basiliensis.

IN LXIII. CAPVT.

**D**E inflammatione vteri. In ipso titulo graecum exemplar deprauatum est. Habet enim *παρενδύσεως* pro *παρεγυλίσεως*, quod etiam *Aristarchi* omiserunt.

Tendo me-  
dius inter  
neru um &  
ligamentũ.

Dolor capitis, tendinis. *Hic nimirum intelligit tendinem in utraq; capitis parte situm, corpus tenue, ac fibrosum, quod excrescentiam vermicularem ad particulas natibus cerebri, utrinq; adjacentes, illigat, ne errabunda vagetur, vel nervos in sincipite intelligunt.*

Per<sup>v</sup>



Per hapsū. Sic reddidi *πίλημα* contra Oroscij opinionem. At *πίλημα*.  
Celsus libro septimo ita inquit: Tum multo is oleo perungendus, indur- Error.  
endusq; hapsus lanæ mollis, tepido oleo repletus &c. Quid sibi velit Oroscij.  
velamen Oroscij, nemo facile intellexerit. Ex lexico suo ita exponen-  
dum censuit.

## IN LXV. CAPVT.

**P**raterea vero inordinatæ. Oroscius græcum codicē deprava- Oroscius.  
tū dicit, legendūq; putat *πυρετοὶ δὲ ἀτακτοὶ μετὰ φρίκης ἐν ταῖς*  
*ἐπισυναρσίαις γίνονται*, hoc est: Febres autē inordinatæ cū horrore in  
accesionibus sūt &c. At *ἐπισυναρσία*, per se febrium accesiones si  
gnificant: nisi forte inflammationū accesiones, aut in pure generando  
intentiones naturæ intelligere veimus. Tunc enim, ut ait Hippocra-  
tes, dolores ac febres accidunt magis quā in iam confecto. Vtram tu  
malis, sequere lectionem. Certe omnia antiqua exemplaria quæ mihi  
videre contigit, impressi codicis verba habent.

Aut candidum oleum. In græco est *λειδονακμίονον ἔλαιον*, hoc  
est, dealbatum oleum. Quomodo oleum fiat candidum, ex Dioscoride  
condiscas.

## IN LXVII. CAPVT.

**T**urpem humorum colluuiem. Græce est *εἰδεχθῆς*, hoc est, *εἰδεχθῆς*.  
turpem aspectu, qualis in Elephantorum facie alijsq; parti-  
bus videri solet. Vsus est eo vocabulo lib. quarto in hac sententia. Ha-  
bet enim *εἰδεχθῆς ὅρι δέπας μόνον τὸ πρῶτον*. Hoc est: Faciem  
autem solam aspectu quodammodo tetram horridam & deformem.

Amurca. Hoc sedimentum in aneo vase ad mellis spissitudinem  
decoqui solet. Interim torreri in duriciem, seu puluerem. Ac postea  
etiam alijs liquidis commisceri.

## IN LXVIII. CAPVT.

**H**elleborismus. Paulus lib. 7. aliquot rationes tradit veratri  
exhibendi. Tu inde colligito.

Metasyncriticum. Superius exposui, quid sibi velit *μετασυν-  
κρίτις*, quod alij male recorporaticum interpretantur, nisi forte in-  
telligas noxium humorem euocando restauraticum.

## IN LXIX. CAPVT.

**S**anguinis vero eruptionem. Cum mola scilicet in utero affli-  
git, ita curabimus, ut sanguinis profluii, quod in immoderata  
purgatione ex abortu potissimum accidit. Item sicut muliebrem flu-  
xum, de quo supra quoque est comprehensum. Basiliensis cor-  
rector dictionem unam expunxit superfluum esse ratus. Nam le-  
git. *τὰς δὲ ἀμνορραγίας ὡς πρὸς καὶ τὸν ῥῆσιν*. Ego ex ipso sensu & ex  
Dd 5



plari veteri legendum censeo: τὰς δὲ αἱμορροΐδας, ὡς πρὸς τὰς αἱμορροΐδας καὶ τὸν ῥῆν. Primum αἱμορροΐδας refertur ad id quod Paulus ante in eodem capite dixit: τισὶ δὲ καὶ αἱμα φέρει, hoc est quibusdam vero etiam sanguis effertur. Secundum αἱμορροΐδας ad caput de immoderata purgatione ubi habet: συνεχῶς δὲ καὶ ἐν ἀμβλώσειν ἰσχυρῶς αἱμορροΐδου. IN LXXII. CAPVT.

σπλάγχνον  
Interaneum.

**Q**Ue interaneum id. In græco codice est οἱ λαιτέχσοι τὸ σπλάγχνον, quod est, quæ continent viscus. Appellat vterum, viscus Ego dixi internaeum, nam cor iecur, cerebrum, pulmo, lien proprie viscera appellantur.

Vulua pro-  
cidit.

Quidam vero & totam vuluam. Paulus negat totam vuluam posse procidere. At nostris temporibus in vna & altera tota procidere extra sinum vidimus, ex cornibus tantum & quibusdam adhuc ligamentis suspensam, cuius rei etiā hodie testimoniū adferre possumus.

ὑπατμισμός  
δυμίσμα.

Vaporibus & suffimentis vaporum. Verba græca ita habent. ὑπατμισμοῖς, καὶ δυμίσμασι, quasi dicas subuaporationibus & suffimentis. IN LXXV. CAPVT.

ῥαγάδες.

**I**N vuluæ ostio. Rime, aut fissa vocantur latinis, quæ apud græcos ῥαγάδες, etsi nonnulli ῥολιδας ita nominent. Celsus libro sexto rhagadia appellat.

Subliuida & feculenta. Codex græcus impressus aliq; nonnulli scripti manu habet: ὑποπλιον καὶ σφαγγώδη, pro ὑποπλιδιον καὶ σφαγγώδη, ita etiā legendū putat Oros. Gemusæus autem nō aduertit. Volsella præhensas. Græce sonat μυδιὰ διαπρατήσας. Est autē μυδιον. μυδιον, ferramentum quo aliquid prehendimus, quod Celsus Volsella nominat: Neq; quicquam, inquiens, commodius est quā volsella prehendere, sub ea; quod volumus excidere. Græcus quidam autor anonymus ait: ait τὰς δὲ λυχαλασμένας σφαυλάς ἀμύπως ἐν τῇ μνο, καὶ μυδιῷ λαβόμενοι, hoc est: Vuas autem immodice relaxatas volsella præhensas excindimus.

IN LXXVII. CAPVT.

σφαίρωμα.

**A**Gibba natium regione. Græce legitur ὁ δὲ πόνος αὐτοῖς ἀπὸ τῶν λαιῶν σφαίρωμα καὶ τὸν βυβῶνα τόπον. Ad verbum sonat: Dolor autem ipsis ex locis iuxta spheroma, & bubonem &c. Quæ iam pars sit σφαίρωμα, audi. Autor quidam græcus anonymus ita scriptum reliquit: λέγει δὲ ὁ ὅσους εἰς τὸ ἱερὸν ῥῆν, πᾶρ ἐν αὐτῇ καὶ τῶν τὰ ἰσχία ὄντι, ἐφ' οἷς οἱ γλῆστοι διὰ τὸ ὄσιν εἶναι ὑποκείμενα μέγιστον ἔχον ὑπερβῶν αὐτοῖς σώματι σαρκώδη, ὡς τὰ λυγρώματα ἐν τοῖς περιφρῇ εἶναι, σφαίρωματα προσεγγρεύεται. Hoc est ad verbum: Desinunt autem lumbi in os sacrū. Viraq; huius parte

coxæ



osse sunt super quas nates eo quod ossa subiecta sint maxima. Hinc  
carnea corpora ipsis substrata sunt, quorum gibba, inde quod rotunda  
sunt, *οφαισμοειδῆς*, quasi orbiculata appellantur.

In quibusdam & vomitus à radiculis. Ita ferè semper Celsus  
interpretatur, *ἐμετ* & *ἀπὸ ραφανίδων* intelligit autè raphanum. Vi-  
de septimum librum, ubi de vomendi modis precipit.

Lixiuio. Sic grecis *λοβία*, aut *λοβία τανύη* vertimus. Male Oro-  
scius hic *λοβίον* *πρωτοσάνθη* lixiuū vertit cinerem, qui primus de-  
stillauerit, cum *πρωτοσάνθη* sit lixiuium quod cinere & calce adie-  
cta sit, apud Paulum in septimo.

Oroscius.

## IN LXXVIII. CAPVT.

Non sola particularum. Vide Galenū libro decimo de cōposi-  
tione medicamentorū secundū locos. Oribasij nonum, & duode-  
cimum Aetiū.

Et cum absunt. Deest in græco codice particula *ἡ*, ut sit *ἡ*  
*χρῆσις*. Vult itaque Paulus, ut lauet & cū defluxiones adsunt, & cū  
non adsunt. Oroscius & Basiliensis corrector omiserunt.

Statim igitur cum quis morbū primum experiri cœperit,  
sanguinis missio erit tentanda. Nam quas iam fluxio frequen-  
ter infestari, ij plus. Pauli sentētia est, ut quāprimū quis fluxio-  
ne cœperit infestari, mittendū sanguinē curet. Vbi autē iam saepe eadē  
fuerit cōsuetudine, precipue in frigidioribus natura, & imbecillibus.  
Nescio quid Oroscio in mētē venerit, legenti *ὅς εἴη φθασαὶ ἡδὴ*  
*πολλὰν* *ῥαυματιδὴν* *αἵμα*, *βλάπτου* &c. Cū & ratio, & vera sen-  
tētia in hunc modū habeat. *ὅς εἴη φθασαὶ ἡδὴ πολλὰν* *ῥαυμα-*  
*τιδὴν* *αἵμα*, *βλάπτου* &c. Nō sum ignarus Aetiū ferè cū superiori  
sentētia cōuenire, ubi habet: Quare necessaria maxime est sanguinis  
ac reliquorum humorum in fluxionibus sanguineis, detractio, preci-  
pue in ijs qui sanguine redundant, ac reliquis humorum recrementis.  
In his enim antequam dolores oboriantur, venam secare oportet, bis  
in anno &c. At Paulus de ijs mentionem facit, qui iam ex sangui-  
neo temperamento, ad pituitosum inclinant temporis processu, natu-  
raq; frigidiore, ac imbecilli sunt, quæ duo sanguinis missionem re-  
cusant.

Oroscius.

Anxietatem, & cibi fastidium. *ἀσώδης ἡ ἀνορεξία*, hoc est,  
anxios & inappetentes. *ἀσὴν* quid sit, antea sum interpretatus. Alii  
qui nauseabundos hic exponunt.

Nec miraculum est si materies. Hoc est humor pituitosus per  
se frigidus, ubi accensus, inflammatusque fuerit temporis spacio, ut  
viridia ligna, aestuat, incandescitque, & si bilem habuerit  
admi-



admixtam, tanto facilius accenditur. Eoq; dicit, ut bilis admixtionem omittam.

Oroscius.

Bulbi per se: vel cum polentæ polline ad ruborem usq; suffricti. Oroscius legit ἔως συμμιξεως, hoc est, ad commixtionem usque, idq; ex suo antiquo exemplari cui plus credit, quam rationi & veritati. Non enim ad commixtionem usque sunt infricandi bulbi, sed ἔως ἀμύξεως, quod est ad ruborem usque in cute excitatum, unde tumor relictus discutatur.

IN LXXIX. CAPVT.

**O**Lei lentiscini. Deest in codice impresso τὸ ἀνταρπης, quod Oroscius præ nimia diligentia præterijt.

Minij. Sic verti μίλτης, Celsum imitatus qui μίλτον σίωπιον red dit minium Synopicum. Manardus reprehendit Barbarum, quod μίλτον exposuerit minium, & non potius rubricam.

Calcis viuidæ. Hoc est, calcis non extinctæ, Verba duo græca idem significat. ἄβυσσος, & ἰώον. Sed primum calcem viuam per se pos itum signat, cum dictione ἰώον calcem tantum.

Oroscius.

μοτοί.

Emmoton.

Emmoton. Hoc est, medicamentum, quod linamentis filatim cō- cerptis excipitur. Nam μοτοί linamenta græcis appellatur, quibus ore vulnorum obturari solent. IN LXXX. CAPVT.

**C**laui. Celsus inquit: Clauus autem nonnunquam quidem etiā calibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur: præcipue tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, doloremq; etiam si non alias tamen ingredienti mouet.

Syringiacus puluis. Hoc est, puluis qui fistularum callis exte- rendis conuenit: Dixit græce Paulus σπριγγιακὸν ξυγὸν quasi syrin- giacum aridum.

IN LXXXI. CAPVT.

**I**N græco codice habetur συμμάτωρ, quasi dicas spissamētōrū. Oro- scius Σύμμεως legēdū ex veteri exemplari putat. Mihi autē vide- tur Σέμμεως, quod est, lupinorū, ut superius etiā habetur. Nā de co- ctione met allorum, præsertim stymmeos in hac re nihil apud bonos au- tores habetur.

Ne manus inquinent. Hoc est, tam spissa duraq; fiant, ut di- gitos iniectos non inquinent, ea enim est emplastrorum crassities. Græci eam ἀμύλωτον appellant, ut superius annotaui. Hic disjunc- to verbo dixit Paulus, καὶ μολυμώδω. Atque hæc contra opinio- nem Oroscij, qui in hoc ipso verbo reprehendendum me censuit.

FINIS COMMENTARII

libri tertij.

COM





## C O M M E N -

## T A R I O R V M I N

P A V L V M A E G I N E -

T A M L I B E R Q V A R -

T V S.

\*

## I N I. C A P V T.



LEPHANTIA. Morbus hic Græca tantū habet Elephantia.

nomina, vocaturq; ἐλεφας, ἐλεφαντίαις, ἐλεφαντίαις.

A quibusdam λεοντίαις, aut σατυρίαις. primā ab elephanto, aliam à leone, &amp; satyris nomenclaturam accepit. Est autem is nimirū, qui vulgo dicitur

lepra. Græcorum enim lepra cutis tantum asperitudo est. Iam barbari elephantiasim vocant pedum tumorem quendam, qui febribus superuenire solet, ne te fallat interim nominum diuersitas.

Extrema decidunt. Hoc est digiti pedum manuumq; auricularum summa, pili, nasus, sed hæc posterius. Istam speciem efficit atra bilis ex flaua supra modum naturæ adusta, quæ ideo perniciofa esse videtur Galeno, quod vehementer erodat, &amp; terram fermentet.

Neque tamen eminentiæ tuberosæ. Sic reddidi μήτε μήν ὄχθης. Sunt enim ὄχθοι tumores verrucosi, tuberosiq; in elephanticiis ὄχθοι. apparentes. Vnde ὄχθῶδῃ ἔλκευ vlcera dicuntur prætumidis labris.

Sola capitis adustione. Vide lib. 6. vbi habes expositū, quomodo ferramento quinque excitant crustas in elephanticiis. Est autē cap. 2.

Nunc saltu, nunc magis alteribus. Miror hic Oroscium nihil Oroscius.

vel ex antiquo suo exemplari, vel ingenioso cerebro attulisse: cum &amp; codex Græcus impressus sit viciosus, &amp; multi hoc in loco impegerint.

Primum enim habetur in Græco, τὰ μὲν ἀφ' αὐτῶν, &amp; τὰ δὲ πλείον ἀλλοτρίων cum legendum sit τὰ μὲν ἀφ' αὐτῶν, &amp; τὰ δὲ πλείον

πλείον



Walteres.

πλείον αλτήροι. quod etiam antea in meis annotationibus monue-  
ram. Quia igitur Paulus valide exerceri vult elephanticos, preci-  
pit illis saltum, alteres & follis usum. Sunt autem alteres masse  
quedam graues, vel ex lapidibus, vel metallis, quales hodie in li-  
brandis rebus adhibentur. Galenus libr. 2. de sanitate tuenda in-  
quit πολὺν δὲ δὴ μάλλον ἐπιβάλλει τοῖς χερσὶν ἀνταρὰς περιλαβὼν  
ἐνατέρᾳ λαταμένους διαπρὸς οἱ λαῖσά παλαίστρων εἶναι αλτήρες, ἀ-  
φίμας ἔχει προτείνοντας, ἢ ἀνατείνοντας αὐτάς, hoc est: Multo autē magis  
fiet si quodā pōdere summis manibus prehēso utraq; seorsum (qualia  
sunt quæ in palaestra alteres dicuntur) protēsis aut sursum elatis ipsis  
in eodē consistat habitu. Itē eodē in libro exercitiij modū præscribit in  
hūc modum ἐνιοι μὲν λαταβύβας αλτήρας ἐν τῷ πρὸ ὀφθαλμοῦ διεσῶτας  
ἀλλήλων ὠρύουσιν, ἑτέροι δὲ ἐν μέσῳ ἱστάντες αὐτῶν ἀντιπρὸς τῷ πρὸ ὀφθαλμοῦ  
τῇ μὲν δεξιᾷ χερὶ, τὸν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, τῇ δὲ ἀριστερᾷ τὸν ἐν τοῖς δεξιῷ,  
ἡ δὲ αὐτὴ ἐνατόροισι τῶν δυνάμεων λαταβύβας τῇ χερσὶ. Ex his satis  
liquet, quid alteres apud Martialem, & alios veteres scriptores fue-  
rint. At litera vna addita αλτήρες, dicti, non sunt massæ quædā,  
sed adminicula, quibus in saltu innitimur: quales sunt cuspides, ha-  
stæ, arūdines. Galenus horū quoq; mentionē facit libro iam citato, in  
hāc sententiā: ἡ δὲ μὲν δὴ καὶ διὰ τῶν χερῶν ἐν τῷ ὀφθαλμοῦ γυμνάσιον  
ἐπιόροπον γυμνάσασθαι χωρὶς τοῦ λατέχου αλτήρας &c. Hac exer-  
citia supernis partibus valēt, lūbis & obliquis spinæ regionibus. Ba-  
siliensis castigatō reliquit locum deprauatum.

Alteres.

Insuper melissæ herbæ. Quæ herba ita vocetur nōdū apud ido-  
neos authores cōperi nec castigatores locū corrigūt. Aetius eā vo-  
cat Mileciam herbam Sermone tertio decimo.

Conferunt etiā si bibantur. Quia meatus viscerum vi quadā  
peculiari adaperiunt, & aluum etiam mouent comprimendo ea quæ  
intestinis inherent.

ἀφιδρωτική-  
εἶα.

Eandem habet efficaciam. Interpretatus sum ἀφιδρωτική, quæ  
desudationes mouet. Sudor autē Celso authore duobus modis elicitur  
aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est & harena calide, & La-  
conici, & Clibani, & quarūdā naturalium sudationes, ubi ē terra pro-  
fusius calidus vapor, edificio includitur, sicut super Baias in Mur-  
retis habemus. IN II. CAPVT.

V Terq; affectus. Nō de lepra vulgari hic agit, sed de extra-  
neo cutis affectu, ut antea monui. Vide Orobasij librū septimū.

ἀπότμησις.

In qua corpus cōsumitur. Græce est μετὰ ἀποτμήσεως σώματι &  
Est autē ἀπότμησις qua semper aliquid à corpore abscedit, eliquatur-  
que. Sic in externis, lib. 2. de internis usurpatur. Nā psora & lepra  
melan



melancholici cutis tantum affectus sunt. Nam si in venis & carne proueniant, cancri vocabulum sortiuntur.

Stercoris argenti. Vno verbo graece dictū ἑλκυσμα & quanquā ἑλκυσμα. etiam σκωρία ἀργυρίου & ἑλκυσμα apud Dioscoridem appelletur.

Lotariorum rubrorum. Graece est λωτάρια ῥυθρα, forte legendū λωτάριον ῥυθρῶν. Hermolaus barbarus Lotariū rubēs quasi diuini loti interpretatur, nisi quis nō de siluestri potius dictū accipiat. alij de Aegyptica intelligūt. Citatur apud Paulū lib. 7. Pa-stillus dia Lotarion ad pudēdorum, sedusq; vicia. Præteryt Orosius. Orosius.

## IN III. CAPVT.

**P**eriq; hoc solo impetigines. Has Galenus lib. 5. de cōpositio-ne medicamentorū secūdū locos nominat μετάργας, voce nimirū ex latina & graeca dictione cōposita, quod cōtra rationē grāmatische fieri videtur. Plinius etiā libro sextodecimo huius meminit, aitq; sub Claudij Tiberij Caesaris principatu potissimū hāc mēti impetigivem inualuisse quidam hanc morbum quem hodie Gallicum, aut Hīspanicum vocant, esse opinantur.

## IN V. CAPVT.

**L**euce, cutis. Leuce vitiliginis species est albida, & altius descē-  
des: in eaq; albi pili sunt, & lanugini, similes. Duæ vero aliæ  
restāt, alphas & melas appellatæ Celso, Paulo autē alphas albus &  
niger. In prima color albus est, ferē subasper, & nō cōtinuus: ut quæ-  
dā quasi guttæ dispersæ esse videātur. Interdū etiā latius, & cū qui-  
busdā intermissionibus serpit. Altera colore ab hac differt, quia ni-  
ger est, & umbrae similis. Leuce quem occupauit, non facile dimittit.

Acu per summa leucen pungito. Celsus libro quinto eadē ferē  
habet: Vtrū autē, inquit, horū aliquod sanabile sit, an nō sit, experi-  
mento facili colligitur. Incidi enim cutis debet aut acu pungi, si san-  
guis exit, quod ferē sit in duobus prioribus, remedio locus est: si hu-  
mor albidus, sanari non potest.

## IN VII. CAPVT.

**S**tigmata curabis. Stigmata in vetere medicina dicta sunt, nō  
Spuncta, sed maculis punctorū quantitate & forma decolorata ho-  
minis cutis. Porro latinus etiam in vsu est ea dictio. Plinius enim &  
Largus aliquoties vsurpant.

Quod matulae adhærescit. Hoc est, quod in vrina subsidet, hoc  
nāque matulae solet adhærescere Dioscorides oculorum cicatrices ex-  
purgare commemorat.

## IN VIII. CAPVT.

**E**xanthemata. Puslule sunt exiguae Celso, quales ex vrtica, ta,  
vel sudore fiunt. Interim pituitæ eruptiones, ita Plinio appellan-  
tur



tur, de quibus hic agitur. Græci etiam *βλαύσεις*, quasi dicas efflorescentias nominant, à verbo *βλαύειν*.

**Cuticula.** In superiore pellicula. Græce est *ἐπιδερμίδα*, quam Latine possis interpretari cuticulam. Nam summa pars, & veluti ipsa cutis efflorescentia existit.

## IN IX. CAPVT.

**S**plenio illitas. Hoc est, panniculo lienis modo oblongo. Plinius, superimponi oportet splenium è melle decocto.

Salforum esus. Male in codice Græco est *ποροράν*, tu fac *ποροράν*, eiusmodi minutias neglexerunt aristarchi interpretum.

## IN X. CAPVT.

**V**T humoris colluies habeat emissarium. Græce est *λατὰ ἐκὸν*, quasi dicas, ex confluxu. Quidam Græcus auctor habet *λατὰ ἐκόν* in eodem significatu.

Calidis eruptionibus. Sic verit *ἐκβάσματα* feruentibus papulis, *περὶ μέρη*. Gliscentibus seu manantibus capitis vlceribus, *ἀκρόασι*. Atq; hæc autoritate veterum.

## IN XI. CAPVT.

**A**mbusta. Latini *πυρναυτὰ* ambusta, vel combusta, vel exusta, citra ignis vocabulum additum exponunt. Proprie vero *πυρναυτὰ* signat vsta igne, eoq; Paulus primum *πυρναυτὰ* dixit. Combustionem vero ex aqua calente, *λατὰ καυμάτα ἀφ' ὕδατος*. Quamquam & aliæ materie sæpe adurant.

**Codex castigatur.** Oui albumen. Male in codice nostro legitur *ὠδον ὄλον*, pro *ὠδον λαύον*. Ita etiam Auicenna habet, & Dioscorides. Annotauit id Orosius.

Ordei farina. Simpliciter in Græco codice est *λευθαῖς*, quod est ordeis. At significantius ex Auicenna & Serapione ordeis farina posuitum est.

Illitumq; lintheolo. Male Græce habetur *ἐμπάσων* pro *ἐμπλάσων*. Id quod neglexit Orosius, & Basiliensis castigat.

## IN XII. CAPVT.

**O**vum integrum. Græca sonant *ὠδον ὀλον*, hoc est: Ovum integrum sine eruis. Quid sibi velit, eruis, non video, cum nulla sit ante mentio eruorum facta. Puto igitur legendum, *χωρὶς τῶν ἐρίγων*, hoc est, sine putaminibus. Quamuis etiam eruorum casus conveniat. Hunc locum praterijt Orosius.

## IN XVII. CAPVT.

**M**Ali punici corticibus vino incoctis, rhu & polenta. Galenus eadem ferè libro secundo ad Glauconem habet. Vnde lectionem



Etionem Pauli corrigendam puto, vt legatur ῥῆτε καὶ ἀλφίτων, pro Castigatur  
 ἕκαστε καὶ ἀλφίτων. Nam cera hic nihil proficit, sed sumac, vt bar- codex.  
 barorum more loquar, astringendi vi præditum. Oroscius hunc locum  
 sua sponte præterijt, & Basiliensis castigator omisit. Oroscius.

## IN XVIII. CAPVT.

**C**Ataplasmate ex ficis siccatis. Vide librum Galeni iam cita-  
 tum. Voco autem ficus siccataς ἰσχάδας: quas etiam Caricas no ἰσχάδας.  
 minare licet. Galenus autem habet: Non autem oportet ipsas caricas  
 assumere, sed aquam, in qua illa decocta intabuerint.

Si voles magis intendere. Hoc est, si vehementius voles siccare.  
 Nam Galenus pro ἑπτάειν habet σφοδρότοπον ξηρᾶναι.

Galenus autem memoriæ. Libro quattodecimo methodi me-  
 dendi meminit, vnde etiam Paulus hæc quasi mutuatus est. Eadem  
 ferè tradit etiam libr. 2. ad Glauconem, & commentario de Tumori-  
 bus præter naturam, vbi ad verbum ista habentur.

Qui humorum ex loco in locum decubitu. Græca lectio nõ-  
 nihil est viciata, habet enim τοῖς ἀπὸ σπλήνός τε καὶ χρονίσας  
 σπλῆνός τε καὶ χρονίσας, pro τοῖς ὅς ἀποσπλήνός τε καὶ χρονίσας  
 ἀποσπλήνός τε καὶ χρονίσας. Nam vna dictio est ἀπόσπληνός τε καὶ χρονίσας.  
 Quam Galenus in hunc modum exponit: ὁνομάζονται δ' οὕτω τὰς διαβίσεις ἐν αἵματι, ὅταν  
 χυμοὶ τινες ἐνοχλῶντες ἐτέρῳ μορίῳ, μεταλλάσσοντες ἐν αἵματι, ἔτρου  
 μετασώσιν. Atq; hic alter modus est generationis abscessuum. Sit  
 itaq; ὅς ἀποσπλήνός τε καὶ χρονίσας, quod ῥῆτε ἀποσπλήνός τε καὶ χρονίσας, vt ait Gale-  
 nus. Differunt igitur inter se ἀπύημα, & ἀπόσπληνός τε καὶ χρονίσας, vt apud  
 idoneos autores licet condiscere. Non aduerterunt nostri aristarchi.

Locus casti-  
gatur.ἀπόσπλη-  
νός τε καὶ  
χρονίσας.

Oroscius.

Porro abscessuum generationem. Græcus codex vitiatu non-  
 nihil est, vbi habet ὅς τῶν ἀποσπλήνός τε καὶ χρονίσας, pro, ὅς ἀπὸ  
 σπλήνός τε καὶ χρονίσας, dictio δὲ omissa sententiam poterat confundere.  
 Oroscius & castigator Basiliensis quantumuis oculati non anno-  
 tarunt.

Codex depr-  
uatus.

Oroscius.

## IN XIX. CAPVT.

**C**Um inflammatio neque. Inuenies penè eadem in secundo ad  
 Glauconem libro. Venti autem νεφῆται membrum emoritur.  
 quod alij barbarè exponunt, mortificatur. νεφῆται.

## IN XX. CAPVT.

**C**Um bilis flaua nulli mixta humori. Hoc est, cum sincera bilis,  
 nullum aliud humorè vel pituitam, vel bilem atrā, vel sanguinè  
 coniunctum habens. Oribasius libro quarto decimo similia habet.

Porri succi cyathi dimidium. Viciatus est codex græcus impres-  
 sus. Nam pro ῥυ. ῥ. legendum est ῥυ. ἡμίση. quod valet Cyathi di-  
 tus.

Codex vicia-  
tus.

Ee



midium: Paulo post, myrtei vncia sex, in græco erat Γο. Ι. S. pro. S. hoc est sedecim, pro sex positum. Statim in eadem linea, Vino diluta, græcus codex habet διῶν ἡμισί, pro διῶν ἡμισ. Non multo post, recrementi plumbi vncia vna. S. græce erat οὐκράσις μονίβδς ἰσοβάφου < .S. Oroscius. pro οὐκράσις μονίβδς Γο. Ι. S. quæ loca nec Oroscius, nec Basiliensis Basiliens. corrector aduertit.

Circa tedam. Hoc est circa lignum ad tedam aptatum, cui lana cum alia quadam pinguedine circumuoluitur, ad flammam alendam. cuiusmodi hodie etiam lucernarum loco vtuntur.

Thuris, aluminis scissi. Hic quoque diligentiam Basiliensis Correctoris desidero, qui lectionem græcam & confusam & mutilam reliquerit. Nam habet λιβάων οχισῆς < .α. quod ad verbum sonat, thuris scissilis drachma nullo sensu. cum legendum sit λιβάων οχισῆς, ἀνὰ. < .α. quod signat thuris, aluminis scissilis, singulorum drachma. distinctione post thuris addita, deinde post οχισῆς ἀνὰ.

## IN XXI. ET XXII. CAPVT.

**E**Risypelas. Multi inter latinos scriptores interpretantur erisypelas sacrum ignem. Celsus autem hunc ab illo separat, eoq; malui græca vti dictione quàm expositione esse obscurus. Vide Galenum secundo ad Glauconem: Aetium libro quartodecimo, & Oribasij septimum.

Abcessorij tumores. Hoc est qui abcessum representant. sic verti ἀποστήματα ὀνόματι quasi dicas apostematici tumores.

Phyma & Phygetlon. Tubercula sunt tumida. Celsus græcis nominibus quoq; appellat Bubo à loco nempe inguine, cui solet magna ex parte accidere appellationem accepit: quanquam etiam alas, & ceruicem interim infestet.

## IN XXIII. CAPVT.

**O**Ribasius. Libro septimo huius tuberculi mentionem. Pauli autem lectio nonnihil est viciata habet enim. ἀδινάδα δὲ ἀντὶς ἀνὰ νάτω pro ἀνὰ τὰτω. Paulo post, τὸ ἔωδὲ λάτω pro ἔωδὲ λάτω ut sit vna dictio. Id quod Aristarchi nostri omiserunt.

## IN XXV. CAPVT.

Codex impressus.

**C**ARBUNCULUS. Sic verti græcam dictionem ἀνθράκων id est ad verbum, Carbones. Celsus autē, quem libenter in dictionibus latinis imitor, Carbunculum nominat.

Quod vlcus est crustaceum. Habetur in græco ἀνθράκων ἕλκος, quod est, siquidem sunt crustacea vlcera. Ego autem legendum puto pro ἀνθράκων, ut referatur ad ἀνθράκων. Sua sponte praterierunt hoc, Oroscius, & Gemusæus.

Depascaturq;. Sic exposui, μετὰ νομῆς quod est cum depastione



ne. Sensus est, ita carni subiectæ affixa est, ut eam quoque depascatur. Volui itaque versionis meæ rationem reddere, ne quis seuerior censor nos à verbis ipsis discesse clamet.

Circumscribuntur. Ad verbum exposui *περιγράφουσαι*. Si *περιγράφουσαι* autem hoc loco circumscribi, tolli, aboleri. Nam qui carbunculi *δαί.* carnē obsidentur, facile tolluntur, qui partes solidas, pertinacius harēt.

Vel & ipsum similiter dilutū. In Græco codice pro *εἰ tu fac ἢ*, quod etsi exiguum sensum tamen poterat confundere. Neglexerunt Censores interpretum.

## IN XXVI. CAPVT.

**C**ancer in qualibet. Hoc caput quasi ad verbum habet Aetius libro quartodecimo. Oribasius septimo. Galenus secundo ad Glauconem. Habet autem lectionem deprauatam in exemplari græco, *διὸν ὅτι τὸ ἐπιθυμιὸν πλῆθος* *Γ. Δ.* S. quæ sonant ad verbum, quale est epithymū pondere vnciarum quatuor. At nemo non medicina peritus intelligit nunquam epithymū dari tanto pondere. Legendum itaque venit in hūc modum, *διὸν ὅτι τὸ ἐπιθυμιὸν πλῆθος* *Γ. Δ.* S. id est quale est epithymum pondere drachmarum quatuor *Γ. Δ.* Nam Dioscorides, alique eiusmodi ferè pondus admittunt. Miror Orosium tam grauem interpretum Censore & Gemusæum, alioqui in medicinis exhibendis peritum hæc non aduertisse.

Orosius.

Codex emendatur.

Gemusæus.

## IN XXVII. CAPVT.

**O**edema laxus quidam. Omnia ex Galeno ad Glauconem, septimo Oribasij, quartodecimo Aetij transcripta sunt. dixi autem indolens tumor, hoc est doloris expers tumor. Vide etiam Galenum libro quartodecimo Methodi.

Affectus qui hominem premit. Lectio Galeni libro iam citato corrupta est: habet enim *τὸ λιπαρὸν* *πλῆθος*, quod Linacer *Galen. codex* exponit multitudinis quæ hominem premit, cum legendum sit *τὸ λιπαρὸν* *πλῆθος* *πᾶσι*. hoc est affectus, qui hominem premit. *emendatur.*

Tenerrimum ellychnion. Ellychnion est quod ex papyro, sparta, canabe, aut stupa toriū in lucernis vritur, dixi tenerrimum, hoc *Ellychnion.* est molliissimum græci. *ἀπαλότερον.*

## IN XXX. CAPVT.

**P**er subsultum. Græce subsultus dicitur, *διαπύδναις*. Galenus libro quinto Methodi quomodo fiat, exponit in hunc modū, *Διαπύδναις* pedes ex iunice quidē ipsa rarefacta, sanguine vero tenuato: interrim etiam ex graciliū vasa forū adaperiū nascitur &c. quādo autem hoc fit, sanguis veluti subsiliendo ex vasis prodit.

## IN XXXI. CAPVT.

**R**uptio. Vnitatis solutio pro particularum natura, nomen clatū rā sortitur. In osse græci *λάτρυμα* quasi fractura dicitur, in *ρήγμα*.



carnosis musculorum partibus ex distentione perueniens, ῥήγμα hoc est ruptura, de qua hic fit mentio. Cū autem filamenta similiter tensa rumpuntur, vulsum. In carne vulnus.

## IN XXXII. CAPVT.

**E**xactus quidem scirrhus. Vide secundum ad Glauconem, & quartumdecimum Methodi: Vnde hæc omnia fere sunt translata, quanquam Oribasius antea & Aetius ea quoque transcripserint.

Orosius.  
Nota lectio  
nem.

A balneo autem in totum. Orosius simpliciter vertit à Lauacris verò continuis abstineant, quod mihi non placet. Nam videtur Paulus præcipere vt in totum à lauacris abstineant scirrhus laborantes, aut si id non fiat, saltem à frequentibus. alioqui dictio συχρὸς ex superfluo fuisset adiecta. Ego itaque lego ἢ γὰρ duabus dictionibus, non ἢ γὰρ vt habetur in exemplaribus. Aetius abstinendum præcipit à balneis medicamentosis quæ atramentum sutorium, alumen, aut sulphur respiciant.

## IN XXXIII. CAPVT.

Codex emen  
datur.

**N**asturcij. Male in codice græco λαρδαμῶν pro λαρδαμῶν habetur, item σκιδάρας pro σκιδάρας. In fine ἀμμοβιανὸς δυμιάμας & < .β. Vbi Gemusæus ex codice Ruellij < .β. legit, à quo hic non dissentio.

## IN XXXVII. CAPVT.

Orosius.  
ἀχυν.

**Q**uercus folia applicata vlceribus. Vide Oribasij librum septimum, ex quo Orosius græcam lectionem castigandam putat, legendumque; ἀχυν ἀλεύς pro ἀχυν vt sit pollen farina, nō aranei telum, quanquam hoc etiam recentibus vulneribus conglutinandis conducatur. Sed malo cum Oribasio legi ἀχυν.

Corrigitur  
lectio.

Anagallis. Rursus ex Oribasio ponendum anagallis, pro ἀνὰ πάλιν ποιεῖ. Expunge periodum. Exemplaria Ruellij, & Lascaris veterem lectionem retinent.

## IN XLV. CAPVT.

**M**yrtha. Galenus tertio methodi fusius hæc exponit. Aetius pro myrrhā videtur, legere, myrtus, non omnino male. nā vlceribus conglutinandis, si Dioscoridi credimus, efficax est, præterea astringit, & siccatur rosionem quod proposito conducit. facilis erat lapsus σμύρνα ex σμυρρίνη, aut μυρτὰ.

Nota

Ostreorum. Aetius habet, ostreorum crematorum, item in fin habetur singulorum vncia octo nimirum pro drachmā octo. Nam antiquum lascari exemplar non γο quod est vncia, sed < habet. Orosius & Gemusæus noluerunt hoc annotare. Rursus in sequenti emplastro, cadmiæ drachmæ sex. In græco male habetur γο. pro < .mox sequi



sequitur, eris combusti singulorū drachma, vbi Codex græcus ro. hoc Depraui-  
est vnciam habet. ta lectio.

## IN XLVIII. CAPVT.

**S**i inferius spectet. Galenus secundo ad Glauconem hæc fere  
ad verbum habet: vnde etiam textus codicis Pauli impres-  
si corrigendus est, legendūque, *λατάρρῳπς δὲ οὐτ' αὐτῷ* & *αὐτῷ*  
vbi habet *αὐτάρρῳπς δὲ οὐτ' αὐτῷ*, contrario nimirum sen-  
su. Galenus autem dicit *λατάρρῳπς δὲ οὐτ' αὐτῷ*. Idem namque  
est *λατάρρῳπς*, & *λατάρρῳπς*. Omisit Oroscius & Basiliensis cor-  
rector.

Corrigi-  
tur græcus te-  
xtus.

Etenim in cubito. Sic interpretatus sum ἐν ὠχέῃ, quæ vox  
græcis significat eam brachij partem, quæ ad manum tendit interius  
vlnam quidam recentiores nominant ἀγνώρ flexura ipsa recte dici-  
tur. Veteres sanguinē ex cubito detrahi præcipientes hæc intellexerūt.

ὠχέῃς

ἀγνώρ

De finibus diruptus. In græco codice est *ὡς πὶ ῥανωδῶς λῶν-  
πῶν*. Signat autem ῥανωδῶς idem quod ῥωγῶν & *ῥωγῶν*, *ῥωγῶν*  
hoc est fractus & ruptus. Venit autem à ῥαν &, quæ vox significat  
pannum & vestem laceratam. Sicut ῥανῶν apud Aristophanem  
vestem vilem, detritam, & pertusam. Hic itaq; ῥανωδῶς abscissui  
accommodatur. in quo cutis pus cōgestum integens, erosa extenuari  
deteriq; instar pellium detritarum contingit.

ῥανωδῶς

ῥαν &

Vt neque admodum sit durum. Mirum est quàm Oroscius  
hic memor sui non sit. Antea me reprehenderat, quod dictionem græ-  
cam ἀμόλωτον verterim, manus non inquinans. Hoc autem loco nō  
videt à Paulo emplastrum liquidum intelligi, cum dicit *μῆτε σκλη-  
ρα, μῆτε ἀμόλωτον*. Galenus ad Glauconem eadem habet.

Oroscius

## IN LIII. CAPVT.

**A**T scopus crustam generantium. Hoc est, eo consilium in  
crustam generantibus dirigitur, vt calefaciant simul & astrin-  
gant. Calx autem calefacit tantum eoq; non ita commode adhibetur.  
Hæc sunt ex Rufo, petita.

## IN LIIII. CAPVT.

**N**eruis vulneratis. Paulus hæc fere ex Galeni tertio secundū  
genera mutuatus est, mutato tantū docēdi ordine. Aetius libro  
quaridécimo, Oribasius septimo habet eadē. Caterū vocat in neruis  
vulneratos, *ὡς ῥῶπῳπς* in tendonibus, *τονοῖσῳπῳπς*. Curatio *ὡς ῥῶπῳπς*  
autem communis est.

Specillo subunctorio. Sic reddidi *ὑπὸ ἀλάφῳ*. nimirū à ver-  
bo *ὑπὸ ἀλάφῳ* quod subungo significat, deriuato.

Maior conuulsionis metus. Male in codice græco habetur,

E e 3



ὁ μὴ λίνδυναι το σπασαδῆναι pro ὁ μὴ λίνδυναι το σπασαδῆναι.  
 Oroscius & Gemuseus non aduerterunt.

## IN LV. CAPVT.

ἀγνύλαι.

**A**Ncylas. Celsus & Scribonius eius discipulus, Contractionem, ligationemque articulorum interpretantur graecorum dictiones ἀγνύλας, & ἀγνυλώσεις.

## IN LVI. CAPVT.

νεῦρα σω-  
δετινά.

**N**Am colligātes nerui. Hoc loco intelligit per σωδετινά νεῦρα, ipsa ligamenta. quae ossa colligant: vocat autem nervos quod eos imitentur. Nam alibi tres species enumerant, alios qui sensum motumq; praebeant, alios qui motui tantum seruiunt, ut tendines, alios qui ossaeam compagem ligant, vinciuntque.

## IN LVII. CAPVT.

Corrigitur  
codex im-  
pressus.

**T**Res sunt vniuersae. Aetius libro pono eundem fere docendi ordinem seruat. Celsus duorum generum meminit, Latorum quos etiam peiores dicit, & teretum, Graeci addunt etiam ascarides. Habetur in Graeco codice ἀσκαρίων pro ἀσκαρίων, hoc est extremorum perfractione potius quam articulorum. antea notaueram.

Σπυγίαι.

Cochleari. Sic exposui Σπυγίαι. quod Grammatici Graeci dicunt instrumentum esse, quo spuma ab ollis tollitur. Quia igitur nullum commodius vasculū ad hanc rem inueni, cochleari interpretatus sum.

## IN LVIII. CAPVT.

Recentiorū  
opinio.

**C**arnem falsam. Recentiores medici carnem suillam pinguem, falsamq; volunt subici. Aetius pinguedine adēpta subdi praecipit. Tu vide quos imitari malis, utrobique bona est ratio.

## FINIS LIBRI QVARTI

## COMMENTA-

## RIORVM.

\*

COM





# COMMEN- TARIORVM IN

PAVLVM AEGINE-

TAM LIBER QVIN-

T V S.

\*

IN I. CAPVT.



E virulenris bestiis. Hoc libro in multis Diosco-  
ridem Paulus imitatur. quanquam Galenus etiam  
librum de Antidotis conscripserit post eum Oriba-  
sius, Aetiusq;

IN II. CAPVT.

Homo adhibendus est qui vulnus exugat. Celsus libro quin-  
to idem precipit. Si cucurbitula iniquiens non est, quod tamen  
vix incidere potest, tum quodlibet simile vas, quod idem possit: Si ne  
id quidem est, homo adhibendus est, qui vulnus exugat. Graece erat  
ἐνυψιόν, ἡ ἐκχρῆσις, hoc est exustione uti.

ἐνυψιόν

Galenus memoriae prodit. De vipera multis in locis meminit,  
tum in commentario simplicium medicamentorum, tum ubi antido-  
ta, confectionemque Theriacae comprehendit.

Aut paliurum. Codex graecus deprauatus particulam ἢ deside-  
rat. Legi q; debet, ἢ πάλιν, quod etiam Oribasius libro octauo ha-  
bet, praterit Castigator Basiliensis.

Codex casti-  
gatur.

Castigator.

Basil.

Defudationes. Graece erat ὑδρωπύριον hoc est, quae sudores mouet,  
ut laconicum, alijq; id genus modi, ut scilicet venenum ab internis  
foras inuocent.

ὑδρωπύριον.

IN III. CAPVT.

Hydrophobiam. Celsus hoc morbi genus miserrimum, aquae  
timorem appellat. Largus aqua hoc est, liquoris metum inter-  
pretatur ὑδροφοβία.

Aquae ti-  
mor.

ὑδροφοβία.

Ee 4



*ἀπορία.* Sudore & anxietate. *Ἀπορία* anxietatem. Est autem proprie ἀπορία consilij, aut propositi inopia, incertitudo, ex qua quis nescit, quid potissimum acturus sit. Ruellius vertit ἀπορίαν languorem.

*περιστομή.* Carnis præcisio. Græce erat τὸ μὴν περιστομήν, quasi dicas circa carnem sectio, vel circumscriptio. nam interim carnem amputare scalpello conuenit.

## IN IIII. CAPVT.

*Celsus.* **L**ata manu morsum ferito. Hac locutione Celsus etiam utitur. Si manus, inquit, vulneri imponitur, superq; id duobus digitis verberatur.

*περυωμένα δὲ γμάτα.* Ad feruidos autem iam morsus. Græca sonant πρὸς δὲ ἡδὲ περυωμένα τ' ἀγμάτων, hoc est ad morsus quos inflammatio iam feruida inuasit.

## IN V. CAPVT.

*Lac ficulneū* **E**T lac ficulneum. Hoc est, liquor ficulneus sic lac papaueris, lac laseris aliorumq; consimilium pro liquore aut lachryma.

## IN VI. CAPVT.

*Dioscorides & Paulus variant hic.* **S**ed leniter rubidus. Græce habetur ἀλλὰ μετρίως μὴν ὑπερ-  
ῥοῦ, quod est, sed mediocriter quidem subrubens. Dioscorides impressus habet pro ὑπερῥοῦ, ὑπερῥοῦ, hoc est humidus. atq; ita vertit Ruellius. Marcellus autem ὑπερῥοῦ. quanquā supra Paulus dixerat. ὑπερῥοῦ. vide vtra placeat lectio.

Et viridium cupressi foliorum. Mutilis est codex græcus. Nā desideratur dictio φύλλων legēdumque venit χλωρῶν ὑπερῥοῦ φύλλων ἢ σφυρίων. Id Orosius non aduertit nec Gemuseus.

## IN VIII. CAPVT.

*Particula.* **P**articula intēditur. Hic intelligo particulā penem ipsum. Sic etiam apud græcos τὸ μορίου accipitur. Dioscorides ἐρδορίχων huius loco habet, quod est pilorum erectionem.

## IN IX. CAPVT.

*Confer aucthores.* **A**t tolliturq;. Pauli Codex Græcus habet ἐπαίρει, hoc est attollitur, Dioscorides vnde hæc transcripsit, περισσύνεται hoc est computrescit, legit. Item Paulus ἀναιδῆ ponit pro ἀναιδατον, hoc est ἀναιδατον.

## IN XII. CAPVT.

*νομή.* **A**lbū vlcus apparet. hoc est vlcus depascens, quod νομή græcis appellatur,

*voris.* Frigidi madoris. hoc est corpus frigido sudore perfunditur, mador initium sudoris est. voris græce dicitur.

IN



## IN XIII. CAPVT.

**D**E amphisbena Hoc animal biceps est, autore Galeno, & utraque parte ingreditur, vnde nomen illi est inditum.

## IN XV. CAPVT.

**D**Ryinus. vide Galenum de Theriaca dictus est à δρῦς, quod Dryinus. in quercuum radicibus viuat.

Torſiones. Græca dictio est τρῶφοι qui proprie tormina sunt cir- τρῶφοί.  
ca umbilicum, omnēque id ſpaciū quod in anteriore parte ab ore  
ſtomachi ad umbilicū partes deſcendit hominem torquens.

## IN XVI. CAPVT.

**Q**ui hæmorrhoi ictum. Hæmorrhū & hæmorrhōis ſuis Hæmorrhū.  
iſporum nominibus ſimilem hominibus perniciem adferunt.  
quippe percuſſi ab eis, ſanguine per os, nares, totōq; corpore effuſo  
intererunt.

Redduntur corpora. Græcus codex habet ἀπαώματα. hoc eſt ra-  
ritatis. Dioſcorides quem Paulus ſequitur, σώματα eōq; ſic verten-  
dum duxi. quod Oroſcius & caſtigatōr Baſilienſis præterierint.

Et ſi cicatrix toto corpore. Sic quoq; legit Aetius. quanquā  
Marcellus Virgilius aliter legendum in Dioſcoride ſentiat.

Quem euomentes. Pauli codex impreſſus βλαμματα pro  
βλαμματα habet. Dioſcoridem ſecutus ſum vnde Paulus hæc tran-  
ſcripſit: licet ſententia non multum variet. Oroſcius non dignatus eſt  
annotare. Oroſcius.

Aduerſus feram præſidia. Græca ſonant πρὸς τὸ δῆριον. Oro-  
ſcius dum nimis exacte loqui ſtudet, in alijs corrigendis, maxime  
fallitur. Paulo ſuperius damnauit quendam quod δῆριον beſtiam  
vertiſſet, ſemper eam dictionem pro vipera accipi affirmans. Cuius  
hic contrarium vides. δῆριον.  
Oroſcius.

## IN XVII. CAPVT.

**N**atricis morſu vulnus factum. Natrix primum in terra vi Natrix,  
uit, & Cherſydios appellatur. deinde in aqua, vnde hydros di- Hydros.  
citur. Similis eſt puſillæ aſpide, præterquam quod ceruicem latam non  
habeat vt aſpides.

## IN XVIII. CAPVT.

**N**aſturiū. Dioſcorides legit καρδάμωμον hoc eſt cardamomū Dioſcorides  
non καρδάμωμον quod eſt naſturiū, ſequere vtram malis le- & Paulus va-  
rietant.

## IN XIX. CAPVT.

**R**eginam Cleopatram. Vide Galeni commentarium de The-  
riaca, vbi hiſtoriam ampliter comprehendit. ſpeciesq; aſpidum  
enumerat. Oroſcius putat in ſine capitis aliqua ex Dioſcoride appo- Oroſcius.  
nenda. at ego breuitatis cauſa omiſſa exiſtimo.



## IN XXIII. CAPVT.

**D**Rachmis duabus. In Aldino exemplari erat Cyatho vno. Basiliensis corrector fecit cyathis duobus. Aetius integram lectionem ita habet. Drachmis duabus ex cyatho vno aceti: Sequentis die drachmis quatuor ex cyathis duobus. Tertia die drachmis octo ex tribus cyathis. hoc praterit Oroscius. Lege igitur in græco < β. μετ' ὄξους Rv. α. τῇ δὲ ἐξῆς < δ. μετ' ὄξους Rv. β. τῇ δὲ τρίτῃ < η. μετ' ὄξους Rv. γ.

## IN XXVIII. CAPVT.

Historia Mithridatis.

**R**Ex Mithridates. Galenus ea commemorat libro de Theriaca ad Pisonem. unde Paulus transscripsit.

## IN XXXII. CAPVT.

Nota.

**F**icus aridæ, item. Transposita et peruersa videtur lectio in Pauli codice impresso. Nam Dioscorides unde omnia hæc sumpsit, aliter habet. Fac itaque in hunc modum οὐκὰ ξυρὰ λαμβάνοντες καὶ τὸ ἀφειψόμεθα δὲ αὐτῶν σὺν οἷνῳ παρασκευάζοντες δὲ τὸ ὑατ' ἐξῆς τῆς αὐτοῦ ὡφελόντες διδάσκοντες βαλάνους ἐοικέντες ἢ λελεασμένους σὺν οἷνῳ μελίτῃ ἢ γάλακτι πίνοντες, ἢ καὶ ἀπὸ αὐτῶν ἀπαντὸν γένος ἐοικέντες καὶ γάλα γυναικῶν πίνοντες. Ita quoque nos reddimus. Pauli scriptura ad verbum habet ut sequitur οὐκὰ ξυρὰ λαμβάνοντες, καὶ τὸ ἀφειψόμεθα αὐτῶν σὺν οἷνῳ ἢ γάλακτι πίνοντες, ἢ οἰνομέλιτι, καὶ ἀπὸ αὐτῶν γένος ἐοικέντες, καὶ γάλα γυναικῶν λαμβάνοντες. παρασκευάζοντες δὲ τὸ ὑατ' ἐξῆς τῆς αὐτοῦ ὡφελόντες διδάσκοντες βαλάνους ἐοικέντες λελεασμένους σὺν οἷνῳ. hoc est inuuantur, si ficus aridas sumant, earumque decoctum cum vino aut lacte bibant, aut mulso, ac pirorum omne genus comedant, & lac muliebri assumant, ubi periculum lenius fit & declinat, confert, si glandes thebaicas detritas cum vino edant.

## IN XXXIII. CAPVT.

**M**ens impeditur. Græci habent λελησμένος, hoc est loquela impedimentum. At Dioscorides unde hæc sumpta sunt διὰ νόσας ἐμποδισμός id est mentis seu intellectus impedimentum habet. Ita quoque Aetius libro tertio decimo scribit. Quibus aulioribus mutandam lectionem putavi, saluo aliorum iudicio.

Et resolutione viget. Hic quoque viciū exemplaris græci est. habet enim καὶ ἐκλύσας pro ἐκλύσας, nec hoc annotauit Oroscius.

## IN XXXV. CAPVT.

Lectio græca emendatur.

**P**iscibus virosis. Corrige lectionem græcam muta; ex, ἰχθυοὶ βρομώδεις. In ἰμοια ἰχθυοὶ βρομώδεις. Paulo post, ὁδὸς δὲ ἀνοσῶν ἀμυγτὶ μεμικμένα. Mutila est lectio, quæ sic instaurari debet.



debet. ὅδεροι δὲ ἀσώδεις, καὶ ἐμετσοὶ χολεῶν ἐνίοτε δὲ αἵματι μεμι-  
μένα. ut nos vertimus. Oroscius & Castigator Basiliensis hæc duo  
loca deprauata reliquerunt. Non multo post πονηδάνου male ha-  
betur pro λυωδάνου.

Oroscius.  
Castiga.  
Basiliens.

## IN XLII. CAPVT.

**C**um oleo & passo. Variat lectio Dioscoridis à Paulo impresso  
habet οὐν ἐλαίῳ καὶ γλυκῇ, hoc est cum oleo & passo, ubi Pau-  
lus οὐν δινῶ καὶ γλυκῇ. quod est cum vinò & passo. Aetius tan-  
tum ex vino dulci habet, sequere quemcunque voles.

Instauratur  
Pauli lectio  
ex Diosco-  
ride.

## IN XLVI. CAPVT.

**P**raesertim in exurgendo. Hoc est cum è lectulo leuare se co-  
nantur, ut ait Largus. Græca sonant, ἐν τῷ θάλασσῳ.

Opobalsami drachma cum vino. Dioscorides habet cum mel-  
le aut lacte. In primo libro etiam cum lacte opobalsamum valere cō-  
tra aconitum tradit. vide an malis cum Dioscoride legere. Ego exem-  
plar sum secutus.

Nota.

## IN XLVIII. CAPVT.

**T**otum corpus prurire facit. Græce est λυσιμὸς καὶ ὅλον τὸ  
σῶμα. Dioscorides etiam in hunc modum habet. Largus au-  
tem cuius mentionem Galenus subinde facit, pro corpus, habet os in  
hunc modum. Ephemerum potum protinus quidem os prurire facit,  
velut scilla tactum postea etiam adurit, quasi pipere manducato.  
Hæc te, lector, latere nolui.

Largus.

Nota.

## IN LIII. CAPVT.

**P**haricum dictum. Multi scriptores dubitant, simplex ne sit  
an compositum. Largus ex compluribus componi affirmat.

Nardum syluestrem. In codice Pauli Græco deerat ἀγρία. Tu  
ex Dioscoride restituito. Basiliensis Castigator omisit.

## IN LIII. CAPVT.

**V**T vinum dulce cum rosaceo. Deprauatus est Codex græ-  
cus impressus. habet enim γλυκὺν οἶνον pro γλυκὺν οἶνον. Omi-  
sit Gemusæus.

Castigatur  
textus Græ-  
cus.

## IN LV. CAPVT.

**A**tramentū sutoriū. Hic quoq; viciatus est codex græcus. ha-  
bet enim χαλκὸς ἀνθ' & hoc est flos aris pro χαλκονδρον, ut sit  
atramentum sutorium. Ex Dioscoride castigatum: Basiliensis casti-  
gator hoc etiam nō aduertit. Largus habet aris flos, sed male opinor.

## IN LVI. CAPVT.

**D**entes tincti. Græcus codex impressus habet ὀδοντες βιβρω-  
μένοι hoc est dentes erosi. Dioscorides in ὀδοντες βιβρωμένοι  
quod

Impressum  
exemplar  
græcum cor-  
rigitur.



quod est Dentes tincti. At Aëtius legit gingivæ corrosa. Secutus sum Dioscoridem. Præterijt Gemusæus.

## IN LVII. CAPVT.

**L**Ac potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum. Sic interpretatus sum γάλα ἐμπιτυαδὲν ἀδροῖον. Nā s̄ prius coagulatum est quàm fuerit assumptum, non opus habet, ut rursus Marcellus. congeletur. Longe dissentio à Marcello cui ἐμπιτυαδὲν vertendum censet, cui coagulum sit admixtum. cum Paulus coagulum superbibi cum aceto precipiat. Sed ἐμπιτυαδὲν intelligo intus, hoc est in corpore congelatum. Ibi enim aliquando coit in grumos, & densatur, ut respirationem impediat. Vbi igitur lac assumptum repente ac cumulatim, in corpore coierit, remedia adserenda sunt.

E' cinere lixiua. Turpiter hic Ruellius Marcellus, aliq̄ inter-  
 λιονία πιλοποιική. pretes lapsi sunt, qui λιονίαν πιλοποιικήν verterint, nunc lutum ex-  
 colatum, nunc lixiui genus aliquod. Nihil enim aliud est quàm è ci-  
 nere lixiuium, quo & pilotarij, & aliij artifices vtuntur. Sicut apud  
 ὕδωρ πιλοποιικόν. Galenum ὕδωρ πιλοποιικόν, quod Largus in eodem medicamento  
 dixerat, è cinere lixiuium, ut aliàs annotauimus.

## IN LXII. CAPVT.

Castigatur  
 codex Gra-  
 cus.

**H**Ormini semine. Male habetur in codice Græco ὀρμίνου ἀ-  
 γρίου pro ὀρμίνου ἀγρίου. neglexit Gemusæus.

## FINIS LIBRI QVINTI

## COMMENTA-

## RIORVM.

\*

COM



COMME-  
NTARIORVM IN  
PAVLVM AEGINE-  
TAM LIBER SEX-

T V S.

\*



v m humor oculis. Liber hic sextus curationem  
trahit, quæ ferramentis & manu administratur.

Certe difficilis existit, tum quod nemo hæc eo ordi- Sextus liber  
ne tractarit, tum quod ij vnde transcripsit, non ex- omnium dif-  
tant. Curabo tamen pro mea fide, vt nihil quod lecto ficillimus.

rem remorari possit, indiscussum relinquatur.

Ferramentis nuclei modo rotundis. λευκοσπῆρες πυρλωροειδῆς.

Grace dicuntur πυρλῶρες, extrema specillorum siue acuta, siue ca- πυρλῶς.  
ua, siue rotunda. Hoc autem loco, rotunda vt vsitio commodius ad-

ministraretur, aliqui nuclearia vocant instrumenta. Celsus tenuibus, Tenuia, retu-  
retusisq; ferramentis ait libr. 7. de oculorum humoribus reprimendis sæq; ferramē-  
sermonem faciens. ta,

At in elephantiafi. Paulus hoc lib. 4. iam docuerat, nempe mul- Vsitio capi-  
tos qui ne in totum insanabiles fierent, ex capitis vsitione seruatos. tis.

IN III. CAPVT.

**H**Ydrocephalon. Celsus lib. 4. Inuenitur genus quod longum Hydrocea-  
potest esse, vbi humor cutem inflat eaq; intumescit, & prementi phalon.  
digito cedit ὑδροκεφαλῶν Græci appellant.

In ociosam inutilemque; mutato substātiā. Oroscius omnia Oroscius.  
grammaticorum Lexica introspexit vt me in dictione Græca ἀργῶν, ἀργός.  
tanquam male eam interpretatum reprehenderet. ac tandem Budæū  
nostrum in commentarijs in Græcam linguam consulens, ἀργεῖν in-  
uenit significare, contrarium ei quod elaboratum, confectum, conco-  
ctumque;



Crudum. Etumq; est, eoq; exponendum hic censuit ἀργύρ, crudam, non attendens, quo modo in re medica crudum dicatur. Nam sanguis nunquā dicitur, post absolutam sanguificationis terminum crudus fieri, sed mordax, acris, crudum vero aut semicoctum succum, sanguinem mutari, aut sanguinem minus elaboratum, ac crudum adhuc in perfectum degenerari. Gal. enim lib. de sanitate tuenda quarto concoctionem ponit crudorum, vel etiam semicoctorum humorum, eductionem acrium. At sanguis non consistit citra concoctionis terminum. Et si adhuc in venis etiam illis capillis semicoctus ac crudus existeret, tamen non diceretur extra vasa elapsus, in crudam mutari substantiam, sed putridam potius ac peregrinam. Qui enim extra instrumenta sua elapsus est, non potest non corrumpi. Crudus autem fieri, non item. Quare Orosius hunc laborem castigandi, non alio quam calumnie studio sumpsisse videtur, ipse maxime corripendus.

λευγρωμί

•••

Orosius.

Pulvino sublimi. eis ὕψος & λευγρῶμί, hoc est, in sublime elevatus, quemadmodum pulvini in superficie tument, gibbero extate.

Et quia paucis particulis subiectus. Orosius coniungit hic sequentia cum prioribus. Græca sic habent ἂν ὀλίγα ὁμάσῃ & ὑπερπτορ λεῖξαι τὸ ἐπείγου τῶν δακτύλων. At clausula hæc posterior λεῖξαι τὸ ἐπείγου segreganda est à priori, connectendaq; sequentibus, in hunc modum, λεῖξαι τὸ ἐπείγου τῶν δακτύλων ῥαδίως ὑπερπτορ.

Lineis incidere.

Duabus utemur lineis. Hoc est duas divisiones moliemur. Celsus ubiq; loquitur eodem modo, ut lib. 7. Reperti in Græcia sunt qui novæ lineis cutē capitis inciderent. Itē Reperti sunt qui à capite recte eas lineas ad tempora diducerent. Græce est ἀνὰ λεχημίδας διαγίρει.

#### IN V. CAPVT.

**A** Ut etiam acutus. Fluxiones in oculos nunc longa, nunc breves eveniunt, pro humorum in illos decumbentium ratione particula è in Græco codice male pro ñ posita est, nec Orosio, nec Gemusæo aduertente.

Aut etiam ceruix deligata sit. Ut scilicet magis conspiciantur. Nam Celsus lib. 7. de eadē re tractans, frequēs curatio est, venas in temporibus adurere: quæ fere quidem in eiusmodi malo tument, sed tamē ut inflentur, magisq; se ostendāt, ceruix ante modice deliganda est.

Membranam detrahemus. Codex Græcus viciatus est, ut qui ὕψος ἔν habeat pro ὑμείων. omisit Orosius, aliq; castigatores. In fine capitis ἀφελωτινὸς vertit crustam inducentibus, cum dicendum esset, cicatricem inducentibus.

#### IN VI. CAPVT.

Hypo



**H**YPOSPATISMO. Anonymus quidam Græcus inquit, hypospa-  
tismus itaq; tribus fit super frontem diuisionibus post latiore  
specillo quod spatoulā vocāt. per corpora quæ interiacent, transmissio.  
Hypospatis-  
mus quasi  
spatæ trans-  
missis.

Exilem spatam. Hoc est gladioli modo latam Græco vocat Pau-  
lus ὑποσπατῖς. paulo post σπατῖον, quasi dicas spatulam. Hæc  
autem dictione vsus sum non quidem latina, sed medicis cognita. τῆς.

Panniculumq; implicitum. Græci πύγμα & πύγματον πύγμα.  
appellant. Galenus in commentarijs de Chirurgia.

## IN VII. CAPVT.

**P**ERISCYPHISMUS. Citatus supra Græcus auctor, memoria pro-  
dit, periscyphismus est, cum transuersis lineis coronæ modo frons  
secatur.

Penicillis. Sic reddidi σφολονεύς, quæ linamenta dicuntur cu-  
nei modo intorta. Vnde quidam reddunt cuneolos ex linamentis. σφῶνιον.

## IN VIII. CAPVT.

**D**E sutura. Titulus capituli habet πρὸ ἀναρράφης quæ dictio ἀναρράφη.  
deriuata est à ῥάφῃ & ἀνα. Sicut inferius caput facit de λα-  
τάρραφῃ hoc est de sutura inferioris palpebræ à λατῶ & ῥάφῃ.

Græci appellant δις τυχίαι. Celsus eleganter libr. 7. hanc di-  
uisionem interpretatur, Modo sub ordine naturali pilorum alius ordo  
subrescit. Quo auctore ego quoq; verti, cum naturali pilorum ordi-  
ni, alij præter naturam pili succrescunt: nihil tamen ex Pauli sen-  
tentia commutavi. Græce sonant in huius modum ἡ λαλουμένη δι-  
ς τυχίαις ἐστὶ μὲν ἐν φούρῳ παρὰ φύσιν τρύχωρ, εἰς τὸν λατῶ φύσιν  
σύχωρ το βλεφάρῳ προσγινομένη τρυχώρ.

Interim in phalangosi. Phalangosis est cum pilorum subnascent  
tium duplex, tripléxve acies vel in superiore, vel in inferiore palpebra  
eis. προεμῖ.

Cuspide specilli. Græce est πυρῆνι σμήλης. At intelligendum πυρῆν.  
venit apud Græcos πυρῆνα nunc pro cuspide accipi, nunc pro extre-  
mo quidem capi sed cauo, vnde aliquid infundi potest. Item rotun-  
do, nucleoq; specilli. Hic igitur specilli cuspide palpebra in rugas, pli-  
casq; aut sinum coacta quod λοδπῶς αἴσις significat, inuertitur. Di-  
xi autem in rugas coacta, pro inuoluta circa cuspidem.

Vt croceno diarrhodon. Sic appellatur collyrion apud Paulum λοδπῶν.  
7. lib. quod ex rosīs inscribitur, adiecto croco in Græco codice λοδπῶν διὰ ῥοδῶ.  
habetur pro λοδπῶν. Neglexit Orosius.

Et veluti lacte infu. Græce est ὡς γάλακτι ἐγχύτω. Orosius. vo-  
luit instillato dici, quasi vero non etiā infundi dicatur in oculū medi-  
camenta. Cels. Quicquid inspergitur, auerso specillo infundi debet.



## IN IX. CAPVT.

Orosius.  
Vrina impu-  
beris.

**V**Rina pueri impubis. Oroscius diligens aliorum iudex: ἀφ-  
θόρου vult à me exponi, venerem non experti. At ego Plini-  
um secutus dixi impubis. Ante pubertatem enim venerem exer-  
cere nequeunt pueri. Hermolaus alijque docti viri eo quo ego modo  
sunt interpretati. Simili calumnia in sequente capite vititur, repre-  
hendens ἰναδὸν verti amplam notandam magnā, sufficientem, dicen-  
dum autem putans, idoneam contra Grammaticorū suorum quibus  
adhaeret pertinaciter, opinionem. Item in Aldino exemplari habe-  
batur, δὲ αἰ γδ, vbi ipse δὲ relative legendum censet, at ego ex Ruellij  
exemplari & sensu sine δὲ in hunc modum corrigendum codicem dico  
αἰ γδ αὐ τὸ τὸν δὲ γδ. &c. In vndecimo capite pro δισυχίαν,  
facito δισυχίαν.

Orosius.

Orosius.  
castigatur.

## IN XII. CAPVT.

**D**E ectropio. Inferioris palpebra vitium est, quod parū sursum  
attollitur, sed pendet & hiat neque potest cum superiore com-  
mitti, vt ait Celsus.

Ectropium.

Ectropium oboritur. Vide librū septimum Aetij. Inuertun-  
tur palpebrae nonnunquam exulceratione precedente & carne ipsa-  
rum adaucta: nonnunquam ex duriore cicatrice.

Celsus.

Auersum specillum. Ita exposui autoribus Celso & Scribo-  
nio, vt etiam antea annotaueram. At Graeci τὸ λυαδισκόν τὸ μέγας  
videntur sepe confundere. Nunc pro cauo, & ad fundendum apto  
specilli extremo, nunc pro acuto & in cuspidem abeunte accipitur, vt  
hoc in loco. Celsus etiam libro quinto. Quicquid, inquit, inspergi-  
tur, auerso specillo infundi debet. Item libro septimo, nam quod par-  
uum est, super inguem in aluum vel digito, vel auerso specillo repel-  
lendum est. Iterum vulnus digitis, vel aduerso specillo deducendum  
est, vt torquentibus exitus detur: ὕσῃ effusis tum diutius para vri-  
na descēdat. Scribonius compositione 227. Ac quarto die auriscal-  
pio auerso, quam partem λυαδισκόν graeci vocant sensim tentare, mo-  
uere ab alienatum oportet, quo celerius excidāt hemorrhoides.

## IN XIII. CAP.

**A**Nabrochismum graece dictam. Nulla est apud latinos di-  
ctio, quae anabrochismum significat. Deriuatur à βρόχος, & ἀνὰ,  
quasi illaqueationem dicas. pili autem ansulis ex filo factis comprehen-  
si euellantur, vt non sit quod Oroscius damnet, pilorū euulsionē à me  
dictam, quae per filum administratur. Auriscalpio. Graece est.  
μέλωτις, quod deductū est à μέλη hoc est specillū, & ὅτις, auris.  
proprie enim auribus destinātū est. Dicitur etiam μέλωτις.

μέλωτις.  
μέλωτις.

Specil-



Specillum quod utroque extremo in cuspidem. male in codice Græco habetur διπύρινον pro διπύρινον. Quod instrumentum est duplici cuspidē præditum. Nam τρυῖνα extremum, ac summam cuspidem, seu nucleum, seu capitulum exponunt. Oroscius reliquit codicem deprauatum, sicut etiam Basiliensis Castigator.

## IN XIII. CAPVT.

**P**Alpebræ cuti præter naturam. Codex deprauatus græcus το βλεφάρου ἀεγματοὶ κατὰ φύσιν habet, pro κατὰ φύσιν. Nota nit Oroscius.

Collectionem quandam. Ita exposui, συναγωγὴν τινὰ ἀειδατὶς, hoc est congregātes aliquo modo hydatidem intra digitos.

## IN XVIII. CAPVT.

**P**Terigion. Celsus libro septimo ita scriptum reliquit. Vnguis vero quod τριγύριον græce vocant, est membranula nervosa oriēs ab angulo, quæ nonnunquam ad pupillam quoque peruenit, eiq; officit &c. Hunc ego imitatus, dixi vnguem oculorum. τριγύριον.

Hamulo modice inflexo. Græce est ἀγνιστῶν μινρονάμπει. Celsus eleganter dixit hamulum paulum mucrone intus recuruato, alibi, hamulos intus recuruato.

## IN XIX. CAPVT.

**S**taphyloma est. Celsus nomē staphylomatis probe exponit libro septimo. In ipso autem, inquiens, oculo, nonnunquā summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, & similis figura, acino fit, vnde id staphyloma græci vocant. Itaque λυψίωσις recte exponitur eleuatio. Nam alius quidam græcus dixit μετωρισμός. staphyloma λυψίωσις. μετωρισμός.

## IN XX. CAPVT.

**D**E purulenti Galeni verba. Græce purulenti τῶ ὀφθαλμοῖ dicuntur, cum scilicet totum oculi orbem, aut eius dimidium pus occupat. Historiam apud Galenum habes in Methodi medicatorie libro quartodecimo. τῶ ὀφθαλμοῖ.

Nisi quis admodum diligenter. In Codice impresso græce habetur, εἰ μὴ πάντῃ τῆς ἀνθρώπου. Deprauate nimirum pro εἰ μὴ πάντῃ τῆς ἀνθρώπου. Oroscius & Gemuseus ceu exiguum præterierunt. Oroscius.

## IN XXI. CAPVT.

**S**uffusio. Latini interpretantur τῶ ὀφθαλμοῖ suffusionem. Barbari Cataractam. Alibi Celsus enim τῶ ὀφθαλμοῖ nominat. τῶ ὀφθαλμοῖ.

Lanamq; oui luteo cum rosaceo. Hunc locū Græce ita habemus ἐπεὶ λανθάνει τὸ σὺν ῥοδίῳ λουθεῖν, quæ Oroscius male & imprudenter vertit, Imponemus oui luteum rosaceo exceptum, deligatumq;. Oroscius.

Ff



## IN XXII. CAPVT.

**E**T si ad malas, subluuies. Hoc est si ad genas humoris impetus deciderit. Paulus dixit, καὶ εἰ πρὸς μᾶλα ὑποπίπτει ἢ ὑποφορεῖ.

Ab vftione lenticula melle adiecto. In Aldino exemplari habebatur omphacomeli, cuius descriptionem habes septimo Pauli inter potiones dulces. At hic nihil proficit. Sed phacomeli, legendum, quod est lenticula melle addito, vt superius τηλόμελι fenu grecū melle adiecto, item malicorio ex σιδωτῶ reddidimus, à σῖλις deriuatum.

## IN XXIII. CAPVT.

**H**ic affectus à prima. Celsus septimo penè eadem habet. Solet inquiens tamen tumere, vel à prima natali die protinus, vel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, vt foramen in ea nullum sit, eoq; audiendi vsu careat. &c. Græci vocant ἑστῶτα. ὡς αὖ πύκτος. In titulo male per iota ἀπίκτους impressum est.

Postea accidit. Hoc est, post natalem diem accidit hoc vitium, si præcesserit exulceratio.

## IN XXIII. CAPVT.

**A**Vriculario specillo. Sic exposui μυλωτίδα, quod aliquando etiā pro simplici specillo accipitur, vt in sequētib; interpretor.

Celsus. Violenta capitis concussione, aure super circulum. Celsus libro sexto ex Hippocrate inquit, Tabula quoq; collocatur media in, herens capitibus vtrinq; pendentibus, superq; eam homo deligatur in latus versus, cuius auris eo modo laborat: Sic vt extra tabulam, emineat. Tunc malleo caput tabule quod à pedibus est, feritur: atq; ita concussa aure, id quod inest, excidit.

luxαμῖς. Iam vero Calamo, græce est δὴα luxαμῖς. Sic enim aqua potest elici, exugendo.

## IN XXV. CAPVT.

**P**OLYPUS. De hoc lib. 3. comprehensum est, vocat autem hic molliores, dictione græce ψαφαρωτέγους, quasi dicas teneriores fragilioresq;.

spatula. Spatula. Celsus etiam hac dictione vtitur lib. 7. de Polypo. Ergo, inquiens, hunc ferramento acuto in modum spathæ facto, resolvere ab osse oportet.

luxαδισμός. Manubriolo ipsius. Græce est τῷ luxαδισμῷ ἀντὶ, quod superius exposui auersam specilli partem. Celsus autem videtur manubriolum capere pro aduersa specilli parte, vt lib. 7. de Chalarzio. Dein scapelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt &c. quanquam etiā dicat eodē libro, Aduerso scalpello subsecare magna cū moderatione.

Duplici cuspide præditi. Male rursus in codice græco δὴα πύ-  
ρίν



πίον impressum est, pro διπύον, nec hoc emendauit Orosius aut. Orosius.  
Gemusius.

## IN XXVII. CAPVT.

**A**Ntheron puluerem. Libro septimo Pauli cōpositionē An- Puluis An-  
theri habes compr̄hensam. Dicitur autem ἀνθήρον quod rosa- theros.  
rum flores inter alia recipiat.

## IN XXX. CAPVT.

**T**onsillæ. Latinos in hoc vitio peculiariter significādo verborū  
inopia laborare testatur. Siquidem per tonsillas & partem cor Paristhnia.  
poris, & morbum exponere cogimur. Græci autem distinctim partem ἀντιὰδδ-  
ωπίδωρα, affectum ἀντιὰδδς appellant.

Deuorationi spirationique negotium. Græce est ἀνοχυσία  
τὴν ἀνοχυσίαν τῆς λυτάνου, καὶ τὸ πνεύματι, quod est ad ver-  
bum, difficilem vsū deuorationi, & spiritui exhibentes.

Quantum licet. Hoc est quoad possumus, ἐφ' ὅσον δύναμεθα.  
Aucenna lib.3. Trahuntur ad exteriora quantum est possibile.

## IN XXXI. CAPVT.

**G**urgulio. Eadem fere Galenus libro sexto de compositione  
medicamentorum secundum locos habet, Carnosa (inquiens) ut  
nos vertimus) quædam particula in summa oris parte suspensa appa-  
ret, si quis toto ore plurimum aperto linguam deprimat, hæc inquam  
caruncula duobus nominibus à veteribus græcis nominatur Garga- Gargareon.  
reon, & Cion hoc est Gurgulio & Columna. His posterius medici Cion.  
prope omnes non ita, sed cronida quod est columellam ipsam nomināt. Gurgulio.  
Nam eorum qui staphylen, hoc est ruam vocitant, satius est non me- Columella.  
minisse. Non enim particulam, sed vnum aliquem ipsius affectum,  
Staphylen hoc est ruam appellamus &c.

Tenues autem oblongæ. Celsus partem ipsam contra græcorū  
opinionem, ruam appellat lib.7. rua inquiens, si cum inflammatione  
descendit &c. Paulo post quasi verba Pauli recenset in hunc modū.  
Si verò inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra  
modum à pituita deducta est, & est tenuis, acuta alba, præcidi de-  
bet. Itemq; si ima, lucida, & crassa, summa tenuis est.

## IN XXXIII. CAPVT.

**Q**Vomodo aspera arteria. Caput est τὸ ἐπὶ λαρυγγόρμις. Su-  
perius annotaui quid ὁ λαρυγξ apud græcos medicos sit, quid  
ὁ φάρυγξ & ἡ φάρυγξ. Hic dico τὸν λαρυγγα & φάρυγα pro aspera  
arteria vsurpari & inter se confundi, sicut etiā βρόγχος. Gale. eodē  
modo vtitur lib.2. de placitis Hippocratis & Platonis magis autem

Larynx.  
Pharynx.



ὁ λαρυγγίς pro summa parte arteriae, ὁ φάρυγξ pro tota ipsa ponitur. Verba Galeni sunt. τὸ μὲν γὰρ τῆς βραχείας ἀρτηρίας ἔνθα δὲ καὶ ὁ φάρυγξ γὰρ προσκαρτεῖται, μὲν ἔστι. Paulo superius. πλεονάζοντες γὰρ ἐπὶ τῶν λευκῶν τῶν λαρυγγίων χόνδρων, οἷον ἐπὶ πλεονάζοντων τινῶν ἢ ἐν φύσει αὐτῶν φαίνεται γίνεσθαι. ἔστι. Iam eodem in loco ὁ φάρυγξ, nisi viciū sit codicis, pro ὁ φάρυγξ usurpatur, in hanc sententiam. οἱ δὲ οὐδὲ ἄλλοι ἔχουσι λέγειν, ἢ δὲ ὅτι πλεονάζοντες ἢ λαρυγγίον ἢ φάρυγξ διὰ τὸ τοῦ ἐκείνου ἀρχεῖσθαι τῶν φωνῶν. ἔστι. IN XXXIII. CAPVT.

**A**No proximos. Codices nostri deprauati erant, λαρυγγίον habentes, pro λαρυγγίον ubi non parum debet Orosius exemplari suo. paulo post fac διὰ τῶν ex διὰ τῶν.

λημνισκός.

Implicitum aliquod in longitudinem. Sic interpretatur λημνισκός. Celsus lib. 7. cap. 28. Intus inquit, ἔστι implicitum in longitudinem linamentum (λημνισκός graeci vocant) in aceto tinctum demittere. In codice graeco est διὰ συνέσθαι distinctum, quasi duae dictiones sint, impressum, quod legendū est διὰ τῶν τῶν, quod pertrahi possit ἔστι implicitari.

Fomentū & medicamē. In exemplari graeco habetur τῶν αὐτῶν Orosius. ἐμβροχὴν μοτοφυλάκων φάρμακον, pro quo legēdū censeo τῶν αὐτῶν μοτοφυλάκων. ἐμβροχὴν, καὶ μοτοφυλάκων φάρμακον. Nam antea vino ἔστι oleo, aut aqua ἔστι oleo aspergi volebat, inde medicamen in lintheolis illitum accommodari. Capitur autem eodem fere sensu, quo ἐμμοτον. primum non annotauit Orosius, nec Gemusaeus.

IN XXXV. CAPVT.

**I**N Ceruice. superstitiosi quidam doctores, pro in ceruice, censent dicendum, in collo, quod ἐν βραχίλῳ graece dicitur. At Celsus fere ubiq; ceruicem pro collo, vt libro quinto de strumi agens in hunc modum, nascuntur maxime in ceruice, sed etiam in alis, ἔστι inguinibus, & in lateribus.

**Carotides.** Arteriae quas Carotidas appellant. Haec arteriae in dextra, sinistraq; circa guttur sursum procedentes ultra aures feruntur, quae nomen inde sortitae sunt, quod tense, aut alterationem quandam ex-

**Musculi.** pertae Caron inducunt, quemadmodum muscoli λαροειδῆς apud Hippocratem de articulis.

**Nervi recurrentes.** Nervi recurrentes. Hi sunt nervi sextae coniugationis cerebri, qui iuxta carotidas arterias deorsum feruntur, cōmuni vtrinq; velamento, ἔστι in Anatome plenius condiscas.

IN XXXVII. CAPVT.

**A**Rteria aperta. Galenus libello de tumoribus praeter naturam hunc in modum habet. ἀρτηρίας δὲ ἀνατομωθεῖσιν, τὸ πᾶν αὐτῶν



ἀνέβριμα λαλεῖται. γίνετ' δὲ καὶ τὰ βέλους αὐτῆς, ἐπειδὴ οὐ  
 εἰς δὴν μὲν ἀφίκεται τὸ προσειλεῖν αὐτῇ δὴνα δὲ μέλει τ' ἀρ-  
 τήρας ἔλκος, μήτε συμφύσεις, μήτε σινουλωθείς, μήτε σαρκὶ φρε-  
 χθείς. Διαγινώσκουσι δὲ τὰ τοιαῦτα παθήματα τῷ σφίγγῳ τῶν  
 ὀφθαλμῶν ἀρτηρίων, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς αὐτοὺς ἀφαιρέσει πᾶς ὄγκος  
 παλινδρομήσης εἰς τὰς ἀρτηρίας τ' ὀφθαλμῶν αὐτῶν δόξας. Ex  
 qua sententia, addendum in Paulo superius est ἔλκος, legendumq;  
 μὲν δὲ τὴν ἀρτηρίαν ἔλκος, non μὲν δὲ τὸ τὴν ἀρτηρίαν, &c. Hac  
 non annotavit Orosius, vel Gemusius.

Tumor omnis euanesceat. Codex græcus habet πᾶς ὁ ὄγκος,  
 pro πᾶς ὄγκος. nec hoc aduerterunt Aristarchi nostri.

## IN XXXVIII. CAPVT.

**G**Randis in ceruice & rotundus. Celsus libro septimo inquit, βρογχονήλιος  
 At in ceruice. inter cutem, & asperam arteriam tumor incre- Gutturosi.  
 scit, βρογχονήλιος græci vocant &c. Qui hoc vitio laborant gutturo-  
 si apud Latinos nominantur. IN XXXIX. CAPVT.

**C**Anglion. Verti ganglion est nerui in modum concretio, quod græ- συστροφή  
 ce est συστροφὴ νόσος. Nam indurantur nerui, contorquenturq;  
 ac in nodosam affectionem coeunt. συστροφὴ δὲ signat inspissari, coi-  
 re, indurescere. IN XL. CAPVT.

**C**Opia vero ipsius. Vide Galeni commentarium de plenitudi-  
 ne: ubi copiam vitæque fusissime exponit.

At in capitis morbis. Galenus libro de anatomicis tractatio-  
 nibus quarto in eandem fere sententiam habet. In ijs qui infra iu- Ordo venarum in mitem-  
tudo sanguinis.  
 gulum afficiuntur, siquidem sanguinem detrahendum oportet, principem lo-  
 cum presidij ratione vena possidet: quæ cubiti flexum accedit secun-  
 dum quæ ad cubitum ipsi deferuntur. Tertium communis: quartum  
 quæ ab humeraria ad flexum cubiti pergit. postremum humeraria  
 ipsa. In illis autem quos supra iugulum morbus infestat, contra,  
 humeraria primum: quæ inde ad cubiti flexum porrigitur secundum:  
 tertium communis: quartum quæ ab interiori parte flexum adit:  
 quintum, quæ cubitum ipsum.

## IN XLI. CAPVT.

**L**Euis itaque Cucurbitula. Dicitur leuis cucurbitula, quæ si-  
 ne scarificatu, & flamma imponitur. vide Galenum in libello Leuis cucurbitula.  
 de hirudinibus, reuulsione, cucurbitula, scarificatu.

Alij cucurbitulis vsi sunt vitreis. Celsus duo genera cucurbitu-  
 larum ponit æneum, & corneum quâquam ex alijs quoque materie ge-  
 neribus fieri doceat. ac si cætera defecerint caliculus quoque pulta. Genera cucurbitularum.  
 rius oris compressioris ei rei commodè aptatur.



## IN XLII. CAPVT.

**H**ippocrates. Libro de Articulis de ala mentionem facit. non autem certe altius ferrum adigi precipit, quod nerui, vena, & arteria subsint, quæ calorem istum ex ferramento tolerare nequeunt.

## IN XLIII. CAPVT.

**C**onuenit igitur. Græcus codex plane peregrinam habet lectionem, quid enim sibi vult aristolochia mentionē facere, uti ferramento crustæ excitanda sunt. Habet autem in hunc modum. Δὲ δὲ Ἀμαργὰς ἀριστολόχιας τὴν ῥίζαν ἐλαίῳ λουσάμενος ἐν τῇ βύβλιν αὐτοῖς πεπυραῖστο μύσας τὰς δὲ χάρας. hoc est conuenit igitur longe aristolochia radice oleo imbuta imponere ipsis crustas ignitas. Mihi autem legendum videtur Δὲ δὲ αὐτοῖς λουτηρίοις πεπυραῖστο μύσας τὰς δὲ χάρας ἐν τῇ βύβλιν, ut nos vertimus. Neglexerunt locum Orosius & Basiliensis castigatōr.

## IN XLV. CAPVT.

**G**alenus solam administrationem. Libro quartodecimo Methodi hæc ad verbum inuenies.

## IN XLVII. CAPVT.

Vomica in  
pectore.

**V**omica laborat. Græce est ἀπιστάμενον quasi dicas, abscedēs. Celsus de vitione iecoris agens, dicit si vero iecur vomica laborat, eadē facienda sunt, quæ in cæteris interioribus suppurationibus, quidam etiam contrā id scalpello aperiunt, ipsam vomicam adurunt.

## IN L. CAPVT.

Ascites.

**Q**uo veluti in utrem aqua colligitur. Hoc est, si ascites hydrops est. Nam ἄσκη & utrem signat. Auicenna administrationem ex Paulo sumpsit.

Imum abdomen adusque tenuem. Sic reddidi ὑπογάστριον, quod ad verbum sonat imum ventrem. Sed abdomen imum ex Celso sumpsi, nam exterior ventris pars est, abdomen. forte ἐπιγάστριον legendum est, ut in sequentibus, χαλκῶν λαλαμίονον διὰ τε τὸ ἐπιγάστριον, καὶ τὸ περιτοναίου διαίρεσιν λαβοῖομεν.

## IN LI. CAPVT.

**Q**uomodo peritonæi. Hoc caput ex sexto medendi Methodi libro sumptum est: verum in codice græco, mirum quam mutilum & deprauatum. Orosius autem, & Basiliensis castigatōr, nō aduerterunt, in erratis interpretum occupati.

Quare etiam remedium. Lege in codice græco ὥστε καὶ ἡ ἰατρὴ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ.

Mox expressa calefacere. fac ἐν ὀφθαλμῷ τούτῳ τὸ ἐν τῷ.

Quæ græci Syringotoma. muta in τὰ λαλόμενα ὀρθρὰ σφραγίσματα.

Figur



Figura autem laboranti. Adde in græco dictionem hoc facto  
ἐπιπύειον δὲ σχῆμα τῷ λάρυγγι.

Cum in superioribus deorsum: Deest in græco, πρὸς δὲ τοῖς  
ἄνω, λάρυγγος. Quoad totum exacte persuatur. Deest al-  
quid. Legendum enim ἀρχὴν ὅθεν ἀντιβῶς ῥαφῇ.

Inde per reliquum abdomen. Fac ex διαπύειον τὸ ἐν ἴσθμῳ ἐπὶ  
γάστρῳ hoc, διαπύειον τὸ ἐν ἴσθμῳ ἐπὶ γάστρῳ.

Deinde ab hoc rursus. Hic multa desiderantur plane necessaria  
quæ superioribus adijciantur ne quis compendij causa ab ipso Paulo  
pretermissa censeat. Sic igitur ex Galeno instaurari debent. ἄρ' αὖ  
δὲ ἀπὸ τούτου πάλιν ἀρχὰς ὡς οὐδὲν ἀπὸ τῶν ἀντιβῶν  
πρὸς τὸν αἶμα, λάρυγγα διενδύειν διὰ τὸ πλεονέκτημα. ἐν-  
θεν δ' αὖ πάλιν εἰς τὴν διέσταν, συρράπτουσαν αὐτὸ τῷ ἀντιβῶν  
πρὸς τὸν αἶμα διενδύειν τὰς τε διὰ τὸ πλεονέκτημα. ἄρ' αὖ  
εἰς τὴν.

Pari modo si proxime oras. Legendum est ἐν τῷ δὲ καὶ τὸ  
μὲν ἰγγυτάτω. Id autem fiet in eum modum. Fac ἵσθμῳ δὲ τῷ  
το λάρυγγα τὸν δὲ τὸν ῥόπον. Quid enim sibi vult ἵσθμῳ δὲ τῷ  
λάρυγγα δὲ τὸν αὐτὸν ῥόπον. Vbi hic tua diligentia Orosius?

## IN LIX. CAPVT.

**S**umpto igitur Cathetiro hoc instrumentum à demittendo di-  
ctum est. nam per id aliquis liquor in vesicam demittitur à λάρυγγα  
ἐν τῷ. Est autē rectus sypho, ut ait Gal. IN LX. CAPVT.

**L**igaminibus sex processuum. Hoc est sex appendiculorum  
ἐξασκελῆς enim ad verbum sonat. sex crurum. à geometris peti-  
ta dictio est, qui figuræ quasdam ἐξασκελῆς nominant.

Super lapidem qui excidendis subicitur. Græce est λάρυγγα  
διενδύειν λάρυγγα τὸν λάρυγγα ἐπὶ τῷ αὐτῷ τῷ λάρυγγα hoc est de-  
inde dividemus infra calculum super ipsum lapidem qui inciden-  
dis subicitur. At vitium exemplaris esse puto. ponendumque pro  
τὸν λάρυγγα, quod est calculum, τὸν λάρυγγα hoc est colem. verū Aetius  
et alij veteres sectionem in cole non infra ad suturam, verum supra  
fieri præcipiunt. sed λάρυγγα. Sunt qui intelligant. super lapidem ipsum  
qui inciditur. IN LXI. CAPVT.

**T**unica erythroides. Duæ sunt testiculorum tunice, dartos,  
ἐρυθροειδῆς. Hic autem male habebatur in Græco ἐλαιοειδῆς  
pro ἐρυθροειδῆς. Paulo post inuenies ἐρυθροειδῆς τὸ ἐρυθροειδῆς positū. Ga-  
museus locū iam citatū reliquit vitiatū. IN LXII. CAPVT.

**H**umoris ociosi in particulis scrotum impli. In græco est  
ἄρ' αὖ ὡς οὐδὲν συλλεγόμενον πρὸς τὸ μέγας τῶν τῶν δόχου διὰ  
πλεονέκτημα, quod ad verbum sonat. Orosius humor colle-



Hernia.

Etus circa partem corporum scrotum implicantium. Mihi visa est superior translatio manifestior. hoc te meminisse volui. Caterum communeranicum nomen est, Hernia ut ait Celsus: unde Herniosi appellantur.

## IN LXIII. CAPVT.

Rhacosis.

**R**Acosin. Ita appellant graeci ῥάκιν & quod vile detritumq; linamentum, ut superius annotatum est. Cum itaq; laxior cutis scroti & veluti lacera pendet, rhacosis vocant.

ἑπινόου.

Quod incidendis subiicitur. Graece est ἑπινόη ὑδρικότου σκωδίσ, quasi dicas super asserē, super quē aliquid inciditur Superius de calculosis dixerat, ἑπινόη ὑδρικός το λίθου. Nonnulli calculum ipsum qui inciditur, exponunt, verum in sequentibus dictio ἑπινόη & innotescet magis.

## IN LXXII. CAPVT.

πριαπισιός

**P**essarium aliquo cicatricem inducēte vinctū. πριαπισιόν reddidi pessarium. nam illud nihil aliud est quam penicillum, pendendi virilis figuram representās. Superius autem habetur, speculo quod graeci διόπτραν appellant, ἀ perspicendo. Nam hoc instrumento triplici crure predito, naturalibus dilatatis, latentes in utero morbi cōspiciuntur modum vero aptandi instrumenti vocant δισπρίσιμον.

διόπτρα.

## IN LXXIII. CAPVT.

λωτός.

**S**peculi tridente. Sic exposui το ἄ διόπτρας λώτῃ. Cum enim speculum tria habeat crura, aut columnulas, aut dentes, inuicem iunctos, sed qui diduci possint, non plane abhorrere visum est à sensu, si tridentem speculi dicerem. Nam quid sibi λωτός apud graecos aliud velit, nescire me fateor. Bernardus felicianus, qui mihi in Pauli sexto vertendo successit, graecam dictionem reliquit, Loton inquitens speculi.

Lotos.

## IN LXXIII. CAPVT.

**C**ontractum. Male in graeco codice est σωνυμένων pro σωνυμένων paulo post λελεπισμένων, pro λελεπισμένων, rursum, postea indicem digitum vinctum, λελεπισμένων habetur pro λελεπισμένων. quae omnia Orosius neglexit.

Hydrocephalon.

Hydrocephalō sit, hoc est aquam in capite. Hoc est ferè quod Celsus dicit, solet etiam euenire ut infans humore distendatur, ex eoq; profluat fœdi odoris sanies.

## IN LXXV. CAPVT.

**M**Anu siquidem sinistra calida, inunctaque. Graece est. τὴν μεν χεῖρα τὴν ἀριστεράν θερμὴν, καὶ λελεπισμένω. fac λελεπισμένω ἀ λιπαίνω. Et hoc reliquerunt aristarchi.

IN



## IN LXXVII. CAPVT.

**S**I oblique, specillo duplici cuspide. male in codice Græco habetur. διαπυρίνω pro διπυρίνω.

Caulis modo porrecton. Græce est ἀποκαυλιθεῖν, hoc notat caulium modo transuersim fractum.

## IN LXXVIII. CAPVT.

**A**Ni fistulæ latentes. Fistulæ anī alie tortuose, alie multiplices, alie transuersæ, alie simplices habentur.

Fistulæ.

Vel specillo per fistulam. Rursus male in græco διαπυρίνω pro διπυρίνω habetur.

Instrumento quod ad sedem. Vocatur hoc διαστολὴς διόπτριον quasi dicas distendens speculum. verum proprie dicitur διόπτριον de vtero. Potest autem accommodari etiam sedi, cum latentes in ea morbi sint.

## IN LXXXIII. CAPVT.

**D**E extremarum partium præcisione. Sic vocatur græcis ἀποτομή. Celsus libro septimo de Gangrena inquit, Gangrena inquiens, inter vngues, alāsque, aut inguina nasci, & si quando medicamenta vincuntur, membrum præcidi oportere, alio loco mihi dictum est.

διαστολὴς.

διόπτριον.

Ex causa exterius adueniente. Græce est ἐν προκαταρτίκῃς αἰτίας, quasi dicas præincipiente aut primaria causa. vt προγονιεύς.

ἀποτομή-  
σµόν.

## IN LXXXV. CAPVT.

**P**ollicibus. In græco est ἡ χεὶρ τοῖς μεγάλαις δακτύλοις, hoc est ad verbum in manus digitis magnis. Quia vero pollex quasi maximus omnium est, verti pollicibus, Celsum imitatus.

## IN LXXXVI. CAPVT.

**V**T sanie excreta, secta hæc. Codex græcus tantum habet, ἵνα ἐκκριθῇ, vbi addendum est ἰχώρος. legendumque ἵνα ἐκκριθῇ ἰχώρ, quod Orosc. & Basilienſis corrector nō annotarūt.

At in rectum superne deorsum. Hic quoque mutila est lectio exemplaris græci. Habet enim εἰς τὸ ἐνθὺ ποιήσας τομὴν ἐν τῶν ἀνωθῶν εἰς τὸ λαλῶν ὑπὸ σάρκωμα γίνεται ἢ ὅτι. vbi legendum est, εἰς τὸ ἐνθὺ ποιήσας τομὴν ἐν τῶν ἀνωθῶν εἰς τὸ λαλῶν, τὸ λαλῶν ὑπὸ σάρκωμα γίνεται, τῆς ὅτι. Istud quoque Aristarchi nostri neglexerunt.

## IN LXXXVIII. CAPVT.

**T**elis extrahendis. Telum vocatur, quicquid manu iaci mittine in aliquem potest. vnde apud græcos βέλτερος ἢ βάλλω quod βέλτερος est iaceo dictum est.

Ff 5



**ἡστίλια.** Sic exposui ἡστίλια Galenus in exegeſi Hippocratis inquit ἡστίλιον ἢ μόνον τὸν ἐς ἰσχυρὸν χρῆσιμον, ἀλλὰ καὶ τὸ ξύλον βέλους, hoc est atracſo non modo ad sacrificium vtilem: sed etiam sagittæ lignum significat. Alibi appellat τὸ ἐπίδεμα, nempe id quod imponitur. Ego vt obtemperarem Oroſcio haſtile dixi, quanquam interpretatio mea ſatis erat manifeſta.

**Βελυλκὺν.** Celsus libro ſeptimo hoc ferramentum ad Authorem Dioſcorum refert. Eſt autē lamina vel ferrea, vel anea etiā ab altero capite, duos vtrinque deorſum conuerſos uncas habet, ab altero duplicata lateribus, leuiterque extrema in eam partem inclinata quæ perforata eſt. Succus ex ventriculo. Hoc eſt Chylus, quæ vox licet græca ſit, medicis tamen non eſt incognita. Eſt autem proprie Chylus, ſuccus ex alimento in ventriculo prima concoctione factus, nec proprie ſuccus latine dicitur, quia vero aliam diſtinctionem non habemus, ea vtendum fuit. Lamina quæ membranam cuſtodiat.

**μυωρυγόν.** vocatur græcis inde μυωρυγόνλαξ. Celsus vt alias annotauit libro octauo exponit in hūc modū. Lamina anea eſt, firma, paulū refima, ab exteriori parte leuis quæ demiffa eſt, vt exterior pars eius cerebro proprior ſit, ſubinde ei ſubiicitur, quod ſcalpro diſcutiendū eſt &c. Sequenti capite rurfus ait, ſubiiciēda lamina eſt, quā cuſtodē eius mēbranæ eſſe propoſui, et ſuper eam quicquid ſpiroſum eſt, et intus eminet excidēdū eſt, forte nō male ἐκινόςπος dici poteſt. IN XC. CAPVT.

**Διπλόη.** Vſque ad laminam ſecundam. Græce erat ἀχρεὶ Διπλόη. Recentiores, ſiquē barbari dicunt ad caluariæ tabulatūram, alij vſque ad duplicationem.

Mirum in modum Galeno commmendatur. Vide librum ſextum Galeni Methodi medendi, vbi de fracturis caluariæ agit.

**Χοινίσιον.** Choenicion. Celsus interpretatur modiolum quod ita deſcribit libro octauo, cap. iij. Modiolus ferramentum concauum, teres eſt imis oris ſerratū per quod medium clauus ipſe quoque interiore orbe cinctus demittitur.

## IN XCII. CAPVT.

**Τ**Enui & ſorbili cibo. Celsus lib. octauo in quo Hippocratem magna ex parte ſequitur, habet. Deinde die tertio humidum cibum, quod Paulus dixit λέγεται, καὶ πορρικτὸς δὲ πορρεῖς.

**Maxilla** intra tres potiffimum ſeptimanas. Huic ſententiæ Celsus aſti pulatur, ſerē vero intra quartum decimum & vnum & vigeſimū diem ſaneſcunt, maxilla, male, iugulum, pectus, latus, os ſcapulorum, coſta, ſpina coxarum, os tali, calx, manus planta.

**Fracturarū differentia.** Quod ſi fractura per tranſuerſum. Fracturarum differentia quæ



quinque sunt: prima quæ fit schidacedon, altera cauledon. Tertia raphanidon, quarta sycydon, postremo alphitedon. prima assulatim quasi per rectitudinem, secunda per transversum, tertia in raphani modum per fissuras, quarta cucumeris modo, quinta in minutissimas partes ut farina efficitur.

## IN CXIII. CAPVT.

**L**amina quæ à tuendis. Græce erat *μωυργοφύλαν* & ἡ ἐν τῷ ἐκκοπίῳ. Adhibetur etiam lamina quàm in cerebri membranis usurpamus, alijs quibusdam excidendis: ut corium, vel asser, vel massa plumbea æneaq; Puto autem legendum ἀδικόπου pro ἐκκοπίῳ. Nam superius ἐκκοπίῳ facta iam erat mentio. Præterea subiungitur, διέλιον *μωυργοφύλαν* &. In sequenti capite Græce habetur *πρωτοπᾶτος* pro *πρωτοπᾶται*. quæ omnia Orosius & Corrector Basiliensis neglexerunt.

## IN XCIX. CAPVT.

**M**Anubrij lignonis. in Græco codice male habetur *διον τυλίον*, pro *διον τελεῖς* quod Orosius & Gemusæus præterierunt. Exponit autem Galenus, rationem administrationis huius commentario secundo in librum Hippocratis de fracturis.

In medio membro. Græca sonant, ἐν μέσῳ τῷ ὁλόῳ. frequentius vertunt τὰ ὁλόα artus. Celsus autem lib. 8. videtur etiam in articulis enumerandis, διέλιον, membri, uti primum in hac sententia, Si breuius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt. Item donec id membrum confirmetur, de humeris, brachijs, cruribus, feminibus, digitisq; confractis verba faciens.

*ὁλόα*  
Artus.  
Membra.

## IN CVII. CAPVT.

**A**Daptamus vero ossa vecte. Hoc est in locum suum commode restituiamus. Caterum *μοχλιον* quod à *μοχλὸς* descendit, *μοχλιον* vectem reddidimus vide Hippoc. lib. de fracturis. ubi habet. *σιδῆσαι χρεὶ ποιεῖσθαι δὲ τῶτον τὸν ῥοπὲρ ἐν πρῶτῳ ἔχουσιν οἱ μοχλοὶ οἱ δὲ λατύποι χρεὶοντῇ, τὸ μέντοι πλατύτῳ, τὸ δὲ τι στυτότῳ, &c.*

Membris coniugalibus. Dicuntur membra coniugalia, cū duo inuicem iungantur, ut in cubito duo ossa, in tibia item duo. Rursus aiuga, quæ sola sunt, nulli consimili iuncta, ut brachium, femur, aliaq; id genus. Apud Galenum in anatomicis *φλέψ ἀβυ* & de vena, quæ ex paribus thoracem intercurrentibus, sola absq; pari relinquitur, mentionem faciens.

Membra con  
iugalia.  
Membra aiu  
ga.

Ut in litera χ. Græce est *λιγὰ τὸν χρισμένον*, male, pro *χρισμένον*, ut in sequentibus etiam habetur. Est autem *χρισμὸς*, imitatio literæ χ.

Linam



μοτοφύλαξ. Linamento illitum. Idem μοτοφύλαξ & ἐμμοτὸν apud grecos est. prius quia in lintheolo servatum significat: alterum in lintheolo illitū.

## IN CXI. CAPVT.

**D**ifferentias. Celsus ita scriptum reliquit. Mouentur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modo quæ iuncta sunt inter se debiscunt: ut cum latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito & in crure, tibia à sura. Interdum saltu, calcis os à talo. Modo articuli suis sedibus excidunt &c. primum παρὰ ῥοθρημα.

παρὰ ῥοθρημα.

ῥοθρημα.

Vsq̃ue ad superficiē. In græco legitur μέχρι τ' ὀσφύς & male nimirū pro μέχρι τ' ὀσφύς. neglexerūt locū Orosius, & Gemusæus.

## IN CXII. CAPVT.

**D**E maxilla. apud Græcos γένυς cum voce λιάτω significat maxillam. cū voce ἄνω, malas. quanquam barbari maxillam inferiorem & superiorem appellent. Græci etiam dictione γνάθος in eodem significatu vtuntur.

σχᾶται.

σχᾶται. Galenus commentario secundo in librum Hippocratis, de articulis exponit quid sibi velit σχᾶται. in hunc modum ὥστε τὸ σχᾶσαι μὲν ἡγεῖται τῶν ὀστέων ἐπὶ τὰ ἄνω & ἄνω ἀρθρήματα. ὁποῖον δὲ τι τὸ πᾶν τῶν ὀστέων, ἀλλ' οὐ μὴν λιάτω τὸ φάναι παραλλαγαί. hoc est, quare σχᾶσαι musculorum & neruorum affectus est citra articulamentum. Qualis autem affectus hic sit, constat quidem ex eo quod dicit, peruerfiones.

Maxillam committunt. Hippocrates legit συμβάλλουσι τὰς λιάτω γνάθος. codex impressus Pauli dictionē λιάτω nō habet. Tu lectionem corrigito secundum Hippocratem, ex quo hæc ad verbum sumpsit. Omisit Orosius, & Castigator Basiliensis.

Interpretatio Hippocr.

Sin autem vtræq; maxilla. Græca sonant, ἢν δὲ ἀμφότεραι αἰ γνάθοι. Hoc est si maxilla vtræq; parte luxata fuerit nō vt recētiore interpretantur, maxilla inferior, & superior, quæ male rectius dicenda sunt. Galenus orationem Hippocratis, vnde hæc sunt transcripta, in eum modum interpretatur. ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει λέγει γνάθους δύο μάζην ὅν τινα γέννω ὡς, ἀλλ' ἐκάτερον τῶν μέρων, λιάθ' αὖ πλάτυνεται αὐτῇ. λέγει δὲ ἡγεῖται τὰ λιάτω πρῶτα λιάθ' ἀγυμνον ἡγεῖται ἀσφρον τὸ ὅτι ὅννομάζειν γέννας. &c. Quæ ita exponere possis. In hac oratione videtur γνάθους nō absolute maxillam appellare, sed vtrâque partem, in quibus ipsa dilatescit, videtur etiam ima extrema in quibus os nudum & ex carne est, maxillas nominare.

Secundū horū directā acie. Pauli codex græcus habet λιάτ' ἀτάξιον, forte λιάθ' ἴξιον & vt Gal. dicit λιάθ' ἐνθυνοποιᾶν, vt scilicet dentes primo



primores in maxilla, primoribus in malis, Canini caninis, molares molaribus respondeant. Hippocratis verba hæc sunt, τὸ δὲ ἀσπράβης μάστις ἂν γυῖος τοῖσι ὀρίοις τῶν ὀδόντων τῶν τε ἄνω καὶ τῶν κάτω λαβ' ἔξιν. Non annotavit Orosius, nec Gemusæus correxit.

Orosius.

Nam musculi hi dum alterantur, & præter naturam intenduntur, carum inducunt. Græca ita sonant. λαβοειδὲς οἱ μύες οὗτοι καὶ ἄλλοις μύεσι, καὶ ἐντείνονται παρὰ φύσιν. Galenus locum exponens commentario supra citato inquit, utrunq; & alteratio, & musculorum tensio carum potest efficere. Nam tensio hæc fit, filamentis quæ prius erant laxa, nunc omnibus secundum rectam lineam extensis. Alteratio, dum calefacti, aut refrigerati, aut humectati, præter modum fuerint, aut inflammationem, aut erysipelas fuerint experti.

λαβ' ἔξιν.

λαβοειδὲς οἱ μύες.

Quomodo

caros.

Hic igitur decimo die potissimum moriuntur. Mutilus est codex Græcus Pauli. habet enim οὗτοι ἔν καὶ δυήσκουσι καὶ μάστις. pro quo legendum est, οὗτοι ἔν δυήσκουσι διακταῖοι μάστις, ut habet Hippo. lib. de articulis. Gal. ibidē exponit dictionem μάστις. pro ἐν τὸ πολὺ, quod est plurimum, magna ex parte, & ut nos diximus, potissimum. Orosius & Gemusæus locum præterierunt.

#### IN CXIII. CAPVT.

**P**rocessus ancoræ similis. Est hic processus interiore in parte exiguus, acutusq; anchoræ modo, qui etiam ab alijs λαβοειδὲς dicitur, quod extrema ipsius pars, ita corniculæ rostrum exterius inclinat.

Musculi bicipitis. Vide Galenum de usu particularum, & de Anatomicis tractationibus. Est autem ex colli musculis anterioribus, qui in duplici capite ligamenta fortia obtinet, vnum ex processu anchorali, alterum ex elata superficie scapularum cervicis.

Ipsūq; humeri fastigium. Quidam anatomici scapularum cum iugulo compactionem Græce nominant ἀνθρώπιον quasi dicas summum humerum. alij tertium os esse prædicant, quod in ipsis tantum hominibus deprehenditur. ubi igitur in Græco codice habetur ἀνθρώπιον, ego reddidi summum humerum, aut humeri fastigium.

Lignum quod Græci hyperon. Lignum est pistilli modo factum, unde etiam nomen habet, frequens apud Hippocratem de articulis.

Hyperon.

Atq; hoc in scalæ gradu. Celsus lib. 3. de humero luxato Paulo consentit, sic (inquiens) brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradum traiecitur, ita alie, ut consistere homo ipse non possit. Hippocrates hanc restitutionem per scalæ gradum separat ab ea quæ fit per

Scala gallinaria.

per



per hyperium. estq; apud illum, quintus restituendi modus. quāquam in sexto modo, scale etiam faciat mentionem.

Ambe.  
Celsus imita-  
tur Hippocr.

Ambe. Ad verbum transcripsit ex Hippocrate. & Celsus Hippocratem libr. 8. quasi expressit in hunc modum. At si vastius corpus, nervi ve robustiores sunt, necessaria est spathula lignea, & quæ crassitudinem duorum digitorum habet; & longitudine ab ala ad digitos perveniat. In qua summa capitulum est rotundum & leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit.

Panniculo circumdatum. Celsus idem alijs verbis exponit. Ea q; spatha fascia involuta, quo nervis tactu ledat, ad alam à brachio dirigitur.

## IN CXV. CAPVT.

Methodus  
similitudinis  
& dissimili-  
tudinis.

Sani cubiti inspectio. Methodus hæc est quam Hippocr. libr. de medicina exponit: quanq; Galenus similitudinis, & dissimilitudinis. Optime enim affecta pars cognoscitur, si cum sana conferatur. Codex autem Græcus male habet μάθης pro μάθης. Quid enim sibi vult, ἢ τοῦ γινώσκοντος & ἀγνώστου & ἐλέγχου μάθης. hoc est sani cubiti affectus arguit. quomodo id quod sanum est, simul affectum est? Melius igitur mea sententia μάθης quod est disciplina. ego dixi inspectio. Aristarchi nostri non aduerterunt.

## IN SEQUENS.

Appellavi Brachiale eam vincturam, qua brachium cum extrema manu committitur. Celsus palmam nominare videtur in octavo. Græci dicunt λατὸν.

## IN CXVII. CAPVT.

Vertebrae spinæ. Hoc caput Paulus magna parte ex Hippocrate transcripsit. Avicenna autem quasi ad verbum ex Paulo transtulit. In hoc discrepamus, ubi ego sculpturam verti, ille foueam habet: ubi ego asserem, ille tabulam.

## IN CXVIII. CAPVT.

Intenso autem affecto Crure. Mutilus est codex Græcus impressus vel Basilee, vel Venetjs id quod etiam ex Avicenna manifeste constat. Habet autem codex in hunc modum. ἐν τῇ ταμίνῃ τοῦ πεπονθότος & πρὸ τῶν σπέρων ὡς δύο δακτύλους. nimirum pro ἐν τῇ ταμίνῃ δὲ τοῦ πεπονθότος & σκελὸς πλεον τοῦ ἐτέρου ὡς δύο δακτύλους. quod miror Orosii ex suo castigato exemplari non aduertisse.

Comprehendens qua crassissimum. Hic etiā male in Græco legitur λατὸν τὸ βραχύτατον, pro λατὸν τὸ παχύτατον. Id etiam omiserunt Orosius & Gemusæus. Ex superioribus lectio poterat corrigi, nisi in aliorum erratis nimium fuissent oculati.

## FINIS.



## C O M M E N -

## T A R I O R V M I N

P A V L V M A E G I N E -

T A M L I B E R S E -

P T I M V S .

\*

**L**IBER hic septimus Pauli de simplici & composita medicina, partim ex Galeno, partim ex Dioscoride, partim etiam ex Oribasio, transcriptus est. ordines Galenus precipue, vires & descriptionem Dioscorides: compositionem medicamentorum Oribasius tradidit: quāquam hic quoque à Galeno & alijs misturarum rationem acceperit. In codice Græco habetur ἐν νύμφῃ hoc est ad verbum, emortuum reddit: nos diximus sensum aufert. Orosius male dicit legendum νύμφῃ. cum potius quadraret ἐν νύμφῃ, quod est enervat. Orosius.

I N I I . C A P V T .

**M**Oderatum sane medicamentum. Galenus secundum genera inquit, medicamentum affectioni cui adhibetur, potentia respondere oportet. Ceterum hic ordines quatuor enumerat, quos Græci τάξεις ἡγεῖ ἀποσάσεις nominat. Galenus etiam ἀπίδους hoc est τάξεις. numeros appellat. nos ordines, intervalla, abscessus, & gradus ἀποσάσεις, appellamus.

Ut iam sensu priuent. Græce est, ὥς ἡδὴ νύμφῃ, quasi dicas, ut iam mortificent, hoc enim frigida vehementer, in membris efficiunt, ut emoriantur, sensuque priuentur. In summa nihil aliud est ἐν νύμφῃ ἐν νύμφῃ, quāam vita & sensu priuare. Poterat Orosius ex hoc loco, superiorem lectionē satis castigatam deprehendere. verum calumniandi animus eò illum prouexit, ut bene dicta etiam deteriora faciat.

I N



**A** Gallochum. Aetius lignum hoc describens, à similitudine quadam coloris Aloes, Xilaloen nominauit. Hunc secuti recentiores quidam non dubitarunt Lignum aloës appellare. In sumatra nuper à Lusitanis inuenta, magna copia esse fertur. Ad odorem gentes hæ vtuntur. Nam si in manu lignum hoc retineatur, optimum spirat odorem.

**ωλάδθ.** Flaccidum ex superfl. Gale. *ωλάδου* interpretatur *ωρίτλω υγρότητι*. Cum itaq; humiditate ea stomachus est irriguus, flaccescit, resoluiturq;. Hæc dixi, vt intelligas, Lector, versionis meæ rationem.

Anchusæ quatuor. Ex Galeno transcripsit: quanquā & Dioscorides fere omnia habeat. Verum Galenus & Paulus in hoc à Dioscoride dissentiunt, quod onochelon viperarum moribus conuenire dicant, forma cataplasmatibus adhibitam, ad alligatum, & comestā his verbis, *κατὰ πλάσσομένην τε περιττομένην, καὶ ἰδιόμην*. Dioscorides de folijs *ὁ δὲ διόμην καὶ πωρόμην, καὶ περιττομένην*.

Polytrichū.  
Callitrichū.  
Trichomanes.

Adiantum. Adiantum & Polytrichon idem sunt, Callitrichum, & Trichomanes etiam idem. Duæ igitur species tantū sunt, non quatuor, vt officinæ putant. Vna herba est adiantos in duas partes separata. vna proprie adiantum dicitur, de qua Dioscorides priuatim in vno capite tractat: folijs magis albis, coriandro similibus & longioribus. Altera pars sequenti capite explicatur, diciturq; Trichomanes, folijs filicis tenuibus, nigrioribus primo, & breuioribus. hæc proprie vocatur Callitrichon. Pharmacopola in duobus comuni vocabulo capilli veneris vtuntur.

Capilli Veneris.

Athera. Ex Dioscoride sumptum. verum clausula hæc apud illum non adest, *ἀπὸ σίτου* quod est è frumento. nec apud Galenum, nec Oribasium inuenitur.

Quid loco acatiae veræ sumi possit.

Aegilops. Auenæ secundum genus. Primum *βρόμθ* dicitur. Acatia. Veterum acatiam non habemus. vtimur autem quadam ex fructu pruni sylvestris facta. verum recte aliquis vtetur loco acatiae veteris, rhu obsoniorum, quod sumach vocant officinæ, vt quidam eruditus annotauit.

Brācha vrsina.

Acanthus. Si Dioscoridis acanthum, & nostram Branchā vrsinam conferas, idem plane esse intelliges. Verg. dixit, mollis acanthus.

Acinos. Ex Dioscoride tantum hoc transcriptum est, vbi *φύγεθλον* interpretatus sum panum, & *ἱερὸν πλάκα* sacros ignes.

Acorus veterum.

Acoron. Acorus veterum, Galanga nostra est: noster autem acorus species glandioli.

Amara



Amaracus. Paulus & Galenus duo capita de amaraco & samp-  
sucho faciunt: easdemq; vires utrique attribuunt. ac si autores con-  
feras idem plane sunt. Amaracus autem magis apud cyprum cele-  
bratus, sampsuchus in tota Gracia praterea amaracus paulo erit  
odoratior, quā hodie apud Gallos maioranam gentilem dicunt quāq;  
magis humi serpit. Sampsuchus erectior minusq; odoratus. Dioscori-  
des etiam diuersa fecit capita de vnguento amaracino & sampsuchi-  
no, quod alterum ex nobiliori maiorana in Cypro & cylicenis, alte-  
rum per totam graciā fieret. Galeni autem Amaracus est, quam  
hodie Matricariam nominamus.

Amaracus.  
Sampsuchus.

Amaranthus. Nota herba est apud Gallos, vocant eam passeue-  
lutū, quod coloris gratia sericū coccineum vincat, annotauit Ruellius.

Matricaria.

Amaranthus.

Ambrosia. Frequens reperitur in gallia inter exiles & madidas  
segetes qua messores se coronant. Vinosa herba rusticis dicitur, alijs  
vinosa ruta, quod folio rutam, & odore vinum imitetur. Quā offici-  
nae ambrosiam nominant, polemonium antiquorum est, non ambrosia.

Ambrosia.

Polemoniū.

Ampeloprasum. Exulcerat. Græcus codex habet λυνοῖ, at ego  
legendum ex Galeno censeo ἐλυνοῖ, quod castigator Basiliensis dissi-  
mulat me annotasse priorem. Oroscius neglexit.

Oroscius.

Anemonæ omnes. Hoc est omnes satiuæ species. Duo enim ge-  
nera tantum habentur. Satium, & sylvestre. Satium nos papauer  
rubrum appellamus: eoq; utimur in triticis nascente, veteres autem  
nunquam papaueris nomine vocarunt. Germani clapperrosen, galli  
passe fleur. Ipsa nomenclatura à vento sumpta est, quod eo flante, flos  
ipsius aperiatur. Erratica nuncupatur gallis coquerelles, primo vere  
crescit flore purpureo, mulierculæ hac noua tingunt.

Duo genera  
Anemonæ.

Lac in mammas suggerunt. Ex Galeno hæc omnia sunt tran-  
scripta. Verum in illo ἀνασπῶσι quasi dicas, sursum in mammas ad-  
ducunt: In Paulo autem & Dioscoride λήλασπῶσι.

ἀνασπῶσι.

Aparine. Addendum in codice græco particula τι, nam sententia  
imperfecta est, si tantum legas ἐχθρὸν ἀνὰ νοτὸν λήλασπῶσι, fac igitur ἐχθρὸν  
ἀνὰ νοτὸν λήλασπῶσι. Hoc Oroscius & Castigator Basiliensis anno-  
tasse debuerant, vel exemplari adiecisse.

Aristolochia. Duabus tantū speciebus in officinis utimur, Longa,  
& Rotunda. Sarmetacea negligitur, vnguentis alioquin utilissima.

Arction prosoptitis. Herba est, quam officinae vocant Lappam  
maiorē. Alterū arction virbasco simile, Lappam minorē appellant.

Lappa.  
Maior.  
Minor.

Armeniacum. Hoc est lapis armenius apud Dioscoridem libr. 5.

Arnabo. Idem est, quod Serapio vocat Zurumbet, Cassiæ fistulæ,  
& cubebis viribus respondens.

Arnabo.



**Arthemisia.** Arthemisia. Duplex, monoclones, & polyclones, matricaria species illius est, per unum & plures ramos distincta. Nam & haec plures habet ramos.

**Baccara.** Asarum. Vulgus Baccharum appellat. Germani Hasel vurtz. Galli, Racabarant.

**Fuligo.** In graeco est *λετάρυα*. Sic etiam habet Dioscorides. Nescio cur Oroscius *παύμα* legendum censeat: cum ipse quoque fractura ossium ad cicatricem venire dicantur. siquidem raro sine ulcere carnis fractura accidat, nec *λετάρυα* solum de capitis fra-

**Oroscius.** Eturis dicitur, ut putat Oroscius, sed omnium membrorum, quod intellexisset Oroscius si Hippocratis librum de fracturis legisset.

**Mumia.** Aspalthus. Vero aspaltho in officinis caremus. Possumus autem ipsa Mumia loco ipsius uti. Nam in Syria pauperes mortui bitumine implentur, vendunturque; postea. Diuites autem myrrha, aloë, croco, balsamo, alijsque id genus conduntur.

**Asphodelus.** Pharmacopole, aphrodilorum vocant.

**Atriplex.** In graeco codice videtur addendum *ταχέως*. Nam *ἀτρί* *λετάρυα* *γαστέρα* *διεφίχεται*, quod est, quare etiam per ventrem transit, imperfecta est sententia, & communis cum alijs omnibus. Nam per ventrem vniuersa quidem transeunt: alia vero cito, quae *ταχύπορα*, alia tarde, quae *βραδύπορα* dicuntur. Legendum igitur cum Galeno *ἀτρί* *λετάρυα* *γαστέρα* *διεφίχεται* *ταχέως*, non aduerterunt nostri Aristarchi.

**Vagula caballina.** Bechion. Officinae vocant vngulam caballinam.

**Buglossum.** Buglossum. Dioscoridis & antiquorum Buglossum est, quam hodie boraginem vocamus. Ei vero quam buglossam appellant officinae, respondet veterum Cirsion dictum. Itaque buglossum duplex erit, alterum minus, diciturque nostra vulgaris borago: alterum maius, quod Cirsion apud veteres dici monuimus.

**Sabina.** Duplex est, altera Cupresso similis, altera tarmarici. Germani seuerbaum, Galli saunier appellant.

**Corallina.** Muscus marinus. Officinae Corallinam vocant. In gracia ad vermes puerorum quasi presentaneo remedio vtuntur. Imo etiam purgare dicitur, etiam vim astringentem veteres ei ascripserunt.

**Minium.** Lemnium minium. Celsus minium vertit *μίλτον*. *Μα* nardus corrigit Barbarum, quod minium dixerit, non rubricam, ipse culpandus. Caterum officinae vocant Terram Sigillatam, quam multis annis fictitiam, imo etiam hodie vendunt, rubricam quandam ex terra sigillata & bolo armeno mixtam exhibentes. veram nunc Venetijs ex Lemno allatam habes: quae ibi in colle quodam fuluo colore nas-



nasceatur. olim Dianæ sigillo eam imprimebant, unde etiam sphra-  
is dicitur. nunc Turcico insignita est.

Terra armenia. Hactenus globulos quosdam in medio im-  
pressos ex Germania allatos pro bolo armeno officina vendiderunt,  
terus autem bolus armenus est, terra illa sigillata turcicis lite-  
is, si supremam & inferiorem partem auferas. nam cum in Tur-  
ia imprimunt, adiungunt sabulum album, ut melius signum reci-  
iat.

Senecta anguis. Hoc est exuuium, quod verno tempore depo-  
unt.

Nuclei acinorum vux. Græcus codex deprauatus est, qui ha-  
et  $\psi\upsilon\chi\alpha$  hoc est frigidi. pro  $\sigma\upsilon\upsilon\upsilon\alpha$  quod est acerbi. Dioscorides dixit  
 $\tau\upsilon\pi\sigma\iota\alpha$  hoc est astringentes. Orosius omisit. Gemusaus inuitus cō-  
edit ita legendum, dissimulans me id antea annotasse.

Gingidium. Paulus siccare dicit ordine tertio: Galenus  $\lambda\alpha\gamma\alpha$  Nota.  
 $\sigma\iota\lambda\iota\sigma\tau\epsilon\pi\alpha\upsilon\alpha\pi\sigma\sigma\alpha\iota\upsilon$  hoc est secundo ordine vel abscessu.

Pollen farinaceus. Tritici intelligendum est.

Teda. Teda proprie dicta, à græcis  $\tau\acute{\alpha}\varsigma$  &  $\tau\acute{\alpha}\delta\iota\upsilon\upsilon$  vocatur. sui Teda.  
generis arbor in Illyrico est: redundantior humore quàm reliqua,  
parcior liquidiorque quàm picea. flammis & lumini sacrorum quo-  
que grata. Improperie tedas appellamus, tum picea satiniæ partes imas  
tum alia quoque ligna, quæ flamma olei vel picis illitu concepta fa-  
cule modo lucent.

Daucos. Vero dauco caremus, qui in Creta nascitur, Noster dau-  
cus in officinis est species pastinacæ sylvestris. Cum autem easdem vi-  
res habeant, nil refert hoc loco dauci uti.

Dictamnus. Hanc non habemus. In Creta tantum nascitur. Vn-  
de facile haberi potest, quam officina pro Dictamno vendunt, non Dictamnus.  
est, nec etiam pseudodictamnus.

Dracunculus. Duplex est: maior, & minor. maior Serpentaria  
in officinis appellatur.

Quercus. Quod sub glandis corio. Dioscorides etiam habet. Tu-  
nica glandis putamini subiecta.

Ehenus. Paulus habet græce  $\alpha\delta\iota\sigma\tau\epsilon\pi\alpha$  nullo sensu pro  $\alpha\delta\iota\sigma\tau\epsilon\pi\alpha$ . Orosius.  
 $\sigma\iota\lambda\iota\sigma\tau\epsilon\pi\alpha$ . Sic etiam Dioscorides Orosius non aduertit, nec Basi-  
liensis castigat.

Veratrum. Olim veratrum album in usu frequentissimum erat:  
nunc nigrum, id quæ solum forte quod illud molestius euacuet. At ve-  
ratrum album si recte correctum exhibeatur, citra molestiam purgat,  
maxime atra bile laborantes, & lue hispanica.



**Hermody-  
lus.**

**Hermodylus.** alius hic est ab eo quem officina hermodactyli  
appellant. *Hermodylus* serapiones duo comprehendit, ephemerum,  
& colchicum. Illud non lethale, hoc perniciosum. Sed in Italia colchicum  
minus noxium est: officinarumque hermodactylus, colchicum existit.  
Solvit ad sanguinem usque. Ephemero caremus.

**Eupatorium.** Eupatorium antiquorum est nostra agrimonia:  
quid autem nostrum Eupatorium sit adhuc me nescire fateor.

**Spelta.**

**Zea** In Germania inferiori, & Italia speltam appellant.

**Zithus.** Potus est ex ordeo aqua resoluta. vocant ubique cerevisia:  
quanquam ea ex alijs etiam frugibus fieri solet.

**Ifatis, Glastum** latini vocant. Galli **Guadam.**

**Caucamum.** Serapionis lacca est, non autem ea quam officina  
vendunt. Tria enim nomine laccae veneunt: unum verum caucamum:  
alterum grana quaedam arte facta: Tertium unde color carmesinus  
confit.

**Cadmia.** Manifestus error in graeco. Legendum enim βορβυτις  
**Orosius.** λεπτομερής παλαιός δὲ παχυμερής. Orosius omisit *Gemu-*  
*sus* dissimulat me annotasse.

**Calamintha, Nepita** Romanis vocatur. Tres sunt species. Prima  
folijs ocymi, altera odore pulegij habet. Tertia folijs mentastri. Offi-  
cina secundam vocant herbam cattorum. Tertiam calamentum, quae

**Calamin-  
tha.**

ceteris est ignavio. Quidam secundam speciem proprie Nepitam à  
Romanis nominari dicunt. Galenus autem libello de paratu facilibus  
inquit, Calamintham absolute Nepitam Romanis appellari.

**Caros.** Officina Carui appellant.

**Cubebae.**

**Carpesium.** Myropola Cubebas nominant.

**Nux.** In graeco deesse aliquid ex dictione λήρυ intelligo. Nam *Ga-*  
*lenus* ita habet, λάρυα τὸ δένδρον ἐξ ᾧ μύριτι λήρυ τοῖς βλαστοῖς τυ-  
πνικόν, λήρυ τοῖς φύλλοις. Tu igitur hinc restitue. Castigatores ne-  
glexerunt.

**Cassia.** De Cassia odorata hic intellige. Cassia fistula antiquis  
eadem erat quae odorata. Officinarum Cinamomum, seu canella vi-  
lioris frustra, Cassia illa antiquorum videtur. Nunc autem vulgus  
cassiam fistulam accipit pro siliqua illa humore nigro intus plena,  
veteribus incognita, qua purgamus hodie bilem.

**Cerasia.** acida inquit conueniunt phlegmaticis & excrementosis  
stomachis. Male in codice graeco legitur φλεγματώδεις καὶ φλεγμα-  
τικοῖς. Mutanda autem ex Galeno φλεγματώδεις καὶ περιττωμα-  
τικοῖς. quod Censores nostri non annotarunt.

**Ceratonix.** Pauli codex graecus habet, ξηραυτικὸς ὅτι καὶ ψυκτι-  
κός.



is. hoc est siccantis facultatis est & refrigerantis. Galenus pro  $\psi\upsilon\pi\iota\varsigma$ . Notā  
 is, legit  $\tau\upsilon\pi\iota\upsilon\varsigma$ . hunc nos sumus imitati. non admonuerunt casti-  
 atores.

Galla. Duo gallarum genera tantum in vsu medicorum sunt:  
 unum solidum, alterum perforatum. aliorum complurium nullus est  
 vsus.

Cinamomum. Hoc caremus. Nam quod nos Cinamomum, aut  
 canellam vocamus cassia potius fistula antiquorum existit. Nam ci-  
 namomum fistula aut canella non est, sed arbutum. vide Galenum  
 de Antidotis.

Hedera. Quod officinae gummi hederae, appellant, non est lachri-  
 ma hederae, sed alterius cuiusdam arboris quam ignoramus. potest au-  
 tem haberi lachrima vera hederae.

Cichoreum. Paulus vocat cichoreum, syluaticam serem, seu in-  
 tybum. Graci tamen alij cichorei vocabulo tam domesticā, quam agre-  
 stem appellant. Domestica duplex est. una latioribus folijs, lactuca  
 similibus quam vulgus corrupto vocabulo Endiuia quasi intybum  
 nuncupant. Altera striclioribus folijs. Officina has duas scariolam  
 quoque nominant. Iam syluatica etiam duplex habetur: ac proprio no-  
 mine cichoreum seu picris ab amaritudine dicitur. Quamquam graci  
 alij cichorei nomine, tam domesticam quam agrestem serem accipiant.  
 At quam hodie vulgus herbariorum Endiuia ostendit in aruis  
 sponte nascentem, folio lactuca pusillo, aculeato, caule spinulis horrido,  
 candicante, cui succus inest lacteus, syluestris lactuca existit.

Clematis. Bis habetur in codice graeco  $\lambda\epsilon\mu\alpha\tau\iota\varsigma$  pro  $\lambda\epsilon\mu\alpha\tau\iota\varsigma$ .  
 non emendarunt censores.

Cnicus. Officinae Cartamum appellant.

Gummi. Arabicum intellige, absolute dictum.

Lixiuum. Protofacton. multi etiam celebres viri transtulerunt  
 cinerem qui primus distillauerit, verum ideo non est dictum lixiuiū  
 protofactum, sed quod primarium sit lixiuium, & principale.

Costus. Vero costo caremus. Potest autem ex Arabia, aut Syria  
 haberi.

Hordeum. Polenta graci  $\alpha\lambda\phi\iota\varsigma$  dicitur. Est autem proprie  
 ordeum torrefactum. Ptisana vero ordeum decortcatum.

Cyclaminus. Duplex, prima species panis porcinus officinis, aut  
 Rapum terrae latinis à rotunditate dicitur. Altera Sigillū Mariae,  
 officinis appellatur.

Lichen. Haec est herba, quam officinae hepaticam nominant, ioci-  
 norum sibri similis.



Leucoion. Per se signat violam albam quam gariophyllatam albam vulgus nominat. Refertur tamen nomen hoc leucoion, etiam ad omnes alias violas: praesertim ad eas quae primo vere nascuntur, siue albae, siue purpureae, siue luteae fuerint. Apud Columellam, habetur. Leucoia candida.

Fuligo. Fuliginem pini, coni, & piceae acriorem esse prodit. Mirum in modum variant interpretes in his vocibus reddendis, misereque se torquent. Γαζα πύκνω transfert pinum: πύκτις, piceam. Κώνον, Conum. Hunc fere secutus est Marcellus, nisi quod πύκτις exponat tedam. Conum autem nucem pineam interpretatur: ut accipit Dioscorides, alijque veteres graeci. Galenus autem Conon arborem appellat, fructum eius, hoc est nucem. Κόνναλον, & Τρόβιλον. Atque hoc pacto apud Paulum accipi debet.

Lapides. In graeco est μέροξ, lege μέροξ. Dioscorides vocat μέροχθον. alij etiam μέροχθον.

Lycium. Officinae verum Lycium non habent.

Atramentum Indicum. Dioscorides vocat lapidem Indicum, praeterea astringentis esse naturae tradit. unde codex Pauli graecus emendari debet. legendumque: τῶν στυφόντων pro τῶν ψυχόντων, quod Orosius non annotauit. Gemusaeus dissimulat me id ostendisse, textumque relinquit deprauatum.

Melantheria. Verti, creta sutoria, ex Scribonio qui ea caligulas calceamentorum tingi scribit.

Melanthium. Nigella est. Quam officinae ostendunt, vera non est. Nam semen est sublaeuum, cum nigrum esse debeat, acutum: boni odoris. Galli melle noyre, Germani ratten appellant.

Myxa. Officinae Sebestem nominant.

Oenanthe. Duplex, una solani folijs herba, quae vitis non est, sed ob fructum racemosum vitis appellatur. Altera labrusca, quae à vite domestica nihil differt, nisi quia syluestrem habitum referat, nec colitur. vocant Oenanthe, labruscae flores, quanquam & herba sit eiusdem nominis.

Opos. Codex Pauli Graecus ὀπίον habet, Galenus ὀπ. Superius de lachryma papaueris quae opium dicitur, actum est. Hic de laserpitij liquore: qui partim beluinum partim assa fetida dicitur officinis.

Eruum. Dubitatur, an officinarum eruum verum sit. nam intus flauescit, cum album esse debeat.

Orminum. Vulgus in Gallia vocant: Toute bonne, aut Balsamitie.

Ory



Oryza. *Vulgus Rixum* appellat, prima adempta litera.

Rizum.

Petroselinum. Verum petroselinum non habemus, forte nostrum est apium hortense, quod Dioscorides condimentis accommodatum dicit.

Peuce. Vbiq; interpretes graecorum *πεύκω* pinum, interim pinastrum reddunt.

Pistacea. Officinae phistica nominant, aut physticorum grana. co Phystica. dex graecus male habet *λεπίωρ*, pro *λεπώρ*. Non emendarunt censor Oroscius, res nostri.

Pityides. Dioscorides pini, piceaq; fructus nominat. Galenus picea tantum, illosq; abuti dictione ait qui vtriusque arboris fructum ita appellant. Sunt autem interni nucum pinearum nuclei.

Poligonatum. Officinae Sigillum Mariae, vel Salomonis dicunt, sigillum. item genicularem & fraxinellam. Mariae.

Pompholyx. Officinae Tutiam nominant, codex Graecus *σαπύω* Tutia. dicit hoc est carnosus ulceribus, pro *λαγυνώδης* habet. Non aduerterunt Aristarchi nostri.

Propolis. Vnguentarij Ceram virgineam nuncupant.

Resina. Dici non potest, quam interpretes Graecorum tum antiqui, tum recentiores in arborum quae resinas fundunt, nomenclaturis euariant. E pinu dixi, quam Graeci *πεύκω* vocant, hanc Marcellus Thedam exponit, quae ratione, ignoro. Gaza, Hermolaus pinum aut pinastrum. Strobilena. Hermolaus verit, Resina è Strobilo, ut haec etiam sit arbor. Nam Plinius de pinu & pinastro agens, easdem arbores alio nomine esse per oram Italiae, quas strobilas vocant, plerique arbitrantur &c. Eadem igitur arbor est strobilus, quae Conos superius dicta est, pineas nuces ferens. Ruellius interpretatus est Resinam Strobilinam quae ex nucibus pineis fiat: secutus Plinium, qui sextodecimo libro inquit, pinus fert minimum Resinae, interdum ex nucibus ipsis. Itaque confundunt haec nomina *πεύκω*, *λεπώρ*, *στέβιλον* addit etiam *πύριον*, pro pinu, aut pinastro, aut picea, cum inter se etiam viribus respondeant, eoq; minus periculi est in expositionum diuersitate.

Notanda

Rhus. Officinae sumach appellant.

Sagapenum. Sepalsiarj Serapinum vocant.

Sandaracha. Officinae veram sandaracham non habent, aut saltim sandaracham ignorat, vernice teā vocantes, vera autē est quae in argenti fodinis cum auro & argēto inuenitur, flāmeo colore rufescit, ita ut cinnabarim quasi referat, odore sulphuris virus. Id quod in auripigmento rubrum vera.



est. vera est sandaracha, licetque auripigmento loco sandarachæ uti, cum idem quasi sint, simulque, alterum alteri iunctum ex fodinis colligantur. Hoc solum differunt, quod auripigmentum nondum à natura perfectum sit: sandaracha autem per concoctionem naturæ, debitum colorem acceperit.

Seseli. Tria sunt genera seselios, Mafiliense, Aetiopicum, & peloponnesiacum. Mafiliensis descriptio conuenit cum nostro, sili montano, ut vocant vulgares. at quod officinæ ostendunt, Aethiopici semen videtur. facillimum est, verum comparare.

Sylphium. Laserpitium herba est. Liqueor Laser vocatur. Affertur partim ex aphrica. armenia, & india, suauissimo odore, præsertim cyrenaicum. unde etiam liqueor Cyrenaicus apud autores vocatur. atque hic officinis dicitur, assa odorata. seu belzuinum partim ex Media & Syria viroso odore, quod liqueorem Medicum, & Syriacum nuncupant, officinæ vero, assam foetidam.

Sisymbrium. In Gallia officinæ mentam aquaticam appellant. In Italia Menta florentina vel menta gentilis aut nobilis. Nam magis odoratum est. Nisi colatur, in nepetam degenerat.

Scammonium. Officinæ raro verum habent.

Scolopendrium Seplasiarum Ceterac existit.

Scordion. In fine sententiæ legitur in græco codice ἐπιπλάττω, pro ἐπιπλάττω, µόνον. croco enim illini sed inspergi sicca debent. Castigatores præterierunt.

Orosius.  
Mirrha.

Mirrha. Quam officinæ vendunt mirrham, est deterrima species mirrhæ. Optima subuiritidis esse debet: confracta, candida vnguium modo. Legitur rursus in codice Græco male ὑδιπλάττω, µόνον, pro ἐπιπλάττω, µόνον. Nec hoc annotarunt censores nostri.

Orosius.

Aluminis  
species.

Solanum. Vulgus Solatrum nominat.

Alumen. alumen scissile officinæ vocant alumen plumæ, nimirum quod si frangitur, capillamenta ipsius, veluti pluma esse videatur. Alumen rotundum raro in officinis inuenitur. nonnunquam tamen inter figulorum lapides conspicitur, quibus vtilis plumboque mistis, vitrum paternum & laucium parant. Alumen liquidum, vocat seplasia, roche alumen. cum foditur, liquidum est, postea durefcit: & si igni admoueaturs rursus liquefcit. Quod placitum & latercularium à Galeno & Paulo nuncupatur, forte est officinarum alumen scaiolæ, ex Gipsi fodinis, pellucens tanquam subtilissima ipsius portio. Sunt adhuc alia aluminis Genera in officinis sed fictitia, Zuccarinum, quod ex alumine liquido aqua rosacea, & albumine oui conficitur. Mulieres hinc fucum parant. Item alumen catinum ex her



ex herba quadam cali vulgo dicta. quæ autem sit adhuc ignoro.

Styrax. Officinæ storax dicunt. Sed quam illæ vocant, styra- Styrax.  
cem liquidam vocant, mirra est stacte. Calamitis autem storax, Stactæ.  
verus styrax est de quo veteres tractant.

Simphitum. Variant sententiæ recentiorum in huius herbe cogni- Nota.  
tione. Adiectum est in codice Græco γλισχόν τι ὑγὴ λευσμῶδες. Ga-  
lenus habet γλισχόν τι ὑγὴ δαννῶδες, quod est viscosum quippiam  
& mordax.

Schœni anthos. Officinæ squinanthos corrupto vocabulo appel-  
lant. verti ego odorati ad differentiam palustris, & rotundi, ad dif-  
ferentiam quadrati seu angulosi. Sæpe autem alterum tantum adij-  
cio, vel odorati, vel rotundi.

Calx. Perperam in codice græco erat. σωτρίαι pro ὀφθαλμιαί hoc Orosius.  
est calefacit. Orosius non aduertit. Gemuseus dissimulat me id an-  
te eum annotasse.

Tragus frumentaceus. Ita dicitur, vt ab herba distinguatur  
Nam herba quadam etiam Tragos dicitur.

Altercum. Deerat in codice græco τῶν ψυχόντων. Inslaurauit  
ex Galeno. Orosius libenter, omisit, & si necessario addatur. Gemu-  
seus fingit se in exemplari antiquo inuenisse: sed textum tamen im-  
pressum, mutilum edidit.

Aes. In siccioribus corporibus conuenire dicit ad cicatricem ducen-  
dam. Sin autem eluatur, in teneris vltima clausula, deerat in codi-  
ce Græco, necessario addenda, propter superiorem sententiam, nempe  
in siccioribus, hoc est duris. Legendum itaque venit, εἰ δὲ πλεονέχῃ το  
ἀπλύτου ἐπὶ τῶν ἀπαλασσομένων χρησιμότητος. Ad verbum fere ex  
Galeno. Non obseruarunt censores nostri.

Chamædrys. Quasi dicas humilis quercus. vnde etiam vulgus,  
querculam minorem appellat.

Chamæpitys. Hoc est humilis pinus aut picea. officinæ Iuam Iua musca-  
muscatam vocant hanc antiquorum chamæpitin. ta.

Chrysocolla. Officinæ vocant Borax.

Ocymum. Vulgo Basilicum dicitur.

## IN IIII. CAPVT.

**A**D affectum induratum. Recte dixit μοχλεῖσθαι quasi ve-  
ste quadam agitare. Male autem in codice græco ὀκνηρῶμι-  
νῶ pro ὀκνηρῶ μὲν. neglexerunt castigatores.

Sed etiam à nervis & neruosis partibus. Orosius diligens vt  
ipse sibi videtur, castigator, legit in codice græco ἀπὸ πλεονέχῃ, quod  
est à costis aut latere vt idem vertit, pro ἀπὸ νεύρων. Aetius & Ori



bafius nobiscum sentiunt.

Elaterium. Paulus aliter quàm Dioscorides Elaterium commendat porraceum. Nam candidum colore optimum videtur Dioscoridi. nisi porraceum aliter intelligi debeat, quod Græci  $\pi\omicron\rho\rho\alpha\kappa\epsilon\iota\omicron\nu$  nominant.

Lathyrides. Species Tithymali est. Capit hic Paulus Lathyrides pro ipsis granis fruticis, cum alioquin lathyrus ipse frutex vocetur. Dioscorides, & Aetius  $\sigma\pi\sigma\mu\acute{\alpha}\tau\iota\alpha$  hoc est grana Lathyridis septem aut octo propinant.

Polypodium. In Græco codice est  $\epsilon\pi\iota\pi\lambda\alpha\delta\acute{\alpha}\sigma\alpha$  pro  $\iota\delta\iota\pi\alpha\delta\acute{\alpha}\sigma\alpha$ . Non emendarunt Aristarchi nostri.

## IN V. CAPVT.

**C**olocynthidis medullæ. Hæc sunt Catapotia, quæ officinæ vocant Cochias. Deprauata autem est scriptura in codice Græco, habet enim  $\alpha\lambda\omicron\upsilon\varsigma$   $\mu\epsilon$ .  $\alpha$ . hoc est, aloes pars vna. Gale. vnde Paulus transcripsit, libro primo de compositione medicamentorum secundum locos,  $\alpha\lambda\omicron\upsilon\varsigma$  habet  $\mu\epsilon$ .  $\omega$ . hoc est partes duæ. Castigatores omiserunt.

Purgatio ex malis cotoneis. Nimis magnum videtur pondus piperis, nempe vnciæ sex forte drachmæ sex.

Oliuæ purgantes. Habetur in compositione oliuarum colymbadum, scissarum, hoc est, ut melius perfundi liquore possint. Aetius libro tertio, inquit, oliuas sigillatim tribus scissuris insectas in eodem liquore aliquot diebus conficito & vtere.

Catapotia ex lapide armenico. Scammonie pondus erat nimis grande, vnciæ sex, mendumq; in codice Græco esse puto, nam legitur  $\tau\omicron$  .s. hoc est vnciæ sex pro  $\tau\omicron$  o. S. quid est semuncia facilis lapsus, cum quasi eadem litera vtriusq; facies sit.

Vbi venter inanitus. In Græco lege post  $\lambda\epsilon\upsilon\omega\sigma\iota\nu$ ,  $\gamma\alpha\tau\epsilon\rho$  &. Nō fuit versa in  $\gamma\alpha\tau\epsilon\rho$  &,  $\delta\epsilon\phi\lambda\omicron\upsilon\varsigma$  dictio, ut putat Castigator Basiliensis. Orosius hunc & superiorem locum præ studio omisit.

Puls. In titulo est Græce  $\omega\delta\iota\delta\iota\nu\omicron\iota\varsigma$  tu fac  $\iota\delta\iota\delta\iota\nu\omicron\iota\varsigma$ , quasi oedematosis.

## IN VII. CAPVT.

**F**riktionē & medicaminum potu. non purgantium, sed obtundentium vim medicaminis præsumpti, intelligito.

## IN VIII. CAPVT.

**M**ellis quod sufficit. Post  $\tau\omicron$   $\alpha\phi\upsilon\sigma\iota$ . In codice Græco, adde,  $\alpha\lambda\lambda\omega\varsigma$ . Hoc est aliter. omiserunt censors nostri.

Hiera Archigenis. In Græco cod. pro  $\omega\delta\iota\delta\iota\nu$  quidā  $\phi\upsilon\lambda\lambda\alpha$  legūt.



## IN X. CAPVT.

**P**Ræcipuè induratis. Melius in codice Græco legitur τῶν δεικνύμενων pro τῶν δεικνύμενων, quod est scyrrho obductis. Nam scyrrhus nunquam potest emolliri aut discuti, aut medicamentis intro sumptis amoueri.

Apij radices. Apios herba est, cuius radices alia pars sursum, alia infra purgat, ne putes hic apium, quod Græci ὄλιον dicunt, intelligi.

Purgatio paulatim respondeat. In Græco est λατὰ λόγον, factu λατ' ὄλιον, neglexerunt castigatores.

## IN XI. CAPVT.

**H**edychroi. Paulus ad verbum quasi ex commentario Galeni; ad Pamphilianum transcripsit: sed exemplaria mirum in modum variant.

Carpobalsami. Huc vsq; conueniunt scripturæ: Galenus in citato libello Carpobalsamum non habet: verum primo de Antidotis, opobalsamum addit: non Carpobalsamum. Præterea in ponderibus dissentiunt, & in nonnullis alijs simplicibus medicamentis. Galeni itaq; ad Pamphilianum codex ita pergit, Iunci odorati floris drachmæ duodecim, secundum alios, vigintiquatuor. Cinamomi drachmæ duodecim, amomi, Casie, rhapontici singulorum drachmæ quindecim, nardi indicæ, folij singulorum drachmæ sedecim, myrrhæ, croci, singulorum drachmæ duodecim, vino falerno excipito in opobalsamum manus intingens. Alia habetur in commentario de Antidotis, sed variat magis.

Pastilli scillini. Carnis ipsius partes duæ, hoc est, ut Galenus ait drachmæ centum viginti, erui farinæ drachmæ sexaginta.

Pastillorum Hedychroi. Deest in Græco ἀπρίονον. Antea verteram magmatis hedychoi, secundum Galenum de Antidotis, quod Oroscius reprehendit sine causa.

Rosarum siccarum drachmæ duodecim. Textus Græcus habet. <.ii. hoc est drachmæ quindecim. Oroscius castigans locum, ait legendum <.ii. quod est drachmæ undecim. Ego <.iβ. hoc est drachmæ duodecim, scribendum esse iudico Galeni exemplaribus tum de Antidotis, tum ad Pamphilianum, tum versibus Andromachi consentientibus.

Napi feminis. Galenus adiicit ρογγύλιον & ἀγρίον, quod est Rapi sylvestris, præterijt Oroscius.

Dictamni. Post dictamni habetur in Græco ἀνθός, quod expungi debet. Oroscius ex Galeno.

Mastic



Masticha Chia. Pauli codex Chia non habet. Ex Galeno addendum.

Cassia nigræ. Galenus Cassia fistula nigra.

Nardi Indicæ. Paulus  $\nu\alpha\rho\delta\omicron\sigma\tau\acute{\alpha}\chi\upsilon$  & hoc est spice nardi. Sed Galenus ubiq; nardi indicæ habet, quanquam Aetius spice nardi etiam legat. Post nardi Indicæ, deest pondus in Græco < .s. hoc est drachma sex.

Carpobassami. In Codice Græco tantum erat  $\beta\alpha\lambda\sigma\acute{\alpha}\mu\omicron\nu$ . Ex Galeno instaurandam  $\lambda\alpha\rho\pi\omicron\beta\alpha\lambda\sigma\acute{\alpha}\mu\omicron\nu$ .

Phu pontici. male legebatur in Græco  $\phi\upsilon$ ,  $\delta\pi\upsilon\varsigma$  pro  $\pi\omega\upsilon$   $\pi\omega\upsilon\iota\upsilon\varsigma$ .

Centaurij. Omnes Theriaca descriptiones apud Galenum habent  $\lambda\omicron\nu\tau\alpha\upsilon\rho\iota\omicron\nu$  quod est centaurij tenuis.

Liquore hypocisthidos. Perperam in Græco  $\delta\pi\upsilon\omicron\nu$   $\psi\omicron\pi\omicron\iota\delta\iota$  & pro  $\delta\pi\omicron\nu$   $\psi\omicron\pi\omicron\iota\delta\iota$  &.

In nephriticis cum mulso. Male Græcus codex habet  $\epsilon\pi\iota$   $\nu\epsilon\phi\rho\iota\tau\iota\kappa\omega\upsilon$   $\mu\epsilon\tau'$   $\delta\epsilon\upsilon\mu\acute{\epsilon}\lambda\iota\tau$  & pro  $\epsilon\pi\iota$   $\nu\epsilon\phi\rho\iota\tau\iota\kappa\omega\upsilon$   $\mu\epsilon\tau'$   $\delta\iota\nu\omicron\mu\acute{\epsilon}\lambda\iota\tau$  &, ex Galeno castigatum. Basiliensis castigator omisit.

Sumuntur viperæ. Ex libello Galeni de Theriaca ad Pamphilianum ad verbum sunt transcripta nisi quod deest in illo,  $\alpha\pi\upsilon$ .

Rutæ sativæ seminis libra. Paulus habet  $\zeta$ .  $\beta$ . hoc est sextarij duo, male nimirum pro  $\lambda\iota$ :  $\alpha$ , ut habet Galenus, omisit, Oroscius.

Malabathri foliorum. Codex Pauli habet singulorum vncia. Galenus vncijs quatuor. Ita etiam Aetius. Neglexit Oroscius.

Thymi summitatum. Hic quoque castigandus codex. Legendumq;  $\gamma\omicron$ .  $\beta$ . pro  $\gamma\omicron$ .  $\beta$ . secundum Galenum & Aetium.

Piperis nigri, fœniculi singulorum libris. Male in codice Græco Pauli  $\lambda\iota$ .  $\alpha$ . habet pro  $\lambda\iota$ .  $\beta$ . sed facilis error erat, ponere  $\omega$ . pro  $\alpha$ . primum signat.  $\beta$ . secundum, literam  $\eta$   $\tau\alpha$ , quam Latini in e vertunt. valet autem in numero, octo.

Tordyli montani. Deest in codice Pauli, ex Galeno plane restituendum. Neglexerunt Oroscius, & Gemusæus, tanquam non addenda compendio.

Philonis antidotum. In Græco est  $\psi\omicron\sigma\upsilon\nu\acute{\alpha}\mu\omicron\varsigma$  < . $\eta$ . ubi legendum  $\psi\omicron\sigma\upsilon\nu\acute{\alpha}\mu\omicron\nu$  < . $\alpha$ . quod praterierunt Aristarchi nostri.

Esdra. in fine compositionis quidam legunt  $\sigma\iota\gamma\epsilon\omega\varsigma$  hoc est intybi pro  $\sigma\iota\sigma\acute{\epsilon}\lambda\epsilon\omega\varsigma$ .

Medicamentum Cyphoides. Textus Græcus & mutilus, & depravatus est. Legendum enim  $\lambda\iota\alpha\lambda\acute{\alpha}\mu\omicron\nu$  < . $\beta$ .  $S$ .  $\beta\delta\epsilon\lambda\lambda\iota\omicron\nu$  < . $\beta$ .  $S$ .  $\kappa\alpha\alpha\iota\alpha\varsigma$  < . $\alpha$ .  $S$ .  $\lambda\iota\nu\alpha\mu\acute{\omega}\mu\omicron\nu$   $\tau\epsilon\iota\omega\delta\omicron\lambda\omicron\nu$ ,  $\nu\acute{\alpha}\gamma\delta\omicron\nu$   $\sigma\iota\acute{\alpha}\chi\upsilon$  & < . $\gamma$ .  $\sigma\chi\epsilon\iota$   $\nu\delta$



πρὸ ἀνθους < .β. S. Oroscius & castigator Basiliensis reliquerunt  
textum deprauatum.

Compositio atactos, Piperis albi & nigri. Deest in codice  
Græco τωπίρεως. Oroscius omisit.

## IN XII. CAPVT.

**T**erra samia cum cremore ptisanæ. In Græco est διὰ χυλῶ  
τῷ σιᾶνους, forte μετὰ χυλῶ. Notauit etiam Oroscius. Gemu-  
seus autem omisit.

Herbæ pulicaris succo. In fine capitis puto Græcum codicem  
esse deprauatum: quàm proxime autem licuit, ad veritatem conuertit.

## IN XVI. CAPVT.

**S**iquidem vino aut succo. Codex Græcus hic rursus depraua-  
tus est. Habet enim, εἰ μὴ οἶνον ἢ χύλω τινὶ λασύντε καὶ φίλῃ. Iectio Græ-  
cæ pro εἰ μὴ οἶνον καὶ φίλῃ δὲ αὐτά. Neglexit castigator Ba- ca depraua-  
siliensis. ta.

## IN XVII. CAPVT.

**O**esypo. In principio Capitis Græcus codex habet, ὁ οἶσπῳ pro  
οἰσύπῳ hoc est Oesypo. Aristarchi nostri præterierunt.

Lixiuu è ficu cui calx. Græci hoc lixiuium vocant λιγίαν πο-  
τόσσαντον. Oroscius, αλύγ; multi vertunt, lixiuium quod primum di-  
stillauerit. Paulus autem libro septimo ipse interpretatur, lixiuium  
cui calx sit admixta. Oroscius.

Emplastrum ex dictamno. Textus Græcus deprauatus corrigi  
debet ex Galeno de compositione medicamentorum secundum genera  
in hunc modum λεπίδῳ < .S. χαλκῶς λιγαύ, μέλι < .η. ἀλοῆς. < .η.  
χαλδάνης. < .ιβ. ut nos vertimus.

Aristolochiæ rotundæ & longæ drachmæ quatuor. In em-  
plastro dia cinnabareos codex Græcus habet post pondus præscriptum  
το. S. quod est semuncia. Sed quatuor drachmæ valent semuncia.  
puto superfluum. Neglexerunt Castigatores.

Olei veteris. In fine Emplastri ex lapidis asij flore. Græcus co-  
dex superflue habet ὄξους ἀγυμιτάτου. Nam superius mentionem a-  
ceti fecerat Paulus. Oroscius & Gemuseus omiserunt.

## IN XVIII. CAPVT.

**S**ertulæ campanæ. In malagmate polyarchio, Deest μελιλύ-  
τς. Instauratum ex Galeno. Neglexerunt hoc correctores.

Pentamyron. In medicamento quedam sunt superflua, & no-  
men ipsum Græcum indicat, quinque tantum significans. & Oriba-  
sius consentit. Ita autem sonant ea quæ adiiciuntur. folia tum, phyl-  
li vnciæ tres, ammoniaci vnciæ. Castiæ vnciæ sex, Ladani &c. aut  
in fine



in fine addendum, ladanii vnciae sex.

Seui Taurini. In medicamento diaspermato deest codici *Græco* λτ. Vi sit seui Taurini libra. Sic etiam habet *Alexander medicus*. omisit *Orosius* & *Castigator Basiliensis*.

*Copton*. Sic dicitur medicamentum, quod non coquitur, verum tunditur, & succis aut liquidis affusis, ad figuram malagmatis redigitur.

## FINIS LIBRI VLTIMI

COMMENTA-

RIORVM.

\*

## ERRATA GRÆCARVM

aliquot vocum in *Pauli commentarijs*. Prior numerus folium, secundus verò paginam indicat.

\*

Folio 663. 19. lege ἀνῆται. 664. 19. ῥάχεως. ἐμπροδην. eod. 20. φλεγμαίνη. eod. 37. ποιοτήτων. ἀρ. 665. 39. νήσιος. 673. 20. ἀλαφῆ. 674. 27. διωάμεis. 697. 20. προνοῖται. φοφῶρ. 21. ἐκκρίσιως. 699. 28. προσπλατῆ μῆνον. 707. 10. ἀδιστραφέους. 727. 16. ἀναγωγῆ. 30. δειμύτι καὶ. 728. 13. παρχημήν. 731. 5. πολλήν. 23. ἐπιτομάχω. 733. 33. λοινά. 734. 6. γίγνεται. 736. 19. ἄλλως. 735. 27. ἀναπυσσάτω. 741. 30. νυστάζονοι. 31. ὑπνώττοντες. 744. 37. διαφκλάφης. 745. 34. ἑραστία. 746. 20. ἀπορρύψαντα. 841. 26. ἀπαλασάρκων χρησιμώτερον. 773. 8. ἀποβεβρυμένων. 775. 13. οὐλη gingiva. 782. 16. ἀτμῶδες. folio eodem. σῆλα. 784. 9. pro decentia lege decidentia. 791. 36. τακῆν. 792. 22. ῥήγινος. 801. 20. ἑς. 812. 16. πηλοποιήσιν.



Lugduni,  
EXCVDEBAT  
PHILIBERTVS  
ROLLETIVS.









# INDEX EORVM

## QV AE HOC O P E

### RE CONTINEN-

### TVR.

\*



Baptismus instru-	436	Absinthium	481
mentum		Acacalis	471
Abdominis inte-		Acacia	ibid.
rrioris membrana		Acalyphe	471
vulnera quomodo		Acaniha Aegyptia vel arabi-	
manu curentur.	398	ca	472
Abdominis suendi ratio	399	Acaniha leuce	ibid.
Abies	491	Acanthium	ibid.
Abrafia quomodo curanda	286	Acanthobolon	382
Abrafia ab inflammatione quid		Acanthus	472
tueatur	ibid.	Aceratios emplastrum Gal.	619
Abrotanum	488	Acetabulum 510 & 658 & 659	
Abscessibus corporis exterioribus		Aceti fex	548
conuenientia medicamenta	289	Acetum	527
In abscessibus qualia corpora inue-		Acetum scillites 573. quibus uti-	
niri soleant	290	le	574
Abscessui quomodo manu scalpel-		Achores quid 113. unde oriantur	
loq; sit medendum	384	ibidem. quomodo curentur ibidem	
Abscessum in pus transysse quomo-		& 114	
do deprehendendum	ibid.	Achras	481
Abscessus medicamentorum	832	Acidorum vires	467
Abscessus quid	291	Acinos herba	472
Abscessus rumpentia	290	Acini mali punici	536
Abscessuum generatio	291	Aconitum	472
Note	ibidem & 30.4	Aconiti poti nota 356 Remedia	
Abscessuum neruicorum medica-		ibidem	
menta	290	Acopa unde dicantur 231 & 633	

\*



# INDEX.

652		<i>Acutus morbus exacte non exacte</i>	
<i>Acopa calefacientia quibus con-</i>	713	<i>Acutus morbus</i>	ibid.
<i>stent 633. eorum vsus</i>	ibidem	<i>Acutus ex decedentia</i>	714
<i>Acopa emollientia quibus conue-</i>	ibid.	<i>Adarce tantum acrimonia &amp; ca-</i>	
<i>niant</i>	ibid.	<i>loris habet vt extrinsecus cum alijs</i>	
<i>Acopa quam spissitudinem habe-</i>	ibid.	<i>imposita vrat.</i>	470
<i>re debeant</i>	ibid.	<i>Adeps animaliu. 47. &amp; 542. suil-</i>	
<i>Acopon à varietate præcilon di-</i>	634	<i>lus ibidem caprillus ibidem anse-</i>	
<i>ctum</i>	ibid.	<i>rinus ibidem. gallorum. gallinaru</i>	
<i>Acopon a Zanite</i>	ibid.	<i>ibidem. leoninus ibidem. bubu-</i>	
<i>Acopon barbaricum dia euphor-</i>		<i>lus ibidem. vrsinus, vulpinus ibid.</i>	
<i>bin, ad coxædicum dolores, &amp; alia</i>	635	<i>viperinus ibidem</i>	
<i>pleraque</i>	ibid.	<i>Adeps marinum calidior &amp; sic-</i>	
<i>Acopon Basilij</i>	ibid.	<i>cior quàm fœminarum</i>	ibidem
<i>Acopon bromion</i>	634	<i>Adeps vetustate calidior redditur</i>	
<i>Acopon cui nomen est pyxis</i>	636		
<i>Acopon dysodes ex Gal. 638. aliud</i>	543	<i>Adglutinamenta</i>	600
<i>ibidem</i>		<i>Adianthum</i>	470 & 832
<i>Acopon ex abiete Gal.</i>	636	<i>Adolescentia atas</i>	666
<i>Acopon ex atramento librario, cu-</i>		<i>Adolescens mulier</i>	ibid.
<i>tis ruborem peculiariter inducens,</i>		<i>Aedaon</i>	470
<i>idq; potissimum in ijs quibus alte-</i>		<i>Aegilops</i>	771
<i>ra capitis pars dolet, ex commen-</i>		<i>Aegilops</i>	470
<i>tarijs Alexandri</i>	637	<i>Aegilops morbus quid. 149 &amp; 376</i>	
<i>Acopon ex nigra populo. 636 &amp;</i>		<i>curatio ibidem</i>	
<i>673</i>		<i>Aegirinum oleum</i>	641
<i>Acopon lysiponium</i>	635	<i>Aegiros</i>	470
<i>Acoron</i>	472	<i>Aegyptia artaba</i>	659
<i>Acorus nostra</i>	832	<i>Aegyptia, pessus</i>	648
<i>Acorus veterum</i>	ibid.	<i>Aegyptia spina sanguinè &amp; alias</i>	
<i>Acridas</i>	472	<i>fluxiones retinet.</i>	472
<i>Acrium vires</i>	467	<i>Aegyptia stomatica</i>	597
<i>Acrochordon</i>	233	<i>Aegyptia terra</i>	485
<i>Acroteria smos</i>	426	<i>Aema</i>	471
<i>Acron acraganthus</i>	87	<i>Aequinoctium vernu quid in ho-</i>	
<i>Aste</i>	472	<i>minibus efficiat</i>	55
<i>Aculeos extrahentia medicamen-</i>		<i>Aequinoctio verno quid facien-</i>	
<i>ta</i>	320	<i>dum</i>	ibidem
		<i>Aeq</i>	



# INDEX.

<i>Aequinoctium vernum dies habet</i>	<i>tio</i>	
<i>quadraginta sex vsq; ad vergilia</i>	<i>Aethale</i>	6
<i>rum ortum</i>	<i>Aethiopica olea</i>	469
<i>ibid.</i>	<i>Aethiopia</i>	490
<i>Aequinoctium autumnale quid in</i>	<i>Aetius Cappadox</i>	470
<i>homine efficiat</i>	<i>Aetonychon</i>	272
<i>56</i>	<i>Agallochum</i>	470
<i>Aequinoctio autumnali quid fa-</i>	<i>Agapeti compositio ad podagram</i>	469
<i>ciendum</i>	<i>584</i>	
<i>ibid.</i>	<i>Agaricum</i>	469
<i>Ab aequinoctio autumnali dies sunt</i>	<i>Agarici nigri damnum corpori affe-</i>	
<i>quadraginta sex ad occasum ver-</i>	<i>rentis remedia</i>	362
<i>giliarum</i>	<i>Agarici vires. 553 Dandi modus</i>	
<i>ibid.</i>	<i>et pondus. ibidem. Quale deligen-</i>	
<i>Aera lolium</i>	<i>dum ibidem</i>	
<i>471</i>	<i>Ageraton</i>	469
<i>Aeree aquae quibus conferunt</i>	<i>Ageratus</i>	517
<i>24</i>	<i>Agglutinamenta</i>	600
<i>Acrem morborum causam esse quo-</i>	<i>601</i>	
<i>modo cognoscatur</i>	<i>Agglutinamenta oculorum qui</i>	
<i>87</i>	<i>defluxionibus infestantur</i>	609
<i>Aereolus</i>	<i>Agnus</i>	469
<i>657</i>	<i>Agrinus sanguis</i>	471
<i>Aer intemperatus contrariae tempe-</i>	<i>Agrastus</i>	469
<i>riei confert</i>	<i>Agrioscordon</i>	540
<i>22</i>	<i>Aima</i>	471
<i>Aeris flos mixtus collyrijs palpebra-</i>	<i>Aizoon</i>	470
<i>rum et asperitates et ficas ex-</i>	<i>Alabastrites</i>	517
<i>terit. 552 quomodo coqui debeat</i>	<i>Alana terra</i>	486
<i>649</i>	<i>Ale quomodo adurantur</i>	393
<i>Aer optimus. 22 Semper prodest</i>	<i>Alauda</i>	510
<i>ibidem</i>	<i>Albus cygnus</i>	602
<i>Aer temperatus temperatis corpo-</i>	<i>Albugines oculorum quomodo cu-</i>	
<i>ribus utilis</i>	<i>rentur</i>	154
<i>ibid.</i>	<i>Album diarodon</i>	606
<i>Aer vitiosus ibidem. semper nocet</i>	<i>Alcea</i>	473
<i>ibidem. quomodo emendandus</i>	<i>Alcibiadion</i>	494
<i>87</i>	<i>Alcibiadios anchusa</i>	469
<i>Aerugo 498 quomodo coquenda</i>	<i>Alcyonium</i>	473
<i>649</i>		
<i>Aes combustum ad cicatricem vl-</i>		
<i>ceribus obducendam in sicciori-</i>		
<i>bus corporibus praestantissimum</i>		
<i>est. 552 quomodo coquendum</i>		
<i>648</i>		
<i>Aestate quae victus ratio conue-</i>		
<i>niat</i>		
<i>25</i>		
<i>Aetatum omnium victus ra-</i>		



# INDEX.

<i>Alexandri cyphoides</i>	580	<i>Althæa</i>	473
<i>Alexandri purgatio ex Rhodomelite confecta</i>	561	<i>Alumen</i> 543. quomodo coquendum	649
<i>Alexandri acopon ex atramento librario</i>	637	<i>Aluminatæ aquæ ad quid conducant</i>	24
<i>Alica</i>	43	<i>Aluus</i> quomodo subducenda	12
<i>Alimenta quæ laudatiss.</i>	40	<i>Aluus</i> pueris quomodo cienda	405
<i>Alimentorum facultates</i>	ibid.	<i>Aluus</i> quomodo emollienda	540
<i>Alimon</i>	473	<i>Aluus</i> quomodo emollienda	ibid.
<i>Allium</i>	42 & 540	<i>Alui</i> deiectiones quid præfagiant	54
<i>Allium sylvestre</i>	ibid.	<i>Alui</i> deiectiones quid præfagiant	74. vide deiectiones.
<i>Alme</i>	473	<i>Aluo</i> astrictæ quomodo medendum	213
<i>Aloë</i>	ibid.	<i>Aluus</i> quomodo subducenda sanis	20
<i>Aloë quibus danda</i>	556	<i>Alui</i> fluxionibus maxime biliosis medetur lac coctum in quod demissi sunt igniti marini calculi	49 & intestinorum torminibus
<i>Aloës dosis</i>	556	<i>Alui</i> astrictæ citæ & cruentæ in febribus causæ & curatio	103
<i>Aloën exhibendi tempus &amp; modus</i>	ibidem	<i>Alypon</i>	474
<i>Aloë quomodo coquenda</i>	651	<i>Alypi</i> seminis vires, quantitas & dandi modus	559
<i>Aloë sola inter medicamenta purgantia stomacho conducit</i>	556	<i>Alysson</i>	474
<i>Allopex</i>	474	<i>Alysi</i> vires & vtendi modus	559
<i>Allopecia vnde dicta</i>	107	<i>Amantium</i> notæ 135. curatio	ibidem
<i>Allopecia remedia</i>	108	<i>Amaracinum oleum</i>	643
<i>Allopecia &amp; ophiafis quomodo differant</i>	107	<i>Amaracus</i>	474
<i>Alos achne</i>	474	<i>Amarantus</i> 474 & 491	467
<i>Alos anthos</i>	ibid.	<i>Amarorum vires</i>	158
<i>Alphitidon</i>	433	<i>Amaurosis oculorum</i>	43
<i>Alphorum generatio 281 curatio</i>	ibidem	<i>Ammanitæ fungi</i>	Ama
<i>Alphi albi vnde ducant originem</i>	ibidem		
<i>Alphi nigri vnde generentur</i>	ibidem		
<i>Als</i>	472		
<i>Alfine</i>	474 & 523		
<i>Altercum</i>	549		
<i>Alterci assumpti notæ 354. Remedia</i>	ibidem		



# INDEX.

<i>Amaſonum paſtillus</i>	ſ87	<i>Anagallis</i>	476
<i>Ambroſia ad febres arcendus</i>		<i>Anagyrrus</i>	ibidem
<i>apta</i>	633	<i>Anarrhinon</i>	477
<i>Ambroſia</i>	474	<i>Ancyloſis quid &amp; quomodo cura-</i>	
<i>Ambuſtorum medicamenta</i>		<i>randa.</i>	326
284		<i>Anaphorici</i>	178
<i>Ambuſtis quomodo pili renaſcan-</i>		<i>Anas</i>	46
<i>tur</i>	285	<i>Anatis ſanguis</i>	471
<i>Ami</i>	474	<i>Anchilops eiꝝſque curatio</i>	149
<i>Amiantum</i>	ibidem	<i>Anchuſa quatuor</i>	469
<i>Amithaonis empl.</i>	616	<i>Ancyle</i>	226
<i>Ammos</i>	475	<i>Ancyloſis</i>	ibidem
<i>Ammoniacum quomodo coquen-</i>		<i>Ancy lion</i>	380
<i>dum</i>	651	<i>Ancylogloſſon</i>	ibidem
<i>Ammoniacũ thymiana</i>	475	<i>Andrachne</i>	476
<i>Ammoniacum ſuffimen</i>	ibid.	<i>Andronius paſtillus</i>	ſ88
<i>Ammoniaci gutta</i>	ibid.	<i>Androſamon</i>	476
<i>Ammoniaci ſuffiminis, pondus. mo-</i>		<i>Androſarces</i>	ibidem
<i>dus vtendi, atque vires</i>		<i>Anemomæ</i>	ibidem
ſ60		<i>Anethine malagma</i>	632
<i>Amomum</i>	476	<i>Anethinum oleum</i>	639
<i>Amores</i>	135	<i>Anethum</i>	476
<i>Ampelos melena</i>	475	<i>Anethum olea incoctum, dolo-</i>	
<i>Ampelos leuce</i>	ibidem	<i>rem lenit &amp; ſomniſerum eſt</i>	
<i>Ampelos agria</i>	ibidem	92	
<i>Ampelos hemeros</i>	ibid.	<i>Aneurisma quid</i>	386. <i>Eius</i>
<i>Ampelopraſum</i>	475	<i>cauſe</i>	387. <i>Notæ ibidem. cura-</i>
<i>Ampelitis terra</i>	486	<i>tio</i>	ibidem
<i>Amphisbenæ morſus curatio</i>		<i>Angina eiꝝſq; ſpecies, &amp; curatio</i>	
344		173	
<i>Amygdalinum oleum</i>	641	<i>Anguis ſeneſta</i>	486
<i>Amygdalinum metopion</i>	ibidem	<i>Anicetos empl.</i>	619
<i>Amygdala, dulcia, amara</i>	45	<i>Ani inflammationis curatio</i>	
& 475		233	
<i>Amylum</i>	43	<i>Ani eryſipelata quomodo curetur</i>	
<i>Amylon</i>	475	ibidem.	
<i>Amurca</i>	ibidem	<i>Ani dolore mitigantia</i>	234
<i>Ambrochiſmus in quibus &amp; quo</i>		<i>Ani excrescentiæ quomodo cu-</i>	
<i>modo fiat.</i>	272	<i>randa</i>	ibidem.



# INDEX.

235	Anodynnon collyrium liquidum	146
Ani vlcera pascendo serpen-	Anonis	477
tia quomodo sananda	Anorexia	192
Ani rimas curantia ibidem.	Anseres	46
234	Anserinus adep	542
Ani condylomata quomodo curan-	Anseris sanguis	471
da	Anserum oua	46
Ani condylomata, tubercula	Anthemis	553
rimae quomodo manu curentur	Antheron	593
424	Anthyllis	477
Ani fistularū curatio manu ad-	Antiadas curantia	172
ministrata	Antidotum quid	569
Ani non perforati curatio	Antidotū dia hematon ex sangui-	473 & 471
Ani vlcera humida quomodo cu-	nibus	569
randa	Antidotorum differentia	569
Ani vlcera citra inflammatio-	Antidotum Mitridatis, diaslin-	573
nem oborta quomodo curanda	cu	575
ibidem	Antidotum philonis	576
Ani procidentis curatio	Antidotum, Sotera	583
Ani vlcera sicca recentia quomo-	Antidotum Satyriacum	217
do curanda	Antidotum theodoretum	571
Animi relaxatio ad probā corpo-	Antidotum theriace quomodo pa-	477
ris educationem plurimum affert	retur 570. Eius vsus	565
momenti	Antirrhinon	632
Anima defectus causse & reme-	Antiochi hiera	440
dia	Antilium	477
104. & deinceps	Antitasis	434
Animalia pedestria	Aparina	480
Animalia fera siccius, quā	Apechema	521
domestica, alimentum exhi-	Aphace	481
bent, minúsque excrementicium	Aphrodes papauer	517
48	Aphronitrum	593
Animalia volatilia	Aphroselenes lapis	477
Animalium partes	Aphroditarium	586
Animalium pedestrium carnes	Aphrodisiasticon elidion pastillus	481
ibidem	Aphros	6. & 171
Anisum	Aphthas curantia	Api
Anodynnon medicamentum ad ab-		
rasa, flagris cesa, & articulorum		
contusiones		



# INDEX.

<i>Apiastrum</i>	521	<i>Aqua inter cutem. Vide hydroph.</i>
<i>Apios</i>	477	<i>Aque aluminatæ ad quid conducant 24. nitrosæ, &amp; falsæ ibid.</i>
<i>Apium</i>	538	<i>sulfuratæ ibidem. bituminatæ ibid. ferreæ ibid.</i>
<i>Apium grande</i>	499	<i>Aqua in qua ferrum extinctum est 538</i>
<i>Apium palustre.</i>	49	<i>Aqua frigida quando assumenda 23</i>
<i>Apium iclus notæ 339. Reme- dia</i>	ibidem	<i>Aquam eductia 560. quibus conueniant ibidem</i>
<i>Apium montanum</i>	527	<i>Aque rosatæ quam hydrosatum dicunt, compositio 599</i>
<i>Apium sylvestre</i>	541	<i>Aquosorum vis 467</i>
<i>Apj dimidij quod ad radicem est utendi modus</i>	559	<i>Aquosum ramicem curantia 228</i>
<i>Apium quas vires possideat 41</i>		<i>Aqua frigida quando cum fiducia propinanda in febribus 83</i>
<i>Apochyma</i>	477	<i>Aquam elicientia quibus exhibenda 560</i>
<i>Apochymatis coctio</i>	650	<i>Aque bituminatæ quibus conferant 24</i>
<i>Apocynon</i>	477	<i>Aquarum naturalium differentia ibidem</i>
<i>Apollinaris herba</i>	549	<i>Aque sulfuratæ quibus conferant ibidem.</i>
<i>Apomeli</i>	599	<i>Aqua vitiosa quomodo emendanda 23</i>
<i>Apomeli, ex commentarijs philagry</i>	599	<i>Aque falsæ &amp; nitrosæ quibus conferant 24</i>
<i>Apoplexia quid</i>	135	<i>Aque ferreæ quibus conferant ibidem</i>
<i>Apoplexia cui ætati &amp; temperamento potissimum accidat 136</i>		<i>Aque vitiosæ notæ 22</i>
<i>Apoplexiæ signa</i>	ibid.	<i>Aque frigide potu coercendi phrenitici 122</i>
<i>Apoplexiæ causa</i>	ibid.	<i>Aquam eductia 220</i>
<i>Apoplexiæ curatio</i>	136	<i>Aquam vitiosam sumpturus quæ præmittere debeat 23</i>
<i>Aposyrmata quomodo curanda 185</i>		<i>Aquosorum vires 467</i>
<i>Apothetapia 8. &amp; 10. &amp; 11.</i>		
<i>Apothrausis</i>	433	
<i>Appetentia canina quomodo curanda 99</i>		
<i>Apri iecur</i>	496	
<i>Aqua 549. nitrosæ, bituminosa, ibidem. pluvialis, ibidem marina 496</i>		
<i>Aqua hydropicis quomodo emit- tatur</i>	396	



# INDEX.

<i>Aqua marina</i>	496	<i>media</i>	361
<i>Aquarum naturalium vis</i>	24	<i>Argenti recrementum</i>	491
<i>Aqua frigida in febribus putridis quando tuto exhibeatur</i>	78	<i>Arida medicamenta eorumq; va- riae differentiae</i>	591
<i>Aqua quae optima 22. eius nota ibidem.</i>		<i>Aridum ad xerophthalmiam &amp;c.</i>	609
<i>Aquae aerea quibus conferant</i>	24	<i>Aridum collyrium Gal. quod ocu- los tuetur</i>	608
<i>Aquae frigidae subito ac cumulati- m pota remedia</i>	362	<i>Aridum dia crocus</i>	609
<i>Aqua vitiosa 22. quomodo corri- genda</i>	23	<i>Aridorum mensura</i>	659
<i>Aquarum sponte prouenientium differentiae 24. vires</i>	ibid.	<i>Arietum testiculi</i>	47
<i>Arabica spina</i>	472	<i>Ariobarzanion emplastrum</i>	614
<i>Arabicus lapis</i>	517	<i>Arisarum</i>	478
<i>Arachne</i>	477	<i>Aristolochia</i>	ibidem
<i>Aranens</i>	ibidem	<i>Aristolochiae clematidis pondus, modus exhibendi &amp; vires</i>	558
<i>Araee ictus nota 340. remedia ibidem</i>		<i>Aristophanium emplastr.</i>	616
<i>Arbutus</i>	508	<i>Armenia</i>	45
<i>Aceuthos</i>	478	<i>Armenia emplastr.</i>	619
<i>Archigenis hiera</i>	566	<i>Armenia terra</i>	486
<i>Archigenis medicamentum ad vi- perarum morsus</i>	344	<i>Armeniacus lapis</i>	517
<i>Archigenis medicamentum ad ero- sionem mamillarum cum ma- lignitate</i>	190	<i>Armeniacum</i>	478
<i>Archigenis medicamentum ad car- cinode &amp; cacoethe vlcera</i>	300	<i>Armenia mala</i>	45
<i>Arction</i>	468	<i>Arnabo</i>	478
<i>Arena</i>	475	<i>Arnoglossum</i>	478
<i>Algemon</i>	152	<i>Aron</i>	479
<i>Argemone</i>	478	<i>Arquatus</i>	225
<i>Argaei montis Cappadociae lapi- des.</i>	517	<i>Arsenicum</i>	479
<i>Argentum viuum</i>	549	<i>Artaba aegyptia</i>	659
<i>Argenti spuma 516. quomodo co- quenda</i>	648	<i>Artemisia</i>	479
<i>Argenti viui assumpti nota &amp; re-</i>		<i>Arteriace ad abscissum vocis so- num &amp; eius claritatem faciens</i>	178
		<i>Arteriace, hypoglossis appellata, ad abscissionem vocis, raucitatem, &amp; agere reijcientes</i>	ibid.
		<i>Arteria quid</i>	63
			Arte



# INDEX.

Arteriarum vsus	ibid.	ter ossa articularum impactis	
Arteriarum origo	ibid.	263	
Arteria omnes eodem pulsandi modo inter se & cum corde conveniunt	ibid.	Articularum topi quomodo curandi	264
Arteria quæ tangenda pulsus dignoscendi causa	64	Articularum topi quid coalescere impediat	263
Arteria post aures in quibus passionibus incidenda	365	Articularum intortorum & contusorum remedia	302
Arteria quomodo diuidantur ibi.		Articularum contractio seu ligatio quæ ancylosis dicitur, quomodo curanda	326
Arteria aspera tumor qui bronchocele dicitur 387. eius differentia duplex ibid. curatio	388	Articularum contusionum medicamenta	286
Arteriam humidiores quæ reddant	72	Articularum morbis quomodo & quæ medicamenta adhibenda	262
Arteria aspera quomodo incidi debeat	383	Articularum vlcera curatio	320
ἀρτηριότομος	175	Artos	479
Arteriotomia	365	Artus sanguine infestati quomodo curentur	264
Arthritis quid 258. signa	ibidem	Asarum	479
Arthritidis causæ	257	Asbole	479
Arthritis à podagra quid differat.	258	Ascalabotes	ibidem
Arthritidis ex sanguineo humore curatio	261	Ascarides lumbrici 331. ubi generentur ibidem. causæ & curatio.	332
Arthriticis non sanguineis solum, sed pituitosis etiam & melancholis in morbi initio sanguis mitti debet.	ibidem	Ascyrrhon	476. & 479
Arthritidis ex bile curatio	259	Ascyrrhoides	476
Articularis morbus vide arthritis.		Asclepias	479
Articularum dolor vehemens quomodo leniendus	ibid.	Asclepion chironium	530
Articuli unde laxentur	377	Asclepion panaces	ibid.
Articularum relaxatorum curatio ibidem		Asclepios smegma aridum	594
Articularum doloribus contractis intenso frigore aut humoribus in-		Aselli	460
		Asia petra flos	517
		Asini	527
		Asininum lac	484
		Asininum iecur	496
		Asphaltus	480



# INDEX.

<i>Aspalatus</i>	479	menta quibus & quando exhibenda	558
<i>Asparagus</i>	480	<i>Atramentum indicum</i>	520
<i>Asparagorum differentia &amp; vires</i>	480	<i>Atramentum scriptorium</i>	520
<i>Asphodelus</i>	42	<i>Atramentum sutorium</i>	552.c.20
<i>Aspera arteria quomodo incidi debeat</i>	383	4. quomodo coquendum	649
<i>Aspidis morsus notæ 346. curatio.</i>	347	<i>Atriplex</i>	480
<i>Aspidis tria genera</i>	346	<i>Atrophia oculorum</i>	156
<i>Aspidis exuvium</i>	486	<i>Attenuantium alimentorum vires</i>	40
<i>Asplenon</i>	480	<i>Auditum grauem corrigentia</i>	14
<i>Asstaphis</i>	ibidem	<i>Auditum grauem curantia</i>	168
<i>Aster atticus</i>	ibidem	<i>Auditus grauis quomodo curandus</i>	163
<i>Aster magni</i>	606	<i>Auditorij meatus non perforati causa &amp; curatio</i>	377
<i>Aster pastillus</i>	585	<i>Auellana</i>	45
<i>Astragalus</i>	480	<i>Auena</i>	43. & 484
<i>Asthmatici 179. eorum curatio ibidem</i>		<i>Auena decoctio</i>	43
<i>Astringentium vires</i>	467	<i>Aues</i>	46
<i>Astringentium ante &amp; post cibum sumptorum facultas</i>	45	<i>Aures animalium</i>	47
<i>Atactos compositio ad podagram</i>	584	<i>Auricula muris</i>	474
<i>Attagea</i>	46	<i>Aurium sordes extrahentia</i>	161
<i>Athanasia Oribasij</i>	575	<i>Aurium dolor quas causas habeat &amp; quomodo curari debeat. 159.</i>	
<i>Athena emplastrum</i>	617	<i>Auribus incidentia quomodo extrahantur.</i>	163
<i>Athera</i>	470	<i>Auribus incidentia quomodo extrahantur.</i>	378
<i>Atheroma quid 306. curatio ibidem. &amp; 386</i>		<i>Aurium sonitus quomodo curandus</i>	163
<i>Atracton</i>	429	<i>Aurium vermes quomodo curandi</i>	162
<i>Atractylis</i>	480	<i>Aurium cruorem fundentium remedia</i>	ibid.
<i>Atractylis vires</i>	41	<i>Aurium vlcera diuturna que faciunt.</i>	ibid.
<i>Atrabilis duplici modo generatur</i>	558		
<i>Atram bilem vacuantia medicamenta simplicia</i>	558		
<i>Atram bilem purgantia medicamenta</i>			

AN



# INDEX.

<i>Aurium</i> tinnitus quomodo emen- dandus	163	conferant	24
<i>Aurium</i> humiditates desiccantia	5	<i>Balnea</i> sulfurata quibus conferantur	ibidem
<i>Auris</i> contusa curatio	440	<i>Balnei</i> aquæ dulcis calidi utilita- tes	ibid.
<i>Aurium</i> pus curantia	161	<i>Balneorum</i> naturalium differen- tie	ibidem
<i>Aurium</i> caro excrescens quomodo arcenda	162	<i>Balneorum</i> sordes	487
<i>Aurium</i> ulceribus cum inflamma- tione quid faciendum	ibid.	<i>Balsamum</i>	482
<i>Aurium</i> curia quomodo sarcienda	379	<i>Barbara</i> , emplastrum	617
<i>Aurium</i> confusio quomodo curan- da	163	<i>Barbaricum</i> acopon, dia euphor- bia	635
<i>Auripigmenti</i> assumpti nota	361.	<i>Barbæ</i> alopecij efficax remedium	151
remedia	ibidem	<i>Basilisci</i> morsus nota	347
<i>Auripigmentum</i>	479.	<i>Basilicum</i> tetrapharmacum	611
coquendum	649	<i>Basilij</i> acopon	635
<i>Autumno</i> quæ victus ratio conue- niat	25	<i>Bassi</i> hygra ad hypopios	153
<i>Auulforum</i> remedia	203	<i>Batina</i> mora	597
<b>B</b>		<i>Batrachi</i>	482
<i>Bacca</i> prunorum sylvestrium	507	<i>Bdellium</i>	ibid.
<i>Baccharis</i>	481	<i>Bdellij</i> pondus, & modus utendi	560
<i>Baion</i> malagma	630	<i>Bdellium</i> quomodo coquendum	651
<i>Balaninon</i> oleum	641	<i>Bechicon</i>	178
<i>Balanus</i> myrepfica	481	<i>Bechicon</i> ex styrace ad tussim	577
<i>Balaustium</i>	ibidem	<i>Bechium</i>	483
<i>Balene</i>	50	<i>Belulcum</i>	429
<i>Ballote</i>	482	<i>Besafa</i>	524
<i>Balnea</i> aluminosa quibus conse- rant	24	<i>Beta</i>	546
<i>Balnea</i> creta quibus conferant ibi- dem	ibid.	<i>Betæ</i> vires	41
<i>Balnea</i> bituminata quibus conse- rant	ibid.	<i>Betonica</i>	482
<i>Balnea</i> ferrea quibus conferant ibi- dem	ibid.	<i>Bilis</i> atra duplici modo generatur	272
<i>Balnea</i> salsa & nitrosa quibus		<i>Bilis</i> vomitioni quomodo occurren- dum	102
		<i>Bilem</i> atram vacuantia medica- menta simplicia	558
		<i>Bilem</i>	



# INDEX.

Bilem atrā purgantia medicamen- ta quibus & quando exhiben- da	ibi. & 559	Bromus	484
Bilem flavam eductia, quando & quibus exhibenda	556	Bronchion	182
Bilem flavam purgantia medica- menta simplicia 556. & sequen- tibus		Bronchus	175
Biliofis alui fluxionibus medetur		Bronchocele	387
lac coctum in quod calculi mari- ni igniti decocti sunt 49. & inte- stinorum torminibus	ibidem	Bryonia	484
Bithynus pastillus	589	Bryon thalassion	ibid.
Bitumen	48	Bubonium	483
Bituminata aqua quibus confe- rant	24	Bubo quid 296. Curatio	ibid.
Bitumen quomodo coquendum	650	Βουβονόκηλη	227 & 412
Blatta quae in pistrinis inuenitur	539	Bubulum lac	484
Blepharoxiston	150	Bubula caro	47
Blitum	483	Bubulum stercus	262
Bliti vires	41	Bubulum stercus	508
Boleti	43	Bubulus talus	528
Βομβύλια	124	Bubulus adeps	542
Botanicum emplastrum	611	Bucellatus purgans	561
Botryon	152	Buccina	50 & 505
Botrys	583	Buglossum	483
Bovis femora cremata	529	Bulbus	483
Brachialis luxatio quomodo cure- tur	459	Bulbus agrestis	357
Brachij confraeti curatio	445	Bulbi	42
Brassica marinae facultates	41	Bulimos quomodo curetur	99
Brassica marina	477	Bunium	483
Brassica facultates	41	Buphthalmum	ibidem
Brathy	483	Buprestis assumpta nota 352. Cu- ratio	ibidem
Brion	484	Buprestis	483
Britannica	ibidem	Butyrum	483
Bromion acopon	634		

C	Acalia	500
	Cachexia quid 218 eius cu- ratio	ibidem
	Cactus arbor	541
	Cacoethe ulcera	315
	Caecos	362
	Cadmia 500. quomodo coquen- da	649
	Cecitudo nocturna quid & quo- modo curetur	156
	Casi	



# INDEX.

Casi flagris quomodo curandi 285.	dem	Calidi & humidi temperamenti	
& 286		notæ	29
Calamagrostis	500	Caliginem oculorum prohibentia	
Calamus	ibid.	14	
Calaminta	500	Callus quid	420
Calcanei ex longo decubitu attri-		Callos excidentia	318
tus quomodo curandi	268	Caluariæ fractæ curatio	435
Calcaneorum & plani pedum scif-		Caluitium unde fiat	107
sura quomodo curandæ	ibid.	Caluitij curatio	107 & 109
Calciametorum veterum coria	488	Camarosis	433
Calx	547	Cameli cerebrum	490
Calcis assumptæ notæ 361. reme-		Campe	501
dia	ibidem	Cancamum	500
Calculorum in renibus notæ		Cancanus	ibidem
207		Cancer in quibus corporis partibus	
Calculi ne creentur	208	oriri soleat 299. Cause ibidem.	
Calculorum materia	207	Signa 300. Curatio	299
Calculi tussi eiekti	175	Cancer in fœminarum mammis	
Calculorum causæ	207	cur potissimum accadat	299
Calculi in vesica notæ	404	Cancer latens	394
Calculorum in renibus curatio		Cancer unde appelletur	300
207		Cancer cur planè non consanescat	
Calculi vesicæ quomodo excinden-		ibidem	
di 404		Cancer quid 272. Incurabilis ibi-	
Calculus quibus excinditur, qui fa-		dem.	
cile curationem recipiant ibid.		Cancer quomodo præcauendus	
Calculos quatuor aut quinque a-		300	
speros tribulorum modo, ad ma-		Cancer quibus partibus corporis ac-	
gnitudinem siliquarum trium,		cidat	394
aut quatuor expuit quidam 182		Cancer quid 394. unde dicatur,	
Calculus per anum in tenesmo ex-		ibidem. Eius curatio manu adhi-	
cretus	198	bita	ibidem
Calculi in sanguinis reiectione ex-		Cancro	50 & 502
creti	175	Canis nou rabiosi morsus remedia	
Calida intemperies quomodo corri-		339	
gatur.	36	Canis qui momordit rabiosus sit	
Calidi & sicci temperamenti notæ		an non, qua ratione cognoscas	
29		337	
Calidioris temperatura notæ ibi-			

Canis



# I N D E X.

Canis rabidi morsuum symptoma- ta	336	rie curantia	115
Caninus appetitus quomodo cu- randus	99	Capitis dolor unde oriatur ibi- dem	
Canis rabidi iecur	496	Capitis vlcuscula densa, rubraq; quomodo curanda	113
Canis rabidi signa	336	Capita 504. Menarum ibid. Sma- ridis ibid. Muris ibid. Milui ibi- dem. Lacertæ	ibid.
Canum stercus	508	Capitis quantitas & figura quæ bona, quæ mala	30
Canes rabiunt plerunq; in æstu ve- hementiore	336	Capitis morbos quæ signa præce- dant	13
Canis rabiosi morsuum remedia	338	Capitis vlcera manantia unde fi- ant 113 quomodo curentur ibi- dem, & 114	
Cannabis	501	Capitis exanthemata quomodo cu- rentur	114
Canopus	560	Capitis morborum signis neglectis quæ egritudines sequantur	54
Canopon	501	Capitis morborum signa ubi appa- ruerint quid faciendum	ibid.
Cantharidis assumpta signa	352	Capitis faui unde nascantur & quomodo curentur	113
Cantharides	501	Capitis formatio	30
Capillus qua ratione aureus redda- tur	111	Capitis pediculi quomodo abigendi	114
Capitis dolor ex insolatu contra- ctus quibus notis dignoscatur	115	Capito piscis	49
Capitis dolor ex insolatu contra- ctus quomodo curetur ibi- dem		Capnistos pastillus	178
Capitis dolorem ex frigida intem- perie notantia, & curantia	ibidem	Capnion	501
Capitis dolorem ex bilioso humore curantia	116	Capnos	ibid.
Caput consortij lege inadolescens quo- modo curetur	ibidem	Capparis	41 & 501
Capitis dolor ex vino quomodo cu- retur	117	Caprarum sanguis	471
Capitis dolor ex ictu quomodo cu- retur	ibidem	Caprarum sylvestrium sanguis ibidem	
Capitis psyrdracia quomodo cure- tur	112	Caprillus finus	262
Capitis dolorem ex calida intempe-		Caprillum stercus	508
		Caprillus adeps	542
		Caprilla caro	47
		Caprillum lac	484
		Capr	



# INDEX.

Caprillum cornu	504	Carpesium	502
Caprillum iecur	495	Carpesia liquoris poti notæ 356. re-	
Caput adurendi modus	263	media	ibidem
Caput quomodo aduratur in lip-		Carya	502
pientibus egre spirantibus, &		Caryinum oleum	642
elephanticis	363	Caryophyllon	502
Caput per os & nares quibus me-		Casens	42 & 548
dicamentis euacuandum	21	Casens laudatior	49
Carbunculus quid 298. Cause ibi-		Casens acris	ibid.
dem. Notæ ibidem. Curatio	ibid.	Casens pessimus	ibidem
Carbunculus	287	Casens oxygalactinus	548
Carbunculus oculorum	155	Casosum lactis	484
Carcinoma oculorum	ibidem	Cassamum	503
Cardamine	540	Cassia	ibid.
Cardamomum	502	Castaneæ	46
Cardamum	502	Castorium	503
Cardiogmos	127	Catagmatice Oribasij 625. ex com-	
Carduus	540	mentarijs Heracleti	ibi.
Cari radix	42	Catalepsis	125
Carice	44	Cataphora quid	72
Cari species	23	Cataphoræ curatio	93
Caris	502	Cataphora quid 53. Causæ ibidem.	
Caries lignorum	537	Curatio	ibid.
Carnes optimæ quæ	47	Cataplasma quod oras vulneris la-	
Carnes volatiliū quomodo diffe-		tas in rabidi canis morsu seruat 338	
rant	46	Cataplasma ad sacrum ignem, her-	
Carnem generantia medicamenta		petas, abscessus, parotidas, & am-	
309		busta	295
Carnis contusæ curatio	302	Cataplasmata	591
Caro bubula	47	Catapotia ex aloë 560 modus riē-	
Caro ceruina	ibid.	di atq; pondus	ibid.
Caro hircina	ibid.	Catapotia ex lapide armenico, ar-	
Caro humana	ibid.	thriticis	563
Caro leporina	ibid.	Catapotia ad tuſsim veterem ac-	
Caro ouilla	ibidem	commodata	177
Caro suilla	ibid.	Catapotia ex xylomacere, dysente-	
Caro thymi falsi	545	ricis vtilia	583
Caros	123	Catapotia ad destillationem in fau-	
Caros à lethargo quid differat	123	ces & tuſsim	177
		Casa	



# I N D E X.

Catapotia Dofithei ad iecur infcri	592		
pta	581	Cera	505
Catheter	213	Cera cū oleo qui modus eſſe debeat	
Catheteriſmus	403	in conficiendis vnguentis	652
Catochos	121 & 125	Cera quomodo coquenda	659
Catochi cauſæ ibid. Signa ibid. Cu		Ceras	504
ratio	126	Ceramium	657
Catochi vel catochomeni vnde di		Ceramium Italicum	ibidem
ſti	125	Ceraſia	45
Caucaliſ	503	Ceraſia 504. dulcia, auſtera ibid.	
Cauda equina	499	acida	ibidem
Cauſos febris	81	Ceraſi arboris gummi	ibidem
Cauſtica	151	Ceraſtis morſus notæ 346. Cura	
Cecis	504	tio	347
Cedrea	503	Ceratum	657
Cedrus arbor	ibidem	Ceratonia arbor	504
Cedrus frutex	ibid.	Ceratoides membrana	152
Cele, Vide ramex		Ceratum thaidis quo facies rube	
Cenchros	ibid.	ſcat	168
Cenchri morſus notæ	346	Ceratum dia turpenes ad podagrâ	
Curatio	ibidem	dolorem leniens mirabiliter	624
Centaurium	503	Cercosſis quid 415. quomodo ſit e	
Centaurij minoris vires 558. Pon		mendanda	ibid.
dus ibid. Exhibendi modus ibid.		Cerebrum 490. Leporis ibidem,	
Centunculus	487	Galli ibid. Cameli ibid. Muſte	
Cepa	42. 512	la ibid. Hirundinum ibid. Ouil	
Cepæa	505	lum	ibid.
Cephaleam curans apophlegmatiſ		Cerebri membrane inflammationis	
mus	120	notæ, cauſæ & curatio	437
Cephale	504	Cerebri vulnerati notæ	431
Cephaleæ curatio	118	Cerebri membrane conuulneratæ	
Cephaleam curans epithema. ibid.		ſigna	ibid.
Cephaleam curans vnguentum		Cerebri membrana nigreſcens quo	
119		modo curetur	438
Cephalea	117	Cerebri eryſipelatis ſigna & cu	
Cephaleam curantia medicamen		ratio	123
ta varia	119	Cerebri temperaturarum notæ 30	
Cephalalgia vnde oriatur	115	Cerebrum animalium	47
Cephalicus puluis, capiti conueniēs		Cerebri inflammationis ſigna &	
		curatio	



# INDEX.

curatio	123	Chamaeraphanon	559
Cerion qui d. 421. eius curatio	ibid.	Chamaesyce	553
Cervicistumor curatio	388	Chelidones	ibidem
Cervi cornu	504	Chelidonia aspidis genus	346
Cervi masculi pudendum	470	Chelidonium	553
Cervina caro	47	Chema	657
Cerussa assumptæ signa 361. remedia	ibidem	Chemosis quid, & quomodo curatur	148
Cerusa 555. quomodo coquenda	649	Chersæa aspidis genus	346
Ceryces	505	Chexananze	566
Cherafolium	ibidem	Chia terra	486
Chalbane	552	Chiacum collyrium	601
Chalazion & eius curatio	150	Chirurgica partes duæ	363
Chalcanthon	552	Choenix	657. & 659
Chalcitis	ibidem	Chole	553
Chalcitis quomodo coqui debeat	648	Cholera quid 195. eius curatio	ibid.
Chalcidica lacerta	538	Chondrilla	554
Chalcos	552	Chondrus	554
Chalcus	657	Chondri coctio	43
Chalcuanthos	552	Constantini sapo	595
Chalazium quid 373. curatio	ibid.	Chorion	419
Chame	50	Chrysanthos	491
Chameacte	472	Chryse emplastrum	625
Chamedrops	553	Chrysocolla	554
Chamedrys	552	Chrysocome	554
Chameleon	ibid.	Chrysis	554
Camelæ pondus & modus administrandi 558. vires	ibidem	Chrysos, pessus emolliens	647
Chamelea	553	Chus	657
Chameleuce	552	Cibis in ventre corruptis quid faciendum	15
Chameleontis nigri assumpti nota	354. curatio	Cibi fastidium prohibentia	I
ibidem		Cibi fastidium eiusq; causse signa & curatio	191. & 192
Chameleontis sanguis	471	Cibi qui laudatissimi	40
Chamemelon	553	Cibi varij assumi non debent	40
Chamemelinon oleum	639	Cibi fastidium in febris quomodo curandum	98
Chamepityos pondus & utendi modus	559	Cicade	545
Chamepitys	553	Cicatrix vlceri quomodo inducenda	313
		Cicatrices oculorum quomodo curantur	**



# INDEX.

ventur	154	Clavicula luxata curatio	455
Cicatrices nigrae quomodo tollende		Clavicula confRACTa curatio	441
316		Clematis	506
Cicatrices quomodo tingantur	154	Clematis altera	ibidem
Cicer	44	Cleonis collyrium	606
Cicer	492	Cleopatrae mors	346
Cichorium	506	Clidion aphrodisiasticon, pastillus	
Cici	505	586	
Cicinum oleum	641	Clidion oribasi ad dysentericos &	
Ciconiarum stercus	509	coeliacos	ibid.
Cicuta	513	Clinopodion	506
Cicutae potae notae 355. remedia	ibid.	Clystere vesicae	403
Cimex	507	Clysteribus qui vti debeant 20. &	
Cimolia terra	486	qualibus	ibid.
Cinara quomodo preparanda	41	Cneoron quas vires obtineat	560
Cinerula	542	Cnicus	507
Cinis	546	Cnici seminis pondus & sumendi	
Cinnabaris	505	modus	560
Cinnamomum	ibid.	Coagulum 535. leporinum	ibidem
Cinarae vires	41	equinum ibid. Phocae ibid.	
Cinocrambe	477	Coccus cnidios	507
Circaea	505	Cocci gnidij vires, pondus, & su-	
Circuncisorum curatio	403	mendi modus	560
Cirsocle	409	Coccus baphicos	507
Cissaros	506	Coccymelaea	ibid.
Cisseris	505	Cochlea	510
Cissos	506	Cochlea	50
Cisthos	ibid.	Cochleae terrestres	ibid.
Cissimum emplastrum	613	Coelia	507
Citta causa	1	Coeliacus affectus	197
Citta grauidarum symptoma vn-		Colchicon vnde dicatur	357
de nomen acceperit	2	Colis glans contexta quomodo ape-	
Citreum malum	46	riatur	401
Citrei mali tres partes	ibid.	Colicus dolor in Italia victus ratio	
Citrium	506	ne temeraria curatus a quodam	
Citrium malagma	631	medico	205
Claudiacum dia smyrnon	603	Colla	507
Clauus quid 269. curatio	ibidem	Colon quid	202
Clauus quid & vnde dicatur	427.	Colobemata	379
curatio	ibid.	Colocyntha	507
		Col	



# INDEX.

Colocynthis	ibid.	los tuetur	ibid.
Colocynthis effectus 557.pondus		Collyrium chiacum	601
ibidem.exhibendi modus ibid.qui		Collyrium ex olea turionum succo	
bus exhibenda	ibid.	tenerum	603
Colicorum remedium	217	Collyrium ex decoctis	602
Colis glans nuda quomodo contegenda	401	Collyrium ex cornu Galeni	605
Colicus morbus quid 202.causse		Collyrium monohemeron	601
ibidem.signa ibidem curatio 203		Collyrium dia hydrias repellens	602
& deinceps		Collyrium liquidum ex caucalide	
Colico & renum dolori quid commune,quid proprium	207		609
Colliquamenta corporis quomodo curanda 92.& sequentibus		Collyrium dia crocu	ibid.
Color vrine aquosus rufus & bilio		Collyrium Ilambonis	603
sus mediocriter pallidus quid significet	7	Collyrium è thure	605
Color malus corporis quomodo emendandus	13	Coma	121
Colpos quid 316.curatio	ibid.	Coma vigilans	121
Columbarum sanguis	471	Comatis vigilantis cause 125.signa	
Columbinus pullus	46	ibid.curatio ibidem	& 126
Columbarum syluestrium stercus	509	Comaros	508
Columella 381.curatio	ibid.	Comitialis morbi nota	128
Columelle inflammatio quomodo curanda	172	Comitialis morbi cause	ibid.
Collyrium anodynon	146	Comitialis morbi curatio 129.&	
Collyrium malabathrinum	608	Comitiales morbus cui ferè etati accidat	128
Colymbades	45	Comitiales morbus trifariam gignitur	ibid.
Collyria	600	Comitiales quomodo coarguendi	
Collyrium ex succo fœniculi	607	Comum	513
Collyrium ex opobalsamo	ibidem	Commi	508
Collyrium ex aloë	606	Compositio Procli,podagræ & coxendicum doloribus accommodata	
Collyrium ex succo fœnugraci	606		584
Collyrium cleonis	ibid.	Compositio dia hermodactylu ad podagram	562
Collyrium crassius ex rino	608	Compositio dia citriu, quod est ex malo medico.stomacho vtilis	561
Collyrium ex duobus lapidibus ad asperitudinem	608	Compositio dia coronopodiu	563
Collyrium aridum Gal.quod oculis		Compositio rhodostacti	599



# I N D E X.

Compositio Agapeti ad podagram	584	tio	ibidem
Compositio atactos ad podagram	ibidem	Corianum	509
Compositio pæonia	581	cordis temperatura notæ	33
Conchule Indicæ	527	Cornu 504 Caprillum, hircinum	
Conchylia	507	ibidem: cerui ibidem. Taurinum	
Concoctionis signa nunquam sinistre apparent	61	ibidem	
Conditum calculos confringens	582	Cornea membrana oculi	152
Condylomata locorum muliebrum	415. quomodo excidenda	Coronopos	510
Condylomatum ani curatio manu administrata	424	Corpus hominis in quatuor partes diducitur	53
Confectio Rhoetis	600	Corpus ut bene oleat quomodo efficiendum	13
Confectio masuchæ	646	Corporis liuores prohibentia	ibid.
Congius	657. & 658. 659	Corpus crassum quomodo extenuandum	27
Conuulsiones vnde oriuntur	140	Corporis habitus quomodo recalcificandus	13
Conuulsionibus puerorum medentia	5	Corpus tenue quomodo impleatur	28
Conuulsiones ex inanitione originem ducant an ex repletionem quomodo cognoscendum	141	Corporum intemperatorum notæ	29
Conuulsionum curatio	ibid.	Corporis temperatissimi notæ	28
Conyza	508	Corpus pletoricum	62
Copros	ibid.	Corpus quomodo erugandum	13
Copton ad duritiem stomachi & iocinoris malagma	632	Corporis malus color quomodo emendandus	ibid.
Coracon emplastrum	616	Corporis colliquamentorum remedia	92
Coria calceamentorum veterum	488	Cortex piceæ	532
Corallium	509	Corydallus	510
Corium	ibidem	Corydos	ibid.
Coris herba	ibid.	Coryza	175
Cordis affectus quomodo curandi	188	Cos olearia	517
Cor animalium	47	Costarum rupture & contusionis notæ & curatio	443
Coriandrum	510	Costus	510
Cordis palpitatio	189	Cotis noxiæ detrimentum	517
Coris animal	509	Cotyla	657
Coriandri assumpti notæ 355. cura-		Cotyledon	510
		Coxarum dolor ab articulari morbo	60



# INDEX.

bo quid differat	255	Crocodili morsus remedia	348
Coxarum doloris causse ibidē. No-		Crocodilus terrestris	540
ta ibid. curatio	ibid.	Crocodilion	512
Coxarum fractura, differentia, no-		Crocus	ibid.
ta, & curatio	444	Crocomagmatis confectura	644
Coxe luxata curatio	461	Crocomagma quomodo paratur	588
Coxendices quomodo adurantur		Crommyon	512
419		Crotones	559
Crania	510	Crudis humoribus abundantes	
Crambe	511	quam curandi rationem desyde-	
Crapulam quid discutiat	51	rent	89
Crataegonos	511	Cruenti sputi causse signa	181
Cremasteres	406	Cruentum sputum quomodo cure-	
Creta sutoria	520	tur	182
Cretica terra	486	Crus quomodo reponi debeat	450
Crethmon	511	Crusta generantia medicamenta	
Crinaton suffimen	645	322	
Crimnon	511	Crystalloides humor oculi	157
Crinon	ibid.	Cubiti fractura quomodo curanda	
Crines	548	447	
Crisis instans quomodo agnoscen-		Cubiti luxatio quot modis fiat &	
da	61	quomodo curetur	458
Crisis futura quomodo prenoscenda		Cucumer	44
ibidem		Cucumis	539
Crisis optima peracta quomodo		Cucumis sylvestris	ibid.
agnoscenda	63	Cucumeris sylvestris radice torticis	
Crisis qualis futura sit, quomodo		pondus	559
dignoscendum & i. & sequentibus		Cucurbitulas ad mouendi modus	
Crithe.	511	391. & deinceps	
Crithe quid eiusq; curatio	150	Cucurbita sylvestris	507
Critonius sinigma	595	Cucurbita	44
Crocini dia rhodon	607	Cucurbita	507
Crocini oleum	644	Cucurbitularum vsus	391
Crocides pessus	647	Cucurbitula levis quid efficiat	
Crocides pastillus	586	391	
Crocodili terrestris sanguis	471	Cucurbitula cum scarificatione ad	
Crocodilorum terrestrium stercus		quid praestet	392
509		Cuminum	512
Crocodilorum fluuiatilium stercus		Cupressus	513
509		Cura quid	135



# INDEX.

Curei malagma	631	<b>D</b>	
Cutis astrictio	10. Eius caussa	D Amasena	46
ibidem.	Nota ibidem. cura-	D Damascena	507
tio	11	D Damascena	488
Cuti senili teneraq; conuenientia		D Damasonium	ibidem
medicamenta	286	D Daphne	ibid.
Cyamos	512	D Daphne herba	ibidem
Cyano	ibid.	D Daphnoides	506
Ciathus	6	D Darti	406
Cyclaminus	512	D Daucus	488
Cyclamini radices pondus & mo-		D Dauci radix	42
dus vtendi	658	D Decretoria signa in morboru princi-	
Cyclisti	436	pio praua sunt 61. Sed vbi mor-	
Cydonaton contusum fragmentis		bus inclinauerit, bona sunt	ibid.
saluis	436	D Decamyron malagma	629
Cygnarium	602	D Deiectio quæ optima	74
Cygnus albus	ibidem	D Deiectio cruda	ibidem
Cygnus rubens	ibidem	D Deiectio merè ruffa	ibid.
Cyminum	512	D Deiectio viridis	ibidem
Cynanche	513	D Deiectio nigra	ibidem
Cynosbatos	ibidem	D Deiectio liuida	ibidem
Cyphi 645. Eius materia	ibidem.	D Deiectio oleosa. pinguisq;	ibidem
vsus ibidem.		D Deiectio viscosa	ibidem
Cyphi magnum quod vocant sola-		D Deiectio nimis fætida	ibidem
re ex rebus triginta sex confe-		D Deiectio omnium deterrima & pe-	
ctum	645	stifera	75
Cyphi, quod rebus vigintiocto con-		D Deiectiones quid præfagiant	56
stat, lunare appellatum	646	D Delphini	50
Cyparissus	513	D Dentes quomodo eximantur	380
Cyperus	ibidem	D Dentes exesi quomodo eximendi	
Cyphoides Alexandri	580	ibidem	
Cyphoides medicamentum ad ieco-		D Dentes superflui quomodo tollen-	
rosos & pectoris vitia	580	di	ibidem
Cypros	513	D Dens confactus quomodo curan-	
Cytinus	536	dus	ibidem
Cyprinum oleum ex commentarijs		D Dentes ab interitu vindicantia	14
Posidonij	643	D Dentium dolorem sedantia	169
Cyprinum aliud	ibidem	D Dentes quo tempore oriantur pue-	
Cytisus	513	ris	4
			Deu



# INDEX.

Dentes attritos curantia	170	Dia cadmias emplastrum	615
Dentium candorem facientia ibi.		Dia dictamnū empla.	617
Dentium stuporem tollentia ibid.		Dia erigerontos empla.	614
Dentium inflammationem curan- tia ibidem		Dia euphorbiū, acopon	635
Dentes mobiles stabilientia	169	Dia coralliū medicamentum, po- dagricis idoneum	583
Dentifricium	170	Dia electriū pastillus	586
Dementibus pueris superantia	5	Diarrhea	196
Dentium smegma	170	Dia hamaton antidotum	573
Verma	488	Dia hermodactiliū compositio ad podagram	562
Destillatio	175	Dia libanū	593
Destillationis curat.	ibid.	Dia cœnelai pastillus	589
Destillationis acris tenuisq; cura- tio	177	Dia ostreon	593
Denterion	419	Dia oxynysines	594
Dia aloes medicamentum	592	Dia phellon pastillus	589
Dia anacardion	580	Dia physalidon	587
Dia alicacabu pastillus	590	Dia rhoden pastillus	586
Diabrosis	181	Dia stole pulsus	63
Dia bacanū medicamentum he- pati accommodatum	580	Dia scincū	573
Diabetes quid 212. eius signa ibi. dem. curatio ibidem		Dia spermaton pastillus	585
Dia calaminthes	579	Dia sphedes, hoc est, ex fece vini cō- busta, Manethonis	593
Diacodion, ex papaveris capitibus et melle	575	Dia cinnabareos empla.	623
Dia coralliū pastillus	586	Dia iteon empl.	618
Diacodion compositum	576	Dia meliloton malagma	626
Dia citriū medicamentum, tardē concoquentibus efficax	579	Dia spermaton malagma	631
Diacodion, ex papaveris capitibus et sapa.	575	Dia strutiū emplastrum	612
Dia chartiū pastillus	588	Dia rhodon, quæ septuaginta duas uncias pendunt	606
Dia citriū compositio stomacho utilis	561	Dia thalias, collyrium	603
Dia chartū	594	Dia thalias, ruffum	ibid.
Dia coronepodiū compositio	553	Dia smyrnon, claudiacum	ibid.
Diacodyon	121	Dia moron simplex	596
Dia agylos, acopon	636	Dia moron compositum	ibid.
Dia aron emplastr.	620	Dia moron ex moris batuis, quæ rubi fructibus sunt	597
		Dia caryon simplex	ibi.
		Dia caryon compositum	ibid.
		Dia gyreos emplastrum	611



# INDEX.

<i>Diagleucous</i>	597	<i>retur</i>	459
<i>Dia besafa</i>	ibid.	<i>Digitorum pterygia putrida quo-</i>	
<i>Dia rhodon album</i>	606	<i>modo curanda</i>	270
<i>Dia smyrnon ad &amp; rhyadas &amp;</i>		<i>Digitorum pedis luxatorum cura-</i>	
<i>eg ylopas</i>	603	<i>tio</i>	465
<i>Dia gigurton, malagma</i>	632	<i>Digitos puerorum, dentibus vulne</i>	
<i>Dia staetes emplastrum</i>	622	<i>ratos quid sanet</i>	5
<i>Dia chylon emplastrum</i>	611	<i>Digitorum contusionis &amp; confra-</i>	
<i>Dia asphodelu emplastrum</i>	611	<i>ctionis curatio</i>	449
<i>Dia ceratos collyrium Galenus</i>		<i>Dioclis epistola Antigono regi</i>	
605		<i>scripta ad valetudinem tuendam</i>	
<i>Dia elcysmatus</i>	613	53	
<i>Dia melitos emplastrum</i>	611	<i>Dionysias</i>	489
<i>Dia aloes collyrium</i>	606	<i>Diospolites</i>	579
<i>Dia libanu collyrium</i>	605	<i>Diphryges quomodo coqui debeat</i>	
<i>Dia scoridon emplastrum</i>	612	648	
<i>Dia rhodon Crocinum</i>	607	<i>Diphryges</i>	486
<i>Dia pyranu emplastrum</i>	612	<i>Dipsacos</i>	ibidem
<i>Diabydrias collyrium</i>	503	<i>Dipsas unde dictus.</i>	345
<i>Dia Zomaton collyrium</i>	602	<i>Dipsadis morsus nota ibid. cura-</i>	
<i>Dia crocu aridon</i>	609	<i>tio</i>	ibidem
<i>Dia rhodon Nili</i>	607	<i>διπρυγες quid 367. Eius causse</i>	
<i>Dia pternes emplastrum</i>	623	<i>ibidem, curatio ibidem</i>	
<i>Dia leptocaryon emplastrum</i>	623	<i>Dolichon</i>	44
<i>Dia turpenes ceratum</i>	624	<i>Doloris species &amp; causse</i>	91
<i>Dia halon emplast.</i>	623	<i>remedia</i>	ibid.
<i>Dia sampsicu malagma</i>	632	<i>Doloris capitis in febribus curatio</i>	
<i>Dichromon empla.</i>	620	94	
<i>Dictamnium</i>	489	<i>Doloris in febribus causse 91. re-</i>	
<i>Dies decretoryj</i>	59	<i>media</i>	ibidem
<i>Dies speculatoryj</i>	60	<i>Dorias</i>	494
<i>Digerentia medicamenta</i>	122	<i>Dorycinon</i>	489
<i>Digitum in manu ubi adnascantur</i>		<i>Dorycnyj poti nota 358. reme-</i>	
393		<i>dia ibidem</i>	
<i>Digitorum adnatorum differentia</i>		<i>Dosulhei catapotia ad iecur inscri-</i>	
<i>ibidem</i>		<i>pta</i>	581
<i>Digitum adnati quomodo preciden-</i>		<i>Dothiene emplastrum</i>	612
<i>di.</i>	ibid.	<i>Drachma</i>	658
<i>Digitorum luxatio quomodo cu-</i>		<i>Dracunculus</i>	489
		<i>Dra</i>	



# INDEX.

Dracunculi 332. ubi generentur	Echinon	ibidem
ibidem. curatio ibidem	Ecchymona quid 302. curatio ibid.	
Dracunculi curatio 426	Echidna 494	
Draconis marini ictus cura 347	Eclegma ex marrubio compositum 576	
Dracuntium 489	Eclegma ad tussim 177	
Dropax Gallus Oribasij 636	Eclegma ex marrubio simplex 576	
Dropacis duplex preparatio 633.		
vsus ibidem	Ecpiesmus oculi 158	
Druppa oliuæ 45	Ecpiesma 433	
Drys 489	Ectropion, eiusq; curatio 149	
Dryini morsuum signa 344. remedia 345	Ectropion 371. Eius causse ibidem. curatio ibidem.	
Dryinus pessimus serpens 344	Educentia spicula aculeos, arundines, spinas & consimilia 320	
Dryopteris 489	Eis onycha 433	
Dulcis radícula 487	Elate 491	
Dulcium vires 467	Elatine ibidem	
Duracina 45	Elaterij noxe quomodo remouende 362	
Dysenteria quid 199. species ibid.	Elaterij effectus 558. quale deligendum. ibidem. Exhibendi modus & pondus ibidem	
causæ ibid. signa ibidem. curatio ibid. & sequentibus	Elaphoboscus 491	
Dysenteria cruenta ibid. Iecoraria ibidem.	Elaterium ibidem	
Dysentericis vtilia catapotia ex xylo-macere 583	Elea 490	
Dysodes acopõ ex Gal. 635. aliud ibidem	Eleon ibidem	
Dysodes malagma 632	Elea ethiopica ibidem	
	Elaomeli ibidem	
E	Elephantia quid 272	
EBenus 489	Elephantia incurabilis quare ibi.	
Ebrietatem precauentia 51	Elephantia duplex ibid. Quæ minus maligna ibidem. Quæ malignior ibidem	
Ebrietatis curatio 15	Elephantie minus maligne curatio ibidem	
Ebulus 472	Elephantia laborantium spirandi difficultas quomodo curanda 276	
Ebur 491		
Eccope 433		
Echini 50		
Echinus herba 494		
Echinus ibidem		

\* \* 5



# INDEX.

<i>Elephantia caussa</i>	272	<i>Empla. ex oxelæo</i>	616
<i>Elephantia victus ratio conueniens</i>	274	<i>Empl. ex achate, discutiens emolliensq;</i>	ibid.
<i>Elleborine</i>	492	<i>Empl. ex plumbagine ad calidas affectiones</i>	ibid.
<i>Eleoselinon</i>	491	<i>Empla. coracon ex oxymelite, ad naturalium vitia &amp; nomas accommodatum</i>	ibidem
<i>Eleliphacus</i>	ibidem	<i>Emplastrum Icesios ad strumas, abscessus, lienem, articulos, &amp; coxendicum dolores</i>	617
<i>Electrum</i>	496	<i>Empl. Neronis, ad ictus omnemq; particularum carnosarum dolorem</i>	618
<i>Elos</i>	153	<i>Empla. ex cerusa vel oui</i>	615
<i>Elymus</i>	492	<i>Emplastrum parygron Oribasij</i>	ibidem
<i>Empetron</i>	492	<i>Emplastrum ariobarzanion</i>	614
<i>Emphysema quid</i>	148	<i>Emplastrum ex dracunculo</i>	ibid.
<i>Emphysematis cura</i>	ibid.	<i>Emplastrum Aristophanium emolliens</i>	616
<i>Empiema 184. caussa 185. signa ibidem. curatio ibidem</i>		<i>Emplastrum ex alihæa, podagricis alijsq; duricis accommodatum</i>	613
<i>Emplastrum smilion ad abscessus</i>	612	<i>Emplastrum cissonum ad neruorum vulnera, punctus, &amp; maximè diuturna</i>	ibidem
<i>Emplastrum diascorodon ad rumpendum</i>	ibid.	<i>Emplastrum botanicum</i>	611
<i>Emplastrum dia apyranu ad discutiendum</i>	ibid.	<i>Emplastrum ex polline farinaceo</i>	611
<i>Emplastrum dia struthiu, strumas discutiens</i>	ibidem	<i>Emplastrorum materia, preparatio &amp; differentia</i>	609
<i>Emplastrum pelarion ex scorïa argenti</i>	613	<i>Emplastrum pyrine, ad duritias scirrhus</i>	613
<i>Emplastrum è fermento abscessus rumpens</i>	612	<i>Emplastrum tetrapharmacu</i>	611
<i>Emplastrum dothiene</i>	ibid.	<i>Emplastrum dia chylon</i>	611
<i>Emplastrum ex succo lini seminis discutiens detergensq;</i>	611	<i>Emplastrum dia asphodelu</i>	ibid.
<i>Emplastrum ex melle</i>	ibi.	<i>Emplastr. oxera multiplicis usus</i>	
<i>Empl. barbara quod cruentis protinus vulneribus inijcitur, &amp; fracturarum callos firmat</i>	617		
<i>Empl. ex salicibus, glutinans cruenta excreantibus, &amp; purulentis efficaax, thoraci impositum</i>	618		
<i>Empla. Galeni aceros, glutinat, concoquit, vlcera ad suppurationem perducit</i>	619		

Em



# INDEX.

<i>Empla. ex ochra, inflammationem</i>	<i>tum</i>	624
<i>arctet tum sponte, tum in iudicio</i>	<i>Emplast. quod nutrienda vlcera</i>	
<i>tortis idoneum</i>	<i>carni est</i>	<i>ibidem</i>
621		
<i>Emplast. ex cedria, glutinat discutit, abstergitque ibid. Aliud</i>	<i>Emplast. Italicum ad purgandum</i>	
<i>emolliens</i>	<i>sordida, inducendumq; carnem</i>	
<i>ibidem</i>	625	
<i>Emplast. ex pumice, ad cicatricem ducendam</i>	<i>Emplast. entaticon</i>	<i>ibidem</i>
622		
<i>Emplast. paula, strumis &amp; bubonibus efficax</i>	<i>Emplast. ex cinnabari ad tophos</i>	
<i>ibid.</i>	<i>aliosque omnigenos tumores induratos, dicitur pamplethes</i>	
<i>Emplast. palmulatum</i>	623	
615		
<i>Empla. ex metallicis</i>	<i>Empla. viride simplex 622. aliud</i>	
619	<i>viride, ad humida vitia, &amp; carnis excrescentias</i>	<i>ibid.</i>
<i>Emplast. armenia fracturis accommodata</i>	<i>Emplast. peganera ad pleuriticos</i>	<i>ibid.</i>
<i>ibidem</i>		
<i>Emplast. ex anchusa, ambustis efficax</i>	<i>Emplast. athena, ad vlcera sordida, impacta, neruorum vulnera</i>	
615	617	
<i>Emplast. ex pampholige ibid.</i>	<i>Emplast. dia dictamnū, glutinans, ad canum morsus, &amp; omni- gena vlcera</i>	<i>ibidem</i>
<i>Emplast. leana, noxia educit in superficiem, humoresq; euacuat</i>	<i>Emplast. enitro ad abscessus, scyrrhos, ad tumores</i>	623
621	<i>Empla. conglutinās ad vlcera quae serpendo depascunt, &amp; sanguinis sputum</i>	620
<i>Emplast. Macedonicum ibid.</i>	<i>Emplast. ex cinere aspidū, discutit strumas &amp; podagras</i>	<i>ibid.</i>
<i>Empla. chryse, cruentis vulneribus accommodatum</i>	<i>Emplast. leana, siccāt discutitq; ibi.</i>	
625	<i>Emplast. ex nitro ad carbunculos</i>	621
<i>Emplast. anicetos. glutinat discutit, squamas separat, &amp; ad articulos recenti cicatrice contractos valet</i>	<i>Emplast. ex anemone</i>	<i>ibid.</i>
619	<i>Empl. viride Macherionis, ad coxendicum cruciatus, articulos infarctos, &amp; abscessus</i>	<i>ibidem</i>
<i>Emplast. Serapionis Melane ibidem</i>	<i>Emplast. ingrediētia medicamēta quomodo coqui debeant</i>	648
<i>Emplast. ex lolio</i>	<i>Emplast. philocotysche, dolorem leniens, ad sedem utilis</i>	615
<i>Emplast. Isis, cruentis accommodata, ad glutinandum, carnem inducendum, &amp; purgandum</i>	<i>Empl</i>	
616		
<i>Emplast. ex vrina muli, podagricis vtile</i>		
624		
<i>Emplast. ex lapidis asij flore, philagry ad scyrrhos ibidem. ex eodē Galeni</i>		<i>ibidem</i>
<i>Emplast. ex salis flore, articularijs in declinatione accommodata</i>		



# INDEX.

<i>Empl. Amithaonis, ad articulos</i>		<i>Epilepsia trifariam gignitur</i>	128
<i>recenti cicatrice contractos, con-</i>		<i>Epilepsie curatio</i>	129. & sequent.
<i>uulsosq; ad extrahendum etiam</i>		<i>Ephialtes vnde constituatur</i>	134
<i>efficax</i>	616	<i>Epilepsie caussa</i>	128
<i>Emplastrum ex perna, tophos sol-</i>		<i>Epilepsia cui ferè etati accidat</i>	
<i>uit</i>	623	<i>ibidem</i>	
<i>Empl. ex lixiuio, coxendicum dolo-</i>		<i>Epilepsie notæ</i>	<i>ibidem</i>
<i>ribus, articularijs &amp; tumoribus</i>		<i>Epileptici quomodo coarguedi</i>	129
<i>oedema referentibus vtile</i>	622	<i>Epimedium</i>	492
<i>Emplast. ex auellanis, ad articulo-</i>		<i>Epimyctides quid</i>	283. signa cu-
<i>rum tophos probatum</i>	623	<i>ratio ibi. &amp; 284</i>	
<i>Empla. Sphærien ad ardores</i>	621	<i>Epimelis</i>	492
<i>Emplastrum Nicolai ad recentia</i>		<i>Epiphora oculorum quomodo cure-</i>	
<i>vulnera, &amp; sinus glutinandos</i>		<i>tur.</i>	147
<i>aptum</i>	618	<i>Epiploenteroceles</i>	411
<i>Empl. ex liquore sycamino</i>	620	<i>Epipactis</i>	492
<i>Empla. dichromon.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Epiplocele</i>	411
<i>Emplastrum dia cadmias, cicatri-</i>		<i>Epistola Dioclis Antigono regi</i>	
<i>cem inducens</i>	615	<i>scripta ad valetudinem tuen-</i>	
<i>Emplastrum Mnasei discutiens</i>		<i>dam</i>	53
	614	<i>Epithymi vires, pondus, &amp; vtendi</i>	
<i>Empl. melanchlorum</i>	613	<i>modus</i>	559
<i>Empl. ex senetione</i>	614	<i>Epithymbri vires</i>	<i>ibid.</i>
<i>Emplastrum psitacium</i>	<i>ibid.</i>	<i>Epithymum</i>	492
<i>Emprosthotonos</i>	142	<i>Epomphalum medicamentum quod</i>	
<i>Encanthis quid eiusq; cura</i>	151	<i>umbilico illinitur ad aluum sub-</i>	
<i>Encephalos</i>	489	<i>ducendam</i>	566
<i>Engisoma</i>	433	<i>Epithematum differentia &amp; vsus</i>	
<i>Entaticon empl.</i>	625		626
<i>Enterocelos</i>	410	<i>Epulis 380. Eius curatio</i>	<i>ibid.</i>
<i>Enthenstici</i>	132	<i>Epulis quid et quomodo curetur</i>	
<i>Ephelidem curantia</i>	167		170
<i>Ephemeron</i>	494	<i>Equarum sanguis</i>	471
<i>Ephemeris assumpti notæ 357. reme-</i>		<i>Erasistrati pächrestos hygra</i>	609
<i>dia</i>	<i>ibid.</i>	<i>Erethrias terra</i>	486
<i>Ephialtes vnde dicatur</i>	134	<i>Eria</i>	493
<i>Ephialtes quomodo cognoscatur</i>		<i>Erice</i>	<i>ibid.</i>
<i>ibidem.</i>		<i>Erigerum</i>	496
<i>Ephialtes quomodo curandus</i>	<i>ibid.</i>	<i>Erinaceus</i>	494
<i>Epicaunia vlcus oculi</i>	152	<i>Erimon</i>	493
		<i>Eri</i>	



# INDEX.

<i>Eruum</i>	528	<i>Exercitatio quid</i>	<i>ibid.</i>
<i>Eruca</i>	493	<i>Exercitationis commoda</i>	7
<i>Eruce picearum</i>	532	<i>Exercitationis tempus idoneum,</i>	
<i>Eruce facultates</i>	41	<i>vrinarum color indicat</i>	<i>ibidem</i>
<i>Eruce pinorum assumptæ signa</i>		<i>Exercitatio vocis qualis esse debeat</i>	
353. <i>Curatio</i>	<i>ibidem</i>	<i>et quæ eius sint commoda</i>	9
<i>Eruce olerum</i>	501	<i>Exomphalon</i>	397
<i>Eryngium</i>	496	<i>F</i>	
<i>Erysipelas inflammatorium</i>	96	<i>Faba</i>	512
<i>Erysipelas quid</i>	287	<i>Fabæ</i>	44
<i>Erysipelata capitis periculosa</i>	96.	<i>Faba Aegyptia</i>	<i>ibidem</i>
<i>eorum curatio</i>	<i>ibidem</i>	<i>Facies vt rubeseat quomodo effi-</i>	
<i>Erysipelas quid ibid. Curatio ibid.</i>		<i>ciendum</i>	168
<i>Erysipelatis cerebri signa et cura-</i>		<i>Faciem à rugis asserentia</i>	167
<i>tio</i>	123	<i>Faciei pillos tollentia</i>	168
<i>Erythrodanon</i>	493	<i>Faciei nigritias tollentia</i>	<i>ibidem</i>
<i>Erythroides tunica</i>	406	<i>Faciei varos tollentia</i>	<i>ibid.</i>
<i>Erythrum</i>	630	<i>Faciei aspretudinem tollentia ibi-</i>	
<i>Eupatorium</i>	493	<i>dem</i>	
<i>Euphorbium</i>	494	<i>Faciei vitia quomodo curentur</i>	
<i>Euphorbij pondus, vires, et modus</i>			167
<i>vtendi</i>	560	<i>Facultates alimentorum</i>	40
<i>Eunuchi quomodo fiant</i>	414	<i>Fames grandis, in febribus quomo-</i>	
<i>Eunuchismus</i>	<i>ibid.</i>	<i>do curetur</i>	99
<i>Euodes, à grato odore dictum, ma-</i>		<i>Farinaceus pollen</i>	487
<i>lagma</i>	630	<i>Fastidium cibi</i>	192
<i>EuZomon</i>	493	<i>Fastidium cibi in febribus quomo-</i>	
<i>Exanthemata puero oborta quo-</i>		<i>do curandum</i>	98
<i>modo curanda</i>	4	<i>Fastidium cibi prohibentia</i>	1
<i>Exanthemata ficsa capitis et men-</i>		<i>Fatuitatis causa</i>	126
<i>ti quomodo curanda</i>	114	<i>Faustini pastillus</i>	589
<i>Exanthematū capitis presid.</i>	113	<i>Fauus quid 421. curatio</i>	<i>ibidem</i>
<i>Exanthroma</i>	453	<i>Fauus quid 307. quomodo cure-</i>	
<i>Exercitationum genera</i>	7	<i>tur</i>	<i>ibidem</i>
<i>Exercitatio valida seu violenta</i>	7	<i>Fani capitis vnde nascantur, et</i>	
<i>Exercitatio celeris</i>	8	<i>quomodo curentur</i>	113
<i>Exercitatio composita</i>	<i>ibidem</i>	<i>Februm continuarum origo notæ</i>	
<i>Exercitatio quando finienda</i>	8	<i>et curatio</i>	83
<i>Exercitatione finita quid facien-</i>		<i>Fex</i>	548
<i>dum</i>	8	<i>Februm putridarum agnitio</i>	77
		<i>Febr</i>	



# INDEX.

<i>Febrium tertianarū agnitio</i>	78	<i>Febres continentes</i>	33
<i>Febris tertiana</i>	79	<i>Febris continens quid</i>	ibid.
<i>Febris tertiana exacta</i>	ibi.	<i>Febres curaturus quot &amp; quæ per-</i>	
<i>Febris tertiana extensa</i>	ibid.	<i>quirere debeat</i>	57
<i>Febrium putridarū curatio</i>	78	<i>Fel 553. Suillum 554. Ouillum</i>	
<i>Febris tertianæ victus</i>	79	<i>ibid. Caprillum, Vrsorum, Boum,</i>	
<i>Febris tertianæ curatio</i>	ibid.	<i>Taurinum ibid. Hyænæ, Callio-</i>	
<i>Febris tertianæ nothæ curatio</i>	80	<i>nymi piscis ibid. Scorpionis ibid.</i>	
<i>Febrium quartanarū agnitio</i>	ibid.	<i>maxime Hirundinis, Capræ syl-</i>	
<i>Febrium quartanarum differen-</i>		<i>uestris, ibid. Gallorum, Perdicū,</i>	
<i>tia</i>	ibidem	<i>Accipitrum, Aquilarum ibid.</i>	
<i>Febrium quartanarū curatio</i>	ibi.	<i>Fel volucrum acrius &amp; siccando</i>	
<i>Febrium quotidianarū agnitio</i>	81	<i>vehementius, quàm quadrupedū</i>	
<i>Febriū quotidianarū curatio</i>	ibi.	<i>ibidem</i>	
<i>Febris quartana quo ferè anni tem-</i>		<i>Felis morsus notæ 342 curatio ibi-</i>	
<i>pore incipiat</i>	80	<i>dem</i>	
<i>Febris hepialis signa, caussæ &amp; cu-</i>		<i>Femora bouis cremata</i>	529
<i>ratio</i>	82	<i>Femorum intertrigines curantia</i>	5
<i>Febris hepialis vnde dicatur</i>	ibid.	<i>Femoris fracturæ quomodo curen-</i>	
<i>Febrium ardentium agnitio</i>	84	<i>tur</i>	448
<i>Febrium ardentium curatio</i>	ibid.	<i>Fœniculum grande</i>	498
<i>Febrium quibus ex affectu erysipe-</i>		<i>Fermentum</i>	495
<i>laceo origo est notæ ibid. eorundem</i>		<i>Ferree aquæ quibus conferant</i>	24
<i>curatio</i>	ibid.	<i>Ferrum</i>	538
<i>Febrium hecticarum agnitio</i>	85	<i>Ferula</i>	525
<i>Febrium hecticarum duæ species</i>		<i>Ficus</i>	44
<i>ibidem</i>		<i>Ficus</i>	544
<i>Febrium hecticarum curat. ibidem</i>		<i>Ficus arbor</i>	544
<i>Febrium diariarum caussæ</i>	76	<i>Ficus humilis</i>	553
<i>Febris diaria qua ratione dignosca-</i>		<i>Ficus capitis morbus quomodo cu-</i>	
<i>tur</i>	ibidem	<i>rands</i>	114
<i>Febris diaria qui opportuni</i>	ibid.	<i>Ficosa capitis &amp; menti exanthema</i>	
<i>Febris diarie curandi ratio</i>	ibid.	<i>mata quomodo curanda</i>	ibid.
<i>Febris diaria laborantium victus</i>		<i>Filicula</i>	489
	77	<i>Filicula</i>	533
<i>Febrium putridarum notæ ibidem</i>		<i>Filix</i>	534
<i>Febrium putridarum curat.</i>	78	<i>Fistula quid</i>	420
<i>Febris semitertianæ notæ, eiusq; ge-</i>		<i>Fistula quid 318. curatio</i>	ibid.
<i>neratio duplex</i>	86	<i>Fistulæ insanabiles</i>	422
<i>Febris semitertianæ curatio ibidem</i>		<i>Fistulæ agrè consanescentes</i>	ibid.
		<i>Fistula</i>	



*I N D E X.*

<i>Fistularum ani curatio quæ manu peragitur</i>	ibid.	<i>Frictionum genera</i>	8
<i>Fistularum differentie</i>	420	<i>Frictionum novæ coniugationes</i>	9
<i>Fistule quomodo manu curandæ ibidem</i>		<i>Frictio dura</i>	8
<i>Fistularum ani latentium notæ</i>	(421)	<i>Frictio mollis</i>	ibid.
<i>Fistularum ani manifestarum notæ</i>	422	<i>Frictio mediocris</i>	ibidem
<i>Flagris cæsi quomodo curandi</i>	285 & 286	<i>Frictio multa &amp; dura</i>	ibid.
<i>Flatus ventriculi unde generentur</i>	195. quomodo curentur	<i>Frictio modica &amp; mollis</i>	ibidem
<i>Flauum medicamentum</i>	593	<i>Frictio apotherapentica</i>	ibidem
<i>Fluxionibus alui biliosis maxime medetur lac coctum in quod calculi marini igniti demissi sunt</i>	49	<i>Frictio preparatoria</i>	7
<i>&amp; intestinorum torminibus ibid.</i>		<i>Frigida lauatio quibus conueniat</i>	23
<i>Fœniculum</i>	519	<i>Frigida intemperies quomodo corrigatur</i>	37
<i>Fœnugracum</i>	44	<i>Frigus cui nocuit, quid facere debeat</i>	18
<i>Fœnugracum</i>	546	<i>Frigidi &amp; succi temperamenti notæ</i>	30
<i>Fætum educientia</i>	238	<i>Frigidi &amp; humidi temperamenti notæ</i>	29
<i>Folium</i>	551	<i>Frigidi temperamenti notæ</i>	29
<i>Fracturis idoneum medicamētum</i>		<i>Frons quomodo incidatur &amp; quibus</i>	366
<i>Oribasij 625. Ex commentarijs Heracleti</i>	ibid.	<i>Fructus temporarij</i>	44
<i>Fractura ossis quid</i>	433	<i>Fructus arborum</i>	ibid.
<i>Fractura in capite quid</i>	ibidem	<i>Fru mentaceorum vires</i>	43
<i>Fracturarum differentie</i>	ibid.	<i>Fucus</i>	551
<i>Fracturarū capitū differentie ibidem</i>		<i>Fuligo</i>	516
<i>Fracturæ capitis species quomodo deprehendenda</i>	434	<i>Fuligo</i>	470
<i>Fracturæ capitis curatio</i>	435	<i>Fumaria</i>	501
<i>Fracturæ cum vulnere curat.</i>	451	<i>Figorū assumptorū remedia</i>	359
<i>Fracturæ callo non firmatæ quomodo curandæ</i>	453	<i>Furunculus quid</i>	297. curat. ibid.
<i>Fracturæ immodico callo obductæ quomodo curentur</i>	452	<i>Fuca purgans &amp; stomacho grata</i>	562
<i>Fraxinus</i>	520		
		<b>G</b>	
		<b>G</b> Agates	512
		Gala	484
		Galaclites	516
		Galbanum	651
		Galbanum quomodo coquendū	651
		Galenī colligrium ex cornu	605
		Gal	



# INDEX.

<i>Galenium malagma</i>	630	<i>riri posſit</i>	401
<i>Galenii picra</i>	579	<i>Glandes ad quid conueniant</i>	20
<i>Galerita</i>	510	<i>Glandes unde conficiantur</i>	ibidem
<i>Galion</i>	485	<i>Glans colis nuda quomodo contegen</i>	da
<i>Galliopsis</i>	ibidem		401
<i>Galla</i>	504	<i>Glandule animalium</i>	47
<i>Galli cerebrum</i>	490	<i>Glaſtum</i>	499
<i>Gallina</i>	46	<i>Glaux</i>	486
<i>Gallarum ſtercus</i>	509	<i>Glaucium</i>	ibid.
<i>Gallarum ventris interior mem-</i>		<i>Glaucoma quid eiusq; remedia</i>	157
<i>brana</i>	507	<i>Glechon</i>	487
<i>Gallus dropax, Oribasij</i>	636	<i>Gloeos</i>	ibid.
<i>Gallarum cohortalium ſanguis</i>		<i>Gluten piſcium</i>	500
471		<i>Glutinium</i>	507
<i>Galopsis</i>	485	<i>Glutinium bubulum</i>	509
<i>Gammari</i>	50	<i>Glycea quomodo curentur</i>	166
<i>Ganglion quid 388. Eius notæ ibi</i>		<i>Glycyrrhiza</i>	487
<i>dem. Curatio</i>	ibidem	<i>Gnaphalium</i>	ibidem
<i>Ganglium quid 287. curatio ibid.</i>		<i>Gonepeſſus</i>	648
<i>Gangrena quid 291. curatio 292</i>		<i>Gongylis</i>	487
<i>Gangrenarum remedia</i>	292	<i>Gordylon</i>	ibidem
<i>Garum</i>	485	<i>Gramma oboli</i>	658
<i>Ge</i>	ibidem	<i>Gramen</i>	469
<i>Geniſta</i>	541	<i>Gramen arundinaceum</i>	500
<i>Genitali exulcerato conueniēs me-</i>		<i>Grandines tuſſiēdo eieſti</i>	175
<i>dicamentum</i>	267	<i>Granum gnidium</i>	507
<i>Gentiana</i>	485	<i>Granum tinctorium</i>	ibidem
<i>Genu articulus luxatus quomodo</i>		<i>Crasſum corpus quomodo extenuan</i>	
<i>reponatur</i>	464	<i>andum</i>	27
<i>Geranium</i>	485	<i>Grauedo</i>	175
<i>Geras</i>	486	<i>Grauedinis curatio</i>	ibidem
<i>Ges entera</i>	ibid.	<i>Grauedinis puerorum curatio</i>	4
<i>Gigarta</i>	ibidem	<i>Grauidarum Symptomata, eorūq;</i>	
<i>Gingidion</i>	41	<i>remedia</i>	1
<i>Gingidium</i>	486	<i>Groſſi</i>	526
<i>Gingiuas corroſas curantia</i>	171	<i>Grues</i>	46
<i>Gladiolus</i>	526	<i>Gummi</i>	508
<i>Glandes</i>	46	<i>Gummi ceraſi arboris</i>	504
<i>Glans unguentaria</i>	481	<i>Gurgulio</i>	381
<i>Glans penis cōtaſta quomodo ape-</i>		<i>Gutturis aſpredinem curantia</i>	177
		<i>Gutta</i>	



# INDEX.

<i>Cutturi spina quō eximantur</i>	382	<i>Hemionitis</i>	496
<i>Gypsum</i>	487	<i>Hemiplagia quid.</i>	135
<i>Cypsi poti nota &amp; remedia</i>	360	<i>Hepar</i>	496. Vide Iecur
<i>Gyrgathon</i>	133	<i>Hepar quomodo vratur</i>	395
<i>Gyrus</i>	487	<i>Hepatis temperatura notæ</i>	34
<i>H</i>		<i>Hepialus febris</i>	82
<i>Habitus corporis quomodo</i>		<i>Hepiali curatio</i>	ibidem
<i>recalsaciendus</i>	13	<i>Hepsema</i>	494
<i>Hematites</i>	516	<i>Heraclion</i>	517
<i>Hemorrhoides caca curatu diffici-</i>		<i>Heraclius lapis</i>	ibidem
<i>les existunt 234. quomodo aperien-</i>		<i>Herba lactaria</i>	546
<i>de</i>	ibidem	<i>Herba apollinaris</i>	549
<i>Hemorrhoidum fluxus superfluous</i>		<i>Herba quomodo coquenda</i>	652
<i>quomodo sistendus</i>	ibid.	<i>Hermaphroditi unde appellati</i>	414
<i>Hemorrhoides quid, &amp; cur sic di-</i>		<i>Eorum quatuor differentie, in</i>	
<i>cantur</i>	ibid.	<i>vis tres, in mulierib. vna</i>	ibidem
<i>Hemorrhoides muliebrium locorū</i>		<i>curatio</i>	ibid.
<i>quomodo excindende</i>	415	<i>Hermodactylus stomacho nocet</i>	
<i>Hemorrhoides ani quomodo manu</i>			261
<i>curande</i>	424	<i>Herpes quid</i>	287
<i>Halatia, quasi dicas ex sale confe-</i>		<i>Herpes exedens</i>	293
<i>cta, purgatio</i>	562	<i>Herpes miliaris</i>	ibidem
<i>Halmi vires</i>	41	<i>Herpyllum</i>	493
<i>Harmation</i>	608	<i>Hidros</i>	498
<i>Hastula regia</i>	480	<i>Hieracitis</i>	517
<i>Hedera</i>	506	<i>Hiera Antiochi</i>	565
<i>Hedera terrestris</i>	552	<i>Hiera Archigenis</i>	566
<i>Hedychroi confectio</i>	569	<i>Hiera Galeni</i>	565
<i>Hediosmus</i>	495	<i>Hiera Iusti</i>	ibidem
<i>Hedysarum</i>	ibid.	<i>Hiera Rufi</i>	566
<i>Helcysma</i>	491	<i>Hippocampus</i>	498
<i>Helleborus</i>	ibid.	<i>Hippolapathum</i>	ibidem
<i>Helechryson</i>	ibid.	<i>Hippomarathon</i>	ibid.
<i>Helenium</i>	ibid.	<i>Hippopotami</i>	448
<i>Heliocas medicamentum</i>	593	<i>Hippopotamus</i>	499
<i>Helxine</i>	492	<i>Hipposelinon</i>	ibid.
<i>Hemerocalles</i>	496	<i>Hipposelinon</i>	541
<i>Hemicrania</i>	117	<i>Hipposelini vires</i>	41
<i>Hemicranie curatio</i>	118	<i>Hippuris</i>	499
<i>Hemina</i>	657. & 658 659	<i>Hircinacaro</i>	47

†



# INDEX.

<i>Hircinum iecur</i>	496	24	
<i>Hircinum cornu</i>	504		<i>Hygra ex caucalide</i> 609
<i>Hirundines</i>	553		<i>Hygidion Ammonij</i> 604
<i>Hirundinum cerebrum</i>	490		<i>Hyoſcyamus</i> 549
<i>Hirundinaria herba</i>	553		<i>Hypericum</i> ibid.
<i>Hirudinum denoratarum digno-</i>			<i>Hypericon</i> 509
<i>tio 354. curatio</i>	ibidem		<i>Hypecoon</i> 550
<i>Hyſſopi liquidi medicamenti præ-</i>			<i>Hypocistiſ</i> ibid.
<i>paratio</i>	625		<i>Hypogloſſon</i> ibid.
<i>Hædi ſanguis</i>	471		<i>Hypoglottides medicamen.</i> 176
<i>Hominis temperatiſſ. notæ</i>	28		<i>Hypopyi</i> 374
<i>Hominis morſus remedia</i>	348		<i>Hypopij</i> 153
<i>Hordeum</i>	511		<i>Hypophæſton</i> 550
<i>Humana caro</i>	47		<i>Hypoſphatiſmus</i> 366
<i>Humerus ſummus quid</i>	455		<i>Hypoſpadiæon</i> 401
<i>Humeri luxati curatio</i>	455		<i>Hypoſphagma quid eiùſq; curatio</i>
<i>Humiditates aurium deſiccantia</i>	5	148	
<i>Humidi temperamenti notæ</i>	29		<i>Hyrcorum ſanguis</i> 471
<i>Hyalos</i>	549		<i>Hyſſopum</i> 551
<i>Hyacinthus</i>	548		
<i>Hydatiſ quid 372. notæ ibid. cura-</i>			<b>I</b>
<i>tio</i>	ibid.		<i>Aſpis</i> 516
<i>Hydnon</i>	549		<i>Ichores</i> 179
<i>Hydor</i>	ibid.		<i>Ichthyocolla</i> 500
<i>Hydrargyros</i>	ibid.		<i>Icterus quid</i> 224
<i>Hydros</i>	346		<i>Icterus niger</i> 222
<i>Hydrocele</i>	228		<i>Ictericorum remedium</i> 217
<i>Hydrocephalon quid 364. Eius</i>			<i>Icterus ratione indicationiſ in febr-</i>
<i>cauſſæ ibidem. notæ ibidem. curatio</i>			<i>bus facile curatur</i> 224
<i>ibidem</i>			<i>Icteri ex calida intemperie iocinoriſ</i>
<i>Hydromalum vinoſum</i>	598		<i>notæ ibid. curatio</i> 225
<i>Hydrops leucophlegmatiaſ, hypo-</i>			<i>Icteri ex calida intemperie ſolida-</i>
<i>ſarcidiosi, vel anafarca, eiùſque ſi-</i>			<i>rum partium generatio 224. notæ</i>
<i>gna &amp; cauſſæ 219. eiùſdem cura-</i>			<i>225. curatio</i> ibid.
<i>tio ibid. &amp; 220. &amp; 221</i>			<i>Ictericis quæ vena ſecanda</i> ibid.
<i>Hydropeperi</i>	549		<i>Idea radix</i> 498
<i>Hydropicus aqua quomodo emitta-</i>			<i>Iecur 496. Caniſ rabidi ibid. ca-</i>
<i>tur</i>	396		<i>prillum ibid. Hircinum ibid. la-</i>
<i>Hydrophobia</i>	336		<i>certæ ibid. Lupinum ibid. Aſi-</i>
<i>Hyemi quæ victuſ ratio conueniat</i>			<i>ninum, Apri ibid. Mergi ibid.</i>
			<i>Iecur animalium</i> 47
			<i>Iecur</i>



# INDEX.

<i>Iecur suillum</i>	ibid.	<i>Iocinoris siccae intemperiei nota</i>	215
<i>Iecur quomodo vratur</i>	394	<i>humida nota ibidem</i>	
<i>Ilambonis collyrium</i>	603	<i>Iocinoris inflammationis signa ibi.</i>	
<i>Ileos quid</i>	206	<i>eiusque curatio</i>	217
<i>Ilex</i>	534	<i>Iocinoris inflammatio à pleuritide</i>	
<i>Incrassantium alimentorum differe- rentiae &amp; vires</i>	40	<i>quomodo discernenda</i>	215
<i>Incubo vel Incubus unde dicatur</i>		<i>Iocinoris inflammationum in gib- ba eius parte, nota</i>	ibid.
134		<i>Iocinoris venarum obstructionis no- ta ibid. curat. 216.</i>	
<i>Indicus lapis</i>	517	<i>Ion</i>	498
<i>Infans recens natus quomodo nu- triendus</i>	3	<i>Ios</i>	ibid.
<i>Infantium victus ratio</i>	6	<i>Iris</i>	499
<i>Inflammatiōe proprie quid 287. cu- ratio</i>	288	<i>Isatis</i>	499
<i>Inflammatiōe erysipelacea</i>	96	<i>Isis emplast.</i>	616
<i>Inguinalis herba</i>	294	<i>Isopyron</i>	499
<i>Inguinibus conueniens medicamē- tum</i>	290	<i>Isotheon collyrium</i>	608
<i>Inodora</i>	465	<i>Itea</i>	499
<i>Insania curatio</i>	147	<i>Ἰτέρον</i>	122
<i>Intemperies frigida quomodo corri- gatur</i>	37	<i>Iudicium futurum quomodo præ- noscendum</i>	61
<i>Intemperatorum corporum nota</i>	29	<i>Iudicium instans quomodo agno- scendum</i>	61
<i>Intertrigines femorum curantia</i>	5	<i>Iuglans</i>	45
<i>Intertrigines curantia</i>	286	<i>Iuguli confecti curatio</i>	441
<i>Intestina terre</i>	486	<i>Iuncus angulosus</i>	513
<i>Intestini procidentia quomodo cu- ran.</i>	399	<i>Iunci odorati &amp; rotundi flos</i>	545
<i>Intestina animalium</i>	48	<i>Iuncus palustris</i>	ibid.
<i>Intybus syluestris</i>	506	<i>Iuniperus</i>	478
<i>Intybi facultates</i>	41	<i>Ixos</i>	498
<i>Iocinoris affectus</i>	214	<i>Ixia signa 357. remedia ibidem</i>	
<i>Iocinorosi qui</i>	ibid.	<i>Ἰακκινθία quid</i>	25
<i>Iocinoris temperatura nota</i>	34	<i>Ἰακκινθία medicamenta</i>	122
<i>Iocinoris imbecillitas</i>	214	<i>L</i>	
<i>Iocinoris frigidae intemperiei nota</i>		<i>LABORIOSAM vitam agentium</i>	
<i>ibid. curatio</i>	216	<i>victus ratio</i>	25
<i>Iocinoris caua pars per aluum gib- ba per vrinas expurgatur</i>	218	<i>Labrorum curia quomodo sarcieda</i>	
		371	
		<i>Labrum veneris</i>	489
		<i>Lac</i>	484



# INDEX.

<i>Lac recens multum</i>	48	<i>caussæ ibid. curatio</i>	187
<i>Lac bubulum</i> 484. <i>Muliebre ibid.</i>		<i>Lathyrus</i>	514
<i>Caprillum, Asininum, Ouillum,</i>		<i>Laurus arbor</i>	488
<i>Vaccinum ibidem.</i>		<i>Lauri foliorum viridiū pondus</i>	159
<i>Lac coctum</i>	48	<i>Laurus Alexandrina</i>	488
<i>Lac nutricis viciatum quomodo</i>		<i>Laurinum oleum</i>	641
<i>corrigatur</i>	3	<i>Leana empl.</i>	620. & 621
<i>Lac ouillum</i>	48	<i>Legumina</i>	44
<i>Lac scißile</i>	49	<i>Lema quid</i>	121
<i>Lac humidius</i>	48	<i>Lamonium</i>	514
<i>Lac caprillum</i>	ibid.	<i>Lemnia terra</i>	485
<i>Lactis probatio</i>	3	<i>Lentes</i>	559
<i>Lac crassius</i>	48	<i>Lenticula</i>	44
<i>Lac coquendi modus</i>	ibid.	<i>Lenticula palestris</i>	550
<i>Lac statim à partu redditum</i>	49	<i>Lenticulas curantia</i>	167
<i>Lac nutricis quot modis vicietur</i>	3	<i>Lentiscus</i>	544
<i>Lactaria herba</i>	546	<i>Lentiscinum oleum</i>	642
<i>Lacerta</i>	538	<i>Leontopetalon</i>	514
<i>Lacerta</i>	537	<i>Lepidion</i>	ibid.
<i>Lacerta iecur</i>	496	<i>Lepidoile ossa</i>	364
<i>Lactuca</i>	497	<i>Lepis</i>	515
<i>Lactuca facultates</i>	41	<i>Leporina caro</i>	47
<i>Ladanon</i>	514	<i>Leporis cerebrum</i>	489
<i>Lagopus</i>	513	<i>Lepora quid</i> 276. <i>caussæ ibid. signa</i>	
<i>Lana</i>	493	<i>ibid. curatio</i>	277
<i>Lana pinguitudo</i>	526	<i>Lethargi caussæ</i> 123. <i>signa ibid. cu-</i>	
<i>Lapathum</i>	514	<i>ratio</i>	124
<i>Lapides</i>	516	<i>Lethargus à caro quid differat</i>	
<i>Lapides quomodo coquendi</i>	649		
<i>Lapides argei montis cappadociæ</i>		<i>Leucacanthum</i>	515
	517	<i>Leucas</i>	ibid.
<i>Lapis specularis</i>	542	<i>Lence</i>	ibid.
<i>Lapsana</i>	514	<i>Lence quid</i> 280. <i>caussæ ibidem cu-</i>	
<i>Larinx</i>	173	<i>ratio</i>	ibid.
<i>Larix</i>	536	<i>Leucus pastillus</i>	590
<i>Laserpitium</i>	539	<i>Leuiratæ</i>	50
<i>Lassitudinum ob exercitationem</i>		<i>Libanius pessus</i>	647
<i>quatuor species earumque reme-</i>		<i>Libanotides</i>	515
<i>dia</i>	9. & 10	<i>Libanotos</i>	ibid.
<i>Lateralis dolor quid</i> 186. <i>notæ ibid.</i>		<i>Libanum</i>	605
		<i>Lib</i>	



# INDEX.

Libellæ	50	Locustæ	58
Libra	658	Loligines	ibid.
Lichen herba	514	Lolium	471
Lichenes equorum	ibid.	Lonchitis	518
Lien animalium	48	Lonchitidis seminis pondus & mo-	
Lien quomodo aduratur	395	dus utendi	560
Lienis obstructionis notæ	222	Lotus herba	518
Lienis expultricis facultatis imbecillitas quomodo cognoscenda	ibid.	Lotus arbor	519
Lienis intemperies quomodo curetur	ibidem	Lumbricorum origo	327
Lienteria quid, eius species, causse, notæ, & curatio	197	Lumbrici rotundi infantibus pecuniares	328
Lignys	516	Lunare cyphi	646
Lignorum caries	537	Lupinum	497
Ligusticum	516	Lupinum	44
Lilium	511	Lupinum iecur	496
Liliaceum oleum	640	Luporum stercus	508
Linguae animalium	47	Lupus, piscis	49
Linguae morbus	171	Luxatio quid	453
Linguae scabrities quomodo curanda	101	Luxationis duæ species	ibid.
Lini semen	517	Luxatio cum fractura quomodo curetur	466
Linospermon	ibid.	Luxatio cum ulcere quomodo curetur	465
Linozostis	ibid.	Lycæonis signa 134. curatio	ibid.
Liosporon	517	Lychnis	518
Lipasmata	138	Lychnidis seminis pondus & modus utendi	559
Lippitudinis causa 145. curatio	ibidem	Lycium	518
Liquidorum mensura	658	Lycotincton	472
Liquidum colly. ex caualide	609	Lycopsis	518
Liquor 527. Cyrenacius, Medicus, Syriacus	ibid.	Lycopsis	469
Lirinum suffimen	645	Lygis	ibid.
Lysiponium acopon	635	Lynceus ad claritatē oculorū	607
Lithargyros	516	Lypyræ febres	83
Lithi	ibid.	Lysimachium	518
Lithospermon	517		
Litrum	518		
Liuores corporis prohibentia	13		

M

Macherionis empl. viride 622  
Macedonicum empla. 621  
Madarosis quid & eius curatio 150  
Magnes 517



# INDEX.

<i>Magni aster</i>	606	<i>Mamiras</i>	519
<i>Mala</i>	521	<i>Mammorum inflammationes quo</i>	
<i>Mala dulcia ibid. austerā, acida,</i>		<i>modo curandæ</i>	300
<i>assa, elixa</i>	ibidem	<i>Mammis medicamentum conue-</i>	
<i>Mala punica</i>	45	<i>niens</i>	290
<i>Malabathrinum collyrium</i>	608	<i>Mandragora</i>	519
<i>Malobathron</i>	519	<i>Manethonus dia sphedes</i>	593
<i>Malacia piscis</i>	50	<i>Manus summa contusionis curatio</i>	
<i>Malacia grauidarū Symptoma</i>	1		448
<i>Malache</i>	519	<i>Manna thuris</i>	519
<i>Mala costrata</i>	50	<i>Manna thuris quomodo coquenda</i>	
<i>Malagma ad capitis dolorem</i>	117		651
<i>Malagma anethine</i>	632	<i>Marathron</i>	519
<i>Malagma ex baccis lauri</i>	631	<i>Marasmos</i>	85
<i>Malagma ex seminibus</i>	ibidem	<i>Marcellius thronus pastillus</i>	588
<i>Malagma erythrium</i>	630	<i>Marciatum malagma</i>	628
<i>Malagma mendesium</i>	627	<i>Marina aqua</i>	496
<i>Malagma marciatum</i>	628	<i>Marrubium</i>	534
<i>Malagma pentamyron</i>	629	<i>Marrubium nigrum</i>	482
<i>Malagma euodes</i>	630	<i>Masaphion confectio</i>	646
<i>Malagma ex fertula cāpana</i>	626	<i>Massalioti medicamentum</i>	594
<i>Malagma citrinum</i>	631	<i>Maſtiche</i>	520
<i>Malagmatū differētia et vsus</i>	626	<i>Maxilla confracta curatio</i>	440
<i>Malagma dia sampſychu</i>	632	<i>Maxillarum luxatio quomodo cu-</i>	
<i>Malagma ex vinaceis</i>	ibid.	<i>randa</i>	453
<i>Malagma decamyron</i>	629	<i>Maſa</i>	43
<i>Malagma ex cenanthe</i>	632	<i>Mecon</i>	521
<i>Malagma polyarchion ex Galeno</i>		<i>Medicamentum ex thure</i>	593
<i>627. aliter</i>	ibidem	<i>Medicamentum vomitum citantia</i>	
<i>Malua</i>	519		567
<i>Malua vires</i>	41	<i>Medicamentum ex oſtreis</i>	593
<i>Malicorium</i>	536	<i>Medicamentum ex duplici pipere</i>	
<i>Malus armeniaca</i>	522		575
<i>Malum citreum</i>	46	<i>Medicamentum ex charta, ad no-</i>	
<i>Malum medicum</i>	506	<i>mas oris potissimum &amp; natura-</i>	
<i>Malus persica</i>	522	<i>lium vlcera</i>	594
<i>Malum punicum</i>	536. Eius acini	<i>Medicamenta purgantia compoſi-</i>	
<i>ibidem</i>		<i>ta</i>	560
<i>Malum terra</i>	478	<i>Medicamentum heliocas, adurens,</i>	
<i>Mamillarū affectus curantia</i>	189		593

Med



# INDEX.

<i>Medicamenta atram bilem pur-</i>	<i>Medicamentum fracturis idoneum</i>
<i>gantia quibus &amp; quando exhi-</i>	<i>Oribasij 625. Ex commentarijs</i>
<i>benda</i>	<i>Heraclei ibidem</i>
<i>558</i>	
<i>Medicamenta simplicia bilem fla-</i>	<i>Medicamentum ex sanguine hirci</i>
<i>uam purgantia</i>	<i>no</i>
<i>555</i>	<i>582</i>
<i>Medicamentum dia besasa ex ru-</i>	<i>Medicamentum nephriticum ex ci-</i>
<i>ta sylvestri</i>	<i>cadis</i>
<i>597</i>	<i>583</i>
<i>Medicamentum ex sylvestris ma-</i>	<i>Medicamentum ex eruis</i>
<i>lua semina</i>	<i>576</i>
<i>583</i>	<i>Medicamentum ex malorum coto-</i>
<i>Medicamenti hyssopi liquidi prae-</i>	<i>neorum carnibus</i>
<i>paratio</i>	<i>578</i>
<i>625</i>	<i>Medicamenta liquida quae illinun-</i>
<i>Medicamentum philoxeni, puru-</i>	<i>tur ad oris vitia, ac guttur accom-</i>
<i>lenti &amp; longa defluxione infe-</i>	<i>modata</i>
<i>statis idoneum</i>	<i>595</i>
<i>577</i>	<i>Medicamenta purgantia stomacho</i>
<i>Medicamentum è muslo</i>	<i>aduersantur, excepta aloe</i>
<i>596</i>	<i>556</i>
<i>Medicamentum dodecaltheon</i>	<i>Medicamentum à murino colore</i>
<i>576</i>	<i>psaron dictum</i>
<i>Medicamentum dia citriu, tarde</i>	<i>593</i>
<i>concoquentibus efficax</i>	<i>Medicamentorum emplastra in-</i>
<i>579</i>	<i>gredientium differentia eorumq;</i>
<i>Medicamentum massalioti</i>	<i>coctio</i>
<i>594</i>	<i>609</i>
<i>Medicamentum quod umbilico illi-</i>	<i>Medicamentum ex lupino iecore</i>
<i>nitur epomphalium dictum, ad al-</i>	<i>prestantissimum</i>
<i>uum subducendam</i>	<i>579</i>
<i>566</i>	<i>Medicamentum xanthon</i>
<i>Medicamentum ex myrto sylue-</i>	<i>593</i>
<i>stri</i>	<i>Medicum malum</i>
<i>594</i>	<i>506</i>
<i>Medicamentum dia coralliu poda-</i>	<i>Medimnus</i>
<i>gricis idoneum</i>	<i>658</i>
<i>583</i>	<i>Medion</i>
<i>Medicamentum dia calaminis</i>	<i>521</i>
<i>579</i>	<i>Medimnus atticus</i>
<i>Medicamentum dia bacanu, hepa-</i>	<i>659</i>
<i>ti accommodatum</i>	<i>Medulla animalium</i>
<i>580</i>	<i>47</i>
<i>Medicamentum Zopyrios</i>	<i>Melan</i>
<i>ibid.</i>	<i>520</i>
<i>Medicamentum Galeni è stilla co-</i>	<i>Mel</i>
<i>mitialibus potissimum efficax</i>	<i>51</i>
<i>574</i>	<i>Mel coctum</i>
<i>Medicamentum dia trion pipereon</i>	<i>ibid.</i>
<i>578</i>	<i>Mel non coctum</i>
<i>Medicamentum ex succo mali pu-</i>	<i>ibidem</i>
<i>nici</i>	<i>Mel sachar</i>
<i>597</i>	<i>520</i>
<i>Medicamentum ex succis maloru ad</i>	<i>Mel vino quanto ponderosius</i>
<i>appetentia abolita &amp; agram co-</i>	<i>658</i>
<i>coctionem probatum</i>	<i>Mel oleo quanto grauius</i>
<i>578</i>	<i>658</i>
	<i>Mela</i>
	<i>521</i>
	<i>Melancholia quid</i>
	<i>131</i>
	<i>Melancholia causse</i>
	<i>ibidem</i>
	<i>Melancholia signa</i>
	<i>ibid.</i>



# INDEX.

<i>Melancholia curatio</i>	ibid.	<i>Mensium suppressio ob interanea-</i>
<i>Melancholia hypochondriaca</i>	131	<i>rum partium aliquam primario</i>
<i>Melanthion</i>	520	<i>affectam quomodo curari debeant</i>
<i>Meli</i>	ibid.	<i>ibidem</i>
<i>Melanchloron emplastrum</i>	613	<i>Mensium suppressionis causse qui</i>
<i>Melanchlorus pastillus</i>	590	<i>bus notis deprehendantur ibid.</i>
<i>Melameria</i>	520	<i>Mensium suppressorum causse ibi-</i>
<i>Melaplacontium quomodo pare-</i>		<i>curatio. ibid.</i>
<i>tur</i>	578	<i>Menses vulneribus quando fluere</i>
<i>Melene serapionis emplastrum</i>	619	<i>incipiant 235. quando desinant 236</i>
<i>Melea</i>	522	<i>Mensium tempus ibid.</i>
<i>Melia</i>	520	<i>Menses moratos prouocantia ibid.</i>
<i>Melitera Oribasij</i>	593	<i>Mensura</i>
<i>Meliceris quid 386. eius notae ibi-</i>		657
<i>curatio ibidem</i>		<i>Mensurarum notae ibidem</i>
<i>Meliceris quid 306 curatio ibid.</i>		<i>Mensura aridorum ibid. &amp; 659</i>
<i>Melilotus</i>	520	<i>Mensura liquidorum 657. &amp; 658</i>
<i>Meline</i>	492	<i>Menta</i>
<i>Melinum oleum</i>	640	495
<i>Melitites</i>	516	<i>Meon</i>
<i>Melon</i>	153	522
<i>Melopepon</i>	44	<i>Mercurialis herba</i>
<i>Memecylos</i>	521	517
<i>Membrum distortum callo firma-</i>		<i>Mergi venter</i>
<i>tum quomodo curetur</i>	452	507
<i>Membrorum attenuatorum cura-</i>		<i>Mergi iecur</i>
<i>tio</i>	28	496
<i>Membrana cerebri si nigruerit quo</i>		<i>Merula</i>
<i>modo curanda</i>	438	46
<i>Memoriae noxa quomodo accidat</i>		<i>Mespila</i>
<i>126. quomodo cognoscatur ibidem</i>		521
<i>quomodo curetur</i>	127	<i>Mespila</i>
<i>Menses scientia medicamenta</i>	237	45
<i>Menses mouentia</i>	21	<i>Metopion</i>
<i>Mesium immoderatus fluxus quas</i>		642
<i>causas habeat 238 quomodo cu-</i>		<i>Milax</i>
<i>randus</i>	ibid.	522
<i>Mensium suppressio complures af-</i>		<i>Millefolium</i>
<i>fectus &amp; longos procreare solet</i>		524
236		<i>Milium</i>
		503
		<i>Milium</i>
		43
		<i>Milphosis quid et eius curatio 150</i>
		<i>Mina</i>
		658
		<i>Mina egyptia</i>
		ibidem
		<i>Mina attica</i>
		ibidem
		<i>Mina Romana</i>
		ibidem
		<i>Minium quomodo coquendum 649</i>
		<i>Minium rubricum</i>
		485
		<i>Misy</i>
		522
		<i>Misy quomodo coquatur</i>
		649
		<i>Murhidatis antidotum dia sciencu</i>
		573

Mnas



# INDEX.

<i>Mnasei emplastrum discuties</i>	614	<i>se</i>	415. incommoda	<i>ibidem</i>	cu
<i>Modius</i>	658	<i>ratio</i>	<i>ibidem</i>		
<i>Modius aegyptius</i>	659	<i>Muliebrium locorum thymi condy</i>			
<i>Modius italicus</i>	<i>ibid.</i>	<i>lomata &amp; hemorrhoides quomodo</i>			
<i>Mola quid</i>	246. <i>notæ</i>	<i>excindantur</i>	<i>ibidem</i>		
	247	<i>Mullus</i>	547		
<i>Mole &amp; aquæ inter cutem differe</i>		<i>Mullus piseis</i>	49		
<i>rentia</i>	146	<i>Mulsa</i>	51		
<i>Moly</i>	524	<i>Mulse preparatio</i>	<i>ibid.</i>		
<i>Molybdos</i>	522	<i>Multipeda</i>	527		
<i>Molybdena</i>	<i>ibid.</i>	<i>Muria</i>	473		
<i>Motonohemeron collyrium</i>	601	<i>Murene morsus curatio</i>	347		
<i>Mora</i>	45	<i>Muris arane ictus notæ</i>	342		
<i>Morea</i>	522	<i>curatio</i>	<i>ibidem</i>		
<i>Morbi principium quod</i>	57	<i>Muris auricula</i>	523		
<i>Morbus comitialis trifariam gigni</i>		<i>Murium stercus</i>	509		
<i>tur</i>	128	<i>Muse pastillus</i>	587		
<i>Morbi publicè grassantes</i>	86	<i>Mustela</i>	484		
<i>Morbi publicè grassantes unde o-</i>		<i>Mustela venter</i>	507		
<i>riantur</i>	<i>ibid.</i>	<i>Mustela cerebrum</i>	490		
<i>Morbi ex aeris statu futuri quomo</i>		<i>Muscus</i>	484		
<i>do presagiedi &amp; prohibendi</i>	87	<i>Muscus marinus</i>	<i>ibid.</i>		
<i>Morbi letalis notæ</i>	58	<i>Myaces</i>	523		
<i>Morbi non letalis signa</i>	<i>ibid.</i>	<i>Myagros</i>	<i>ibidem</i>		
<i>Morosis unde fiat</i>	126	<i>Myaron</i>	<i>ibid.</i>		
<i>Moroxus</i>	516	<i>Mycetes</i>	<i>ibid.</i>		
<i>Morus</i>	522	<i>Mydriasis oculorum</i>	156		
<i>Motus mediocris valetudini tuen-</i>		<i>Myelos</i>	523		
<i>de summum affert presidium</i>		<i>Myocephalon</i>	153		
	40	<i>Myopia qui</i>	159		
<i>Muliebre lac</i>	484	<i>Myopiasis</i>	<i>ibid.</i>		
<i>Mulier agrè pariens superstes ne</i>		<i>Myosote</i>	523		
<i>futura sit an minus quomodo co-</i>		<i>Myrica</i>	<i>ibidem</i>		
<i>gnosendum</i>	417	<i>Myriophyllum</i>	524		
<i>Muliebris fluor</i>	239 <i>eius species &amp;</i>	<i>Myrmecia</i>	233		
<i>causæ ibidem. notæ ibidem. cura-</i>		<i>Myrmecia quid</i>	427 <i>unde sic vo-</i>		
<i>tio ibidem</i>		<i>cetur</i>	428. <i>curatio ibidem</i>		
<i>Muliebres loci, vide vulva &amp;</i>		<i>Myrrha</i>	541		
<i>uterus</i>		<i>Myrrha</i>	524		
<i>Muliebrium locorū clausura caus</i>		<i>Myrrha quomodo coquenda</i>	652		



# INDEX.

<i>Myrrhis</i>	524	<i>Nascanthois</i>	524
<i>Myrrhine</i>	ibid.	<i>Nascaphthois</i>	ibid.
<i>Myrsinatum emplastrum</i>	615	<i>Nasturtium</i>	501
<i>Myrsine</i>	524	<i>Nasturtij vires</i>	41
<i>Myrsinoides</i>	506	<i>Natricis morsus nota</i>	346
<i>Myrtus</i>	524	<i>curatio</i>	ibid.
<i>Myrtites quomodo fiat</i>	559	<i>Naturalia. Vide pudenda</i>	
<i>Mystrum</i>	658	<i>Naturalium inflammationes quo-</i>	
<i>Mystrum magnum</i>	ibidem	<i>modo curandæ</i>	300
<i>Mystrum paruum</i>	659	<i>Naturalium vlcera citra inflam-</i>	
<i>Mytuli</i>	523	<i>mationem oborta quomodo cu-</i>	
<i>Myurus unde dicatur</i>	66	<i>randa</i>	232
<i>Myxa</i>	523	<i>Naturalium particularum conser-</i>	
		<i>uatio</i>	226
<b>N</b>			
<i>Napus</i>	42	<i>Naturalium aquarum vis</i>	24
<i>Napy</i>	524	<i>Naturalium aquarum differentia</i>	
<i>Narce</i>	525	<i>ibidem</i>	
<i>Narcissus</i>	ibid.	<i>Naturalium balneorum differen-</i>	
<i>Narcoticorum largior vsus quæ in</i>		<i>tia</i>	ibidem
<i>commoda afferat</i>	260	<i>Naturalium thymi</i>	403
<i>Nardinum</i>	604	<i>Nauigantium victus</i>	26
<i>Nardostachys</i>	524	<i>Nausea quomodo curanda</i>	101
<i>Nardus cizicine iniectio prima</i>		<i>Naxiæ cotis detrimentum</i>	517
<i>629. altera iniectio ibidem. tertia</i>		<i>Nephritici</i>	207
<i>iniectio ibidem</i>		<i>Nephriticum medicamentum ex</i>	
<i>Nardus gallica</i>	524	<i>bellarijs vesicæ &amp; renum exul-</i>	
<i>Nardus montana</i>	ibid.	<i>cerationi idoneum</i>	583
<i>Nares fractæ &amp; contusæ quomodo</i>		<i>Nephriticum medicamentum ex cæ-</i>	
<i>curentur</i>	439	<i>cadis</i>	582
<i>Narium vitia 165. &amp; deinde per</i>		<i>Nepita</i>	500
<i>totum caput</i>		<i>Nerion</i>	525
<i>Narium sanguinis fluxus quomo-</i>		<i>Neruitestium</i>	406
<i>do sistendus</i>	166	<i>Nervus præcisus quomodo curan-</i>	
<i>Narium vlcera quomodo curentur</i>		<i>dus</i>	326
<i>166</i>		<i>Nervis vulneratis aut punctis quæ</i>	
<i>Narium fædus odor quomodo cu-</i>		<i>accidant</i>	323
<i>retur</i>	ibid.	<i>Nervorum vulneratorum curatio ibid.</i>	
<i>Narium vitia quomodo emenden-</i>		<i>Nervorum contusorum curatio</i>	326
<i>tur</i>	165	<i>Nervicorum abscessuum medica-</i>	
<i>Nartex</i>	525	<i>menta</i>	290
			<i>Ner</i>



# INDEX.

Neuras	525	ibidem. nota ibidem. curatio	376
Nigella incommoda quomodo amo- lienda	362	Oculorum qui defluxionibus infe- stantur agglutinamenta	609
Nili dia rhodon	607	Oculorum carcinomati quid fieri debeat	155
Nili malagna ad lienem omnemq; duritiæ	630	Oculi procidentia quomodo curan- da	153
Nitrum	518	Oculi humor crystalloides	157
Nitru quomodo coqui debeat	649	Oculorum obscuritas	158
Nitri spuma	481	Oculorum suppurationem curan- tia	155
Nitrose & salsa aquæ quibus con- ferant	24	Oculi procidentia	153
Noctua sanguis	471	Oculorum hebetudo	158
Nuces	502	Oculorum confusio quomodo cu- randa	159
Nuces	45	Oculi purulenti quomodo curandi	153
Nuces virides, aride	ibid.	Oculorum suffusio quid, eiusq; cu- ratio	157
Nuclei acinorum ruæ	486	Oculi si cute non obtegatur, cura- tio	370
Nutrix qualis esset debeat	2	Oculi purulenti quomodo curandi	374
Nutrici quæ sint vitanda	ibidem	Oculi dolorum causæ	145
Nutricis lac laudatissimum	ibid.	Oculorum epiphora, id est, defluxio- nis impetus quomodo curetur	147
Nutricis lac quod modis vicietur	3	Oculorum vnguis	374. curatio
Nutricis lac vitiatum quomodo cor- rigatur	ibid.	ibidem	
Nyctalops quid & quomodo cu- retur	156	Oculorum phibysis eiusq; curatio	156
Nymphæa	525	Oculorum atrophia eiusq; curatio	156
Nymphe quid 415. Quomodo excin- denda	ibid.	Oculorum hebetudinem curantia	155
Nymphodoti pastillus	591	Oculorum albugines quomodo cu- rentur	154
O		Oculorum vnguis qui pterygion græcis dicitur, quid, eiusq; cura- tio	110
Oculus	658		
Oboli gramma	658		
Ochra	486		
Ochra	44		
Ocimum	555		
Ocimoides	ibidem		
Oculorum caliginē prohibentia	14		
Oculorum expressiois curatio	158		
Ocularium medicamentorum disse- rentia atq; usus	600		
Oculorum suffusio	375. unde fiat		



# INDEX.

Oculorum vlcera eorumq; curatio	152	Oleum balaninum	641
Oculorum inflammationis curatio	145	Oleum caryinum	ibid.
Oculorum cicatrices quomodo carentur	154	Oleum chamæmelinum	639
Oculi membrana cornea	152	Oleum cicinum	641
Oculorum carbunculo quid faciendum	155	Oleum cyprinum posidonij	643.
Oculi tunica pæyoqðis	153	Aliud	ibidem
Oculi dolorum curatio	145	Olei cū cera qui modus esse debeat in conficiendis vnguentis &c.	652
Oculorum mydriasis	156	Oleum crocinum	644.
Ocimum	41	Oleum dulce	490 omotribes ibid.
Odora	467	elotum ibidem. Vetus ibidem. Tenuæ ibidem. Sabinum ibid. Ex agrestis olea ibid. Ricininum ibidem. Sesaminum, Raphaninum	ibidem
Oe	526	Oleum irinum	643
Oedema quid	25	Oleum laurinum	642
Oedema quid 301. causse	ibidem	Oleum liliaceum	640
Oedema aliorum morborum accidens nonnunquam 301. quomodo curandum	ibid.	Oleum lentiscinum	643
Oedemata pedum discutientia	2	Oleum mastichinum	642. magis varium ibidem
Oenanthe	526	Oleum sycionium simplex	642.
Oenantharia	644	compositum ibidem. aliud efficacius	ibid.
Oenanthini confectio	ibid.	Oleum melinum	640
Alia	645	Oleum picinum	532
Oenos	526	Oleum raphaninum	641
Oesypus	ibid.	Oleum ricininum	ibid.
Oesypus	493	Olei rosacei confectio	639
Olea	658	Oleum sesaminum	640
Olea	490	Oleum susinum	ibidem
Olea radice corticis pondus & v. tendi modus	559	Oleum violaceum	641
Olea digerentia	89	Oleum melle quanto leuius	658
Oleum	490	Oleum vino quanto leuius	ibid.
Oleum amaracinum	643	Oleum quomodo coquendum	650
Oleum amygdalinum	641	Olei diuersa genera quomodo conficiantur	637
Olea Aethiopica	490	Oleosorum vires	468
Oleum egirinum	641	Olearia cos	517
Oleum anethinum	639	Olera syluestria vitiosos humores gign	



# INDEX.

gignunt	41	Syriacus	ibid.
Olerum facultates	ibid.	Orchis herba	528
Olera cruda peiores succos procreant		Ordeum	43
quàm cocta	42	Oreoselinum	527
Olera condita muria vel oxalme		Oribasij clidion	586
quas facultates habeant	ibid.	Oribasij dropax Gallus	636
Olfactus vitia 165. & deinde per		Oribasij melitera	593
totum caput		Oribasij parygrum emplastrum	615
ὄλιγοφόρον vinum	122	Origanum	527
Oliuæ	45	Oriogenes pastillus	590
Olostium	526	Oris affectus	168
Olympos seu olympiacum	604	Oris ventriculi inflammationes quo-	
Olynti	526	modo curentur	191
Omenti procidentia quomodo cu-		Oryza	43
randa	401	Orminum	528
ὀμὴν λύσις	174	Orobanchæ	528
Omphacium	526	Orobos	ibid.
Omphacomelitis preparatio	599	Orthopnœa	179
Onagra	526	Oryza	528
Onobrychis	527	Ossa	528
Onochelos	469	Osta	ibid.
Onoclea	ibid.	Ostheon	406
Onoma	526	Ostraca	529
Ononis	ibid.	Ostracoderma	49
Ononis	477	Ostracites	517
Ononis	527	Ostrea	50
Ononis	526	Ostrea	529
Onothera	ibid.	Osyris	528
Onothuris	ibid.	Othoma	526
Onyches	527	Otium summum valetudini maxi-	
Oon	555	me obest	40
Ophiasis vnde dicta	107	Oua puncta 45. Fricla	47
Ophites	517	Ouilla caro	47
Ophthalmia vnde fiat	145	Ouillum cerebrum	490
Opiethocranion	363	Onium stercus	509
Opiethotonos	142	Ouillum lac	484
Opiethotonicis potio accommoda	143	Ouina pellis	488
Opopanax quomodo coqui debeat		Ouron	529
651		Ouum	555
Opos 527. Cyrenaicus, medicus,		Oui candidum	ibidem
		Oui lu	



# INDEX.

<i>Oui luteum</i>	<i>ibid.</i>	<i>Papyrus</i>	530
<i>Onum aceto incoctum ventris fluxiones desiccant</i>	<i>ibid.</i>	<i>Paracynanche</i>	173
<i>Oxera emplastr.</i>	619	<i>Paralysis quid</i>	135
<i>Oxos</i>	527	<i>Parathrema</i>	453
<i>Oxyacanthos</i>	<i>ibid.</i>	<i>Parastata</i>	406
<i>Oxybaphus</i>	658	<i>Pardalianches</i>	472
<i>Oxymeli simplex</i>	573	<i>Paresis curatio</i>	137
<i>Oxymeli Iuliani § 60. Pōdus § 61.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Parietaria</i>	422
<i>Vires</i>	<i>ibid.</i>	<i>Paronychia</i>	530
<i>Oxymeli splenicum</i>	581	<i>Paronychia</i>	270
<i>Oxymeli scillinum</i>	574	<i>Parotis quid</i>	164
<i>Oxenas curantia</i>	165	<i>Partes animalium</i>	47
<b>P</b>		<i>Particularum naturalium conseruatio</i>	226
<i>Peonia</i>	487	<i>Particularum principalium vulneratarum agnitio</i>	431
<i>Peonia compositio</i>	581	<i>Partium attenuatarum curatio</i>	28
<i>Paguri</i>	50	<i>Partium extremarum praecisio quomodo administranda</i>	426
<i>Paliuron</i>	529	<i>Parthenium</i>	492
<i>Palma</i>	551	<i>Parthenij vires, &amp; vtendi modus</i>	559
<i>Palpebrarum pili oculum irritantes quomodo curandi</i>	151	<i>Partus difficilis causae 253. curatio</i>	254
<i>Palpebrarum vstionem ex vrente medicamento factam veteres omnes damnarunt</i>	369	<i>Partus ex vtero qua ratione excutitur excindaturq; 417. &amp; deinde per totum caput</i>	
<i>Palpebrae superioris sutura quomodo administranda</i>	368	<i>Parulis 379. Eius curatio</i>	<i>ibid.</i>
<i>Palpebrarum pediculi quomodo ar cendi</i>	150	<i>Parulis quid &amp; quomodo curetur</i>	170
<i>Palpitatio cordis</i>	189	<i>Parygrum emplastr. Qribasij</i>	615
<i>Palumbus</i>	46	<i>Passer troglodytes</i>	548
<i>Palumbi sanguis</i>	471	<i>Passeres exigui</i>	46
<i>Palumbi venter</i>	507	<i>Pastillus Oribasij clidion</i>	586
<i>Panaces Herculeum</i>	529	<i>Pastillus dia spermaton</i>	585
<i>Pancration</i>	529	<i>Pastillus purgans</i>	562
<i>Panicum</i>	492	<i>Pastillus ex spina Aegyptia</i>	586
<i>Panis</i>	479	<i>Pastillus dia castorin, colicis effi cax</i>	589
<i>Panis syncomistos</i>	43	<i>Pastilli scillini quomodo praeparantur</i>	
<i>Papauer</i>	521		
<i>Papaueris liquoris epoti nota</i>	355.		
<i>Curatio</i>	<i>ibid.</i>		



# INDEX.

rentur	570	Pegannum	531
Pastillus dia rhodon	586	Pelagij pisces	49
Pastillus faustini	588	Pelarion ad vlcera	602
Pastillus leucus	590	Pelarion ex scoria argenti	613
Pastillus cui nomen est thronus		Pelecinos	495
Marcellius	588	Pelles calceamentorū veterū	488
Pastill. ex erica, lieni dicatus	587	Penis glans nuda quomodo conte-	
Pastillus nerae ex Hera commen-		gatur	401
tarijs	588	Pentamyron malagma	629
Pastillus trigonus	585	Pentaphyllon	530
Pastillus nymphodoti	591	Peperi	ibid.
Pastillus capnistos ad tussim con-		Peplion	ibid.
tinuam	178	Peplon herba	ibid.
Pastillus oriogenes	590	Pepon	44
Pastillus musæ	587	Peponatum smegma	594
Pastillus ad capitis dolorem ex in-		Perdix	46
temperie calida	115	Perdicium	491
Pastilli 584. eorum differentia ibi		Periclymenon	530
dem. Vfus	ibid.	Periphymosis	402
Pastillus aster dictus	585	Peripneumonia quid	180
Pastillus dia corallio	586	Periscyphismus	367
Pastinaca	542	Peritonæi vulnera quomodo manu	
Pastinaca marina	548	curanda	398
Pastinaceradix	42	Perniones quid 267. eorum cura-	
Pastinaceæ	50	tio	ibidem
Patella	449	Persæa	531
Patellæ fractæ curatio	ibid.	Perturbationis oculi causa	145
Panicum	43	Pessi	646
Pauo	46	Pessus quid	237
Pectoris rupturæ, impressiois, con-		Pessorum differentia	646
fractionis notæ & curatio	443	Pessus titianus	648
Pediculi capitis quomodo abigendi		Pessorum aperientium materia	647.
114		Vfus	ibid.
Pedis ossa fracta quomodo curentur		Pessus Aegyptia	648
450		Pestilentia quomodo præcauenda	
Pedis digitorum luxatorum cura-		88	
tio	465	Pestilentia notæ	87
Pedis rimæ quomodo curandæ	268	Pestilentiam arcentia	87
Pedum œdemata discutientia	2	Petasites	531
Peganera emplastrum	622	Peuce	531
		Peuc	



# INDEX.

<i>Peucedanum</i>	ibid.	<i>Phusta</i> , ad conterendum calculos	
<i>Phaci</i>	550		581
<i>Phacos</i>	ibidem	<i>Phycos</i>	551
<i>Phæon</i> ad oculos sanguine suffu-		<i>Phygeihlon</i>	296
<i>fos</i> , & magnos affectus	602	<i>Phylites</i>	552
<i>Phagedæne</i> remedia	311	<i>Phyllon</i>	551
<i>Phalangites</i>	550	<i>Phyma</i> quid	296. curatio ibid.
<i>Phalangiorum</i> morsus notæ, & cu		<i>Piceæ</i> cortex	532
<i>ratio</i>	339	<i>Picis</i> flos	ibidem
<i>Phalaris</i>	550	<i>Picinum</i> oleum	ibidem
<i>Pharici</i> poti signa 358. remedia		<i>Picra</i> Galeni	579
<i>ibidem</i>		<i>Pilos</i> argentia	109
<i>Pharynx</i>	173	<i>Pilos</i> extenuantia	110
<i>Phaselum</i>	44	<i>Pili</i> palpebrarum oculum irritan-	
<i>Phasganion</i>	525	<i>tes</i> quomodo curandi	151
<i>Phasianus</i>	45	<i>Pilos</i> nutrientia	109
<i>Phasiolum</i>	499	<i>Pinaster</i>	531
<i>Phellos</i>	551	<i>Pingit</i> terra	486
<i>Philagrianum</i> malagma	627	<i>Pinguedo</i> animalium	47
<i>Philocotyche</i> emplastrum	615	<i>Pinguis</i> quomodo coquenda	650
<i>Philonis</i> antidotum	575	<i>Pini</i> resina	536
<i>Philyras</i>	551	<i>Pini</i> nucleus	45
<i>Phlegmone</i> quid	287	<i>Pinus</i>	531
<i>Phlomit</i>	526	<i>Piper</i>	530
<i>Phlomos</i>	551	<i>Piper</i> aquaticum	549
<i>Phlyctæna</i>	153	<i>Pappi</i> quid 362. eorum remedia	
<i>Phlyctenæ</i> quomodo curandæ	284		361
<i>Phœnicine</i> emplastrum	615	<i>Pirum</i> agreste	481
<i>Phœnix</i> herba	551	<i>Pirus</i>	477
φῶνις μοι	125	<i>Pisces</i>	49
<i>Phormion</i>	551	<i>Pisces</i> cetacei	50
<i>Phrenes</i>	121	<i>Pisces</i> omnium deterrimi	49
<i>Phrenitis</i> quid	120	<i>Pisces</i> molles cute	50
<i>Phrenitidos</i> causæ ibid. & signa		<i>Pisces</i> pelagij	49
<i>ibid.</i> Curatio	121	<i>Piscium</i> ius	495
<i>Phrygius</i>	517	<i>Pissa</i>	531
<i>Phrynion</i>	534	<i>Pisselæon</i>	532
<i>Phthysis</i> oculorum	156	<i>Pistacia</i>	46
<i>Phthysis</i> quomodo curetur	186	<i>Pisum</i>	44
<i>Phu</i>	551	<i>Pituita</i> in ventriculo redundans,	
		<i>quomo</i>	



# INDEX.

quomodo vacuanda	18	exhibendi	558
Pytyides	532	Pomorum omnium facultates	44
Pityocampæ	ibidem	Pompholyx	533
Pityos phlæos	ibid.	Pompholygeron emplastrum	615
Pityriasis	112	Pondera	657
Pityriaseos curatio	ibid.	Ponderum notæ	ibid.
Pityusa	532	Populus nigra	470
Pix	531	Porrigo capitis	112
Plantæ sordida vlcera quomodo cu- randa	267	Porphyræ	533
Platanus	533	Porrum	42
Plethoricum corpus	62	Porrum agreste	475
Πληθώρα quid	25	Portulaca	476
Plumbago	522	Potamogeton	533
Plumbago quomodo coquēda	648	Poterion	534
Plumbum	522	Prasion	534
Plumbi scobis potæ signa 361.reme- dia	ibid.	Prasoides	492
Pneumon	532	Præcocia	45
Pnigalion	134	Præster vnde dictus	345
Podagra quid 257. signa 258		Priapismus quid 231. causse ibidem curatio ibid.	
Podagræ causse	256	Principium morbi quod	57
Podagrica remedia	583	Prinos	534
Podagra ab arthride quid differat 256		Proficiscentium victus	26
Podagra quomodo præcauerit possit 267		Propolis	534
Pœcilon acopon	634	Propolis quomodo coqui debeat	650
Pollen farinaceus	487	Propomata	698
Polycnemon	533	Prosechy stacticum	604
Polygalon	ibid.	Prospophys	406
Polygonon	ibidem	Protelus ad claritatem oculorum, cicatricesq; extenuat	607
Polygonoides	506	Prunus	507
Polyide sphragis	588	Prunus	ibid.
Polypi	50	Pruni fructus	ibid.
Polypus quid 378. vnde dicatur ibid. curatio ibid.		Pruna damascena	ibid.
Polypodascurantia	165	Pruritus causse 269. signa ibidem	
Polypodion	533	Pruritus gingiuarum puerorum curantia	4.5
Polypody radices vires & modus		Psaron medicamentum	594
		Pseudodictamnion	555
		Psilothrum	595

††



# INDEX.

<i>Psilothra medicamenta quæ</i>	226	<i>Pulmonis temperatura notæ</i>	32
<i>Psimmythion</i>	555	<i>Puls ad purgandum</i>	563
<i>Psitacium emplastrum</i>	614	<i>Pulsus quid</i>	63
<i>Psora quid 276. causæ ibid. signa</i>		<i>Pulsus vsus duplex</i>	ibid.
<i>ibid. curatio</i>	ibidem	<i>Pulsus duri &amp; vehementis discrimen</i>	72
<i>Psoricon</i>	555	<i>Pulsuum genera &amp; differentie recensentur &amp; explicantur 63. &amp; deinceps</i>	
<i>Psorophthalmia quid eiusque curatio</i>	148	<i>Pulsuum causæ &amp; presagia 69. &amp; sequentibus</i>	
<i>Psydracia capitis</i>	113	<i>Pulvis cephalicus, capiti conueniens</i>	
<i>Psyllium</i>	555		592
<i>Psyllij assumpti notæ 355. remedia</i>		<i>Pulvis pilos abolens, ad podagram</i>	
<i>ibidem</i>			595
<i>Ptarmica</i>	534	<i>Pulvis ex aloë</i>	592
<i>Ptelea</i>	ibid.	<i>Pumex</i>	505
<i>Pteris</i>	ibid.	<i>Pumex quomodo coqui debeat</i>	649
<i>Pterygion quid 374. curatio</i>	ibid.	<i>Purgans puls</i>	563
<i>Pterygion oculorum quid eiusque curatio</i>	154	<i>Purgantia medicamenta non simplicia quodam temperamento, sed totius substantiæ proprietate purgant</i>	556
<i>Ptyas aspidis genus</i>	346	<i>Purgantes oliuæ</i>	561
<i>Pudendum masculi cerui</i>	470	<i>Purgatio ex Rhodomelite Alexandri</i>	561
<i>Pudendorum vlcera quomodo curanda</i>	267. & 270	<i>Purgationibus quos vti conueniat</i>	556
<i>Pudendorum rimas curantia</i>	232	<i>Purgationis tempus</i>	ibid.
<i>Puerorum stercus</i>	508	<i>Purgans fusca, &amp; stomacho grata</i>	562
<i>Puerorum aphthæ quomodo curentur</i>	5	<i>Purgantia medicamenta composita</i>	560
<i>Pueris quomodo ciëda aluus 4. &amp; 5</i>		<i>Purgans pastillus</i>	562
<i>Puerorum tussis quomodo curanda</i>	4	<i>Purgans vinum in hydropicis</i>	ibid.
<i>Puerorum morbi &amp; symptomata</i>		<i>Purgans bucellatus</i>	561
<i>ibidem</i>		<i>Purgatio halatia</i>	562
<i>Pueri quo tempore dentiant</i>	ibid.	<i>Purgatione modum excedente quid fieri debeat</i>	564
<i>Pulegium</i>	487	<i>Purpure</i>	533
<i>Pulegij vires, pondus &amp; sumendi modus</i>	559		Pur
<i>Pulicaris herba</i>	515		
<i>Pullus columbinus</i>	46		
<i>Pulmo 332. agninus, suillus, vulpinus</i>	ibid.		
<i>Pulmo animalium</i>	48		



# INDEX.

Purulenti quomodo adurendi	393	Rane rubeta hausta signa	353. cu-
Purulentiorum curatio	185	ratio	ibid.
Putredini quamlibet partem occu-		Ranarum sanguis	471
panti accommodata medicamenta		Rapa	42
312		Raphanis	ibid.
Pycnocomon	534	Raphanidon	433
Pyrethrum	535	Raphanus	535
Pyrethri pondus & utendi modus		Raphano quando & quomodo ute-	
559		dum	42
Pyrgita	46	Raphaninum oleum	641
Pyrine emplastrum	613	Rapum	487
Pyritis	524	Ratiocinationis offensa quomodo	
Pyros	535	contingat, dignoscatur & cure-	
Pytia	535	tur	126
Pyxis acopon	636	Raucitas	175
		Recrementum	541
<b>Q</b> uantitatis quae mensuratur		Refractio	433
tres differentiae	657	Remedia	434
Quercus	489	Renes animalium	47
Quinquefolium	530	Renum affectus quomodo digno-	
		scendi & curandi	207
<b>R</b> adicula	42	Renum calculi causa, nota & cu-	
Radicula dulcis	487	ratio ibid. & deinceps	
Radices quomodo coquenda	652	Repletionis curatio	15
Radij fractura quomodo curanda		Resinae	536
447		Resolutionis curatio	137
Raie	50	Resolutionis ob colicum dolorem co-	
Ramicum genera	227	tractae curatio	278
Ramex intestinorum rupto peri-		Rha	535
tonao difficiliter curatur, qua qui		Rhacos	ibid.
ob raritatem illius contingit ibid.		Rhagade ani & pudendorum quo	
Ramex omenti	41	modo sanandae	232
Ramices pueri frequentius patiun-		Rhamnus	535
tur & quare	227	Rheon	535
Ramex varicosus 409. eius nota		Rhetinae	536
ibid. curatio	410	Rhinarium	605
Ramex tophaceus 409. curatio ibi.		Rhoda	536
Ramex ventosus ibid. curatio	410	Rhodia radix	536
Ramicis curatio 227. & deinceps		Rhodia ad suppressendum sangui-	
Rane	482	nem ulcera depascentia, & exire-	



# INDEX.

stentias	593	224	
Rhodomalum	599	Ruta veneris ardorem obtundit	16
Rhoe	536		S
Rhœa	ibid.	S Abina	483
Rhoetis confectio	600	S Sachar	520
Rhogme	433	Sagapenum	537
Rhu	551	Sagapenum quomodo coquendum	
Rhyas quid, eiusq; curatio	151	651	
Rhypos	536	Sal	472
Rhythmus quid	65	Sal quomodo coqui debeat	649
Rhythmici differentie	ibidem	Salis flos	474
Rhythmus in pulsu quid	ibid.	Salamandra	537
Ricinum	595	Salamandræ assumptæ signa	353
Ricininum oleum	641	curatio	ibidem
Ricini pondus, vtendi modus, &		Sales theriaci	572
vires	559	Salix	499
Ricinorum sanguis	471	Salsamentum thymi	545
Rigoris in febribus curatio	95	Salse & nitrosæ aquæ quibus con-	
Rimæ ani quomodo manu curande		ferant	24
424		Salforum vires	468
Rimæ digitorum totorumq; pedum		Salvia	491
quomodo curande	268	Sambucus	472
Rhododaphne	525	Sambuci corticis radicis pondus, vi-	
Rose	536	res, & modus vtendi	560
Rosacei confectio	639	Samia terra	485
Rosmarinus	515	Sandaracha	537
Rostra animalium	47	Sandarac hañ coquenda	649
Rubia	493	Sandix	537
Rubra tinctorum	ibid.	Sanguis	471
Rubus	482	Sanguinem è naribus profluentem	
Rubus caninus	513	in febribus quomodo sistere oportet	103
Rubens cygnus	602	Sanguinis è naribus profluum se-	
Rufi potio contra pestem	88	dantia	166
Rumex	514	Sanguinem commouentia	236
Rumex grandis	498	Sanguis bubulus 48. leporinus ibi.	
Ruptorum remedia	303	porci iuuenis ibid. caprillus ibid.	
Ruptis à quibus abstinendum	228	Sanguis ex vena, arteria vel nari-	
Ruta	531	bus profluens quomodo sistendus	
Ruta syluestris	524	320	
Rutæ syluestris nocentur remedia			

San



# INDEX.

Sanguinem venane an arteria pro-	se ibidem. curatio ibid.	364
fundat quomodo dignoscatur	Sclerophthalmia quid eiusq; cura-	
321	tio	148
Sanguinis renum profluuij curatio	Scolopendra marina	540
211	Scolopendrae morsus nota	341. cu-
Sanguinis profluuium curans medi-	ratio	ibid.
camentum	212	Scolopomacherion
Sanguinis ex ore profluuium quo-	Scolymon	366
modo sistendum	173	Scolymos quas vires habeat
Sanguis animalium	48	41
Sanguinaria	533	Scordion
Saporum species	467	Scordon
Sapphyrus	517	Scordoprason
Sapotes	537	Scorpioides
Sar cocolla	ibidem	Scorpius
Sarcomata curantia	165	Scrotum
Sardoniam herba	358	Scroti inflammationis nota
Sardoniam herbae pote signa	ibid.	228
Satureia	498	Scrupulus
Satyriasis quid eiusq; causse	230.	658
que symptomata eam consequan-	educende	
tur	ibid.	419
Satyriacum antidotum	583	Sedes, Vide anus
Satyrium	537	Sedi illita que purgent
Saura	537	566
Saxifraga	ibid.	Sedis tuberosa vlcera quomodo cu-
Saxiphages	ibid.	randa
Scammonia	540	300
Scandix	41. & 540	Selache
Scapularum compressionis, ruptu-		50
re, refractionis nota & curatio		Selemusiaterra
442		486
Schidacidon	435	Selinon
Schinos	545	538
Schistos	516	Semen redundans quomodo immi-
Scillini pastilli quomodo preparen-		nuendum
tur	570	17
Scingos	540	Semina quomodo coquenda
Scirrhus quid 303. eius differentie		652
ibidem. qui sit insanabilis ibi. caus		Seminis redundantis noxa
		17
		Seminaria vasa
		35
		Semperuiuum
		470
		Senescio herba
		496
		Senecta anguis
		480
		Senum habitus quomodo recalfacie
		dus
		13
		Senum victus ratio 12. & sequen-
		tibus



# INDEX.

Sepia	50	Singultus causse	102
Sapia testa	538	Sinus quid 216. eius cura	ibidem
Seps	ibidem	Sion	539
Serapionis melane empl.	619	Sion quas habeat vires	41
Serapias	528	Siraon.	494
Seris	538	Siricum	537
Seriphum	ibid.	Sisarum	539
Serpillum	493	Sifer	ibid.
Sertula campana	520	Sisymbrium	ibidem
Serum lactis quomodo à caseo di-		Sison	ibidem
scernatur	49	Sitis in febris curatio	100
Sesamoides	538	Smegmata	591
Sesaminum oleum	640	Smegma dentium	170
Sextarius	658. & deinceps	Smegma peponatum	594
Sicci temperamenti notæ	29	Smilax	541
Sicyos	539	Smilacis potæ signa 357. remedia	358
Sicyos agrios	ibid.	Smilion ad abscessus	612
Sicyonium oleum simplex 642. com-		Smyris	517
positum ibidem. aliud efficacius		Smyrna	541
ibidem		Smyrnion	ibid.
Sideratio quid 291. vide sphacilos		Smyrni vires	41
Sideritis	538	Stæchas	543
Sideros	ibid.	Sol si quem exusserit, quid facien-	
Sidion	536	dum	18
Signa decretoria in morborum prin-		Solani furiosi poti signa 358. re-	
cipio prava sunt	61	media	ibid.
Signa concoctionis nunquam sini-		Solanum	543
stre apparent	ibidem	Solare cyphi	645
Signa decretoria vbi morbus incli-		Solstitium æstiuum quid efficiat	
nauerit, bona sunt	ibidem	in hominibus	56
Siliqua	658	Solstitium hyemale quid in corpo-	
Siliquæ	46	ribus humanis efficiat	55
Silphe	539	Somnus quid	52
Silphium	ibid.	Somni vehementis causse 53. cu-	
Silurus	ibidem	ratio	ibidem
Silibon	ibid.	Sonchus	541
Sinapi	524	Soporis vehementis causse ibidem.	
Sinapismi vsus	633	curatio	ibidem
Sinciput quibus secetur 367. et quo		Soporis noxy curatio	93
modo	ibidem	Sorbi	



# INDEX.

Sorba	45	Squille	ibid.
Sordes	536	Stachys	542
Sordes balneorum	487	Stacticum profechij	604
Sori	545	Staphiloma	153
Sotera, antidotum	487	Staphyloma quid 374. curatio ibi	
Sparganium	541	dem	
Spartos	ibid.	Staphylinus	542
Specularium	542	Steata	542
Specularis lapis	ibid.	Steatoma quid 306. Curatio ibid.	
Sphacelos quid 291. Curatio	292	Stegnosus	10
Sphæron emplastr. ad ardore	621	Stellio transmarinus	342
Sphincter	203	Stellionis transmarini morsus re-	
Spiræsup	332	media	ibid.
Sphongion malagma	631	Stercus 508. Canum ibid. Puero-	
Sphragis polyida	588	rum ibid. Luporum ibid. Capril-	
Spica nardi 524. Indica, Syriaca		lum ibid. Bubulum	ibidem
ibidem		Stercus caprillum	262
Spina alba	472	Sterilitatis remouenda ratio 250.	
Spina Aegyptia vel Arabica ibi.		& deinceps	
Spine gutturi quomodo eximan-		Sternutamenta quæ citent	166
tur	382	Sternutamenta in febribus quomo	
Spirandi difficultas	179	do curentur	98
Splen, vide Lien		Stigmata quomodo curanda	282
Spodium	542	Stimmi	543
Spondylion	544	Stæba	ibid.
Spondyli	50	Stomachus quomodo aduratur	396
Spongia	542	Stomachus atrabile vitiosus quo-	
Spongus	ibid.	modo curandus	192
Spongiarum lapides	517	Stomachi exundationem impedi-	
Spontanearū lassitudinū tres spe-		tia	I
cies, earū curatio II. & deinceps.		Stomacho in febribus quæ cura ad-	
Spuma nitri	481	hibenda	94
Spumæ argenti potæ signa 361. re-		Stomachi dolores convulsorij quo-	
media	ibidem	modo curandi	195
Sputi notæ	76	Stomachi affectus curantia	191
Sputum cruentum curantia	177	Stomachi rofionem emendantia	I
Squama	515	Stomatica Aegyptia	597
Squamæ Cypriæ pondus & modus		Stomatica medicamenta	595
utendi	559	Strabismus quid, & quomodo cu-	
Squatine	50	retur	158



*I N D E X.*

Strangulatorum curatio	173	Suspiriosi qui	179.	Eorum curatio
Stratiotes	543	ibidem		
Strobilinare sina	537	Syca		544
Strobilus	45	Sycamina		45
Strum quid	385.	Syce		544
ibid m. ubi oriantur ibidem. curaio	ibidem	Sycomora		46
Grume quomodo curande	299	Sycomorus		544
Strutiocameli	46	Sycosis quid eiusq; curatio		150
Strychnon	543	Symphytum petraeum		544
Stultitia unde fiat	126	Symptomata & morbi puerorum dentientium & eorum curatio ibi dem & sequentibus		
Sturnorum stercus	509	Synanche		173
Stypteria	543	Synopes in febribus caussa & re media		ibidem. & 90
Styrax	ibid.	Syntexis		48
Styracis albi pondus, & utendi modus	559	Syntexes quomodo curari debeant		92
Suber	551	Syriasis quid		6
Succidanea inuicem medicamenta		Syriasi succurrentia		ibid.
652. & deinde per totum cap.		Syrica		46
Succinum	496	Syrmaismi		54
Sudor	498	Systole pulsus		63
Sudorem elicientia	22			
Sudori in febribus quid adhibendum	96	T		
Suffimenta	645	TAbes quomodo curetur		186
Suffimen rosatum	ibidem	Tali articulus luxatus quomodo reponendus		464
Suffocatorum curatio	173	Talus bubulus		528
Suffusio	375	Tamarix		523
Sugillata quomodo curetur	168	Tarichos		545
Suilla caro	47	Taurocolla		ibidem
Suillus talus	528	Taurinum cornu		504
Sulfur quomodo coqui debeat	649	Taurorum sanguis		471
Sulfurata aquae quibus conferantur	24	Tauri recens occisi sanguinis potus nota 359. remedia		360
Sulphur	497	Taxis		541. & 357
Suppurationem oculorum curantia	155	Tecolithos		517
Surditatis remedia	163	Tede		484
Susinum compositum	640	Tela è corpore quomodo extrahenda		429
Susinum oleum	ibidem	Telephion		546



# INDEX.

<i>Telis</i>	<i>ibidem</i>	<i>Thalassion hydor</i>	496
<i>Tellina</i>	545	<i>Thalasseros</i>	607
<i>Temperamentorum ordines</i>	468	<i>Thaliolum</i>	496
<i>interualla</i>	468	<i>Thapsia</i>	497
<i>Temperamenti optimi notæ</i>	28	<i>Thapsia quomodo coquenda</i>	651
<i>Tenesmus quid, unde oriatur, &amp;</i>	198	<i>Thapsia quæ pericula nonnunquam</i>	
<i>quomodo curetur</i>	198	<i>afferat 362. eorundem remedia</i>	
<i>Tenue corpus quomodo impleatur</i>	<i>ibidem</i>		
28		<i>Theion</i>	497
<i>Tephra</i>	546	<i>Thelypteris</i>	<i>ibidem</i>
<i>Terra</i>	485	<i>Theodotion minus</i>	804
<i>Terra quomodo coquenda</i>	650	<i>Theriace antidotum quomodo pare-</i>	
<i>Terre intestina</i>	483	<i>tur 570. Eius vsus</i>	571
<i>Terra tuber</i>	549	<i>Theriace pastilli quomodo fiant</i>	
<i>Terebinthus quid, eius causse, notæ</i>	570		
<i>&amp; curatio</i>	297	<i>Thermarum differentia &amp; vires</i>	
<i>Terebinthina resina</i>	536	<i>24. &amp; deinceps.</i>	
<i>Terebinthina ad aluum subdu-</i>		<i>Thermos</i>	497
<i>cendam quantitas &amp; exhibitio-</i>		<i>Thlasia</i>	433. & 434
<i>nis tempus</i>	20	<i>Thlasia aurium</i>	163
<i>Terminthos</i>	545	<i>Thlaspi</i>	497
<i>Teste</i>	529	<i>Thoracis morbos quæ signa prae-</i>	
<i>Testes aphthæ ulcere pressi quomo-</i>		<i>dant</i>	54
<i>do curandi</i>	229	<i>Thridax</i>	497
<i>Testicularum caro excrefcens quo-</i>		<i>Thronus Marcellius pastillus</i>	588
<i>modo amouenda</i>	<i>ibid.</i>	<i>Thus</i>	515
<i>Testiculi inflammationis notæ</i>	230	<i>Thuris lachryma quomodo coquen-</i>	
<i>229. curatio</i>	230	<i>da</i>	651
<i>Testiculus quid</i>	406	<i>Thuris manna</i>	519
<i>Testiculi animalium</i>	47	<i>Thylacitis</i>	524
<i>Testicularum inflammationes quo-</i>		<i>Thymbra</i>	498
<i>modo curandæ</i>	300	<i>Thymus</i>	497
<i>Testiculariū tēperaturæ notæ</i>	35	<i>Thymus</i>	233
<i>Testium conseruatio</i>	225	<i>Thymus locorum muliebrium</i>	415.
<i>Testudinis marinae sanguis quomo-</i>		<i>quomodo excindendus</i>	<i>ibidem</i>
<i>do preparetur 348. Eius vsus ibi.</i>		<i>Thymi naturalium quid 403. eorū</i>	
<i>Tetrastrophacum emplastr.</i>	611	<i>differentia ibi. curatio</i>	<i>ibidem.</i>
<i>Tettiges</i>	545	<i>Thynni pregrandes</i>	50
<i>Teucrion</i>	546	<i>Tibiæ fracturæ quomodo curandæ</i>	
<i>Teutlon</i>	<i>ibidem</i>		
	449		



# INDEX.

<i>Tilia</i>	551	<i>Tripolium</i>	548
<i>Tiphodes febres</i>	83	<i>Triticum</i>	43 & 538
<i>Titanus</i>	547	<i>Trixago palustris</i>	540
<i>Tishymalus</i> 546. <i>Eius septem species</i>	ibidem	<i>Troglodytes passer</i>	548
<i>Titianus pessus</i>	648	<i>Tryglion</i>	658
<i>Tonsilla</i> 380. <i>Eius caussa</i> ibid. <i>Cu ratio</i>	381	<i>Trygon</i>	548
<i>Tonsillarum inflammationi resistentia</i>	171	<i>Tryx</i>	ibid.
<i>Tophos in artubus quid coalescere impediatur</i>	263	<i>Tuberum facultates</i>	43
<i>Tophi articularum quomodo curandi</i>	264 & 266	<i>Tubercula ani quomodo manu curanda</i>	424
<i>Tophorum commune</i>	266	<i>Turdi</i>	46
<i>Tormina quomodo curentur</i>	199	<i>Turtur</i>	ibid.
<i>Torpedines</i>	50	<i>Turturis sanguis</i>	471
<i>Torpedo marina</i>	529	<i>Tusis</i>	175
<i>Toxicum unde dictum</i>	359	<i>Tusim continuam pastillus curas</i>	178
<i>Toxici poti notæ</i> ibid. <i>Remedia ibidem</i>		<i>Tusis in febribus quomodo occurrendum</i>	97
<i>Trachoma quid, eius curatio</i>	150	<i>Tusis grandines &amp; calculi ex petore educiti</i>	175
<i>Tragacantha</i>	547	<i>Tusilago</i>	483
<i>Tragium</i>	ibid.	<i>Tusicula puerorum curatio</i>	4
<i>Tragoriganum</i>	ibidem	<i>Tylosis</i>	150
<i>Tragositodes</i>	ibidem		V
<i>Tragus frumentaceus</i>	ibid.	<i>Vaccinum lac</i>	484
<i>Terebinthus</i>	545	<i>Valetudini tuenda summum otium maxime obest</i>	40
<i>Tremoris origo</i>	144	<i>Varices</i>	409
<i>Triblium</i>	658	<i>Varicosus varix</i>	ibid.
<i>Tribolos</i>	547	<i>Vari quid &amp; quomodo curantur</i>	168
<i>Tribulus</i>	ibid.	<i>Vasa quomodo diuidantur &amp; quibus</i>	565
<i>Triches</i>	548	<i>Vasorum adustio quomodo administranda</i>	366
<i>Trixagion quæ curent</i>	151	<i>Vena sectio quomodo administranda</i>	391. & deinceps
<i>Trichismus</i>	434	<i>Venena</i>	347
<i>Trifolium</i>	537	<i>Venenorum simplicium enumeratio</i>	351
<i>Trigle</i>	547		
<i>Trigonus pastillus</i>	585		
<i>Triorchis</i>	528		
<i>Triphyllon</i>	537	<i>Venter</i> 507. <i>Mergi</i> ibid. <i>Gallinarum</i>	



# INDEX.

rum ventris interior membrana	tio	ibidem
ibid. Palumbi ibidem. Musſele	Vesica morbos quæ signa præcedans	
ibidem	55	
Ventriculi affectus curantia	191	Vesica morborum signis neglectis
Ventris morborum signis apparen-		quæ ægritudines sequantur ibid.
tibus quid faciendum	54	Vesica resolutio
Venter quomodo emolliendus	56	213
Ventriculus animalium	46	Vesica resolutionē comitantia ibid.
Ventriculi temperatura notæ	32	Vespertilionum sanguis
Ventriculi status vnde generentur,		471
et quomodo curentur	195	Vestis attrita fragmentum
Ventriculi intemperies quomodo cor-		535
rigantur	37	Victus nauigantium
Veneris ardorem obtundit ruta	16	26
Veneris commoda	ibid.	Victus ratio omnium ætatum 6.
Veneris impotentia 231. causſæ ibi-		et deinceps
dem. Curatio	ibid.	Victus ratio infantum
Veratrum	425	ibid.
Veratri albi assumpti noxæ quomo-		Victus ratio in laboribus vitam a-
do curandæ	362	gentium
Veratrum quibus conueniat	557	25
Veratrum quomodo exhibeatur		Victus ratio senum 12. et sequen-
568		tibus
Verbascum	551	Victus ratio quolibet anni tempore
Verbenaca	531	quæ seruanda
Vergiliarum exortus quid efficiat		24
in hominibus	56	Vigiliæ quomodo arceantur
Veri quæ victus ratio cōueniat	24	52
Vermes terreni	486	Vigiliarum variæ causſæ
Vertebrarum contusionis, et fractu-		ibid.
re notæ, et curatio	444	Vigilijs in febribus quomodo resi-
Vertiginis curatio	128	stendum 92. et sequentibus
Verruca quid 428. vnde sic nomi-		
netur ibid. Curatio	ibid.	Vinum album
Verruca pensilis	233	51
Vesicæ affectus quomodo dignoscen-		Vinum dulce
di, et curandi	207	50
Vesicæ calculi signa	404	Vinum meracioris copiosi assumpti
Vesicæ clystere	403	remedia
Vesicæ exulceratæ signa 410. Cura-		362
		Vini moderate sumpti commoda
		51
		Vini immoderati sumpti incommo-
		da
		ibid.
		Vinum omne nutrit
		50
		Vini potio in febribus quando con-
		ueniat
		78
		Vinum purgans in hydropicis
		562
		Vinum rubens et crassum
		50
		Vini vires
		ibid.
		Viola
		498
		Viola alba
		515
		Violaceum oleum
		640
		Vipera
		494
		Vipe



# INDEX.

<i>Viperatum maris tū fœmina mor</i>	<i>Vmbilici prominentis curatio</i>	226	
<i>sus notæ 343. Curatio</i>	<i>ibid.</i>	658	
<i>Vires quæ dissoluant</i>	72	<i>Vnedon</i>	492
<i>Viride emplastr. Macherionis</i>	622	<i>Vnguenta quomodo coquant.</i>	610
<i>Virulentorum præcautiones</i>	334	<i>Vnguentum Zosimi ad tremulosce</i>	
<i>Viscum</i>	498	<i>lebratum</i>	636
<i>Vitis nigra 475. Satiua</i>	<i>ibidem</i>	<i>Vngues</i>	50
<i>Vitrum</i>	549	<i>Vngues qui laborauerint, vt absce-</i>	
<i>Vituli marini</i>	50	<i>dant</i>	271
<i>Vlcus simplex quid 307. Quo-</i>	<i>modo curandum</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Vlcus cauum quomodo implendum</i>	309	<i>Vnguio oculorum, quid eiuq; cura-</i>	
<i>Vlcera sordida quomodo purganda</i>	310	<i>tio</i>	154
<i>Vlceri cicatrix quomodo inducen-</i>	<i>da</i>	<i>Vnguio petrygiū quid 426. caus</i>	
<i>313</i>		<i>se ibidem. Curatio</i>	<i>ibidem</i>
<i>Vlcera carcinode quomodo curen-</i>	<i>tur</i>	<i>Vngues cruenti quomodo curand.</i>	
<i>300</i>		<i>271</i>	
<i>Vlcera chyronia quomodo curanda</i>	299	<i>Vngues contusi quomodo curandi</i>	
<i>Vlcera capitis manantia vnde fi-</i>	<i>ant 113. quomodo curentur. ibid.</i>	<i>ibidem</i>	
<i>¶ 114</i>		<i>Vnguio reduuia quid 270. cu-</i>	
<i>Vlcerum vermes quomodo arcendi</i>	310	<i>ratio</i>	<i>ibidem</i>
<i>Vlcera oculorum eorumq; curatio</i>	152	<i>Vocis exercitatio qualis esse debeat,</i>	
<i>Vlcera cacoethe</i>	315	<i>¶ quæ eius sint commoda</i>	9
<i>Vlcera chironia, telephia</i>	<i>ibid.</i>	<i>Volatilia</i>	46
<i>Vlcera vetera quomodo cur.</i>	299	<i>Vomenti quid observandum</i>	19
<i>Vlcera articulorum quomodo cu-</i>	<i>rentur</i>	<i>Vomitum quomodo provocandus</i>	54
<i>320</i>		<i>Vomitu qui vti debeant, ¶ quomo-</i>	
<i>Vlcerum disruptorum curatio</i>	319	<i>do 527. ¶ sequentibus</i>	
<i>Vlcus circa os sacrum vnde proue-</i>	<i>niat</i>	<i>Vomitum quæ comod. præstet</i>	19
<i>106</i>		<i>Vomitionis bilis quomodo occurren-</i>	
<i>Vlophonos</i>	357	<i>dum</i>	102
<i>Vmbilico illita quæ purgent</i>	566	<i>Vranium</i>	606
<i>Vmbilici prominentis causæ</i>	397.	<i>Vreteres</i>	210
<i>notæ ibid. Curat.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Vrina 529. Humana ibid. Pueri</i>	
		<i>venerem non experti ibid. Mulo-</i>	
		<i>rum ibid. Caprarum, Chamelo-</i>	
		<i>rum</i>	<i>ibid.</i>
		<i>Vrinam cientia</i>	55
		<i>Vrinarum color aquosus, rufus, ¶</i>	
		<i>biliosus, mediocriter pallidus quid</i>	
		<i>significet</i>	7
		<i>Vrinæ difficultas quomodo cu.</i>	213
		<i>Vrin</i>	



# INDEX.


Vrinae difficultatē indicantia	ibid.	Vua passa	480
Vrinae incontinentia unde oriatur		Vulpes	474
214		Vulva vide Muliebres loci	
Vrinam quæ moueant	19	Vulvæ abscessus quomodo manu curandus	416
Vrinam mouentia	220		48
Vrinarum notæ	75	Vulvæ animalium	
Vrinae retentionis causæ	403	Vulvæ fluor 239. Eius species, & causse ibid. notæ ibid. Curatio ibidem	
Vrsorum sanguis	471		
Vrtica	ibid.	Vulvæ ostij phymus quomodo curetur	416
Vteri abscessus notæ 242. Curatio ibidem		X	
Vteri affectus	235	Anthion	525
Vteri callus quomodo curand.	253	Xanthion medicamentum	594
Vteri cancrorum species 244. notæ ibid. Curatio	ibid.	Xerophthalmia quid eiusq; curatio	148
Vteri clausuræ, quam phinon appellant causæ 250. Curatio	ibid.	Xestēs	658
Vteri duricies quomodo curanda		Xiphion	525
245		Xyris	ibidem
Vteri hæmorrhoides quomodo deprehendende 253. Curatio ibidem		Xyraphium medicamentum aduersus capitis & menti ficosæ exanthemata	114
Vteri inflammationis causse 240. Signa ibid. Curatio	ibid.	Xyris	525
Vteri fluor, vide Muliebris fluor.		Xyster	605
Vteri à naturali sede declinantis curatio	241	Z	
Vteri mola	246	Armala	524
Vteri vlcera pascendo serpētia quomodo curanda	243	Zea	494
Vua 381. Curatio	ibid.	Zingiber	ibid.
Vue	44	Zomos	495
Vue inflammatio quomodo curanda	172	Zopyrios medicamentum	580
		Zosimi unguentum	636
		Zyme	495
		Zythus	ibid.

*FINIS INDICIS.*
















Inna vixit velox Inuoluit nona Luna  
Inna vixit velox Inuoluit nona Luna